

7588
HIERONYMI

TRAGI DE STIRPIVM, MAXIME

EARVM, QVAE IN GERMANIA NOSTRA NASCVNTVR,

usitatis nomenclaturis, proprijsq; differentijs, neq; non

temperaturis ac facultatibus, Commentariorum

Libri tres, Germanica primum lingua cons

scripti, nunc in Latinam conuersi, In

terprete DAVIDE KYBERO

Argentinenli.



*mus - C.
Tab - 69^a*

n^o 13

HIS ACCESSERVNT A'FRONTE PRAEFATIONES DVAE:
altera D. CONRADI GESNERI Tigurini, Medici clarissimi, rei herbariae scriptorum, qui in hunc usq; diem scripserunt, catalogum complectens: altera ipsius Auctoris, herbariae cognitionis laudes, & alia nonnulla scitu tum necessaria, tum iucundissima, continens.

PRAETEREA, COROLLARI VICE ADCALCEM OPERIS,
adiectus est Benedicti Textoris Segusiani de Stirpium differentijs, ex Dioscoride secundum locos communes, Libellus, omnibus plantariae cognitionis studiosis utilisimus.

AD HAEC INDICES SEX: QVIBVS NON TANTV

Nomenclaturae Graecae, Latinae, Germanicae, Arabicae, Hebra-


icaeq; sed & morborum curationes optimo ordine

indicantur, subiunximus.



**Cautum est Privilegio Caroli V Imperatoris, ne quis intra
septennium Typographus à se impressum ædat: aut
aliunde empta uendat.**

*Ex Bibliotheca ff. Predicatorum Parisiensis. Conu. S. Amant. 6^{ta} Martii
ad S^m Bonaventuram*



ILLVSTRISSIMO, CLARISSIMOQVE PRINCIPI, AC

DOMINO, D. VVOLFANGO PALATINO APVD RHE-
num, Duci Bauariæ, Comiti Veldentiæ, &c.

Domino suo clementissimo.

S. D. P.



VIREGIBVS, PRINCIPI

bus, aut magnatibus labores suos literarios nuncupare solent, princeps illustrissime: ij mihi tribus potissimum rationibus moueri uidentur. Non solum enim ornamentum quoddam lucubrationibus suis hoc pacto adferri existimant: uerum etiam cum ea bonorum uirorum fors semper fuerit: ut pro immensis in gratiam Reipub. exhaustis laboribus, inuidia uicissim ipsi grauentur: ac quæ prauitas improborum est hominum, calumniam effugere raro possint: defensores ac propugnatores aduersus iniquos suos necessitate coacti quærunt. Accedit huc alia non minus grauis, quam iusta causa: quæ uiros doctos impellit: ut in fronte lucubrationum suarum, magnorum principum, præsertim eorum, qui non tantum nobilitate, & antiquitate generis, sed uirtute quoq; & rebus præclare gestis clari sunt, laudes, ac præconia præmittant. Etenim si uirtus sola cum in omni hominum genere, tum uero in principibus uiris, maxime quando ueræ religionis studio, eruditioni, et opum splendori coniuncta fuerit, laudabiles eos efficit, in quibus est, & immortalitatem mereatur: institutum istorum omnibus modis & probandum, & sequendum imitandumq; iudico. Neq; uero adulationis suspic

cio in hanc consuetudinem cadere debet, quoniam nulla alia ratione principum, & nobilium laudes à doctis hominibus celebrantur: nisi ut ad posteritatem uirtutis exempla, quibus illa tanquam præscripto in rebus agendis uti, & ad uirtutis studium incitari possit, transmittantur. Hoc sane consilio ueteres, et classicos illos scriptores usos fuisse nerisimile est: dum sui quisque temporis Imperatoribus, regibus, principibus, alijsque magni nominis uiris sua inscribunt uolumina. Sed quorsum tandem hæc, dicet aliquis, eua det oratio? Nempe eo: ut intelligat Clementia tua, tum ex his, tum ex ijs quæ paulo post subiiciemus, nequaquam uanas fuisse causas, ob quas Hieronymi Tragi de stirpium natura commentarios, à me latinos factos, sub illustrissimo C. T. nomine in lucem prodire uoluerim. Quanquam autem, ut de postrema causa non nihil dicam, non tantum generis, uerum etiam uirtutis insignibus, atque ornamentis quamplurimis ac maximis C. T. præditam omnes boni agnoscant: tamē ea dicendi facultate me minime instructum, tenuitatis meæ probe mihi conscius, libenter fateor: quantam illustrissimæ T. Clementiæ ornamentorum magnitudo requirere uidetur. Nemo enim est, qui nesciat Christianæ, & purioris religionis, bonarumque literarum amore incredibili, studioque flagrantissimo incensum C. T. animum. Quæ duo quam claros efficiant, & æternitatis gloria uerè suspiciendos Principes: & sacræ, & humaniores literæ satis docere nos possunt. Neque hic cæteras uirtutes enumerare uolo: hoc est, animi celsitudinem, prudentiam, iustitiam, clementiam, humanitatem, & fortunæ bona, (hæc enim animi sunt, & paucis uere tribui possunt, hoc præsertim nostro sæculo) quibus Rex regum, Dominus dominantium,

Princepsq; principum, Deus Opt. Max. Clementiam tuam
ornauit, decorauitq;. Quamobrem consultius esse arbitror, tanti
Principis laudes non attingere, quam non satis ornatè, atque co-
piose, quod merebantur, exponere. Adde, quod summos, clas-
sissimosq; Principes, magnos etiam, ac eruditione & eloquen-
tia insignes, quibus ego infimæ sortis homuncio, nullaq; uel eru-
ditione, uel eloquentia instructus, adiungi nec debeo, nec possum,
collaudare, & celebrare decet. Si namq; Atheniensis ille ciuis
infimi generis homo, licet consilium optimum inuenisset, illud ta-
men non ipse, sed alium autoritate pollentem exponere uoluit, (ne
ob personæ suæ uilitatem consilium ponderis minus haberet) si
hic inquam laudatur: propterea quod non solum quid, uerum etia-
am à quo ea dicantur, quæ ad omnes pertinent, considerandum
duxit: quanto rectius ego facio, quod ab eo argumento abstineo,
quod cum amplissimum sit, & magnam requirat eloquentiam: à
summis, & excellentissimis uiris tractari debeat. Itaque ad reli-
quas duas causas uenio (ne nimium sim prolixus) quæ instituto no-
stro magis quam hæc, cuius modo mentionem fecimus, fauere ui-
dentur. Etenim quemadmodum Sol almus luce sua inferiorè mun-
dum illustrat, nihil interim ab eodem splendoris recipiens: ita non
dedignabitur, ut speramus C. T. nostrum opus illustrissimo suo no-
mine exornare, illustrareq;, etiam si nihil, aut minimum ex illo ad
C. T. redeat splendoris. Quanquam non omnino dedecori,
quin potius laudi, & ornamento, quantum iudicamus, quocunque
tandem loco à zoilis Tragi habeatur, fuerit. Cum namque
hactenus inter Germanos nostros tanto fauore exceptum fuerit:
ut pleriq; uel doctissimi omnibus cæteris hos de Stirpium natura

commentarios præferre non dubitarint, (absit inuidia dicto) nobis pollicemur omnibus bonis, reiꝫ herbariæ studiosis exterarũ quoꝫ nationum gratissimos futuros. Vnde non parum laudis, & existimationis ad C. T. accedere poterit. Cuius enim tuus est T. ragus, nec uulgaris, & magno loco apud C. T. habitus. Ex quo intelligunt omnes C. T. doctos homines amare, et fouere: summisꝫ laudibus extollent C. T. uerè principem animum: qui cum eruditionis non sit expers: eruditos quoꝫ & humaniores literas magni faciat. Norunt enim omnes, non solum eos, qui Ecclesiastico, & Scolastico munere in principatu C. T. funguntur, uerum etiã consiliarios eiusdem prudentia, sapientiãꝫ, & eruditione excellere. Sed quid de Consiliariorũ, ludi moderatorum, et Ecclesiæ ministrorum eruditione dico? Cur nõ potius C. T. doctrinam quæ ab ineunte ætate haud uulgari imbutam illam scimus, prædico? O populum fœlicem, cui talis princeps contigit: qui cum sapientissimus ipse sit, sapientes etiam habeat consiliarios, doctosꝫ in omni functionũ genere uiros. Nescio sanè utri gratuler: populo ne, cui pietas ipsa, & sapientia præesse uidetur: an uero C. T. quæ tot, & amplissimis donis à Dco opt. max. ornata est. Sed quia, ut ante dixi, ingenij mei tenuitas, & uitæ conditio obstant, quo minus laudes C. T. celebrare oratione possim: pergam deinceps, & reliquas exponã causas, quæ me eo impulerũt: ut C. T. hos de Stirpium natura commentarios à me latinitate donatos offerre. Hoc enim persuadeat sibi C. T. ea me uerecundia præditum: ut nunquam ad amplissimam C. T. aulam accessurus, & C. T. quam intelligo nunc politicis, & grauissimis negotijs occupatam, interpellaturus fuissim: nisi me necessitas, cui nulla ratione obistere potui, coëc-

tui, coegisset. Nam ut nihil magni, aut eximij in conuertendo hoc scripto præstitisse me agnosco: ita non paruo me exposui periculo. Nullū enim studiorum genus existit: quod plus laboris minus uero laudis, et præmij propositum habeat: ipsa authorum ex lingua hac in illam traductione. Ac ferendum quidem erat, si nihil illi gloriæ, & remunerationis accederet: modo non uituperationis, et calumniæ plurimum à malignis hominibus expectandum esset. Reperias etenim quamplurimos, qui cum ipsi Reip. in hoc studiorum genere inferuire, aut non possint, aut non uelint (fruges ut opinor tantum consumere nati) alios, qui pro uirili in id incumbunt: ut spartum, quæ ipsis obtigit, exornēt: repræhensionibus suis, ac linguæ uirulentia, à coeptis nonnunquam deterreāt, auocentq;. At qui conatus horum, & fauore prosequendi, et promouendi erāt: debebantq; iniusti rerum æstimatores illi cogitare: id quod prudentissime dictum à Græcis est: *μωμεῖς δὲ μὴ δῖος ἔσθ' ἄνθρωπος, μωμεῖς δὲ δὲ πᾶσι χαλεπὸν*. Facillimum enim est alienum opus reprehendere: sed non perinde facile, aliquid simile, aut præstantius elaborare, atq; conficere. Præsertim in hoc curriculo: quod multis prodesse queat. Sed & inter doctiores (quod ualde deplorandum existimo) nonnullos reperias: quibus nihil placet, nisi quod ipsi elucubrārūt: qui & alios siue pares sibi, siue impares ferre nequeunt. Hinc illæ æmulationes, hinc concertationes, hinc calumniæ, hinc deniq; conuitia: quibus mutuò sese literati homines (si modo literati nominandi sunt, qui ab omni humanitate sunt alienissimi,) sæpenumero conficiunt, proficiscuntur. Vt quamplurima hodie scripta uidere sit: quæ bonis, & modestis hominibus authores suos nulla alia de causa inuisos reddant: quàm quod illi calumniæ potius, quàm ueri

tatis studio digladiari uideantur. Proinde dubium mihi non est: quod multis doctissimis uiris, & ipsi Trago, (contra quem quosdam calamum iam strinxisse, nō ita pridem audiui) euenit, hoc me effugere nequaquam posse. Erunt namq; qui quoniam Tragum lingua patria Germanis suis de stirpibus differentem ferre non potuerint: multo minus in linguam Latinam transfusum eius opus tolerare uelint. Vnde quamcumq; illum calumniandi uel ab interprete, uel aliunde occasione arripere conabuntur. Quod uero ad meam attinet translationē: de qua in Præfatione ad Lectorem plura dicturus sum: non dubito quin in aliquibus uel mentē authoris non satis expressisse, uel nō satis eleganter, ut decebat, reddidisse nonnullis uideri possim. Ac non diffiteor, eam me elegantiam, & perspicuitatem ad hoc opus minime attulisse: quam uel ipse desiderabā, uel alij expectabant: & inerūt fortasse aliqua magno quoq; huic operi errata. Sed meminerint hī, ingenui esse hominis, quæ emendanda sunt emendare: neq; propterea ab uno, & altero errato uniuersum opus damnare, dirisq; execrationibus proscindere: et quod inuidorum est ingeniū, etiam bene dicta sinistra interpretatione notare. Ex his quæ hucusq; diximus princeps illustrissime, (ne longius mea euagetur oratio) facile intelliget C. T. quo in loco res nostræ uersentur: quæ nobis ab iniquis nostris pericula immineant: & quid à zoilis utriq; expectandum sit. Nam, ut ante dixi, haud dubie mei quoq; mihi non deerunt Momī: præsertim, cum authorem plærisq; inuisum, in linguam latinam conuerterim. Quæ quoniam ita se habent: quid quæso nobis reliquum est: nisi ut defensorem, & propugnatorem, qui nostram aduersus maleuolos tueatur causam, quæramus? Neq; uero aliud quidq; cupimus,

cupimus, nisi ut commentarij isti siue germanici, siue latini; quo animo à nobis scripti, & conuersi sunt: eodem ab omnibus legantur, & iudicentur. Non enim in hoc æditi sunt, ut uel auctori, uel interpreti quidquam gloriæ adferant: alijs uero qui idem argumentum tractant, aliquid detrahant: sed ut rei herbariæ studiosis, si non excellentes, at nonnullas commoditates apportarent: nosq; inter eos inueniremur: qui pro uiribus Rempub. dono sibi à Deo Opt. Max. collato iuuare uoluisse uiderentur. Ac nihil moramur, quo loco hæc nostra habeantur: sicut nec inique ferimus, si scripta aliorum nostris laboribus præferantur. Sit sanè suus cuiq; honos: & quam quisq; auctoritatem meretur, eam obtineat: modo cessant inuidia, & calumniandi studium. Exposui non tantum commune utriusq; hoc est auctoris, & interpretis periculum, uerum etiam quis noster in æditione huius operis animus sit, paucis, et obiter perstrinxi: quod & iustam, & necessariam nos petere defensionem. C. T. agnoscat. Quare ut ambagibus, quas uerecundia in petitionibus ingenuis hominibus suggerere solet, omisis, quod uolo paucis absoluam: T. C. magnopere rogo, atq; obsecro, ut hos commentarios, qualescunq; esse alijs uideantur, aduersus iniquos nostros iudices tueri atq; defendere dignetur. Porro in bonam spem uenio: nullam hoc in negotio nos repulsam passuros: neq; grauatim huius operis defensionem C. T. suscepturam esse. Neq; uideo (pace C. T. dixerim) quæ ratione uel patrociniū nobis recusare, uel consilium quo freti, quidquid id est, quod in hoc opere ornando præstitimus, T. C. dedicare non dubitauimus, improbare possit C. T. Si enim uel authorem ipsum, uel opus respicere uelimus: cui potius nuncupanda erat hæc Cōmentariorum Tragi trans-

latio: aut quis illius aduersus uilitigatores patronus magis legitimus esse potuit T. C.? Meminit haud dubie C. T. opus Germanicum in ditione C. T. cœptum, confectumq; , ac illustrissimæ Principi, et Dominae. D. Elizabethæ, ex clarissima Cattorum Principis familia prognatæ, matri C. T. Principi omnium uirtutum genere clarissimæ, cum primo partu in lucem æderetur, dedicatum esse. Cui ergo idem opus iam latinum factum nuncupari iustius debuit, quàm T. C. præsertim linguam latinam haud uulgariter callenti? Iam cum Tragus ciuis C. T. sit, & ciues suos defendere Principum uirorum peculiare sit officium: etiam eorum liberi (quibus merito accenseri debent hæ studiosorum quasi foeturæ, ac tanquam opellæ) non solum à principe suo ius ciuitatis habent: sed etiam optimo iure defensionem ab eodem sperant, atq; expectant. Ego autem tametsi C. T. ciuis non sim: tamen non tantum ciuibus tuis faueo, id quod officium qualecunq; quod in conuertendis Hieronymi Tragi commentarijs præstiti, declarare potest: uerum etiam C. T. insignia ornamenta ueneror, & suspicio. Cumq; ingenui homines quorumcunq; erga se studium, & animi propensionem laudandam semper existimauerint: hanc animi nostri quo erga C. T. affecti sumus, significationem gratam futuram speramus. Nec dubitamus, quin pro insigni beneuolentia, quatum bonas literas, & liberalia studia, tum eorum sectatores, & amatores C. T. complectitur, hoc quoque opus commendatissimum habituram. Quod cum fecerit, non solum nos, uerum etiam omnes rei herbariæ studiosos, quibus hæc scripta, & translata sunt, immortalis sibi deuinciet beneficio. Sed ne plus æquò C.

T. molesti

T. molestissimus, finem epistolæ nostræ imponimus: si prius C. T. rogauerimus: ne in malam partem nostram interpretetur inopportunitatem. Precamur autem Deum Opt. Max. æternū Dominū nostrī Iesu Christi patrem: ut gubernacula rerum, quæ C. T. commisit, ita fortunare dignetur: ut ad gloriam sanctissimi eius nominis, & C. T. ac subditorum omnium æternam salutem cedant, Amen. Argentina, anno salutis M. D. LII. mense Martio.

Clementiæ Tuæ

deditissimus .

*David Kyberus
Argentinensis.*

DAVIDIS KYBERI AD CAN- DIDVM LECTOREM PRAEFATIO.



IDEO PLERISQVE, HYMANISSE LECTOR,
qui auctores uel conuertendos, uel enarrandos susceperunt, cum fere morem esse: ut quaedam in laudem tum auctoris, tum libri praesentur. Ego uero in praesentia neque de auctore, neque de opere eius quicquam dicere constitui, non tantum quia uino uendibili suspensa hedera opus non est, ut uulgatum habet prouerbum: uerum etiam quia

& auctoris nostri, & diuinissimae rei herbariae cognitionis laudes copiose in praefationibus duabus, quae sequuntur, expositae sunt. Itaque omissis his ad alia pergemus, & de versione nostra non nihil dicemus. Hanc equidem non ostentandae eruditionis, (quam nullam, aut perexiguam nobis inesse satis scimus) aut gloriae aucupandae gratia suscepimus: sed eo nomine (quod norunt & D. Vuendelinus, & D. Tragus alijque nonnulli, qui eius rei mihi auctores fuere) ut, quemadmodum nostris germanici, ita exteris latini de stirpibus Tragi commentarii prodesse. Cum namque ingratitude & inuidia nihil magis detestandum mortales ducant, sane non uideo, quo pacto utriusque sceleris suspicione liberare nos queamus, si quae nostra profert Germania, quorum ad omnes ex aequo pertineat utilitas, ea alijs communicare nolumus. Atqui nisi omnium ingraticissimi uideri uelimus, negare non possumus ab exteris nationibus cum in omni bonarum literarum genere, tum uero in re herbaria plurimos, & praestantissimos in Germaniam nostram inuectos libros. Iam ut non tantum gratitudinis significationem aliquam demus: uerum etiam hos qui sumptibus, & laboribus in id incumbunt, ut quam amplissimis nos sibi deuinciant beneficijs, ad tam diuina, & utilia studia magis magisque incitemus, & incendamus, aequum esse iudico, ut & nos illis candide nostra impertiamus. Eo certe studio Latinitati hos commentarios donare uoluimus: ut intelligant omnes nihil nobis prius esse: quam ut & nostros homines & quoscumque alios nostra iuuemus opera. Proinde rogamus omnes rei herbariae studiosos, ne uel temere, uel inuidiose, sed ut candide, & in bonam partem nostros labores, bono animo a nobis susceptos iudicent, interpretenturque. Tametsi enim eam perspicuitatem, elegantiamque orationis, ad hoc opus minime attuli, quam res ipsa postulabat: tamen optima fide in his commentarijs conuertendus usum me esse intelliget, quicumque Latina nostra cum Germanicis contulerit. Ac non dubito quin aequos iudices habiturus sim eos qui labores nostros penitus introspecterint, candorisque uel minimum habuerint. Nam reliquos

reliquos qui omnia reprehendere solent, aut certe nil nisi errata, & uitia arripere, quo prauitatem, ingenij sui quod malum est & confusione quadam malis quam bonis plus afficitur, scilicet prodant, negligendos prorsus existimo. Quod si hi omnino pergant nobis esse molesti, hoc unum illis imprecabimur, ut & ipsi aliquando tantum laboris in eiusmodi studio consumere cogantur, quantum nos ad conuersionem istorum commentariorum insumpsimus. Cæterum luce clarius apparebit (ut puto) non tam facile esse proprios labores suscipere, quam alienos reprehendere. Ac non dubitarim si tam prodesse Reipub. cuperent, quam eos, qui hoc pro uiribus conantur reprehendere parati sunt, quin longe candidius alienos essent iudicaturi labores. Sed relinquamus hos sibi, qui admoneri se non patiuntur. Nec illorum iniquitatem, quæ non magis alijs nocet, quam se ipsam prodit, morari ingenuos homines decet. Nos ad institutum nostrum accedamus. Nam quid in hoc opere præstiterimus: & quæ in translatione nostra candidum lectorem obseruare uelimus, paucis præfationis loco præmittere operæ pretium duximus. Primum ergo sciat humanissimus lector, bona nos fide (quod Interpretis officium esse sentimus) id reddidisse, quod Germanici habebant Commentarij: nullis quod equidem sciam, omissis, paucissimis uero mutatis. Nihil enim immutare uoluimus, nisi ubi uel ordo, uel perspicuitas, quæ duo in omni oratione magnum habent momentum, id requirere uidebantur. Neque enim ita uerbis alligatum atque astrictum interpretem esse oportet, ut ab illis discedere interdum non liceat, præsertim ubi linguarum, & phrasæ dissimilitudo nos admonet, urgetque. Quam autem à Latina phrasi Germanica interdum discrepet, nemini qui utramque linguam callet, arbitror esse obscurum. Adde quod author ipse mutandi, subtrahendi, & ad probatissimorum scriptorum exemplaria corrigendi hos commentarios potestatem mihi fecerat, maxime quod ad nomenclaturas attinet. Quanquam in alieno libro, tantum iuris mihi sumere, neque etiam tantum iudicio meo tribuere uolui, ut quod ad rem ipsam attinet mutare quicquam conarer, nisi ubi manifesta me cogerent errata, à quibus neminem mortalium plane liberum esse iudico. Et si fidelis interpretis est, summum studium, maximamque adhibere diligentiam, ut quoad eius fieri potest, non solum proprijs usitatiscum in conuertendo utatur uerbis, uerum etiam errata, quæ uel oculatissimis quandoque obrepunt, è medio tollat. Iam neque nomenclaturas, in quibus sæpe prolixus est Tragus, castigare, mutare, aut abrogare uolui, tum quod iudicio meo, quoniã solus in uasto hoc opere laborabam, nequaquam fiderẽ, tum etiam quia plerique suas afferebant causas, ob quas hæc omnia essent relinquenda. Quos enim prolixitas hæc offendit, illi uno, & altero nomine obseruato, reliqua legendo præterire possunt, & ad uirium explicationem properare. Rursum

quibus

quibus grata est diligens rerum inuestigatio, illi habebunt quod legant: Mihi certe, ut ingenue fatear quod sentio, inter conuertendum, per sæpe molesta fuit tam proluxa de nominibus disputatio, dum tot auctores, quorum testimonijs frequentissime Tragus utitur euoluere cogor: sæpe etiam iucunda fuit. Non raro superuacanea, sæpissime uero utilissima & necessaria uisa est. Porro adieciimus nos quarundam plantarum historijs Hebraica nomina, non quæ ipsi cõfinxissimus, quod nonnullos fecisse uideo, sed ea maxime quæ uel in Biblijs, uel Rabbīnorum, & Talmudistarum scriptis extarent: ideoq; ubiq; fere testimonia locorum, unde ea desumpsissimus, adieciimus. Verum enim uero ex Phrisio ab initio quædam mutuati sumus, cuius nos postea poenituit, cum perpenso illius scripto nihil illo insulsius extare deprehendimus. Non pauca autem apud Hebræos inuenimus uocabula, quæ Serapionis plantarum appellationibus exacte respondent, ut uidere potes in Mandragoræ, Citri, & quarundam aliarum plantarum historia. Oramus autem rei herbariæ studiosos: ut æqui, boniq; faciant hanc nostrā opellam, quam aliquando Deo fauente, ubi plus otij nacti fuerimus, exponere, atque exornare studebimus. Cæterum dum ex Dioscoride testimonia adducimus: Vergilium Marcellum in capitum distinctione, Ruellium uero in versione sequimur. In Theophrasto citando nonnunquam Græci exemplaris in quo decem de plantarum historia extant libri, interdum Gazæ, qui nouem tantum libros conuertit, partitione usi sumus, cuius rei lectori rem admonere placuit, ne hæc illum diuersitas turbaret. Diligenter autem & summo studio rei herbariæ scriptorum loca, quæ ab Authore adducuntur, in omnibus capitibus annotauimus: ut si minus hæc nostra translatio quibusdam satisfaciat: ad primos fontes se conferre possint. Nam licet pro uirili, propria, & rei herbariæ accommodata phrasi, singula reddere conatus sim: tamen fieri non potest, ut in tam ampla materia aliquando non peccetur: id quod doctissimis uiris contigisse uidemus. Hermolai enim Barbari translationem sæpe emendat Marcellus Vergilius, & hunc non raro Manardus & Ruellius corrigunt: sicut nec ipsam Ruellij conuersionem in omnibus eruditīs placere uidemus. Quid mirum ergo si idem mihi aliquando usu ueniat: quod doctissimis quoque accidisse perspicuum est. Nolim tamen sciolos (eruditorum enim limam non subterfugio, quin imò gratias magnas illis habeo, si non solum erudire, sed & candide errata nostra emendent) impetu quodam, & temeritate nostra inuadere, quæ quanto nobis labore constiterint, quantaq; diligentia usi fuerimus, dum in conuertendis his commentarijs, quindecim ad minus rei herbariæ scriptores perlegimus, phrasimq; eorum imitari conati sumus, & nos experti sumus, & alij testabuntur, qui & ipsi in hoc studiorum curriculo aliquando uersati sunt.

AD LECTOREM.

sunt. Qui ergo adeo præceptis sunt iudicij, si prius reliquos euoluant herbarios tam ueteres, quam recentiores, ac diligenter nostra cum Germanicis conferant, postea iudicent, sed cum candore, & æquitate. Cæterum consilio excellentissimi Medici Domini Conradi Gesneri, libellum Benedicti Textoris, cuius argumentum, & usum facile ex inscriptione, & Præfatione cognosces, coronidis uice adiecimus. Subiunximus & senos indices, summa à nobis confectos diligentia. Quod si non per omnia uotis respondeant: ignoscat nobis candidus lector. Nihil enim adeo elaboratum conficiunt homines, quod non aliqua parte imperfectionis particeps sit. Et cogitet humanissimus lector solum me, & alij studijs, pluribusque negotijs occupatum hæc Commentaria in lucem ædenda adornasse: nec aliorum auxilio adiutum, nisi duorum adolescentum, qui uno, & altero indice colligendo auxiliares nobis manus præbuerunt. Hæc ferè sunt, quorum candidum lectorem admonere uoluimus. Et quia longis in hoc opere absoluendo laboribus defatigati, ac fracti propè sumus: hic subsitemus, rogantes rei herbariæ studiosos, ut hilari fronte nostros labores suscipiant: & Tragum uirum bonum ac bene de hoc studij genere meritum, ea beneuolentia, qua uiros integerrimos, & Reipub. utilissimos complecti solemus, prosequantur. Vale.

CONRADI GESNERI MEDICI TI GVRINI AD REI MEDICAE STUDIOSOS PRAEFATIO;

*in libros de natura Stirpium Hieronymi Tragi, in qua enumerantur
qui de plantis quouis modo in hunc usq; diem aliquid
litteris prodiderunt.*



NON PARVA HAEC SAECVLÏ NOSTRI PER
Dei gratiam foelicitas est, quod partim nostra, partim pa-
trum nostrorum memoria, literarum artium atq; scienti-
arum fere omnium indigna, tum in uerbis tum in rebus,
& rerum cognitione barbaries, à bonis & eruditis uiris
depelli, & pristinus Græcæ Latinaeq; linguarum nitor in
integrum tanquam postliminio reuocari & restitui cœpit. Vnde mox om-
nes scientiarum thesauri, linguarum ceu clauium & instrumentorum usu,
patefacti, & optima uariarum rerum in sacris humanisq; literis cognitio,
à qua priorum aliquot sæculorum homines iam diu exclusierant, bonis &
studiosis omnibus tanquam in penetralia admissis, referata communica-
taq; est. Eodem autem tempore ut reliqua naturalis philosophia & Medi-
cina, sic & stirpium historia paulatim renata, diuersisq; nationibus quasi
certatim exulta est, ita ut nullo unquam ante nos sæculo ad tantum fastigi-
um peruenisse uideatur. Quamuis enim multa à ueteribus tradita nobis in
cognita sunt, uel quia illi descriptiones singulorum accuratas non relique-
runt, uel quia regiones nostræ non proferunt: multo plura tamen alia me-
dicamenta, in plantarum genere imprimis, priscis ignota, certè non prodita,
ætas nostra agnoscit & usurpat foeliciter. Verum esse quod dico facile cõ-
stabit, illi qui numerum ueterum pharmacorum, quæ pleraq; omnia Dio-
scorides descripsit, & rursus eorum quæ hodie ab hominibus eruditis no-
rata, & literis illustrata sunt, inter se contulerit. Neq; id mirum, facile enim
maiorum inuentis pauca semper paulatim adiunguntur: & ut Ascræus ille
ait, pauca etiam sæpius adiecta, magnum deniq; cumulum efficiunt.

Quoniam uerò illorum qui rem herbariam & uniuersam plantarum hi-
storiam prodiderunt, auxerunt, illustrarunt, per diuersa tempora, natio-
nes, & linguas magnus est numerus, nomina singulorum, quotquot me-
moriam complecti & ab alijs memorata colligere in præsentia potui, ordine
quodam recensere uolui. Primum igitur Græcos, deinde Latinos uetères,
tertio Arabes, quarto recentiores, qui tum latinè tum alijs linguis hodie uul-
garibus scripserunt, literarum in singulis seriem secutus enumerabo. Nam
temporum ordo in multis ignotus nobis est, & quinam alijs doctius aut
utilius scripserint iudicium tum difficile tum inuidiosum. Poteram
eos pri-

eos priuatim numerare quorum scripta extant: poteram pro ipsa tractationis differentia catalogos instituere. Scripserunt enim quidam grammaticæ tantum, ut nos in catalogo nostro, ubi nomina solum interpretamur. alij historicæ, ut Oribasius ex Dioscoridis: & nos quoque in historia nostra, descriptionibus tantum expressis, facultatibus uero omissis præterquam communibus quas paucissimis efferri licebat. Galenus & eum secuti, Aëtius, Ægineta, uires & facultates ferme tantum exposuerunt, hoc est, modice scripserunt. alij philosophicæ & physice, ut Aristoteles, Theophrastus, & si qui alij plantarum genera, species, differentias, & partes secundum locos communes distribuerunt, aut causas inuestigarunt. est enim Physica quoque descriptio duplex, illam historicam, hanc ætiologicam Græci uocant. utroque modo ut Aristoteles animalium, sic stirpium Theophrastus historiam prosequitur. Quidam denique rusticæ, ut Geoponicorum & Cepericorum authores, qui sationes, plantationes & cultus uarios docuerunt. Alij forte etiam aliter, ut qui de coronis & floribus scripserunt, quique de odoribus, *κατακτινίδες, διακτινίδες, συνκακτινίδες*, & (ut ita dicam) *ὁ δὲ πρῶτος*. Possunt & *ἀσπινίδες* tractari, si quis eas explicauerit quæ tinctoribus & pictoribus utiles sunt. Aliqui illas tantum attigerunt quæ cibi aut condimenti usum præstant, *καρυεινίδες, ὑγίαντες, καὶ πρὸς ἰσχυρίην*. Qui de plantis magice & superstitiose scripserunt, ut Orpheus & Democritus, quem sæpe deridet Plinius, indigni sunt mentione. Sunt qui exsupradictis modis, duos tresue aut plures coniunxerint. Sunt quorum scripta partim extent, partim amissa sint. Quamobrem non inueni commodiorem simul facilioremque rationem, quam alphabeticam: cui hoc etiam accedit commodi, quod nihil opus sit eadem diuersis in locis repeti, id quod omnino faciendum fuisset tractationis discrimen sequenti: ut in Theophrasto, qui non physice tantum, idque bifariam, ut dixi, de plantis agit, sed etiam historicæ & medicæ passim, & similiter in alijs pluribus. Porro licet nonnulli recentiorum parum Latine aut doctè scripserint, & erudito hoc sæculo ab omnibus contemnantur, nolui tamen illos silentio præterire, quod harum rerum studiosi & curiosi homines, in plerisque omnibus etiam barbaris libris (quos ab ijs solis qui iam iudicio ualent, optimis legendis primum exercitati, uersari uelim) non inutilia quædam reperiuntur sint, quamuis & pauca, & uix digna fortassis ea temporis iactura quæ in istis inquirendis insumitur. Sed quidam adeo curiosi sunt, ut quodcunque studium sibi excolendum sumpserint, in eo ut excellant, minutatim omnia perquirant. Mihi quidem ipsi hæc authorum commemoratio iucunda est, & gratitudinis quoddam officium cuique pro scriptis & lucubrationibus suis, quibus posteritati consultum quantum in se esset quisque uoluit, hæc enumerandis ferme præstare mihi uideor.

CON. GES. PRÆFATIO
 GRAECI QVI DE PLAN-
 TIS SCRIPSERVNT.

AETIUS, uide in Cl. Galeno.

ALEXANDER Magnus, quære in Hermæ.

ALEXIAS rhizotomus, in Thrasya dicitur.

ANAXAGORAS physicus Philosophus citatur à Theophrasto de Hist. 32. ubi de generatione plantarum agit.

ANDREÂ qui multa superstitiose & arroganter scripsit, relinqui suadeo: & multò magis Pamphilum, qui ne in somnis quidem unquam uidit stirpes illas, quarum effigies describere conatur. Tales enim homines, ut et Tarentini Heraclides eos comparabat simillimi sunt præconibus, qui fugitiui alicuius mancipij, etiam nunquam ab eis conspecti, notas quas auditu acceperint describunt: & tanquam incantationis alicuius uerba proferunt, ne si proxime quidem astaret, illum quem describunt cognituri, Galenus. *Κῆρυκας ὁ περιφωρῶς, ὁ γὰρ Ἀνδρῆας ὁ ἱερὸς* (hæ enim cæteræ diligentius hanc partem tractasse uidentur) utilissimas radices multas herbascq; aliquot inde scriptas reliquerunt. Veruntamen pro antiquioribus testandũ illud est, in paucis quæ tradita ab eis fuerunt, quod exactum erat eos tradidisse, Dioscorides.

Brunfelsius Andream Chium herbarum scriptorem in primo Dioscoridis libro memorari ait: ego Ghij cognomen (ut sic appellem quod gentile est) nusquam legisse memini. Nam Plinius etiam Andreâ medicũ per sepe citans, primum libro uicesimo, deinde sex proximè sequentibus, patriæ nomen, quod equidem sciam, nusquam adiecit.

Andream medicum de serpentibus, & de ijs quæ falsò creduntur scripta quædam reliquisse author est Athenæus, Eiusdem libri qui *Νόστις* inscriptus sit meminit Scholiastes Nicandri in Theriacis.

Androcides animaduersa brassicæ naturæ uitæ infensa, ex eadem remedium contra uinũ & ebrietatem inuenit, Theophrastus circa finem libri quartide hist. pl. & ex eo mutuatus Plinius 17. 24. qui raphanũ uocem Græcam reliquit, Gaza melius brassicam transtulit. Idem nimirum fuit Andracydes, quando & temporis ratio congruit, qui (ut refert Plinius 14. 5.) ad regẽ Alexandrum scripsit: Vinum potaturus, o rex, memento te bibere sanguinem terræ, &c.

ANDROTION author est myrtum & oleam maximè purgatione egere, Theophrast. de hist. plan. 2. 8. Idem à Varrone & Columella nominatur inter rei rusticæ scriptores quorum patria ignoratur: item à Plinio inter eodem, libro 8. & 10. 14. 15. 17. 18.

ANTIGONI cuiusdam uerba de lauro & dauco refert Nicandri Scholiastes in Theriacis.

APOLLODO.

Appollodorus de odoribus scripsit, Plinius lib. 21. & 13. Idem lib. 20. & 24. Appollodorum Tarentinum & alterum Cittiensem, ambos medicos commemorat.

Appollonius medicamenta parabilia conscripsit, Galenus in præfatione lib. 6. de simplicibus, ubi simplicium pharmacorum scriptores enumerat. Non exprimit autem cuius is fuerit, cum plures hoc nomine medici fuerint, ut Antiocheni duo, Memphites, Pitaneus, & quartus cognomento Mys. Memphytem quidem aliquid de plantis condidisse ex Scholijs in Nicandri Theriaca constat. Claudij Appollonij medici secundo de antidotis Galenus meminit. Sed parabilium remediorum scriptores alij etiam plures sunt, qui non ex professo de stirpibus, sed obiter quædã de eis prodiderunt.

Archigenes inter recentiores medicos in therapeuticis suis libris multapassim de usu remediorum scripsit Galenus.

Archilochus cytisum ait utilem esse pecori, quia lac auget, Nicandri Scholia in Ther.

Aristenas ceu qui de plantis aliquid scripserit, Ibidem.

Aristogiton anonymon herbam celebravit, Plinius.

Aristophilus pharmacopola Plataicus vires quasdam herbarum mirabiles compertas sibi esse dicebat, Theophrastus de hist. plant. 9. 19.

Aristotelis de plantis libri obscuri sunt, propter illam per diuersas linguas mutationem obscuriores etiam facti. Transtulit eos Andreas de Lacuna, & alius quidam innominatus. Citantur alicubi ab Athenæo. Noui Augustini Niphi coniecturam, qui Theophrasto adscriptos libros Aristotelis esse putat: & duos illos breues Aristoteli attributos, Theophrasti esse non probo.

Aristotelis problemata de stirpium genere & oleraceis, problematum eius sectione 36. leguntur.

Asclepiades medicus citatur a Plinio libris 7. 15. 20. & alijs septem deinceps. Plurima autem de eo scribit lib. 26. cap. 3. item lib. 7. cap. 37. & lib. 25. cap. 1.

Nemo æque de omnibus medicamentis simplicibus scripsit, ac Dioscorides, nisi quis etiam Tanitrum Asclepiadis (Τάνιτρον τοῦ Ἀσκληπιάδου) laudet, qui sane meretur laudari, præterquam in ijs ubi causas rerum assignare conatur, Galenus. Ego Tanitrum libralicuius inscriptionem esse, coniicio, cuius author sit Asclepiades.

Asclepiodorus Alexandrinus a puero ferebatur præcipuissimi inter æquales ingenij & doctissimus esse, ita ut curiosius de quauis re obuia interrogaret siue naturali siue artificiali. Itaque breui tempore omnino perceperat tum colorum quibus tinctores utuntur mixtiones omnes, & omne genus tincturæ ad uestes pertinentes, item innumeras lignorum differentias, &

quomodo fibræ ipsarum secundum rectum differrent, aut quomodo contextæ essent. Quin & lapidum herbarumque uariarum facultates ac species, tum communiter tum rariorum, omnibus modis ab eo inquirebatur ac inueniebantur. Quamobrem multum negotij facessabat rerum singularum professoribus, sæpe illos conueniens, & singulatim quam accuratissime inquirens. Plantarum quidem historiam maximi faciebat: & magnis etiam animalium, partim ipse suis oculis perdiscens & explorans quantum poterat, partim inquirens ab alijs quam diligentissime, & omnia de iisdem ueterum scripta perlegens &c. Suidas.

B Bassus Tylæus, uide in Sextio Nigro.

Julius Bassus (homo Romanus aut Latinus saltem,) Græce de medicina scripsit, citatus à Plinio lib. 24. & 26.

Bion Solensis citatur à Plinio cum alibi, tum libris 14. 15. 17. 10. in quibus de uitis, arboribus & agricultura docet, & libro 28. Cæcilius Bion qui scripsit, *περί Ἀνθρώπων*, inter externos: Cæcilius uero medicus simpliciter libro 29. inter Latinos auctores.

C Cæcilius, lege Bion.

Callimachus & Mnestheus medici apud Græcos de coronis priuatim scripsere, quæ nocere capiti, Plinius 31. 3.

Callimachum de trifolio scribentem Nicandri interpres in Theriacis citat.

Castrius, Celsennius & Firmus Cepurica, i. de re hortensi scripserunt, Plinius lib. 19. inter Latinos auctores.

Celsennius in Castitio dictus est.

Chæreas Atheniensis aliquid de plantis scripsit, circa carduos & spinas diligentissimum teste Plinio lib. 20. cap. 23. Citatur & ab eodem libris 8. 12. 14. 10. 17. 18.

Chrysippi uolumina referta herbarum mentione inuenimus, Plinius. Idem lib. 20. Chrysippus medicus, inquit, priuatim uolumen Brassicæ dicauit, per singula membra hominis digestum.

CL. Galeni libri doctissimi de simplicibus medicamentis extant undecim, pro quibus ut plurimum illi debere nos fateor: ita miror tam doctum & excellentem hominem, & diuinijs omniq; occasione noua experiendi affluentem, non solum tamen plantas nouas nullas descripsisse, neque ueterum nomina sui sæculi, aut aliarum linguarum nominibus interpretatum esse, uerum etiam plurima à Dioscoride alijsq; tradita præterisse. Quod forsitan fecit, quod in ipsa arte elaboranda plus temporis ponendum existimaret, & materiam medicam satis abunde nobis suppetere, magisq; ut ea quæ in promptu & communia sunt penitus cognosceremus secundum primas & secundas singularum qualitates, & insuper experientiam, opus esse putaret, quam multis, uarijsq; & incertis nouis absque fine perquirendis occupari.

curpari. Hæc excusatio etiam si alicuius momenti est, non omnino tamen mihi satisfacit. nam ne in illis quidem quæ tradit, experientiam suam nobis approbat: cum in plurimis appareat eum de facultatibus stirpium, earumque gradibus, ut uocant, non eo quo debebat modo pronunciare, a primis qualitatibus ad secundas progrediendo, aut ex gustu & sapore de eis iudicando: sed uice uersa, ex secundis qualitatibus quas Dioscorides aliique eis attribuunt, de primis iudicium ferendo: quod ut fieri aliquando potest, cum simplices remediorum sunt facultates, ita cum eadem partibus & uiribus diuersis constant, fieri non potest, multo minus uero ex tertijs qualitatibus secundas ac primas inuenire est, at secundas & tertias ex primis, facilius atque certius. Hinc equidem coniectio plantas illas in quibus eum iudicandis quo dixi modo errare contigit, uel ignotas ei prorsus, uel per negligentiam uel quod nimium suo iudicio tribueret, inter scribendum non gustatas esse, aut ullo experimento probatas. Hæc & nostra iam olim fuit sententia, & postea Valerium Cordum, & alios quosdam a simplicium medicamentorum cognitione laudatos homines similiter sensisse intellexi. Eandem reprehensionem & maiorem etiam merentur, Ægineta, Aëtius, & Oribasius, qui similiter ut Galenus aliorum ante se multa medicamenta omisit, sic ipsi multa Galeni, & insuper tantum eius authoritati tribuerunt, ut ne latum quidem unguem ab eius iudicio usquam discesserint, & nihil ferre prorsus de suo adiecerint: sed omnia sua ex Galeno uel eiusdem uerbis, uel breuius aliquanto repetierint. Itaque hac in parte multo magis laudauerim Arabes, qui inter cætera quæ a Græcis mutuuntur, multa passim de suo & Græcis incognita addiderunt, sed his ut hoc facerent maior occasio fuit, ut qui in alia orbis parte, & posteriores tempore uixerint. Attribuitur etiam Galeno de simplicibus liber ad Paternianum qui latine tantum & si parum latine circumfertur, nullo interpretis nomine adiecto: neque equidem ex Græco translatus puto. Græce non extat. Capita sunt 299. enumeratis ordine alphabeti Latini medicamentis. Insunt Barbara quædam & Arabica uocabula. Nihil fere, ni fallor, in eo legitur quod non ab alijs authoribus melius & purius traditum habeamus. Item de centaurio minore libellus.

Galeni librum de 46 plantis habemus cum commentario Humain, Gentilis.

Clæodemii sententiam de generatione plantarum adfert Theophrastus de histo. pl. 3. 2. ubi Græce *κλæδου* legitur, alibi uero *κλæδου*, Clidemus, ut lib. 5. cap. 12. de causis, ubi de morbis arborum loquitur: & eiusdem operis libro primo cap. 10. causam inquirens cur calida hyeme potius germinet, æstate frigida.

Clæophanti medici nomen frequens legitur in historia Plinij a libro 20.

usque ad 27. lib. 26. uini rationem ab eo illustratam scribit: & alibi utxisse eum ante Asclepiadem.

CRateuas, Dionisius, Metrodorus, de herbis Græce scripserunt, ratione blandissima, sed qua nihil pene aliud quam rei difficultas intelligatur. Pinxere namque effigies herbarum, atque ita subscribere effectus. Verum & pictura fallax est, & coloribus tam numerosis, præsertim in æmulatione naturæ, multum degenerat transcribentium sors uaria. Præterea parum est singulas earū ætates pingi, cū quadripartitis uarietatibus anni faciem mutant. Quare cæteri sermone eas tradidere: aliqui ne effigie quidem indicata, & nudis plerumque nominibus defuncti, quoniam satis uidebatur potestates uimq; demonstrare quærere uolentibus, Plinius: a quo passim citatur lib. 20. & septem proxime sequentibus.

Crateuas rhizotomus, diligenter quidem scripsit quæ scripsit de radicibus & herbis, sed multa præterijt, Dioscor. Galenus reprehendit illos qui herbarum et aliorum remediorum cognitionē ex libris et descriptionibus, quam præceptoribus repetunt: & similes eos ait esse *τοῖς ἐν τοῖς βιβλίοις νοσφιστάς*, id est, nauium gubernatoribus qui artem ex commentario aliquo hauserint. Si quis tamen, inquit, huiusmodi descriptionibus egeat, nemo tam miser (aut imperitus) est, qui in Dioscoridis, Nigri, Heraclidæ, Crateuæ, & aliorū quæ plurimorum qui in arte ista consenuerunt, libros sit neglecturus.

CRateuæ *ῥιζοτομὸν* Nicandri Scholiastes in Theriacis allegat ubi etiā legimus inuenisse eum Thapsum herbam in Thapso insula una a Sporadum.

Extat ad ipsum Hippocratis epistola, quæ eū laudat tanq; optimū rhizotomon, qd & ipse exercitatus sit in hac arte, & a maioribus eam acceperit:

D DAlion herbarius citatur a Plinio lib. 20. cap. 17. & sequentibus aliquot libris, & in iisdem etiam DAmion medicus.

DAmocrates trimetris iambicis iberidem herbam celebravit in libro qui Clinicus inscribitur, quos recitat Galenus libro 10. de comp. phar. sec. locos in cura ischiadicorum, alibi etiam tum eodem in opere, tum in eo qd est de compositione secundum genera, & libro secundo de antidotis, uersus ipsius de medicamentis quibusdam compositis refert.

Seruilis Damocrates inuentor & buccinator herbæ quam iberida appellauit, qua cum omnes suos ægros curabat, Plinius 25. 8.

DEmocritus peragratius Persidis, Arabiæ, Æthiopix, Ægyptiq; magis, uolumen de herbarum effectu composuit, & similiter Pythagoras, Plinius. Citatur Democritus apud Theophrastum de hist. plant. 1. 8. & de causis 2. 16. & 6. 1. Ex duobus quidem prioribus locis ipsum etiam de plantis, quod ad causas, literis mandasse non nihil satis clarum fit.

Democritus in libro Chirocinetam inscripto de herbis quibusdam magicis mirabiles effectus tradit, quos repetit Plinius 24. 17.

DE REI HERBARIÆ SCRIPTORIBVS.

Diagoram medicum de plantis aliquid composuisse apparet ex frequen-
ti eius citatione apud Plinium libris 12. 13. 20. & sequentibus aliquor. Libri
quidem uicesimi capite 18. mentionem eius facit in opio seu papaueris succo
parando.

Dieuches multa obiter de usure mediorum scripsit in therapeuticis suis.
uoluminibus, Galenus, Citatur etiam passim a Plinio lib. 20. & septem deinceps.
De Brassica priuatim scripsit, eodem teste.

Diocles Carystius rationalis sectæ medicus & herbariæ medicinæ stu-
diosus fuit, aliquoties citatus a Galeno, Plutarcho, Scholiaste Nicandri in
Theriakis; item a Plin. lib. 20. & 7. sequentibus.

Dioclis Carystii uolumina, qui secundus ab Hippocrate ætate fama-
q; extitit, referta herbarum mentione inuenimus uolumina, Plinius 26. 2. idem
Galenus testatur. Achæneus huius Dioclis *ὕλην* citat.

Diodotus, Niger, & Perronius medici, Asclepiadæ omnes, commentarios
de usitata materia medica scripserunt, &c. Diosc. uide in Nigro. Plinius libro
20. circa finem capitis octauī, Petronius Diodotus (inquit) qui Antilegome-
na scripsit, in totū damnauit serin, multis modis arguens. Eundē (Petroniū
Diodorū) aliq̃ties libris quatuor sequentibus nominat, & Diodoti Empti-
rica lib. 20. cap. 12.

Diogenes Physicus philosophus citatur a Theophrasto de hist. plant. 3.
2. ubi de generatione plantarum agit.

Dionysius scriptor *πρωτογράφος* memoratur a M. Varrone de rer. rusti. 1. 1.
Plinius Dionysium effigies herbarum pinxisse ait, ut in Crateuarecitali.
Idem alibi sepe in plantarum mentione Dionysii medici autoritate utitur,
libris 12. 13. 20. & septem deinceps, & Salustij Dionysij medici libro 32. cap.
7. ex ramis remedium describens.

Dionysij *πρωτογράφου*, Nicandri in Theriakis Scholiastes adducit.

Dioscorides, uide Pedacius.

Diphilus Siphnius medicus reliquit librum de alimentis, uel ut Athe-
neus citat *πρωτογράφος ποσίων, τοῖς νοσήσι καὶ ὑγιαινόντων*, in quo multa passim de stir-
pibus & alimento ex eis docuit.

Epænetus de oleribus scripsit, Scholiastes Nicandri in Theriakis.

Episharmi medici mentio fit apud Plinium lib. 20. & septem deinceps.

Erastriati uolumina referta herbarum mentione inuenimus, Plinius.

Evax rex Arabum de simplicium effectibus ad Neronem scripsit, Pli-
nius, insinuat autem eum Græce scripsisse. Extat hodie libellus Latinis car-
minibus ineptis exaratis, qui in hunc regem authorem refertur.

Evdemus pharmacopola hac in arte facile princeps: & alter Chius Eu-
demus arte minime laudatus, nominantur 9. 18.

Eudamus hic fuisse uidetur cuius in Pluro Aristophanes meminisse, tanquam Pharmacopolæ annulos uendentis cōtra uenena & serpentium morfus.

Athenæus libro 9. Diipnos. ex Eudemi Atheniensis de oleribus libro uerba quædam recitat. Idem libro primo Euthydemi cuiusdam quæ de oleribus scripserit meminit.

EVryphōn in Therapeuticis suis uoluminibus passim quædam ad plantas pertinentia adfert, Galenus.

G Glaucias medicus aliquid de herbis conscripsit, circa carduos diligentissimus, referente Plinio lib. 20. cap. 23. Idem sequentibus etiam septem libris aliquoties eundem authorem nominat.

GLaucon bupleuron olus laudauit in medicina, Plinius 22. 22.

H Heraclides Tarentinus & Iolas Bithynus medicamenta simplicia paucis attigerunt, re herbaria prorsus relictæ, metallorum quoque & aromatum nulla mentione facta, Dioscorides in præfatione. Ego eos de radicibus & liquoribus potius quam de herbis egisse puto, nam & paulo post radices & herbas distinguit Dioscorides. Galenus hunc authorem de pharmacorum apparatu & delectu precepisse ait: unde uideri posset descriptiones ac uires, herbarum præsertim, præterisse: nisi rursus hæc Galeni uerba eodem in loco (in præfatione libri 6. de simpl.) legerentur: Si quis plantarum descriptionibus egeat, Dioscoridis, Nigri, Heraclidæ, Crateuæ & aliorum qui in arte ista consenuerunt, libros sibi comparabit.

Heraclides Tarentinus citatur à Plinio li. 12. & 13. & Heraclides medicus in eiusdem duodecimi libri authorum catalogo tanquam diuersus, quod mihi non uidetur. & libro 23. & quatuor sequentibus.

HERmæ Ægyptio attribuitur quidam liber continens herbas sacras triginta sex horoscoporum, ex quo Pamphilus æton, id est, aquilam dictam herbam commemorat, Galenus: addens, hæc omnia nugas esse, & ab authore excogitata, nec usquam in natura extare herbas illas triginta sex. Ego apud Aggregatorem sæpe inuenio Thessaliam quendam citatum; qui herbis nomina à zodiaci signis indit. Vidi & Iatromathematica Hermæ Trismegisto attributa in quo medicamenta aliquot simplicia, calida primum, post frigida enumerantur.

Apud Græcos est quidam liber Alexandri Magni de septem herbis septem planetarum: & alter, qui dicitur Thessali Mysteriū, & Hermes, id est, Mercurius de duodecim herbis duodecim signis attributis, & septem alijs herbis per septem stellas. Hi libri rectè huic operi præponentur, Gerardus Cremonensis in præfatione sua in libros Kiranidis à se translato.

HERophilus clarus medicina herbarum studiosus fuit maxime, unde & dictum ab eo serunt quædam fortassis etiam calcatas prodesse, ut refert Plinius.

nus 25.2. Hinc forte ancilæ medicæ calceis quasdam imponi iubent, ut chelidonium contra auriginem. Meminit eius etiam Galenus lib. 2. Therapeut. Et in præfatione in sextum de simplicibus, de usu remediorum multa passim in therapeuticis ipsius uoluminibus reperiri scribit.

Herophilo quanquam subtilioris sectæ conditori, ante omnes celebratam rationem eam (per herbas medendi, legimus;) Paulatim (post ueteres illos medicos) usu ad uerba garrulitatemq; descendēte. Sedere namq; in his scholis auditioni operatos gratus erat, quàm ire per solitudines, & quærere herbas alias alijs diebus anni, Plinius 26. 2. qui & sequente mox capite huius authoris meminit, & rursus 29. 1.

Hicetius de conditura uini scripsit, Plinius lib. 14. ca. 19. qui & inter medicos hunc authorem nominare solet libro 20. & septem sequentibus. Et 27. 4. Hicetius non parux authoritatis medicus anonymon herbam celebrauit.

Hippocratis qui primus medendi præcepta clarissimè condidit, referta herbarum mentione inuenimus uolumina, Plinius. Idem testatur Galenus in præfatione libri sexti de simplic. med.

Hippon etiam aliquid de plantis scripsit ut apparet apud Theophrastum 1. 6. & 3. 3. de hist. plant.

Iolas (*Ιολας*) Bithynus materiam medicam tractauit, sed imperfectè. Videtur de supra in Heraclide Tarentino. Apud Plinium ubiq; Iollas per l duplex scribitur: à quo citatur libris 12. 13. & 20. & sequentibus septem. et 33. 34. 35. In Nicandri Theriacorum Scholijs Iolaus pro Iola non rectè legitur.

IVbergis in Aphrica authoritatem sæpissime de plantis quibusdam peregrinis scribens adfert Plinius lib. 13. 14. & c. Nusquam autem ex professo hunc regem de plantis scripsisse puto, sed historias earum expeditionibus & peregrinationibus suis à se descriptis obiter inseruisse, ut animalium quoque.

Celebrauit inter alia herbam Euphorbiam, Plin. 25. 7.

IVlius Bassus, uide in Basso.

LYcus Neapolitanus medicus citatur à Plinio li. 20. ca. 20. ubi de atriplici scribit & aliquoties in septem deinceps libris, & alibi, semper inter externos, & inter medicos, ubi illorum nomina separat.

Manteas (*Μαντέας*) scripsit de medicamentis purgantibus, & clysteribus: Item de re medijs secundum partes corporis humani, Galen.

MEdius medicus citatur à Plinio lib. 20. & septem deinceps.

MEnander qui Biochresta scripsit, citatur Plinio libro 19. & octo sequentibus, neq; inter medicos numeratur, & si pleraq; omnia, ni fallor, ubi nominatur, ad plantas pertineant.

Menestor citatur à Theophrasto de hist. pl. 1. 3. & 5. 4. & 5. 10. & de causis pl. libro 1. cap. 21. & eiusdem libri cap. 26. in quibus locis omnibus

aliquid ab eo quod ad plantas pertineat proditum refertur. Item 2. 5. de cau-
lis.

Menetheus quidam, *αριθμῶς*, scripsit nomenclaturas pharmacorū, ut refert
Galenus in Glossis in dictione *βίμπας*. Sed quærendū an uox corrupta, neq̃
enim usitatum inuenio huiusmodi proprium nomen, nec etymon apparet.

Menodorus Erasistratus medicus fuit, Hicetij amicus, cuius de cucurbitis
scripta Athenæus repetit lib. 2. Sympos.

Metrodorus herbas depinxit: uide supra in Crateua. Plinius libro 21. &
sex sequentibus Metrodorum medicum non raro citat.

Mictionis (*Μικτών*) rhizotomica Scholiastes Nicandri in Theriacis ad-
ducit. Plinius libro 20. & septem sequentibus non Mictionem sed Mictio-
nem medicum nominat: & libro 28, Mictionem Smyrnæum.

Idem libro 20. cap. 23, Mictionis rhizotomum ena memorat, ego rhizo-
tomica potius dixerim.

MNesidis medici de opio sententiam Plinius proferit lib. 20. cap. 18. & li-
bris septem sequentibus, & lib. 13. & 33. 34. 35. sæpe hunc authorem nominat.
MNesthei Atheniensis medici uolumen *ἡπιδιούρ*, hoc est de ijs quæ in ci-
bo sumuntur, Athenæus prædicat lib. 2. Dipnos.

Mnesitheus de coronis priuatim scripsit quæ nocerent capiti, Plinius 31.
3. Eiusdem subinde mepinis lib. 20. & septem sequentibus.

MVfæus post Orpheum & Hesiodus, polion herbam mirati sunt, Pli-
nius 25. 1.

N Nicandri Poetæ Theriaca & Alexipharmaca extrāt, quibus passim mul-
tas herbarum descriptiones ac uires intermiscet. Citatur à Dioscoride (ut in
morsu cenchri) & Plinio. Et mihi quidem uidetur Dioscorides plurima à
Nicandro mutuatus, cum eadem præscribant in plerisq; omnibus uenenis
tum signa tum remedia, & herbis quas describunt notas easdem ferè attri-
buant, ut nihil apud Nicandrum sit quod non apud Dioscoridem quoq; le-
gatur. aut potius ambo ex uno quodam tertio sua descriperunt. Plinius Ni-
candri autoritate utitur libro 8. 10. 11. 20. & septem deinceps. Item 29. 31. 32.
36. 37.

Nlceratus medicus, uide mox in Nigro. Multa de re medica scripsit, sed
nihil tam probatur Cælio Aureliano q̃ commentarium eius de catalepsia.

Nominatur à Plinio lib. 31.

Niger, Plinio Sextius uel Sestius, Niger, homo Latinus Græce de medici-
na scripsit, Citatus à Plinio libros 12. 13. 14. 20. cum decem sequentibus, & 32.
33. 34. Qui plantarum descriptiones desiderat, Nigri, Dioscoridis & alio-
rū qui in arte ista consenuerunt uolumina facile sibi comparabit. Galenus.

Ego pleraq; à Plinio citata ex Sestio nigro, apud Dioscoridem reperio,
ut sunt loci de castoreo, salamandra, maluis, & nasturtio, in quo tamen quæ-
dam Plinius

dam Plinius è Sextio citat quæ apud Dioscoridem non leguntur, Recentiores, ut Bassus Tylæus, Niccratus, Petronius, Niger & Diodorus, Asclepiadæ omnes, communem notamq; omnibus & in uitæ humanæ usu quotidianam materiam exacta descriptione dignati, medicas remediorum vires, & probationes in decursu tradiderunt: non experientia rerum vires probationes & efficaciam metientes, sed uano de causis sermone usq; ad contentio nis tumorem, ubiq; rem extollentes & alia pro alijs aliquando describentes. Siquidem qui inter eos excellere Niger uidetur, multa passim falsa tradidit, unde apparet pleraq; non ut ipse uiderat, sed ex historia aliorumq; traditionibus docuisse, Dioscorides.

OLympias Thebana medicinæ perita, citatur frequenter à Plinio li. 20. O & septem deinceps.

OPhion medicus aliquoties legitur apud Plinium lib. 20. & sequentibus septem circa plantas & earum vires, et si impressi codices Ophion habeant. in catalogo quidem authorum, hoc est libro primo semper Ophion scribitur.

Nominatur & Ophilius medicus libro 28. Plinij.

ORibafius ex Dioscoride plantarum descriptiones ordine alphabeti digessit.

ORpheus primus omnium quos memoria nouit, de herbis curiosius aliqua prodidit, Plinius. Et mox, Orpheus & Hesiodus suffitiones commendauere.

Extant etiamnum huius curiositatis indicia in libro qui hymnos continet, siue huius siue alterius Orphæi, ubi semper quæ singulis dijs suffiri debeant, initio singulorum hymnorum nominantur.

PAmphilus de stirpibus uolumen edidit ordine literarum, in quo sæpe fabulas quasdam aniles recenset, & supersticiosa quædam describit, & incantationes quibus in eruendis herbis quidam utuntur: Quin et amuleta quædam et alia uana, non curiosa solum & extra rem medicam, sed et falsa omnia. Solent autem unicuique herbæ primum uaria nomina temere adijcere, ut Ægyptia, Babylonica, & quæ quidam peculiariter aut symbolice eis imposuerunt, (hinc nimirum adiectæ sunt illæ quæ in nonnullis exemplaribus Dioscoridis reperiuntur nomenclaturæ.) Deinde metamorphoses addit, si quæ hominum forte in stirpem mutatum esse in fabulis sit: tum incantationes, sacrificia & suffimenta quæ circa herbas eruendas à nonnullis obseruantur, & alias huiusmodi nugas ac superstitiones: cuius generis etiam hoc est quod herbas alias alijs dijs aut dæmonibus sacras facit, & quasdam à syderibus uel horoscopis denominat. Sed apparet eum nihil quam grammaticum fuisse, nec uidisse herbas de quibus scribit, ut supra etiam in Andrea dictum est) nec uires earum expertum esse, et quibusuis aliorum scriptis temere fidem adhibuisse, Galenus.

Pamphilus

Pamphilus in Glossis *ut p. 101* a Romanis inquit *ut p. 101*, appellari, Athenæus libro 3. Et alibi aliquoties citat Pamphili Alexandrini de nominibus & glossis librum. ego eundem hunc Alexandrinum grammaticum cuius Prati dictionū Suidæ dictionario accessit, de plantis etiam scripsisse puto.

PAulus Ægineta Galeni de simplicibus medicamentis libros in compendium redegit.

PEdaciū, uel ut alij malunt, Pedanius Dioscorides, Anazarbeus, miles sub Antonio & Cleopatra, omnem materiā medicā omnium absolute scripsit, Galeno etiam teste, &c. de quo plura in Bibliotheca scripsimus: & ipse de suo opere satis multa in præfatione dicit.

Dioscoridem cum ipsa Cleopatra uixisse Suidas author est, & libros uiginti quatuor medicinales ab eo conscriptos. Quos libros nihil aliud continere quam illos qui habentur puto, ordine uiginti quatuor apud Græcos literarum digestos, quo ordine etiam hodie reperiri eos audio.

PEtrichus, *ut p. 101*.

CAucalis illinitur & contra uenena marinorum, sicut Petreius in carmine suo significat, Plinius. 22. 22. Ego Petrichum hunc authorem esse puto, qui & carmine scripsit & Ophiaca, hoc est, remedia serpentium & ueneratorum, quæ a Nicædri Scholiaste aliquoties citatur, nec refert quod Pereius alibi etiam sæpe in Plinio legatur, item Petreius, & Petridius libro primo in catalogo authorum a libro 20. usque ad 27. semper .n. hoc nomen eodē ordine & inter medicos ponitur, ut a Petricho ubique corruptum facile intelligatur. Petridius qui Ophiaca scripsit, Plinius 20. 23. Hæc scripseram cum reperi Gyraldum in opere suo de Poëtis, Plinij loco supra citato ex libro 22. Petricum legere, sine aspiratione, nimirum emendatiore codice usum. Etiam si uero hoc in opere Petrichus de animalibus uenenatis eorumque remedijs agat, multus tamen obiter est in plantis etiam & earum uiribus scribendis.

PEtroniū, uide in Diodoro.

PHanias phisicus medicus qui de stirpibus scripsit, citatur a Plinio lib. 21. & sex deinceps. Athenæus Eressium & peripateticum fuisse scribit, quintum eius de plantis librum adducens libro tertio Dipsosophistarum, & rursus libro nono. Reperio & *quædam* aliquoties apud eundem per quod non placet.

PHilippus & Archigenes inter recentiores multa utiliter de usu remediorum simplicium in Therapeuticis suis uoluminibus scripserunt, Galenus in præfatione libri 6. de simp. Quidam pro Philippo hic Pamphilum legunt, sed perperam: cum Pamphilum Galenus omnino relinquendum, ut qui prorsus inutiliter scripserit, suadeat, neque ulli eius therapeutici libri ut Archigenis & Philippi ferantur.

Plinius 18. 31. Philippum quendam citat qui astronomicum aliquid reliquit.

Philip

Philippus Cous primus Empiricam separauit a logica, rationes accipiens ab Herophylo cuius discipulus fuit, Galenus in Isagoge.

PHilistion medicus nominatur a Plinio libro 20. & septem sequentibus ita ut appareat eum permulta ex plantis remedia tradidisse.

PHilotimi liber $\pi\eta\tau\eta\mu\eta\tau\eta$, hoc est, de alimentis memoratur Athenæo, libro secundo.

Phyllinus medicus nominatur a Plinio lib. 20. & septem sequentibus.

PListonicus & Praxagoras in therapeuticis suis uoluminibus non paucapassim de usu simplicium pharmacoporum docent.

Plistonici frequens mentio fit apud Plinium lib. 20. & septem deinceps, & 36.

PLutarchus etiam nominatur in Scholijs Theriacorum Nicandri, tanq̃ de herbarum aliquid scripserit, forte obiter tantum.

PRaxagoræ & Chryssippi uolumina referta herbarum mentione inuenimus, Plinius: qui passim eius autoritate utitur libro 20. & septem sequentibus. Vide in Plistonico.

PYthagoras mirabiles quosdam herbarum affectus tradit in libro quẽ quidam Cleomporo medico ascribunt, sed Pythagoræ pertinax fama antiq̃uitasq̃ uindicant, Plinius 24. 17.

Et alibi Pythagoras clarus sapientia, primus, (et̃ prius scripserit Orphæus, sed pauca quædam curiosa) uolumen de herbarum effectu composuit. Composuit & Democritus, ambo peragratis Persidis, Arabiæ, Æthiopix, Ægypti q̃magis.

Et alibi: Brassicam priuatim celebrauit, ut & M. Cato.

RVfus Ephesius libros quatuor de herbis hexametro carmine condidit, & multa passim remedia in therapeuticis suis libris describit, Galenus. Aldus olim Venetijs cum Dioscoride Græco carmina aliquot Græca de uiribus quarundam herbarum excudit, authoris incerti, quæ an Rusi sint alijs inquirendum relinquo.

SAlustius Dionysius. Vide Dionysius.

SARYrus quidam nominatur a Theophrasto de hist. plant. 3. 12. ita ut de plantis aliquid scripsisse uideri possit.

SERuilius Damocrates, uide Damocrates.

SExtius aliàs Sestius, uide Niger.

SIMus medicus super uiribus herbarum quarundam memoratur a Plinio, lib. 21. & tex deinceps.

SOlon Smyrnæus atriplex difficulter in Italia nasci tradidit, Plin. lib. 20.

SORanus Ephesius, qui sub Traiano & adhuc sub Galeno uixit, composuit libros aliquot pharmacorum, Cælio Aureliano teste.

SOsimenes medicus stirpium aliquot uires prodidit, citante Plinio libro 20. & quinque sequentibus.

Symeon.

Symeon Sethi librum de cibariorū & condimentorū facultatibus con-
didit Græce, quem & Latinum habemus Lilio Greg. Gyrardo interpr. te.
T Tanitrus uide in Asclepiade.

Themison celebrauit uulgarem herbam plantaginem uolumine de ca-
sedito.

Theophrasti libri de historia deq; causis plantarū, noti sunt omnibus
de quibus non nihil supra in Aristotele diximus, plura autem in primo To-
mo Bibliothecæ. Et in libris quidem de historia inscriptis, stirpium genera
species, ac differentias describens, historias quoq; passim siue descriptiones
& medicas facultates aliosq; usus admiscet. In libris uero de causis plane
physicum agit, uariorum quæ circa plantas eueniunt affectuum causas red-
dendo. Theodorus Gaza horum uoluminum interpres in multis rephen-
di potest, sensum, authoris non assequutus, ut ego ipse collatis plerisq; lo-
cis diligenter obseruaui. Idem dixerim de locis illis quæ ex hoc authore Plin-
ius transtulit.

Theophrasti *πυρινῶν* liber decimusquartus citatur à Scholiaste Nicandri
in Alexipharmacis, ubi os in persico caryon appellari docet.

De floribus scripsit Theophrastus apud Græcos; ex nostris autem inscri-
psere aliqui libros Anthologicon: flores uero persecutus est nemo quod e-
quidem inueniam, Plinius 21.3. Idem plerosq; libros sui operis Theophrasti
authoritate ornauit, nempe octauum & sex deinceps, & decimum sextum
cum tredecim sequentibus: & 31.35 36.37.

Thessalus, uide supra in Herme.

Thrasyas Mantinenſis radicū peritissimus habitus est, Theophr. 9. 17.
& 18. hist. Alexias quoq; eius discipulus ingenij plurimū ualuit acrimonia
nec infra illum bonis artibus fuit instructus. nam et reliquas medicinæ par-
tes, quas ille non tenuit, is egregie cōsecutus est. Idē 9. 17. hist. plant.

Timaristi medici mentio crebra apud Plinium lib. 21. & sex deinceps. Li-
bro 26. non recte pro Timaristo Tmiarchus scribitur.

Tlepolemus medicus subinde nominatur Plinio in describendis plana-
tarum uiribus libro 20. & septem sequentibus. Primus quidem liber, id est,
Catalogus authorum Theopolemum pro Tlepolemo perperam habet.
Nos libro 20. ca. 17. Tlepoletum legimus. Theopolemi certe nomen omi-
nosius est, quàm ut eo usus quisquam existimari debeat. Tlepoletus uero
usitatum est nomen, idem fere quod Menæchnus significans.

TRYphonis Alexandrini *πυρινῶν* siue *πυρῶν ἰσχυρίων* citat Athenæus lib. 3. tri-
bus in locis: & primo quidem secundum huius operis librum nominat.

TYkanion ceu qui de stirpibus aliquid condiderit à Scholiaste Theria-
corum Nicandri nominatur. Eundem esse credo Tyrannionē Messenium
philosophum, qui (Suida teste) de auspicijs & alia plura utilia scripsit.

Xenocrates

Xenocrates Aphrodisiensis homo curiosus & magicæ uanitatis non ex Pers, condidit antiphrasin super diuersis et peregrinis stirpium nominibus, Galenus.

Eundem esse puto quem Plinius inter medicos citat lib. 20. & decem sequentibus. Idem alium Ephesium nominat li. 12. & 13.

LATINI VETERES

Æmilius Macer Veronensis poeta, uolucres & herbarum facultates carmine prosecutus est. de quo Ouidius in libro de Tristib.

Sæpe suas uolucres legit mihi grandior æuo,

Quæq; nocet serpens. quæ iuuat herba Macer.

Meminit & Plinius Macri, eiusq; testimonijs utitur, item Galenus libro 6. Pharmacorum. Æmilius macer (inquit Gyraldus) patriam habuit Veronam, sed diu Romæ uersatus est, in poematis suis Nicandrum poetam imitatus, ut scribit Fabius &c. Huius Macri nomine corruptores quidam & plagiarij, de herbis opusculum, carmine quidem concinnatum, sed rude et barbarum in uulgus dederunt. In eo quoq; C. Plinius citatur, qui uno plus minus seculo post Macrum floruit. Plura uide in Biblioth. nostra.

Æmilij Macri autoritate utitur Plinius libris 9. 10. 11. & 17.

Antonius Castor.

Nobis herbas plerasq; omnes, inquit Plinius, (à priscis descriptas) exceptis admodum paucis, contigit contemplari scientia Antonij Castoris, cui summa autoritas erat in ea arte nostro æuo, uisendo hortulo eius, in quo plurimas alebat, centesimum ætatis annum excedens, nullum corporis malum expertus, ac ne etate quidem memoria aut uigore concussis, Citatur autem à Plinio li. 20. & septem sequentibus.

Antonius Musa Cæsaris Augusti medicus de herbæ uetonicæ remedij 47. libellum ad M. Agrippam exarauit. Vide plura in Biblioth. nostra.

C. Plinius secundus in Historia mundi, quæ libris 37. constat, sedecim C. scripsit de stirpibus, nempe à duodecimo usq; ad uigesimum septimum, uarijs omnino modis de eis tractans, philosophice, historice, medice, rustice, magice &c. In hoc opere emendando multi hactenus egregij uiri defudarunt, quorum lucubrationes extant. Nos nuper etiam Gulielmum Pellicerium episcopum Montispeffulanensem emendatissimam horum uoluminum æditionem parare audiuius.

Magna pars Dioscoridis scriptorum in Plinij etiam historijs reperitur, cum tamē Dioscoridem ipse nusquam citet alijs nimirum authoribus usus
ex quibus

ex quibus Dioscorides quoque pleraque desumpserat. Ex Theophrasti etiam de historia plant. libro plurima transtulit, & quedam non satis feliciter, ut in Theophrasto dixi.

C. Plinii Secundi nomine excusi sunt de re medica libri quinque. Horum primi tres passim ex Plinii operibus ab aliquo collecti videntur, aduersus morbos diuersos. Quartus simplicium medicamentorum numero, facultates describit, Galenum & Dioscoridem aliquoties citans, unde apparet C. Plinii Secundi hoc opus non esse. Paulus Iouius in libro de piscibus Romanis cap. 35. Plinii Valeriani esse iudicat, cuius marmoreum sepulchrum etiamnum Comi conspiciatur ubi Pliniorum familia floruit.

C. Valgius uir illustris & eruditione spectatus post M. Catonem & Pompeium Lenæum, de re medica herbarum uolumen imperfectum ædidi ad diuum Augustum, Plinius: qui & testimonijs eius utitur libris 23. 24. 26.

I IVlius Bassus homo Latinus Græcè de medicina scripsit: uide supra in Basso, inter Græcos.

L L. Apuleij Madaurensis philosophi Platonici de uiribus herbarum liber hodie in manibus habetur, quem à Chirone Centauro præceptore Achillis, & ab Æsculapio dicitur accepisse.

M Macer, Vide Æmilius Macer.

M. Cato. Herbarum remedia apud Latinos primus & diu solus idem ille M. Cato, omnium bonarum artium magister, paucis duntaxat attigit, boum etiam medicina non omissa, Plinius.

P Brassicam peculiariter celebrauit, Idem 20. 9. in opere scilicet de re rust. Plinius Valerianus, uide C. Plinius.

Pompeius Lenæus.

Mitridates Ponti rex, in reliqua ingenij magnitudine, medicinæ peculiariter studiosus, ab hominibus subiectis, qui fuisse pars magna terrarum, singula exquirens, scrinium commentationum harum (de re medica stirpium) & exemplaria, effectusque in arcanis suis reliquit. Pompeius autem omni regia præda potitus, transferre ea sermone nostro liberum suum Pompeium Lenæum, grammaticæ artis doctissimum, iussit: utique ita profuit non minus quam reipub. uictoria illa. Et hoc primum tempore hanc scientiam ad nostros peruenisse animaduerto, Plinius.

S Sextius (alias Sestius) Niger, homo Latinus Græcè de medicina scripsit: Vide inter Græcos in Nigro.

ARABICI SCRIPTORES

A AVerrois libro 5, sui colligit, id est, uniuersalis, in re medica operis, primum de alimentis & medicamentis, eorumque facultatibus ac differentijs in genere

In genere agit, deinde insigniorum stirpiū uires ex Galeni libris de simplicibus eodem ordine alphabeti Græci recenset, ut nos obseruauimus.

A Vicenna librū secundū sui operis de medicamentis simplicibus omnis generis conscripsit, omnibus in unū literarum ordinē redactis, in quo auctores citat, Galenum, Dioscoridem, & paucos quosdam Arabes.

Idem in libro de corde, simplicia medicamenta (ut uocant) cordialia, scilicet literarum enumerat.

Aben bitar (uel, ut alij scribunt, Ebenbitar) scripsit de simplicibus medicamentis opus insigne & magnum, ordine alphabetico, citatis authoribus, quod a Bellunenſi aliquoties citatur, qui & Arabicum expositorem eum alicubi nominat. Hoc nuper ex peregrinatione sua in Orientem doctissim⁹ uir Guil. Postellus secum aduexit. In eo (inquit in epistola quam de suis ac peregrinis & secum aduectis libris nuper ad me scripsit) simplicia quamplurima & remedia innumera, quorum nec nomen, nec uirtus, nec usus, nobis adhuc innotuit, sunt expressa: atq; omnia ita absolute, ut quicquid super hisdem medicamentis apud Dioscoridem, Galenum & Oribasium imperfectum & mutilatum est ex hoc uolumine restitui & sarciri possit.

Idem & alia multa de medicamentis simplicibus uolumina, innominatis authoribus, & Dioscoridis compendium, (omnia puto Arabice scripta) se attulisse scribit.

ALcanzi ab Auicenna & Io. Serapione in explicandis simplicium facultatibus citatur: item a Ioanne Mesue.

ARahib apud Auicennam.

ALchuin aliquid de simplicibus condidit, citante Bellunenſi in Auicennam.

Ebenesis liber de simplicibus memoratur Bellunenſi, qui eundem expositorem Arabicum uocat, & expositionem eius in librum Samarcandi citat, ex capite de mania. Samarcandum uero alibi de signis scripsisse ait.

Ebengieslen de simplicibus apud eundem.

Elluchasem Elimithar medicus de Baldaïs in Tacuinis sanitatis tuende, plurimorum tum alimentorum tum medicaminum simplicium facultates describit, eorum duntaxat quæ in cibum uel condimenta ueniunt per classes quasdam rerum, ordine dicens de fructibus arborum, de cerealibus, seminibus, leguminibus, panificio, oleribus, & reliquis.

HALi filius Abba libro secundo partis secundæ uoluminis Regalis de medicamentis simplicibus agit.

HVmain, quem uulgo Ioannitium uocant, citatur ab Auicenna aliquoties libro secundo ut in Seebram: & a Ioanne Mesue tum hic tum filius eius.

Cl. Galeni librum de 46. plantis habemus cum commentario Humain, Gentilis.

I IO. Damascenus filius Mesue librum ædidi de simplicibus pharmacis purgantibus tum lenioribus tum uehementibus.

IO. filius Serapionis omnium qui ante ipsum de medicamentis simplicibus scripserant tum Græcorum tum Arabum lucubraciones collegit, & in ordinem digessit. Ab initio quidem operis authores enumerantur 79. quorum nomina hic omitto, quod plerique obscuri sint, & nihil eorum extet, quod sciam, ut Abugerig, Abix, Atabari, Albafari, &c. Sed maxima huius operis pars ex Dioscoridis & Galeni uerbis constat. Insunt tamen plurima passim (ut etiam in Auicennæ libro secundo) à Græcis ueteribus non descripta simplicia, partim cognita hodie, partim incognita.

ISAACI liber de diætis particularibus plurima alimentorum condimentorumque genera enumerat, cum singulorum facultatibus tum circa uictus rationem, tum ad medendum, similiter ut in suo de alimentis libro Symeon Sethi.

R RASIS uolumen de re medica in nouem libros digestum condidit, quorum tertius alimentorum & medicamentorum simplicium facultates edocet. IO. Serapio etiam passim huius authoris uerba citat, quæ conferendo deprehendi alia esse quam quæ in iam dicto Rasis libro habentur: an uero in continente sic inscripto huius authoris opere inueniantur, haud scio.

S SALOMONEM DAUIDIS filium, in historia Regum, mortalium omnium multo sapientissimum fuisse legimus, mox autem inter fructus & opera sapientiæ eius commemorantur, Parabolarum tria millia, Carmina quinque supra mille, Historia plantarum à cedro usque ad hyssopum, (hoc est, omne genus plantarum, arborum, fruticum & herbarum;) postremo historia animalium.

SERAFIM (aliàs Sirasi, uel Sirasim) interpretatur uocabula quædā Arabica, cum alia tum simplicium pharmacorum, citatus aliquoties Bellunensi.

RECENTIORES.

A ADAMUS LONICERUS Germanus nuperrime de omni materia medica scripsit, uolumine ex ueterum ac recentiorum scriptis concinnato utiliter, breuiter ac modeste, hoc est, citra reprehensionem aliorum. Multis quidē in locis Hyeronimi Tragi & Valerij Cordi, sententiam sequitur.

ÆGIDIJ (eiusdem scilicet qui de urinis & pulsibus scripsit) de herbarum quarundam uiribus carmina legere memini. Conieci aliquando huius esse carmina illa de herbis quæ Æmilio Macro adscribuntur, propter similitudinem styli.

ALBERTUS MAGNUS in libello secretorum herbis quibusdam uires magicas

DE REI HERBARIÆ SCRIPTORIBVS.

gigas adscribit. In eiusdem libello de mirabilibus mundi diuersa herbarum uocabula, sed corruptissima leguntur. Hæc legat qui bonas horas male collocare uolet.

ALoisi^j Mundellæ clarissimi hoc tempore medici Brixlæ in Italia Animagueriones in examen simplicium Antonij Musæ Brassauoli.

AMati Lusitani Annotationes in Dioscoridem.

ANDreæ Carolstadij de uiribus & usu Brassicæ libellus Germanicus.

ANtonius Musa Brassauolus medicus illustrissimi Ferrariæ ducis Herculis Estensis, conscripsit examen omnium simplicium medicamentorum, quorum usus est in officinis.

ARnoldo de uilla noua quidam attribuunt librum de omni genere simplicium medicamentorum qui Aggregator practicus inscribitur, consarcinatus ex Auicenna, Serapione, Pandectario, Plateario, &c, sed falso, cum in eodem opere Arnoldus de Villa noua citetur.

Cæterum in libro cui titulus de simplicibus, medicamentorum facultates per locos describit Arnoldus, hoc est, secundum qualitates primas, secundas & tertias, &c. Vide infra in Iacobo de Dondis.

Vidi & fragmentum libelli eius de remedijs ex quercu.

BAptista Fiera in Coena sua plurima simplicia condimentaq; & eorum facultates carmine elegiaco satis eleganter descripsit.

BAptista Sardus scripsit in Pandectas Syluarii.

BArtholomæi Anglici libri 19. de proprietatibus rerum ex libris ueterū collecti, sed sine iudicio & eruditione, & stilo barbaro, superiore sæculo in pretio erant. Horum decimus nonus de plantis agit.

BEnedictus Textor Segusianus medicus eruditus, superioribus annis libellum de stirpium differentijs ex descriptionibus Dioscoridis, utili sane, & pulcherrima methodo digessit.

CArolus figulus in Botanomethodo de herbis cognoscendis in genere C quædam tractat.

CArolus Stephanus multa utilissime docet in libris de re hortenſi, Vineto, Seminario, aut Plantario, Agro aut Prato, & Sylua, quibus non solū plantarum cognitionem, sed etiā linguæ Latinæ usum illustrauit.

CEmundus Anglus & Stephanus Aquæus Bituricensis in totam naturalem historiam Plinij commentarios reliquerunt, in quibus an quicquam ad plantarum cognitionem utile reperiatur, haud scio.

CONratii Gelnieri extat catalogus plantarum, ubi nomina duntaxat in quatuor linguis Latina, Græca, Germanica & Gallica e regione ponuntur. Adiectæ sunt quæ in pleriq; Dioscoridis codicibus reperiuntur nomenclaturæ stirpium uariæ & plæræq; barbaræ, serieliterarum.

Item historia plantarum, eodem ordine, descriptiones tantū cōtinens ex

Dioscoride, Plinio Theophrasto: facultates autem brevissime in genere tantum ex Ægineta fere, &c. cum Græcis & Arabicis nominibus per margines adiectis.

In libro physicorum, qui cum secunda parte Bibliothecæ habetur, stirpium quasdam classes instituit, & locos aliquot authorum ubi de singulis agant ostendit.

Purgantia quoque medicamenta, & aluum mollientia, & uomitoria eodem ordine recensuit, &c.

CONradus Mengenbergger de plantis & cæteris diuersis rebus naturæ uolumen Germanice scriptum reliquit.

EVcharius Rhodion, uide in Ioanne Cuba.

EVonymi Philatri Thesaurus de liquoribus & oleis destillatis, alijsq; medicamentis quorū non in substantia usus est, Tiguri nuperrime excusus.

EVricij Cordi dialogus de herbis uarijs.

Idē Nicandri Theriaca & Alexipharmaca latinis carminibus expressit.

FAustus Longianus. Dioscoridem in linguam Italicam transtulit ante Pet. And. Marthæolum.

GABriel Humelbergius Antonij Musæ de herba Vetonica, & L. Apuleij de medicaminibus herbarum libros recognouit, & commentarios adiecit, ex quibus quod ad plantarum cognitionem nihil proficias.

GAleatij cuiusdam librum ante annos octoginta scriptum uidi, in quo ordine literarum omne genus simplicium pharmacorum describit, & facultates recenset, stilo barbaro, & Arabicis plerunque nominibus.

GAlfredum nescio quem de herbis aliquid scripsisse legi.

Gualtherus Riffus Dioscoridem ædidi cum annotationibus, in quibus nihil proprium ab eo afferri puto, sed aliorum duntaxat in eundem authorem aut similis argumenti scripta reperi, adiectis etiam figuris stirpium & animalium aliquot.

Idem in Germanico suo de liquorib⁹ destillandis opere, singulis fere liquorib⁹ uires adscribit easdē quæ plantis ipsis attribuuntur, & licet semper alienis utatur scriptis, authores tamen nusquam nominat.

GVilielmus Pellicerius episcopus Monspeffulanensis, uir cum alias tum stirpium & animalium præcipue piscium historiæ longe doctissimus, Plinij naturalis historiæ, ut supra dixi, emendatissimam æditionem parat.

Guilielmus Placentinus libro quarto. voluminis, quod Summam conseruationis & curationis inscripsit, de medicamentis tum simplicibus tum compositis pertractat.

GVilielmus Turnerus uir diligentissimus doctissimusq; plantarum effigies & uires Anglice descripsit, cuius operis partem excusam nuper uidimus, & quod reliquum est audivissime expectamus.

Hermolaus Barbarus patritius Venetus uir eruditionis nomine nuncq̃ H
fatis laudatus, Dioscoridem nobis primus Latinum reddidit, elegantissi-
ma & Pliniana oratione, ubi tamen accusatur, quod nimio Plinium imi-
tandi studio nonnunquam à Dioscoridis sententia recesserit. Adiecit etiam
Corollarium longe doctissimum & uarij argumenti, quo non Dioscori-
dem solum & rem medicam illustrat: sed etiam utranque linguam & omnē
philologiam pulcherrime exornat. Idem in Plinianis Castigationibus pas-
sim quædam ad stirpium cognitionem utilia intermiscet.

Hieronymus Brunswicensis primus de liquoribus destillandis ex omni
remediorū simplicium genere Germanis suis scripsit utilissimum uolumen;
ex quo postea multi multa mutuati, de h̃isdem uel Germanice uel Latine con-
diderunt. Eucharis Rhodion quidem totum fere illud opus in Germa-
nicum librum de simplicibus medic. Ioannis Cubæ transtulisse se profite-
tur. Eundem autem puto esse librum quem Theodericus Dorstenius e Ger-
manico nuper Latinum fecit.

Hieronymus Cardanus medicus Mediolanensis libro octauo operis de
Subtilitate multa de plantis rara & egregia adfert, philosophice, medicæ &
historice. Item in libello de Simplici medicina hæc tractat:

Quod nulla simplex medicina est sine culpa.

De principalibus uniuscuiusque medicinæ iuuamentis.

De earundem proprijs nocumentis.

De ipsorum nocumentorum peculiaribus emendationibus:

De quorundam illarum malo usu.

Item in libro de 100. Erroribus, Errorē 11. Quod auxilia simplicia & com-
posita corrupta habeant.

Hieronymus Tragus, uide in fine huius alphabeti.

Hildegardis abbatissa in Germania circa annum Domini 1180. elucu-
brauit libros quatuor de medicamentis simplicibus, ex metallis, plantis, &
animalibus &c. phrasis pro sæculi ratione barbara est, & multa insunt su-
perstitiosa, & omni ratione carentia.

Iacobi de Dondis, quem uulgo Aggregatorem uocant, librum de ui-
ribus simplicium, alicubi aut uidi aut citatum legi, & forsan is est qui Ar-
noldo de Villa noua attribuitur, nam Arnoldi non esse certum est, & Ag-
gregator quoque inscribitur, sicut magnum uolumen huius Iacobi, ubi me-
dicamenta tum simplicia tum composita per locos communes secundum
facultates eorum digessit.

Iacobus Goupylus medicus Parisiensis Græce & Latine doctissimus
Dioscoridem nuper plurimis in locis emendatum in utraque lingua dedit,
seruata Io. Ruellij translatione.

Iacobus Syluius Ambian⁹ de omni re medica optimè meritis in libris

de simplicium medicamentorum delectu, præparatione & compositione, uniuersam materiam medicam utilissime illustrauit.

IANUS Cornarius Macri poema de plantis: & aliud incerti authoris de iisdem & animalium partibus ac terræ speciebus emendauit, & annotationes adiecit.

IO. Agricola Ammonij libri 2. de herbis alijsq; medicamentis simplicibus ueterum & recentiorum.

Idem scripsit Indicem copiosum simplicium pharmacorum à Dioscoride proditorum: Et alium communem libris de simplic. Dioscoride, Galeni & Serapionis.

IO. Atrocianus commentarios quosdam ædidi in Macrum de herbis.

IO. Bapt. Egnarij in Dioscoridē annotationes exant, quas nondū uidi.

IO. Cuba medicus olim Francfordiæ ad Moenum de simplicibus medicamentis Germanice scripsit, quem librum postea Eucharius Rhodion pater, eiusdem urbis medicus emēdauit & auxit cum alijs tum inserto passim Hieronymi Brunswicensis libro de liquoribus destillatis. Idem, aut prope modum idem, opus esse puto quod nuper Theodericus Dorstenius Botanici titulo Latinum dedit, sed multis locis auctius. Impressa sunt hæc uolumina aliquoties ab Egenolpho Francfordiæ cum imaginibus.

IO. Dantzius condidit dialogos utilissimos de simplicium pharmacorum facultatibus in genere, ex prioribus Galeni libris eiusdem argumenti.

Dioscoridem etiā Germanice reddidit, qui & cum figuris publicatus est.

IO. Lonicerus Scholia composuit in Dioscoridis libros cum nomenclaturis Græcis, Latinis, Germanicis, & Hebraicis.

IO. Manardus in doctissimis epistolis suis tum alia multa passim ad cognitionem medicaminum simplicium erudite docet, tum in prima libri octauæ epistola Marcelli Vergilij interpretationem in primum Dioscoridis librum examinat.

IO. Michaëlis Sauonarolæ catalogus, continens tam simplicium quam compositorum medicamentorum nomenclaturas, usum & summam.

IO. Monhemius librum de plantis in publicum dedit, in quem totam nostram plantarum historiam transcripsit: & quædam ex catalogo nostro plantarū. Adiecit insuper nūnullas, ex L. Fuchso præcipue, ut uidetur, recentiorū præsertim & ueteribus indictarū stirpiū descriptiones, ordine literarū.

IO. Platearij liber (uulgo dictus Circa instans, ab initio eius) de medicamentis simplicib; ijs duntaxat quorū frequētor usus est in pharmacopolijs.

IO. Ruellius Græce et Latine linguae peritissimus, de natura stirpiū libros tres eleganter docte & copiose cōscripsit, ita ut omnes qui ante eū scripserūt facile uicerit. Primi quidē libri bona pars cōmunes & generales de plantis cōsiderationes cōtinet, ad imitationē historię plantarū Theophrasti. Multa

etiam in eodē grammaticè interpretatur. Vellem etiā quæcunque ex ueteribus & alijs desumpsit, ita separasse, ut quæ cuius authoris essent, appareret: quæ item ipsius, id si fecisset, facilius etiā excusaretur crebre illæ earundē rerū, uerbis paululū uariantibus, repetitiones. Ita nihil est omni ex parte absolutū.

Dioscoridē quoq; Latine expressit: quæ eius translatio, cæteris (Marcelli & Hermolai) fere præfertur, quoniam postrema est, inspectis ab ipso aliorū interpretationibus. Sed hæc etiā suis nāuis non caret.

IO. Tollati cuiusdā liber de remedijs herbarū alijsq; Margarita medicinæ inscriptis, ordine literarū Argētinæ publicat⁹ est, anno Dñi 1518. chartis 10.

ISidorus lib. 17 Etymologiarū de re rust. & uarijs plantis quædā scripsit.

Kīranis, (uel ut alijs scribūt, Kīranides, Kīranus, Caranus) scripsit quædā Arabice de facultatibus magicis & medicis stirpiū quarundā, lapidū & animalīū, libris 4 quos Gerard⁹ Cremonēsis Latinos fecit barbarā dictione.

LAurentius Frisius medicus Germanus scripsit Synonyma materiæ medicæ Latinis, Græcis, Arabicis & Germanicis uocabulis, opusculo Germanico, inepto sane & mendosissimo.

LEonhartus Fuchsius primum in Paradoxis suis libro primo, multa utiliter super quibusdam simplicibus medicamentis, & circa eadem erroribus scripsit. dein magnum volumen de historia stirpiū edidit, Latine & Germanice cum imaginibus: cuius alter etiā Tomus iandudum expectatur.

MARcellus Vergilius Florentinus Dioscoridē Latinū fecit, & cōmentarios doctissimos adiecit, in quib⁹ partim Dioscoridē explicat, partim translationis suæ rationē reddit, partim reprehendit Hermolai translationē, ad ipsam quidem plantarum rariorū aut incognitarū notionē non multū emolumenti adfert, de quo plura scripsi in Bibliotheca.

MATthæi Syluatici Pandectæ medicinales quanq; magna barbarie & inscitia rerū uerborumq; contaminatæ, nonnihil tamen hominī docto & industriō ad medicamentorū simplicium cognitionem occasionis adferūt.

MAcer uide supra inter ueteres Latinos in Æmilio Macro.

MIChaëlis de Capella Synonyma medica: quæ nondum uidi.

NIColaus Leoniceus in opere de Plinij & aliorum in re medica erroribus, multa ad stirpes noscendas utilia docet.

O THo Brunfelsius stirpium historiam edidit, Latine & Germanice, cum iconibus perpulchre expressis. Et quanquam alijs mox secuti omnia perfectius & eruditius tractauerint, plurimum tamen illi debetur, quod occasio nem alijs præbuerit, & plantarum figuras primus omnīū nostro sæculo elegāter & aduiuum depictas dederit. Idem in Onomastico. i. Dictionario suo medicinali, medicamentorū simplicium et alia plurima uocabula recenset & interpretatur. Verū id uolumen ineptijs & mēdis in reb⁹ ac uerbis referius est, q̃ ab eruditjs hominibus tolerari possit.

Præterea Marcelli Vergilij in Dioscoridem commentarijs ea quæ superflua uidebantur ademit.

Edidit & reformationem Officinarum per omnia medicamenta simplicia usitata, ubi etiam docet quomodo quæque colligi, seruari, & parari debeant, &c.

P **P**etrus Anderas Matthæolus. Senensis Dioscoridem nuper in sermonem Italicum conuertit, & commentarios eadem lingua copiosos & eruditos adiecit, ubi diligentissime quæcunque de iisdem medicamentis Galenus scripserat, suo quæq; loco recenset, plerunque etiam Plinij et aliorum scriptis utitur. Et recentiora medicamenta à Dioscoride omiſſa ex recentioribus passim commode adijcit, & plurima sua aduersus uarios morbos & eximia quædam experimenta describit. Audio nunc idem opus Venetijs Latine ædendum. Sed, ut fara sunt hominum, cum in alijs reprehendendis frequentissimus sit, partim iure, partim iniuria, ipse interim suos quosque errores, quorum aliquot ipse deprehendi committit.

Petrus Hispanus condidit Thesaurum pauperum, qui liber idem fere est cum Rosa Anglica, ut Garinaria scribit: in quo simplicium aliquot medicamentorum ab eo exponi puto.

Petri Paduani Additiones in ueterem translationem Dioscoridis.

Q **Q**uod Apollinaris nomine Argentinæ nuper æditi sunt libri duo Germanice, quorum prior remedia continet ex stirpibus ad diuersos affectus à capite ad pedes. Secundus herbarum, aliquot usitatorum, & qui ex eis destillantur liquorum facultates præscribit, & herbarum imagines addit. Ego hoc authoris nomen confictum puto, Opus ipsum etſi non inutile est, nihil tamen in eo reperiatur, quod non contineatur in illorum libris qui de stirpibus ex professo tradiderunt.

R **R**aphael Volaterranus commentariorum urbanorum libro 26. de plantis agit.

REmaclus Fusch confarcinauit nomenclaturas stirpium usitatorum pharmacopoliſ ordine literarum, Latine, Gallice, Germanice, quandoque etiam Italice & Hispanice. sed ita ut nihil doceat, quod non prius ab alijs scriptum sit.

Item historiam aquarum destillatarum: & Libellum de simplicium medicamentis, quorum frequentior usus est electione.

ROdericus Lusitanus annotationes, non contemnendas in duos priores libros Dioscoridis reliquit.

S **S**ebastianus Montuus dialexi quarta libri primi, de simplicium medicamentorum notione quadam differit.

S **S**ymon Genuensis Synonyma scripsit.

SYmphoriani Campegi Hortus Gallicus, de medic. simplicibus. Haud scio an idem sit huius authoris liber qui inscribitur Campus Elysus Gallicæ. Extant eiusdem Castigationes pharmacopolarum & Arabum medicorum, &c. uide in Bibliotheca nostra.

Theodericus Dorstenius: uide in Io. Cuba.

Thomas Gypson Anglus herbarium uolumen sermone patrio conscripsit.

VAlerius Cordus Euricij filius scripsit quædam de simplicibus medic. quorum an extet aut excusum sit quicquam, haud scio. In Antidotario quidem, ut uocant, Norimbergæ per ipsum ædito, multa obiter interpretatur.

VIncentius Belluacensis libro 10. Speculi Naturalis, & quinque sequentibus, de omni genere plantarum perscribit. Sunt autem Collectanea ex scriptis ueterum Græcorum & Arabum fere.

Hactenus recentiores enumerauimus, qui stirpium historiam scribendo illustrarunt: inter quos Hieronymus Tragus, Ioannes Ruellius, & Leonardus Fuchsius, tanquam soles quidam interminora sydera relucet. De Ruellio quid sentiam, & quid in eo desiderem, dixi: quoniam ille diem suum obiit. Scripta certe ipsius eternitatem merentur. De Trago & Fuchsio, qui adhuc in uiuis sunt, non æque decet iudicare. Ambo uiri eruditi sunt, & in hac palæstra exercitatissimi. Vterque uolumen suum, si Deus opt. max. uitam eis extenderit, excolere, augere, & emendare poterit. Ne tamen affectu aliquo motus, nihil de eis dicere uoluissè uidear, ut sententiam meam occultare: dicam quod sentio, absit inuidia & omnis candide dictorum sinistra interpretatio.

Leonardus Fuchsius igitur paulo post Hieronymum Tragum, opus suum de historia stirpium, quod Tomum primum appellat, euulgauit. Et quoniam utrique in Germania scripserunt, æmulatio quædam inter eos exorta est, ut solet inter homines: sed non inutilis illa. Hac enim excitatus uterque lucubrationes suas magis magisque ornare & augere nunc pergit. *Ayali & ius idè sperio.* Ego qui utrumque ex æquo amo, & inter optimos ac doctissimos uiros suspicio atque ueneror, (ita tamen ut dissentire ab utroque mihi quoties uidetur liberum esse uelim,) & merito quidem cum ex utriusque scriptis & iam olim profecerim ipse & proficiam indies ita eos hoc certamen certare opto, ut publicæ potius utilitatis & rei ipsius exornandæ perficiendæque, quam priuatæ gloriæ & ambitionis gratia, quod faciunt fecisse uideri possint. Et spero sane hunc animum, tanquam non doctis tantum sed probis etiam priusque uiris, in his quæ posthac ædent non deluturum. Ego neutrum neutri præterea habet uterque fortassis quo excellit, sed alius in alio genere, quum comparatio nisi in eodem genere, ut philosophi docent, legitima non

fit. Itaq; laudo & amplector utrumq;, & pro scriptis suis, ex quibus tum fructum tum uoluptatem subinde capio, ex æquo utriq; gradus habeo. Nec metuo ne id mihi ab eis accidat, quod fieri solet ab hominibus improbis, nam quo improbius quisq; est, aut saltem ab animi celsitudine remotior, eo minus tollere potest illos qui ipsum non maioris quam aduersariū fecerint. Omnino enim præferri uult, nec satis habet non se fieri minoris, quin cōtumeliam & inimicitiam interpretatur, nisi non uno aut altero tantum, sed modis omnibus anteponatur. Huiusmodi uiros si illos quibus de scribo existimarem, ne incepissem quidem hæc scribere. Sed Fuchsi laudes, quas certe multas & magnas meretur, ne sim prolixior, nunc omitto.

De Trago dicam, quoniam Typographo placuit, ut qualecunque hoc scriptum nostrum in operis ipsius fronte poneretur. Semper igitur mirifice mihi placuit huius uiri studium in stirpium historia indefessum, & quod de illis præcipue plantis quas Germania nostra profert plerisque omnibus, diligentissime omnium hætenus docuerit. Descriptiones singularum tam accuratas & exquisitas instituit, ut quæq; uel primum nascuntur, uel adole-scunt, uel iam perfecta sunt, per omnes partes, coloribus etiam, magnitudinibus & figuris, & si quid aliud sub conspectum cadit, ita expressis, ut nullus pictor repræsentare melius possit. Cæteras etiam tactiles qualitates, item odores, saporesq; diligentissime expressit. atq; hæc omnia ferme non ex commentarijs aut historia, sed oculatus ipse testis & obseruator singulorum,

Iam quod ad numerum, nullus est siue ueterum siue recentiorum in hunc usque diem, qui stirpes plures nobis descripserit. Non enim de illis tantum agere uoluit, quæ in communi medicorum aut uulgi usu sunt, sed omnino de omnibus quæ ad manus eius peruenerunt, etsi uel nomina uel uires uel facultates uel etiam utrumque ignoraret, quod eius institutum mihi ualde probatur, nam & ingenuum est quæ nescias fateri, & alijs ad inquirendum proponere: & animus philosophicus ipsis per se naturæ operibus delectatur. Medici uero eruditi de quouis etiam ignoto & nunquam antehac uisito remedio, ex sapore, odore, alijsq; iudicandi & experiendi modis uniusculiusque uim & naturam facile addiscunt. Accedit & illud ad huius uiri laudes, quod in Germania uel primus (post Brunswicensem, qui utiliter quidem scripsit, sed propter sæculi sui ruditatem, neq; de multis, nec erudite, præsertim quod ad uetëra stirpium nomina attinet, uel inter primos, hoc argumentum publice illustrarit, & in ijs potissimum plantis quas Germania fert, quæ cæteris omnibus diligentissime sit uersatus.

Porro facultates non illas tantum in singulis explicat, quas doctissimi quiq;

DE REI HERBARIAE SCRIPTORIBVS.

quicq̃ ueterum Græcorū Latinorumq̃ & Arabum tradiderunt: sed plurimā
passim utilissime de suis ac proprijs experimentis adiungit. Multa a uulgo
& uulgari per Germaniam usu accepit: non illa quidem leuia & contemnen
da, sed a multis sæculis ueluti per manus tradita, & perpetuo quodam usu
confirmata. Huiusmodi sunt remedia multa ex ijs quibus fere utuntur rusti
ci, pastores, hippiatrī, & chirurgi quidam, & alij nonnulli illiterati, qui non
quibusuis morbis sed certis quibusdam mederi se profitentur, quod & mu
lierculæ quædam præsertim ætate prouectiores, faciunt. Hoc genus homi
num cum non ex literis aut ueterum scriptis, nec ulla methodo, quæ exercet,
didicerit: uerisimile est eos multa eorum quæ sciunt a maioribus suis & alijs
eiusdem nationis hominibus, per communem confirmatumq̃ in singulis
regionibus longo tempore usum fama accepisse. Non est autem quod me
dicum pudeat, uel ex rusticis & mulierculis, & reliquo hominum uulgo, re
rum quarundam cognitionem petere. Vniuersalia enim & eam quæ pro
prie ars dicitur, a uiris eruditis tantum haurire possumus: particularia uero
cum cætera tum in simplicibus medicamentis, quod propemodum infinita
sunt, a quibusuis hominibus discere non dedignabimur. Habet enim
ut dixi, quæque regio, ueluti propria quædam & per manus tradita medi
camenta, & medicamentorum nomina, quæ plerunque non temere imposi
ta sunt, sed uel aliud quidpiam ad plantæ naturam pertinens, uel peculiarem
aliquam eius in medendo facultatem denotant, qualia sunt apud Germa
nos Wundfraut/ Wermût/ Bachheil/ Hirschfraut/ Imbenfraut/ Bä
wurz/ Söllwurz, & alia innumera. Hæc de Hieronymo Trago dixerim,
doctrinæ & diligentiae summæ uiro, non solum in stirpium historia, ut dixi,
quam doctissimus uir David Kyberus Argentinenfis ex Germanica lin
gua in Latinam optima fide, purè & eleganter conuertit: uerum etiam in
alijs medicamentis simul alimentisq̃ simplicibus, quod nuper declarauit
libro Germanico de alimentis ædico, & declarabit amplius, si uiixerit, alijs
quibusdam ædendis libris, quos ut commode & foeliciter absoluat, saxi
Deus opt. maximus.

DE SCRIPTORIBVS ILLIS QVI

SPARSIM ET OBITER UTILIA QVAEDAM AD

plantarum cognitionem tradiderunt.

Hactenus fere qui ex professo & præcipue de stirpibus monumenta re
liquerunt, enumeravi: nunc pergam de ijs dicere qui passim, & inter cætera
obiter in lucubrationibus suis, operæpretium aliquid quod ad plantas
aliquot

aliquot, utcunque paucas, tradiderunt, & primū de medicis, deinde ceteris quibuscumque, ut rerum rusticarum authorum scriptoribus, &c. quamquam illi quoque fere medica intermiscerent.

Medici igitur plerique omnes in therapeuticis suis voluminibus, siue practicis, ut uulgo uocant, multa ad stirpium & uirium ipsarum cognitionem utilia intermiscerent, quod Galenus etiam testatur in praefatione libri sui sexti de simplicibus, & priuatim de Hippocrate, Euryphonte, Dioscoride, Platonico, Herophilo, Philippo & Archigene. Et Plinius de Hippocrate, Praxagora, Chrysippo, Erasistrato, ut supra inter ueteres scriptores singulatim recitauimus. cū horum omnium nomina, cū qui non ex professo hoc egerit, illic omitti, & in praesentia tantum memorari poterant. Sed hi non multi sunt, & forte quaedam illic commodius dicta. His adnumero etiam Galenum in libris de compos. medic. secundum locos affectos, Aetium Actuariū, & recentiores, quos nominare nihil attinet. Alexander Benedictus tantum, ut qui excellat, taceri non debet, qui cum in libris suis uiginti uouē multa pulchre & erudite passim de plantis quibuscumque scripsisset, ab initio tricesimi & ultimi quibus in libris quānam peculiariter animaduertenda descripserit, tum in stirpium genere tum alia quaedam ordine literarum recenset.

His adde plerosque illos, qui therapeuticos aliorum libros commentariis suis explicauerunt, inter quos (quod ad hoc argumentum) praetulerim Ianni Cornarii annotationes in Galenum *κατὰ τόνον*.

Medici omnes qui de alimentis scripserunt, ut Galenus & Graeci illum secuti, Symeon Sethi, Isaacus, Hieronymus Tragus, Ant. Gazius, & alij multi ueteres ac recentiores, quorum (praesertim ueterum) in praecedentibus aliquot nomina retuli.

Authores librorum de uenenis per classes quasdam de uenenis agere solent: sunt enim alia metallica, alia ex animantibus, alia ex plantis, ut Dioscorides, Nicander, Galenus in libris de antidotis, Petrus Aponensis, Ant. Guainerius, Aëtius, Aegineta, Arnoldus de villa noua, Scribonius largus, Guilielmus, Placentinus, Varignana &c.

Quotquot medicamentorum compositorum descriptiones reliquerūt, Antidotaria uocant: ut Galenus praecipue in libris de Antidotis, Nicolaus Myrepsus in quem eruditae annotationes Leonh. Fuchsij extant, qui eundem authorem Latinitate donauit. Cornelius Celsus, Scriboni⁹ Largus, Actuarius. Et ex Arabibus Ioan. Mesue, cuius Antidotarium Christophorus de Barzizij interpretatur: Iacobus Syluius idem emendauit & pura Latinitate reddidit adiectis Sholijs. Idem nuper monachi quidam in Italia emendarunt & annotationibus illustrarunt, quibus sane plurima ad plantarum historiam utilissima inseruerunt, Rasis, Io. Serapio, Io. Damascenus, Auicenna

DE REI HERBARIÆ SCRIPTORIBVS.

Aulcenna libro quinto Canonis. Constantinus. Io. de S. Amando in Antidotarium Nicolai. Galaf Iſraëlitæ. Iacobi Manlij Luminare maius ſiue interpretatio Antidotorum Io. Meſue & aliorum illuſtrium medicorum.

Bernardus Cordonius circa finem libri primi Operis quod Liſium inſcripſit, de Antidotis a capite ad pectus. Arnoldus de uilla noua. Gulielm⁹ Placentinus libro 4. Summæ. Antonius Guainerius. Bartholomæus Monagnana. De medicamentis compositis noſtro ſæculo apud pharmacopolas uſitatís, Ant. Muſa & Valerius Cordus ſcripſerunt, & multa utiliter de ſimplicibus medicamentis quibuſdā addiderunt. Theobaldus Lepleigni⁹ uſ etiam Enchiridion condidit medicamentorum compos. uſitationum.

Symphorianus Campegius libro ſecundo de caſtigationibus pharmacopolarum caſtigat Antidotarium Meſue, Nicolai, Serapionis, & aliorum recentiorum.

Succidaneorum ſcriptores, ut author libelli qui cum Galeni operibus coniungi ſolet & Æginetæ, quem nos olim emendatum cum annotationibus dedimus. Iacobus Syluius, & Arabs quidam.

Qui uno opere uaria rei medicæ argumenta tractarunt, ut epiſtolarum & dialogorum conditores. Io. Manardus, Aloſſius Mundella. Fuchſius in Paradoxiſ. Hier. Cardanus in libris Contradictionum, & de erroribus medicorum, & de malo medendi uſu.

Diſtionariorum conditores, ut Pandectarius. Andr. Bellunen. Brunſelſius, ſupra etiam nominati.

Qui de abditis rerum cauſis ſcripſerunt, uel de ſympthia & antipathia rerum, ut Io. Ferneliuſ, Hieronymus Fracaſtoriuſ. Conſtantino Africano tribuitur liber quidam de phyſicis ligaturis, quem etiam reperio inter opera Arnoldi de Villa noua.

Scriptores de coloribus ut Ariſtoteles, Ant. Thyleſiuſ, Bayſiuſ in libro de ueſtibus.

Veterinarij, ut Abſyrtuſ, Hierocleſ & alij quorum ſcripta uno uolumine Græco comprehenduntur, Vegetiuſ, & rei ruſt. authores aliquot. Et qui aliorum animalium curationes tradiderunt, ut Demetriuſ quidam de accipitribus & canibus, cuius Græcum codicem nuper naſtuſ ſum.

Geoponicorum ſeu rei ruſticæ ſcriptores Græci Latiniq^{ue}, quos nominauimus Tomo ſecundo Bibliothecæ libri Phyſicorum Tit. 13. Eſt & inter opera Philoniſ Iudæi de cultu plant. lib.

Vina & uitium genera quidam celebrarunt, quos Pliniuſ recenſet 14. 19. ut Euphroniuſ, Ariſtomachuſ. Coniadeſ, Hiceſiuſ, omneſ Græci.

Cepuricorū. i. rei horteniſ ſcriptoreſ ueteres, Firmuſ Ceſenniuſ, Caſtriciuſ, a Plinio citati. Columella in horto. Recentioreſ, Caroluſ Stephanuſ, Strabuſ Galluſ poëta,

Io. Iouianus Pontanus Poëta celebravit cultum citrorū libris sex, quos hortos Hesperidum inscripsit,

Marius Grapaldus in parte operis sui de partibus ædium ad plantas diuertit.

Fr. Massarius dum nonum Plinij librum interpretatur, qui de piscibus est, multa eruditè de plantis quibusdam disserit.

Plutarchus in libro de fluuijs uarias quasdam & mirabiles, plerasq; incredibiles, in singulis nascentes herbas commemorat.

Apud Arrianum in Nauigatione maris rubri, raro quædam aromata nominantur, ut magla, moto, gizir, asyphè, merocti, thymiana, duaca, abirminæa.

Postremo historici quidam & geographi obiter interdū stirpes aliquas memorant aut describunt: præcipuè uerò recentiores Nati orbis scriptores quidam, ut Ludouicus Romanus & alij, aromata aliâsq; peregrinas plantas sparsim describunt.

DE ILLIS QUI DE MEDICAMEN-

TORVM SIMPLICIVM FACVLTATIBVS SECVN-

dum differentias qualitatum primarum, secundarum, & reliquarum scripserunt.

Nunc de illis dicam authoribus, qui plantarum facultates non suas cuiusq; omnes uno loco enumerarunt, sed per classes quasdam & locos communes distribuerūt, primum secundū qualitates primas, calidum, frigidū, humidū, siccū, earūq; differentias, quas gradus uel abscissus uocant, deinde iuxta secundas qualitates, ut saporum differentia sunt, & alia quædam, ut sunt astringere, discutere, abstergere & expurgare, ora uasorum aperire, extenuare, euocare uel extrahere, adurere, emollire, indurare, flatu discutere, semen generare uel promouere, urinam cicere, menses detrahare aut sistere, uenenis resistere, ambustis mederi, lenire & mitigare dolorem, strumas discutere, uentrem mollire, purgare, & si quid huiusmodi est. Et secundum tertias qualitates, quibus etiam præcedentium quædam adnumerari possunt. Voco autem tertias particulares, quæ nullo sensu iudicari possunt, sed aut ratione aut experientia tantū, ut quæ ad certam aliquā corporis partem referuntur, aut certos quosdam morbos peculiariter curant. Est autem huiusmodi medicamentorum distributio, non solum magis artificiosa, sed ad morborum curationes utilior, cum sic ex multis ad eundem usum pertinentibus, commodiora deligere liceat, & in quorundam inopia alia substituere. Sed pleriq; omnes ex Galeno & alijs collegerunt tantum singularia,

quæ

quæ per suos locos digesserunt. pauci artem ipsam qualitates istas earumq; gradus discernendi docuerunt, & qui id fecerunt pleriq; imitati sunt Galenū qui primus & copiosissime diligentissimeq; hoc præstitit in prioribus quinque de medic. simplicibus libris. Neq; id mirum, est enim per quam difficile (uos cuiq; qualitati gradus assignare, graduum differentias, (hoc est, initia, fines & media;) difficilius. Plurima diuersis aut contrarijs uiribus constant, de quibus minimè facile est pronunciare. Et sæpe in hoc iudicio, ut supra dixi, Galenus etiam hallucinatur. Non idè tamen negligendum hoc studium est, quoniam nonnihil difficultatis habet. Sat enim fuerit, si non exactè & per demonstrationē, quam proximè tamen fieri potest, & fide digna coniectura remediorum facultates cognoscere, quæ quidē cognitio longè præferenda est illi, quæ circa plantarum historias et nomina uersatur, ab homine medico uidelicet, non enim de Grammaticis aut Philosophis nunc loquor. Itaq; hortor omnes rei medicæ studiosos, præcipuè tyrones, ut stirpium omnium, aut saltem præcipuarum & quæ in aliquo usu receptæ sunt, temperamenta, excessus & qualitates perdiscant, cum ex ueterum libris, ubi & librarij multa corruperunt, & authores ipsi aliquoties aberrarunt, tum ex uniuersali quadam methodo & scientia, quæ ferè ex sapore, odore, colore, & partium crassitie aut tenuitate deducitur, & alijs quibuldam indi-
cijs ratione uel experientia cognoscendis, &c.

Io. Dantzius dialogos quosdam reliquit ex prioribus quinque Galeni libris de facultatibus simplic. med. dijudicandis, diligenter concinnatos. Et tabulas in eodem uolumine de facultatibus medicam. simpl. quæ apud Diosc. & Galenum reperiuntur, (ijs quæ ab animalibus sumuntur acceptis) ordine alphabetico collocatis simplicibus, ita digestas ut Tacuini Elulchasem, ex libris Galeni. Adiecit etiā typographus alias tabulas ex superioribus collectas, quibus simplicia medic. digeruntur secundum qualitates, quibus præditæ sunt, & affectus quibus medentur, ordine literarum, quales etiam hætenus aliquoties cum Latino Dioscoride, sed corruptissimæ illæ & mendaces impressæ sunt.

Aëtius, Ægineta, & Oribasius, Galenum sequuti, de uiribus medicamentorum simp. in genere quædam tradiderunt, classibus institutis.

Quæ Oribasij nomine de uiribus simplicium & eorundem delectu ad Eunapium, Basilæ olim excusa sunt, omnia apud Aëtium quoq; habentur libro secundo. Sunt autem tabulæ simplicium secundum primas & secundas qualitates.

Cor. Celsus libro quinto simplicia med. secundum uarias facultatum differentias enumerat, sed multis uires falsas attribuit: ut & Hermes Trismegistus in Iatromathematicis, frigida & calida medicamenta aliquot seorsim recensens.

De simplicium medic. uiribus pronunciandi methodum Io. Serapio & Auerrhois scripserunt, ab initio librorum ubi de iisdem particulatim tractant, item Albegnesit in libro de facultatibus remediorum & alimentorum, docte quidem & egregie, nisi quod interpretatio barbara est, & Aucenna tractatu primo libri 2.

De alimentorum quidem facultatibus per locos communes in genere Galenus egit.

De medicamentorum simpl. gradibus seu primarum qualitatum differentijs extat scriptum Iac. Alkindi, cuius autoritate etiam Io. Mesue utitur: item Arnoldi de Villanoua per aphorismos. Idem in libro de simplicibus, facultates medicamentorum describit iuxta qualitates primas, secundas & tertias: ut & Iulianita quidam, & Leonardus Fuchsius circa finem libri primi Compendij medicinæ.

Rufus de gradibus medicamentorum scripserunt Iacobus Forliuiensis, Gentilis Fulginas, Laurentius Maioli, Gerardus de solo, Angelus de Gyra.

Constantini Africani liber de gradibus simplicium medicamentorum per singula medicamenta, primum enumerat ea, quæ primi sunt ordinis cuiuscunque facultatis, deinde quæ secundi, & sic deinceps. Præfatur autem pauca de gradibus in genere, chartis undecim.

Iacobus de Dondis qui Aggregator Patavinus cognominatur, ex ueterum scriptis omne genus remediorum & simplicium compositorum per libros nouem digessit, secundum locos communes primarum, secundarum, & tertiarum qualitatum, &c. uide in Bibliotheca nostra.

Otho Brunfelsius Iatrion medic. simplicium inscripsit opus, in quo libris quatuor ex Dioscoride, Plinio & alijs authoribus diuersis medicamentis, præcipue simplicia, ut uarijs quæque affectibus a capite ad pedes conducunt, digessit. item ad ulcera, uulnera, febres, morbos muliebres & uenena.

Leonardus Legius collegit ex prisicis aliquot medicis Summam seu Tabulam pharmacorum simplicium & compositorum, secundum ordinem alphabeticum partium corporis, uel affectuum, quibus medentur aut nocent.

Idem in eodem uolumine ordine literarum medic. simplicia usitiora enumerat, ita ut cum unoquoque nominet medicamentum aliquod compositum cui admiscetur, (qualis fere tabula cum Luminari maiori, ut uocant habetur, sed copiosior.) Deinde simplicia recenset secundum primas qualitates, ordine literarum similiter, sed graduum differentias omittit.

Q. Apollinaris nescio quis (supra dixi suspicari me fictum esse nomen) in priore libro e' duobus Germanice nuper æditis, remedia ex plantis ad diuersos affectus a capite ad pedes præscribit.

DE REI HERBARIÆ SCRIPTORIBVS

Io. Ruellius libri primi de natura stirpium capite 21. de medicaminum ratione & uiribus breuiter, sed doctissimè agit.

Guillelmus Puteanus in libro ubi aloën aperire ora uenarum, &c. pro **Io.** Mesue aduersus **Manardum** & **Fuchsum** contendit, multa doctissimè ad simplicium medic. facultates noscendas in genere differit.

Ianus Cornarius in fine Epigraphes rei medicæ simplicium pharm. classes instituit secundum primas qualitates, adiectis unicuique graduum differentijs.

Ant. Guainerius in Antidotario non composita solum medicamenta describit, sed etiam simplicia passim enumerat, quæ alterent, id est, calefaciant uel refrigerent, caput, pectus & pulmonem, cor, stomachum, hepar, splenem, renes, uterum, iuncturas, item purgantia.

Iac. Hollerius de materia chirurgica doctissimè scripsit secundum classes facultatum.

Io. Mesue in librum de simplicibus pharm. purgantibus erudita metaphrasi illustrauit **Io.** Tagautius. Extant in eadem annotationes & censuræ **Io.** Manardi.

Symph. Campegius libro tertio de castigationibus pharmacopolarum scripsit de modo curandi per medicinas laxatiuas.

Hieronymus Cardanus in libello de simplici medicina, multa de purgantibus tractat.

Nos etiam aliquando tabulas de simpl. medicamentis purgantibus, aluum mollientibus, & uomitorijs, dedimus.

F I N I S.

HIERONYMI TRAGI IN SVOS DE STIRPIVM HISTORIA, COMMENTA- rios Prefatio.



CVM MVLTÆ SVNT IN VNIVERSA RERVM natura, in quibus immensam Dei Opt. Max. sapientiam uidere est, & quæ iure quis admirari possit, tum uero hoc admiratione dignissimum, quod è frigida duracq; tellure omnis generis elegantissimæ plantæ prorumpunt. Neq; uero ex his sapientia tantum, sed & bonitas ac clemencia creatoris, summacq; celestis patris erga homines beneuolentia elucet. Siquidem nulla tam aspera, tam horrida & inculta uspiam locorum terra est, quam non elegantissimis iuxtaq; efficacissimis, & ad ualitudinem tuendam ac recuperandam accommodatissimis stirpibus affatim donaric rerum omnium genitor ac conseruator benignissimus. Atqui ea est mortalium ingratitude, ea insolentia, id deniq; nouitatis studium, ut nihil illis arrideat, nisi peregrinum, & quod è longinquis regionibus magnis sumptibus apportari necesse sit. Interim quæ domi passim obuia sunt, & nostris corporibus dubio procul magis commoda, quippe quæ sub eodem nobiscum cœlo nascantur, neglecta & contempta iacent. Idem omnibus alijs, quantum uis præstantissimis Dei donis usu uenire solet, ut quia illis obruimur, nihili à nobis æstimentur. Quæ cum ita se habeant, sane causa cur nam illa uel auferantur prorsus, uel obscurantur, haud magno labore inuestigabitur. Scilicet ingratitude nostræ pœnas damus probe meritas, dum quas opes impio fastu spernimus, eas aut uniuersas, aut certe usum illarum amittamus. Nimirum pariratione Res Herbaria iussu Dei iudicio in profundissimum obscuritatis ac ignorantie cœnum demersa, multis iam sæculis latet. Quotus enim quisq; reperitur, qui non longe petitis & exoticis illis medicamentis, quam domesticis uti malit? nonne doctissimi quicq; de peregrinis ac nunquam sibi uisis herbis, ingentia uolumina scribunt, spretis patris, quas pedibus quotidie calcant? Atq; utinam uel tandem diuinissimæ simplicium cognitioni suus redeat honos, quod procul dubio tum fiet, cum dona Dei nobis collata amplecti, nostracq; industria pro uirili ornare contenderimus. Equidem quoties doctorum uirorum ea in reseruentem, ne quid acerbius dicam, apud me perpendo, non possum non uehementer & ex animo dolere, prouinciam illam à doctioribus, ad indoctos deuolui, qui ne prorsus iaceat in tenebris herbarum cognitio, non raro à Domino Deo per bonos uiros ad scribendum excitantur. Hac certe ratione ad officium scribendi amicorum hortatu & me adduci passus sum,
non

P R A E F A T I O.

non quod magnam in dē me gloriā reportare posse considerem, sed ut ex-
emplo meo doctiores ad negotium tam utile tamq̃ necessarium suscipien-
dum stimulare. Antequam uero ad rem ipsam accedamus, præfabimur
nonnulla, quæ in rem candidi lectoris, rei q̃ herbariæ studiosi fore non du-
bitamus.

Q U I S N A M P R I M V S I N T E R

R I S S I M P L I C I A U T V O C A N T C O G N O.

uerit. Caput. I.

S I sacrosanctæ scripturæ credimus, facile intelligemus dominum
Deum opt. max. primum stirpium plantatorem esse, a quo illæ,
& creatæ & hucusq̃ conseruatæ fuerunt. Nam priusquam homo
crearetur, omnes plantæ, cuncti frutices, uniuersæq̃ arbores, genuinis suis
uiribus ac facultatibus dotatæ omnibusq̃ numeris absolutæ, Deo autho-
re e terra exierunt. Quas cum singulari admiratione Adam primus homo
contemplatus fuisset, indidit his nomina, pro ineffabili quam a Domino
Deo acceperat sapientia rerumq̃ naturæ cognitione. Quodcunque enim
nomen teste Mose Adam rebus indidit, hoc nomine nominabantur. Quam
obrem non opus est ut longis uerborum ambagibus disputetur, quis sit au-
thor rei herbariæ, quis uero primus illam mortales edocuerit, cum constet ex
sacris literis, Dominum Deum opt. max. autorem, creatorem, inuentorem,
& conseruatorem esse, non tantum stirpium, sed & uniuersæ naturæ, ab eoq̃
omnem rerum cognitionem ad mortales profectam.

Gen. 2.

A D A M V M P R I M V M H O M I N E M

O M N E S C R E A T V R A S, N E C N O N S T I R P E S P R I-

*mum cognouisse, eamq̃ cognitionem posteris suis
communicasse. Cap. II.*

N O N est autem obscurum ijs, qui poëtarum fabulis relictis uerita-
tem ex sacris literis cognoscere student, Adamum Protoplastū
illum ac totius generis humani parentem, non solum diuino as-
satum sp̃ritu omnes creaturas in terra cognouisse, sed & singulis ut supra
docuimus proprias indidisse appellationes. Adde his, Adamo, necnon
uxori ipsius, Eux inquam, usum quoq̃: quantum ipsis quidem necesse erat,
creaturarum perspectum fuisse. Nam nisi ea sapientia & cognitione prædi-
ti fuissent, quo pacto potuisset ipse Adamus in sudore uultus sui, uti domi-
nus Deus iusserat, panem suum (cuius confectionem ignoraret,) comme-

deret. Cæterum constat ex diuinis literis uniuersam terram, & quæcunque in illa continentur, primis nostris parentibus à Deo optimo maximo donatam, subiectamq;. Sic namq; dicebat illis Dominus. Replete terram & subijcite eam, Ecce dedi uobis omnem herbam seminificantem semen, quæ est in superficie uniuersæ terræ, & omne lignum in quo est fructus, lignum uidelicet quod semen seminificat, uobis in cibum erit. Tamen si autem primi nostri parentes, præceptum domini Dei transgressi, non solum iustitiâ, sed & sapientiam, originalem amiserunt, tamen cognitione & usu herbarum, frugum & fructuum minimè spoliati fuerunt. Nam tertio Geneseos capite respondit Adamo Dominus, herbam agri manducabis. Quod cum ita se habeat, colligi facile potest herbarum terræq; fructuum cognitionem Adamo etiam post lapsum reliquam fuisse. Nisi enim illam habuisset, facile noxia pro salubribus in cibo eligere poterat. Ex his manifestum esse puto Adamum primum extitisse, qui herbariam doctrinam, ad posteros propagarit.

QVIS POST ADAMVM HERBARVM

RVM COGNITIONI OPERAM DEDERIT.

Caput III.

EX filiis Adami nonnulli pecuariam exercuerunt, alij, uidelicet Cain & posterius ipsius agriculturâ. Hi quoq; alias artes inuenere, tabernaculorum inquam constructionem, ferri, aliorumq; metallorum tractationem, quæ temporis progressu subinde magis atque magis excoltæ, per posteros Noe uniuerso mundo innotuerunt. Rei herbarie cognitio similiter quotidiana experientia aucta à Chaldæis demum & Aegyptijs (quod scripta ipsorum testantur) mirum in modum amplificata fuit.

QVI APVD GRAECOS CAETERASQVE

GENTES SIMPLICIVM (VT VOCANT)

inuentores extiterint. Caput IIII.

A Pollinem Medicinæ inuentorem à ueteribus creditum fuisse, tum alij tum uero Ouidius libro primo Metamorphoseon testatus est cum hunc in modum scribit.

Inuentum medicina meum est, opiferaq; per orbem

Dicor, & herbarum subiecta potentia uobis.

Nos uero superioribus capitibus ostendimus Dominum Deum ut omnium rerum, ita & medicinæ ac herbarum primum esse authorem, qui illas etiam nunc hominibus e terra producit, hominibusq; salubres reddit. Hoc non tantum sacræ testantur

P R A E F A T I O.

testantur literæ, uerum etiam ueteres ac sapientissimi Græcorum scriptores testantur. Hesiodus namq; & Homerus, ambo uetustissimi poëtæ in carminibus suis aperte fatentur plantarum uires ac facultates, earumq; cognitionem diuinam esse, & à Dñs hominibus communicatam. Homerus certe in Odyss. lib. x. haud obscure testatur herbã Moly uocaram, quæ aduersus Circes ueneficia utilis erat, à Mercurio primũ inuentam fuisse. Quæ uerba tamen si fabulis accenseri possint, nemo tamen negare potest cognitionem plantariam huic studio peculiariter deditos homines requirere. Nemo enim feliciter in quacuncq; reuersari solet, nisi inclinatione quadam naturæ fatoué aut diuina ordinatione ad eam trahatur. Quod animaduertentes ueteres magnis ac diuinis honoribus eiusmodi homines affecerunt, Apollo namq; cuius iam ante meminimus apud antiquos Deus habitus fuit, sicut & Aesculapius, Machaon, Podalyrius, ac clarissima Hippocratis Coi familia, qui omnes mortalibus quasi Dñi fuerunt.

REGES, PRINCIPES, ALIOSQ; VE

MAGNOS VIROS, REM HERBARIAM OLIM

tractasse, Caput V.

Multi sane clarissimi Reges Principesq; olim rem herbariam ita amarunt, ut sepositis interdum regijs politicisq; negotijs non paruam herbis cognoscendis operam darent, quo uel si non tantum Reip. utiles forent, uerum etiam æternum & immortale sibi compararent nomen. Salomonem namq; decantatissimum illum Israëlitarum regem, uel minima ac uilissima naturæ opera considerasse ita ut à Cedro usq; ad Hyssopum, quæ è pariete progignitur disputarit, scriptura sancta commemorat.

Iam si gentiles reges & principes, qui hanc cognitionem & magni fecerunt, & excoluerunt, enumerare uelim, dies me citius deficiat quam omnia persequar. Adferam tamen nonnullos in medium, quo exemplo illorum multi ad tam diuinam cognitionem amandam excitentur. Mithridate ergo Parthorum rex celeberrimus, qui uiginti duas calluit linguas, rei Medicæ studiosissimus, simplicia medicamenta plantaq; diligentissime inuestigauit, & ex his compositionem insignem confecit aduersus omne ueneni genus, quam Mithridatium etiam num hodie uocant, quæ & in omnibus officinis ubiq; terrarum passim & usurpatur & celebratur. Idem Mithridates Scordium quod longis annis nostræ Germaniæ incognitum fuit, inuenit, suoq; nomine Mithridatiam appellauit. Gentius Illyriæ Rex herbæ Gentianæ, quæ in Germania nostra in altis quibusdam montibus & deserto

P R A E F A T I O.

tis gignitur, primus inuentor traditur, à quo & apellationē eius herbæ perfectam nemo ignorat. *Lyfimachia* à *Lyfimacho* *Macedoniæ* rege inuentam scribunt, & proprio nomine insignitam.

Iam & *Panaces*, plantæ laudatissimæ, quæ à facultatibus suis iure apud *Germanos* *heil allen schaden* uocari possent, ad *Chironem* & *Herculem* inuentores referuntur, ut in *Nicandro* uidere est. *Iubam* *Mauritaniae* regem herbam *Euphorbiam* inuenisse legimus. *Mercurius* herbam *Mercurialem* & nonnullas alias plantas mortalibus primus indicauit. *Hercules* præter alia & *Hyoscyamum* inuenit, sicut & *Asclepiades* *Chamomillam*. *Themison* plantaginis, *Achilles* *Millefolij*, *Artemissiam*, *Arthemis*, *Teucrij*, quod alias *Veronica* dicitur, *Teucer* inuentor proditur. Sed ut & scriptores nonnullos proferamus, qui plantas quasdam peculiariter laudauere, *Polium* et *Maluas* describit *Hesiodus*, *Pythagoras* *Cepas* suas celebrat. *Morchion* de *Raphano* librum composuit. *Zeno* *Capparim* prædicat, *Chrysippus* & *Cato* *Brassicam* laudant. Ut interim *Centarium*, *Eupatorium*, *Clymenon*, *Iridem*, & *Betonicam* prætereamus, quæ omnes plantæ celebres habent inuentores.

Ex his quæ huc usq; diximus facile apparet magno in pretio olim rem herbariam fuisse. Quod si pari honore deinceps quæ secuta sunt sæcula eam cognitionem prosecuta fuissent, dubium non est quin hodie & plura & certiora aduersus plærosq; morbos remedia habere possemus, quibus per rei herbariæ contemptum atq; neglectū in uniuersum hodie destituimur. Quam in re non exigua in Magistratum, & cruditos homines iure transfertur culpa, qui cum diuinam hanc cognitionem nihili prorsus faciant, licet ea carere interdum non possint, plurimum à maiorum diligentia recesserunt. Si namq; tanto studio erga plantas affecti sepenumero fuere, ut per somnum quis aliquarum plantarum usus esset admonerentur. Mulierculam enim quandam rosam caninam in somnis uidisse, simulq; cognouisse, radicem lacte caprino decoctam & potam filio suo, qui tum à rabioso cane morsus fuerat profuturam, ueterum monumenta testantur. Sunt autem huiusmodi considerationes rerum naturæ, licet hodie passim contemnantur, non postrema diuinæ erga humanum genus beneuolentiæ indicia, & quæ à ueteribus nequaquam, ut nostro sit tempore neglecta fuere, *Galenum* namq; non puduit *Palestinam* ipsam & *Syriam* atq; *Cyprum* petere, quo terram *Lemniam*, *Bitumen* uerum, omnisq; generis metalla cognosceret. Pari sane studio strenuissimus miles *Dioscorides* uel remotissimas terras inuisere uoluit, ut laboribus suis & scriptis posteritati prodesse posset. Quam diligenter uero plantas descripserit, & nomenclaturas earum uarias annotauerit libri eius, qui in omnium manibus sunt, facile declarant.

QV A S

Q V A S N A M P L A N T A S E T E X I I S

P E T I T A R E M E D I A , B R V T A A N I M A L I A

hominibus ostenderint.

Caput VI.

Q Vanti facienda sit res herbaria, uel hinc demonstrari potest, quod non contemnenda remedia ex plantis petita, ab animalibus brutis indicata fuere. Venatores etenim naturæ studiosi obseruatores, animaduenterunt olim Ceruos infixâ tela Cretensi Dictamno exigere, qui factum est, ut deinceps omnis generis sagittas, aculeosq; ea herba mortales refrigerent. Memorî quocq; proditum est Ceruos aduersus uenenatos Phalangiorum ictus caneros fluuiatiles Theriacæ loco deuorare, quod idem contra Hyoscyami uirus apros syluestres usurpare Helianus author est. Hic uero admirandam puto Dei Opt. Max. erga omnes creaturas insignem prouidentiam, qua singulis animalibus, non tantum quod ad uictum, sed & quod ad medicinam attineret prospectum esse uoluit. Vrsos etiam aiunt Hederam amare, & non tantum musco terrestri sanguinem è uulneribus manantem sistunt, uerum etiam cum nimio Mandragoræ usu sibi ipsis periculum creauerint, formicas quibus sibi rursus medeantur, illico quærunt. Quin & Dracones fastidium quod ipsis nonnunquam obreppit Lactuca syluestri purgare consueuerunt, sicut canes gramine. Mustela aduersus glires aut serpentes pugnatura, Ruta folijs primum omnium se munit armatq;. Feles suas quocq; habent plantas, quibus caliginosis medeantur oculis. Non solum enim Nepetam herbam, uerum etiam Valerianæ radicem & eunt, & uniuersum super illas uolitant corpus, quod non semel ipse obseru. ui.

Quid uero de auiibus dicam, quæ non minus quam quadrupedes, plurimas herbas nobilitauerunt, mortalesq; plurima remedia docuerunt? Ciconia etenim cum non bene habet aquam marinam hauriens, rostro sibi ipsi per posteriora tanquam clystere infundit, qua ratione aluum sibi ciere solet. Præterea & ex Origano medicinam sibi quærît. Corui, Graculi, perdices, Columbe, turdiq; quotannis folijs Lauri se purgare consueuerunt. Gallinæ, Palumbes & turtures, Parietariam in morbis suis quærunt. Grues, & quæcunq; his congeneres aues uidentur iunco palustri delectantur. Anates syluestres, Anseres, aliaq; quam plurimæ aquaticæ aues Sidericim Cratææ, cuius 1. libro cap. xv. infra meminimus expectunt. Iam & Chelidonium herbam aduersus oculorum caliginem pollere hirundines indicarunt, eam namq; illi pullorum suorum oculis medentur. Vide de his Aristotelem. Serpentes sceniculo oculorum hebetudine emendant, & ad Iuniperos plerumq; senectâ exuunt. Cochleæ herba Cunila uocata opem sibi in morbis adferunt.

Hæc uero quæ huc usq; diximus in eum finem à nobis in medium adferuntur, ut intelligant omnes considerentq; Naturam quæ Dei est ministra omnibus creaturis eam cognitionem indidisse, quæ, ea quæ ad sanitatem, tum tuendam, tum recuperandam attinent, naturali quadam inclinatione appetant quærantq;. Quæ tamen si non solum iucunda, uerum etiam necessaria sint cognitu, tamen alijs & uilibus quidem rebus nimirum opum & uoluptatum studio abstracti, insignem hanc Philosophiam & contemnimus & negligimus.

QVID VETERES DE RE HERBARIA SENSERINT, QUANTI ILLAM FECERINT, & qui de illa scripserint, Caput. VII.

Quanto uero in pretio apud ueteres Reges, prudentesq; ac doctos homines res herbaria fuerit, monumenta illorum testantur. Euax etenim Arabum Rex tanti plantarum cognitionem fecisse legitur, ut non tantum describi illas, uerum etiam depingi uoluerit, demumq; depictas & descriptas plantas ad Neronem Cæsarem honoris gratia miserit. Quare Romanos deinceps Imperatores rem herbariam, & qui eam tractarent, non solum magno honore affectisse, uerum etiam magnis sumptibus, (ut Galenus refert) ipsas plantas, libros depictos, eosq; qui tam diuinam scientiam profiterentur, conquisiuisse scriptis ueterum proditum est. Hinc nimirum factum est, ut multi doctissimi uiri partim naturæ admiratione, partim præmijs propositis impulsu stirpium historiam diligentissime, obseruatis ac indicatis omnibus circumstantijs descripserint. Inter quos haud postremus est Theophrastus, qui post longam rerum experientiam nouem libris uniuersam herbarum, fruticum arborumq; historiam complexus est. Posthunc idem argumentum, summa cum laude tractauere quamplurimi alijs, nimirum Heraclides Tarentinus, Iulius Bassus, Petronius Niger, Crateuas, & Andreas. His adiungendus est Dioscorides rei herbariæ scientissimus, qui licet militiæ deditus esset, tamen herbarum cognitionem adeo non contempsit, ut multis peragratiss regionibus, magnisq; exhaustis laboribus, diuinum nobis de re herbaria uolumen reliquerit, pro quo beneficio nisi ingrati plane uideri uelimus immortales illi habendæ sunt gratiæ. Proinde hos tanquam primarios ac principes quosdam alijs in hoc studij genere clarissimi uiri subsecuti sunt, Latini, Græci, & Arabes multi, Galenus inquam, Paulus Aegineta & hijs quidem Græci, Latinorum enim plures numerare licet & Arabes, ut sunt, Maçer, Apuleius, Serapio, Mesue, Auicenna, Rhafes, & alijs, qui omnes inter alia quæ

alia quæ literis mandarunt, & herbariæ rei historias scriptis suis inferere uoluerunt, & ad posteritatem transmittere. Quorum labores ut uniuerso studioforum ordini imo omnibus mortalibus quam utilissimi censendi sunt, ita ab omnibus danda erat opera ut istorum libros repurgatos legere possemus. Sed quæ prauitas humani est ingenij, ut quæ ad uoluptatem & luxum pertinent maiori desiderio sectemur, quam quæ uere nobis commodare possent, uix inspicere possumus, nedum in id incumbere ut sumptibus nostris ueterum scripta in lucem castigata proferantur.

CVR VETERES TANTOS LABO-

RES INCOGNOSCENDIS ET DESCRIBENDIS STIR-

pibus alijsq; Simplicibus impendere uoluerint.

Caput VIII.

C Vm omnes plantæ efficacissimis ad sanitatem tum tuendâ tum recuperandâ facultatibus a Deo opt. max. donatæ sint, ita quidem ut nemo facile uel uilissimæ ac uulgatissimæ herbulæ uires & utilitates enumerare queat; (Quis enim est qui omnem Straminis usum & ad quod illud res adhibeatur, oratione se explicare posse, profiteri audeat, ut interim alias raceam plantas, quæ diligenti cultura & plantantur & conseruantur?) Cum hæc inquam ita se habeant in promptu ratio est, cur ueteres plantariam cognitionem tanti fecerint. Fuerunt etiam illi Simplicibus medicamentis contenti, nec compositis & quæ ex pluribus constarent, frequenter uti uoluerunt, propterea quod cõposita medicamenta fallacia esse deprehenderent, inq; mixtionibus illorū magnā sæpe rerum discordiam oriri uiderent. Id quod inde euenire certum est, quod hi qui eiusmodi composita medicamenta aut pro placito suo, aut aliorum ægrorum præscribunt, non raro Simplicia ipsa non norunt, multo minus autem plantarū, quæ contrarijs sæpenumero præditæ sunt uiribus, expertas habent facultates. Quamobrē meo quidē iudicio non imprudenter prisci illi homines egisse uideri debent, qui compositionibus suis haud multa miscuerunt Simplicia, & non nisi ea quorum uis illis explorata esset. Inter quas Michridatis compositio quæ hodie etiamnum in usu est, & nonnullæ Attali Pergameni regis, quemadmodū ipse Galen⁹ refert, primas tenent. Ceterū si omnino cõpositis medicamentis utendū sit non plures q̃ quatuor Simplicia confectionib⁹ suis miscere debebant Medici, q̃d ueteres factitasse uidem⁹. Hinc a quaternario numero olim dicta fuit Theriaca diatessaron & aliæ nonnullæ compositiones. Verumenim uero Simplicibus per se uti consultissimum uidetur, cum illa a Deo, eiusq; ministra Natura tantas facultates

uiresq; acceperint, ut singula in suo genere, sanandi, roborandi, dolores sedandi, refrigerandi, exsalfaciendi, purgandi, & si necesse sit adurendi ui poleant, nec opus sit multa simul miscere, quæ ratio hodie & usitata est, & ab omnibus expetitur. Sunt enim ut ante diximus & Auicenna testatur simplicia, ad medendum efficacissima per se, nec aliorum auxilio indigent. Idem quoq; Auicenna & Hierophil⁹ simplicia per se, nullis alijs admixtis in medicina magnum momentum habere tradunt, cum composita medicamenta sine simplicibus consistere nequeant. Quapropter hoc nostro sæculo plurimum hac in re peccare multos uidemus. Reperias enim Medicos pleurosq; è scholis primū egressos, & ad Praxin, ut uocant accedentes (nihil hic de eruditis, & qui Methodo uera utuntur dixerim) qui aduersus quemuis morbum medicamentum præscribant decem aut uiginti constans simplicibus, quorum uix dimidiam partem cognitā habeant, sicut neq; morbum ipsum aut causam eius. Interea Medicos tales ægri sequuntur magnosq; suo cum damno præscriptis eorum utuntur. Quod si Medicos istos roges cur hæc uel illa præscribant, nihil aliud respondent, nisi in Auicenna & Vallesco, quibus sapientiores & doctiores uideri nolint, se ista legisse. Neq; aliter hi mihi sentire uidentur quam Romani sacerdotes, qui nullas alias preces ad Deum facere, neq; quicquam aliud in s. L. legere solent, quam quod in Breuiarijs suis (ut uocant) contineri uident. Sed eiusmodi Medicorum auxilia, ac tales sacerdotum preces Mundi ingratitudo meretur, & merito illi contingit, quod uulgarum apud Germanos habet prouerbiū *Ein neuer Arzt/eins neuen Birkhoffs bedarff*. Hoc est, Nouus Medicus, nouo opus habet Cœmiterio,

RECENSENTVR CAUSAE OB

QVAS RES HERBARIA SIMPLICIVMQVE

usus nostro tempore neglectus & oblitteratus pene fuerit.

Caput

IX.

MUltæ sane causæ sunt, ob quas diuina rei herbariæ cognitio longo tempore contempta & neglecta fuerit. Prima temporis iniuriæ ascribetur, quod omnia mutat, & præsentibus minime parcit, ita ut quæ hoc sæculo uulgarissima sint, eorum apud posteros plane nulla sit memoria. Ac licet temporis longinquitas in abolendis rebus magni sit momenti, tamen rei herbariæ non tam illa, quam magistratuū (pace illorum dixerim) negligentia nocuit. Cum namq; illorum officium sit, nō tantum operam dare, quo ciues & defendantur, & omni rerum necessariorum sufficientia (ut ita dicam) minime destituantur, uerum etiam ut & religio & sapientiæ studium sine quibus nulla Respubl. feliciter gubernari unquam

inquam poterit, promoueantur, negari non potest illorum culpa & superstitionem & barbariem in mundum irrepsisse. Debebant illis non tam auaritia ac dilatandi terminos suos cupiditas, & uoluptates cordi fuisse, quam ut recte iuuentus a teneris annis in Scholis linguarum, bonarumq; artium institueretur, quo deinceps in omni functionum genere sapientes & prudentes eruditosq; uiros, Reipub. præficere, & in locum eorum qui indies decedunt substituere potuissent. Quod studium cum illis defuit subsecuta est calamitosa illa ac profunda in omni literarum bonarum genere barbaries. Atque utinam uel hodie hæc altius apud se perpenderent, qui rerum potiuntur. Sed ne longius nostra digrediat oratio, redeamus ad institutum nostrum. Postquam ergo linguarum præcipuarum, hoc est, Hebraicæ, Græcæ, Latinæ, quæ & religionis & omnis doctrinæ conseruatrices merito censendæ sunt, cognitio negligi, & in locum earum Sophistica deliria passim doceri, et quod ad medicinam attinet ex male uersis Arabum scriptis duntaxat, neglectis Græcis & probatissimis authoribus, præcepta medicinæ peti cœperunt, in tantos errores demersi fuimus, ut neque quid doceremus alios, aut quid ipsi disceremus, nobis constaret. Manifestum namq; est, & negari non potest, sæpe in Arabicis libris nomina plantarum de morbis interpretatos nos fuisse, & contra, quod luce clarius est, & errata medicorum restantur. In hanc ignorationem nostra culpa incidimus. Germani enim sicut & aliæ nationes, nostram medicinam, tam quod ad artem ipsam, quam quod ad materiam eius attinet ex Arabia petebamus. Cum ea enim regio pretiosissima quæq; gignat aromata, quæ nobis ad minationi erant, ea, ut hodie etiamnum fieri uidemus, magnis sumptibus ad nos deportari curabamus.

Inter cæteras uero causas propter quas res herbaria longo tempore neglecta iacuit, & hæc quam nunc referemus haud postrema fuerit. Qui enim hactenus in Scholis medicorum studiosis præerant, ij nihil nisi scripta Mesuæ & Auicennæ Arabum, quæ in hodiernum usque diem non prorsus intelligimus, prælegebant. Præterea in curandis mortalium morbis istorum compositionibus tantum utebantur, spreto interea Germanicis & uulgaribus simplicibus, quorum cognitio & usus ex Galeno et Dioscoride petendus erat. Proinde qui doctorum nomen sibi usurpabant, Simplicium cognitionem contemnebant, tanquam se indignam. Ac ubi necessitas aliquando urgeret, ut necesse esset Simplicibus uulgaribus uti, coquis suis seplasiarijs qui & ipsi parum aut nihil in hac cognitione exploratū haberent, quidquid id erat officij demandabant. Quapropter ad Rizophoros & agyrtas, aut erroneos illos Aegyptios (sic enim se nominant) aut aniculas negotium hoc deuoluebatur. Et quidquid isti de herbarum nomenclaturis, facultatibusq; decernerent, rarus a doctoribus & seplasiarijs habebatur. Sed quantum

quantum ista Medicorum & officinarum ignorantia hominibus ægris nocuerit, nunc non dicam. Certe Mundus hoc pacto decipi uult, & meretur.

PER QVEM ET QVA RATIO

NE PLANTARIA COGNITIO NOSTRO TEM-

pore restitui cœperit.

Caput X.

Q Vanquam autem ingratitudo nostra grauissima quæq; merebatur, tamen non uoluit nos diuina benignitas hoc thesauro diutius carere, quin potius effecit ut res herbaria nō multis ante annis paulatim restitueretur, ita ut hodie (Deo sit laus) nemo non sciat simplicia non contemnenda esse, ut ante hac factum est, sed cum gratiarum actione usurpanda, quippe quæ ad omnes ferè morbos curandos (ut olim prodidit Hierophilus) efficacissima sint. Vnde doctissimi ueterum & diligentissimi homines, peculiarem quiscq; plantam omnibus modis, ad quosnam illa morbos faceret exploratam, posteritatis memoriæ mandabant. Sic Antonius Musa Beronicam, Apollonius Centaurium, Themison plantaginem, Homerus uero Crocum prædicat. Breuiter nullus ex doctoribus superiorum sæculorum Medicis fuit, qui non herbam aliquam (ut supra diximus) celebrarit, eaq; multos morbos curarit, cum hodie plures reperiatur quæ morbis medendis, non simplicia, sed composita medicamenta maxime ea quæ ex quamplurimis conficiuntur simplicibus, adhibeant, quæ tamen frequentius homines ægros ad orcum mittant, quam sanitati restituant. Sed ad rem accedamus, paucisq; & obiter eos commemoremus per quos pristinae dignitati res herbaria reddita est. Deus itaq; Opt. Max. his postremis temporibus uiros quosdam bonos & doctissimos in omnibus nationibus excitauit, qui ueterum scripta, nimirum Nicandri, Theophrasti, Dioscoridis, aliorumq; mendis repurgata, latinitati donarunt, ita ut ab omnibus nunc legi possint. Inter quos laudem obtinent. Hermolaus Barbarus, Ioannes Ruellius, Manardus Ferrariensis, Marcellus, Vergilius Florentinus, hi enim Dioscoridem in linguam Latinam transfulerunt, pro quo beneficio gratiæ illis maximæ sunt habendæ. Iam nec Germaniæ nostræ defuit diuina liberalitas, ut quæ in omni bonarum literarum genere, non uulgares uiros habuerit, quos hoc loco commemorare nihil attinet. Sed quod ad rem Herbariam pertinet, non pauci in Germania nostra uiri doctissimi reperti sunt & adhuc nonnulli in uiuis sunt, qui hanc Medicinæ partem scriptis suis illustrarunt. Primus post Hieronymum Braunschweig herbas tractauit Otho Brunfelsius uir pius, iuxtaq; doctissimus. Quid uero de Euricio et Valerio Cordis dicā, uiris nunquam satis laudatis

Post

Post hos Leonhartus Fuchsius, Ioannes Lonicerus, & Conradus Gesnerus Tigurinus Medicus clarissimus in hanc palæstram magna cum laude descenderunt. Hī enim omnes nullis laboribus parcunt, quo hac in re patriæ & posteritati inserviant. Quod idem pro uirili hoc in libro (in quo magno labore summaq; diligentia, quæ & ipse uidi, & expertus sum tradi di, quam foeliciter aliorum esto, sed candidorum iudicium) præstare sum conatus, ac deinceps, uita comite Deoq; fauente conabor sedulo. Quem admodum uero hī quorum nunc mentionem fecimus in plantis describendis utiles labores susceperunt, ita non pauci alij idem argumentum tractare uolentes, chartas potius inutiliter consumpsere, quam mortalibus scriptis suis profuere. Etenim si horū labores exactius pensites, nihil noui aut eximij in medium hos producere uidemus, quin potius aliorum labores in uolumen quoddam confarcinatos pro suis uenditare. Quos equidem aut laudis aut lucri cupiditatē exagitare credibile est, reputantes apud se dulce ex re qualibet, ut uulgatum habet prouerbium, esse lucrum. Culi cum omnino aut Muscarum hī ingenio præditi uidentur. Sicut enim bestiolæ istæ alieno se implent sanguine, ita isti alienis uestiuntur plumis, quibus tanquam suis superbiunt. Ut uero hæc perficiant, calami quem ingeniosæ moderari norunt, beneficio utuntur, ut uerissime de illis dici queat. Verite stylum & fecisti librum.

QVAS UTILITATES HERBARVM

RVM IMAGINES DEPICTAE ADFERANT, ET

quis illas primus depinxerit.

Caput XI.

Vlgo ita sentiunt, & ecclesiastici quidam scriptores asserunt, imagines Laicorum esse libros, quod illis libenter damus, maxime ubi hī, quibus uerbi diuini prædicatio commissæ est, ita obmutuerint, ut uel non possint, uel non uelint scripturas sanctas populo interpretari.

At quod ad herbarios depictos attinet, certum est non nihil illos utilitatis tum adferre, cum uiuas herbas, aut omnino non habemus, aut recentes nancisci non possumus. Quisquis uero hortos proprios & hortulanos habet is multas ac uarias stirpes plantare, quod olim Antonium Castorem Romæ fecisse legimus, earumq; uiuas imagines contemplari poterit, ita ut picturis non sit opus, nisi in hīs plantis quæ maxime peregrinæ sunt, quas nec recentes ubiq; locorum intueri licet, & quæ nostro solo assueti omni no recusant, Ac meo quidem iudicio uera pictoria ars ob multas causas nequa

nequaquam contemnenda uidetur, siquidem ueteres Græci, ut antiquissima monimenta loquuntur, ab ineunte ætate iuuentutē suam non tantū liberalibus studiis imbuebant, uerum etiam pingendi rationem docebant, quo omnes res gestas, aliāq; memoria digna, nunquam non in conspectu haberent.

Herbas primus Euax rex Arabum pinxisse, ac eiusmodi depictum librū Neroni Cæsari honoris gratia misisse dicitur. Fuerunt etiam alij multi, qui hoc institutum secuti sunt, nimirum Dionysius, Crateuas, Methrodorus, alijq; clarissimi uiri;

Nostro sæculo Michael Isingrinus Typographus Basiliensis primas tenet inter eos qui depictos herbarios ædiderunt. Is enim elegantissimos dedit plantarum Icones, & summo artificio ad naturæ imitationem comparatos. Nec sua priuandus est laude Christianus Egenolphus Francfordiensis Typographus, qui & ipse nullis neq; sumptibus, neque laboribus parcat, quo plantarum cognitionem & libris bonis & imaginibus pulchris illustret. Sed quid duo huiusmodi præstiterint opera ab ipsis in lucem ædita abunde testantur.

Nostros uero commentarios Iconibus illustrauit adolescentulus quidam Argentinensis David Kandel nomine. Is enim Vuendelini Rihelii nostri sumptibus ad me Hornibachium concessit, ubi herbarum, fruticum, arborumq; imagines simplicissime, sed & ad imitationem uiuarum stirpium, quas illi proponebam, diligentissime expressit. Qui cum summa industria in hoc opere usus fuerit, pictoriamq; artem nemine docente adeptus sit, quod multi Argentinenses norunt, eamq; indies magis magisque ita excoluerit ut industriæ suæ ipsum nec pœnitere, nec pudere iure debeat, uolui hoc loco mentionem eius honestam facere.

Quantis uero laboribus, sumptibusq; opus sit, in depingendis, exculpendis & imprimendis herbarum Iconibus, & honestissimus uir D. Vuendelinus Rihelius Typographus argentinensis, Dominus, amicus meus obseruandus, satis expertus est. Ac quia laboribus & sumptibus suis Reipub. seruile conatus est, laude sua dignus uideri merito debet. Alexander Magnus quondam mirifice celebrabatur, propterea quod magnam pecuniæ summam Aristoteli præceptoris suo misisset, quo is omnis generis animalia conquireret & describeret. Hodie uero (proh dolor) hæc & alia utilia studia exulant, nemoq; est qui illa uel exolat, uel sumptibus suis adiuare uelit. Quanquam non ita pridem cognoui doctissimum diligentissimūq; uirum D. Conradum Gesnerum Tigurinum, Dominum ac amicum meum obseruandiss. cum laborem suscepisse, quem ut foeliciter absoluat, faxit Deo opt. max.

DE HERBARVM GERMINA

TIONE. Caput XII.

Quo pacto uero, quo tempore, quibus in locis tam syluestres q̃
satiuæ stirpes proueniant, quando etiam colligendę, & quomo
do adseruandę sint, præterea quæ singularum sint facultates,
quis usus, satis luculenter in commentarijs nostris docuimus, ita ut in præ
sentia nihil de his dicendum uideatur, quare relictis illis, causas & argumen
tum suscepti operis, ordinemq̃ quem in illo sequimur, neque non cur ab
urtica auspicari uoluerimus paucis perstringamus.

QVAE ME CAUSAE PER MOVE

RINT, VT LINGVA GERMANICA HOS DE-STIRPI

um historia commentarios conscribere uoluerim. Caput XIII.

Cum profectiones meas & labores stirpium gratia susceptos uir
doctissimus Otho Brunfelsius piæ memoriæ, quibusdam refe
rentibus, Argentinae cognouisset, Hornbachium usq̃ ad me pe
des commigrauit, ut coram & hortos & collectanea mea uideret. Quæ sane
ita illi placuerunt ut deinceps & ipse & alij literis suis, ut uastum opus in or
dinem redigere ac Germaniæ nostræ communicare uellem, cohortari me
nunquam destiterunt. Quamquam autem quod petebant facile recusare
potuerim, ut qui tenuitatis & ingenij mei exiguitatis conscius mihi essem, ta
men excusationis nullus apud illos relictus fuit locus, ita quidem ut
post immensos exantlatos labores grauiores demum suscipere, ac partim
reprehensionibus quorundā me obijcere, partim uero bonis uiris tam im
probe urgētibus obsequi cogerer. Quod si studium laboresq̃ nostri pa
triae charissimæ; hoc est, Germaniæ aliquo saltem modo utiles fuerint, ni
hil sane est quod magis me exhilarare possit.

Præterea herbariorum qui superioris sæculo in usu fuerunt errata, ut susce
ptum opus semel perficerem, me commouerunt. Quæ uero ea sint hoc loco ni
hil attinet enumerare. Manifestū enim est Herbarios superioris sæculi in no
minibus tam herbarum q̃ morborum, & in in explicatione temperament
ac facultatum plurimum erroris habuisse, uulgusq̃ imperitum non tantum
seduxisse, uerum etiam damno haud uulgari affecisse.

Ad hæc ut de stirpibus hos conscriberem comentarios pauperū clamo
res me stimularunt. Ab his. n. sæpenumero rogatus fui, ut in gratiam paupe
rum & ad laudē Dei opt. max. donum q̃dā Deo acceperam, in lucem pro
ferre uellem. Hæ fere sunt causæ quæ me ad hoc opus ita impulerunt, ut ab
illo desisteret nullus potuerim. Faxit autem Deus ut tam profint nostri labo
res, quam prompto animo in Reipub. gratiam a nobis suscepti sunt.

QVID.

QVID IN HISCE NOSTRIS COM-

MENTARIIS CONTINEATUR, ET QVEM IN ILLIS

*ordinem seruemus.**Caput XIII.*

Nhiscenostris commentarijs Simplicia (ut uocant) & ea quidem
 I tractantur, quæ in Germania nostra ad manus meas peruenerunt,
 ut sunt herbae, caules, radices, flores, semina, fructus, poma sylue-
 stria & satia, praeterea frutices arboresq; fructiferae & steriles. Haec enim
 omnia diligentissime quomodo, ubi, & quando germinant, una cum appel-
 lationibus earum descripsimus. Deinde singulas etiam stirpes in suo gene-
 riti ita declarare uolui, ut indicare me non piguerit, quo tempore anni com-
 modissime reperiri & transplantari possint, & quo quæq; solo gaudeant.
 Nequenon adiecimus omnium plantarum fruticum, arborumq; quantum
 licuit, nomenclaturas germanicas, cum Germanis potissimum haec princi-
 pio scripserimus. Et ob multas etiam causas non omisimus Latinas, Grae-
 cas, Arabicas, aliasq; appellationes. Postremo singularum etiam natu-
 ras, qualitates, temperamenta, uiresq; exposuimus, & quo pacto tam exter-
 nis quam internis corporis partibus hisce mederi possimus. Quæ omnia
 tum ex probatissimis rei herbariae scriptoribus, Theophrasto inquam, Dio-
 scoride, & Galeno, tum uero ex ijs quæ longo usu & obseruatione ipse exper-
 tus fuera de promens, fideliter, simpliciter breuiterq; & ordine descripsi.

Cæterum partitum uniuersum opus in tres libros, quorum prior
 uulgares omnes tam syluestres quam satias & domesticas plantas, hor-
 tentesq; coronarias multasq; florumq; genera complurima, odoratas eti-
 am herbas quæ & medicinae & culinæ inserviunt, ordine & singulas suo in
 genere & loco descriptas continet. In secundo libro, Trifoliorum & Grami-
 num uaria genera, legaria, cerealia eorumq; uitia, siue ea in agris, pratis,
 paludibus, uliginosis, aut aquis proueniant: proinde & oleraceas, bulbo-
 sas, hederaceas & quæ alijs sese alligant, & humi repunt aut in altum ascen-
 dunt herbas, neque non lappaceas, aculeatas & umbellatas quasdam quo-
 rum mentio in primo libro non fuerat facta, ac peregrinas quasdam tra-
 cto. Tertius idemq; postremus habet omnes fere frutices, arboresq;, &
 fructiferas sterilesue omnes quotquot illarum in Germania nostra uidere
 mihi contigit. In his uero omnibus describendis eam fere rationem secu-
 tus sum, ut eas in tractatione coniungerem plantas quas natura formæ si-
 militudine coniunxisse uidetur, ita tamen, ut singulas suis capitibus ab alijs
 fecernerem. Neq; uolui literarum ordinem sequi ut ueteres solent herbarij.
 Habet enim ea ratio multum incommoditatis, siquid iudico. Nam qui
 eam in scriptis suis tenent, illi magna confusione rerum nunc herbam, sta-
 tim arborem, mox fruticem ponere necesse habent. Sed quo pacto plantæ
 quæ

quæ affinitate quadam formæ cōgeneres uidentur recte discernentur, si hoc ordine ut diximus describantur. Equidē facile est Alphabeti ordinem sequi. Quæcunq; enim quocunq; tempore occurrunt plantæ suum semper suam litera locum inueniunt, in quem nullo labore referri possunt, quod compendium in nostris laboribus, quos sane magnos in hoc opere pro Repub. exhaustimus, locum non habet.

Q V O S L A B O R E S I N H O C O P E R E

ADORNANDO SVSTINVERIMVS, ET CVR AB VR-

tica auspiciari uoluerimus.

Caput XV.

Uti nostræ ætatis herbarij in scriptis suis palam testantur, quanto sumptus fecerint, quantaq; diligentia & labore herbas suas secundum ordinem alphabeti in altissimis montibus, desertis, syluis & uallibus inquisierint. Vbi etiam commemorant sæpe e uarijs regionibus plantas quasdam magnis sumptibus petiuisse. Ad hæc non raro montes uallesq; perlustrasse, ac in sæuissimis quandoque tempestatibus, magno suo cum periculo, plantas quæsiuisse. Quæ omnia ut ab his referuntur facile crediderim. Qui enim tales semel suscepit labores, cum hæc & grauiora etiam perpeti oportet. Ego uero in præsentia pericula mea, immensos labores, famem, sitim, frigus, æstusq; terrores, longas & periculosas profectiones, difficillima itinera, per inuia, per montes, ualles, syluas, camposq; iacentes, aliq; Germaniæ loca, nequaquam commemorabo, quid enim alijs cum his? Delectatio ipsa & uoluptas quam ex rerum naturæ cognitione percipiebam, & studium Reipub. inseruiendi, hæc ut lubens sufferrem effecerunt. Itaque omissis his paucis etiam exponamus, cur ab vrtica librum auspiciari uoluerimus. Constat ergo vrticam inter omnes plantas tenerrimam omnisq; impuritatis sordiumq; quibus cæteræ herbæ sere coinquinantur, expertem esse, qui factum est, ut primum illi tribuerim locum. Præterea ut dignitati suæ restitueretur, & contemptus eius uindicaretur, uolui à fronte libri illā collocare. Notum est enim Medicos nostros & Sepiastarios magno vrticam fastu contemnere, ac puderet illos tam uili (ut ipsi sentiunt) herba uti. Quoniam uero vrtica non tantum in cibo, uerum etiam in medicina magnarum est uirium, quemadmodum in historia illius audiemus, recte mihi uideo fecisse, quod secus quam alij solent magno in honore illam habeam. Proinde cum maiores mei vrtice folia in sigillo suo, quo & ego utor, semper ostenderint, placuit uel eam quoque ob causam vrticam

P R A E F A T I O.


Urticam (quam tanquam et cibo & medicina utilissimam plantam in culina
& officina mea haud postremo loco semper habui) eiusq; historiam primo
quoque loco in hisce commentarijs describere. Hæc fere sunt quæ
præfationis uice nostris de stirpium historia commentarijs
præmittenda duximus. Nunc ad rem
ipsam accedamus.

F I N I S.

IOANNES SAPIDVS LE
CTORI STUDIOSO.

*Hoc Hieronymus ore Tragus spirabat, ut annos
Natus bis ternos octoq; lustra fuit.
Cui nullus medicus uulsam non porrigat herbam,
Tam dextre herbarum uimq; genusq; tenet,
Etcui tam laute struitur pœnuaria cella,
Qualem uiderunt sæcula nulla prius.
Det Deus huic sano longæui temporis usum
Vnus qui multos sedulus arte iuuat.*





1

HIERONYMI TRAGI DE STIR-
PIVM, MAXIME VERO EARVM, QVÆ IN GER-
mania nostra nascuntur, usitatis nomenclaturis, proprijsq; disse-
rentijs, necnon temperaturis ac facultatibus, commens-
tariorum Liber primus, Interprete Dauide
Kybero Argentinenst.

* *
*

De Vrticæ varijs generibus. Caput. I.

QUONIAM IGITUR STIRPIVM, PRÆSERTIM
uero earum quas Germania nostra profert, historiam no-
bis conscribere propositum est: exordiemur ab urtica, plan-
ta uulgatissima, omnibusq; notissima.

Nascuntur urticæ (ut à locis natalibus descriptionem auspicemur) ple-
runcq; iuxta sepes, macerias, inter rudera, alijsq; incultis locis.

Earum nouem genera Germanis sunt cognita, & decimum quoq; non
ita pridem ad nos ab exteris nationibus allatum est.

Inter omnes uero tres tantum reperiuntur, quæ tactu pungunt.

Rursus ex his ipsis, duæ quandoq; ad altitudinem trium cubitorum extre-
scunt, & radices illarū similiter magnæ fiunt longitudinis, quæ inuicem con-
tortæ & implicatæ, humi serpunt, colore croceo præditæ. Aduentante Vere
quotannis nouas cymas emittunt, unde nonnunquam una de radice quin-
i uel seni, aliquando plures, interim & pauciores asperrimi, lanuginosi, ac
quadrati caules prodeunt, quorum alij asperrimis & spadiceis, alij nigriori-
bus, & undiq; instar ferræ incisus folijs uestiuntur. Porro utraq; uehemen-
ter adurit. Semen utriusq; cauli, inter folia, expansis fibris adnascitur, quod
ubi tempore Autumni maturuerit, & extritum fuerit, albidum esse, & ad fi-
guram Milij (licet minus illo sit) accedere apparet. Nec uero illas planta-
re necesse est, quando sua sponte affatim luxurient, neque facile extirpari
queant, quo nomine inuisæ sunt agricolis, quippe quæ Plinio teste damnum
& impedimentum afferant omnibus hortensibus herbis.

Tertia uulgaris, quam Heyter Vessel hoc est, causticam siue ardentiorē
urticam, Germani dicunt, admodum exiguæ quantitatis est, raro enim ad
altitudinem trium palmorum assurgit, caulis eius rotundus, radix breuior,
folia angustiora, semen uero maius. Vrtica est alsiuosa, hyemis impatiens,

Urtica vulgares, urentes.
Gemein Brennend Klesseln.




quare singulis annis, ex semine deciduo repullulascit, horrorem omnium
 singularis pestis.

4. Peregrina autem, eademq; elegantissima, folijs, caule, & semine iam com-
 memoratae.

Vrtica maior.
Heuter Viesel.


Vrtica Romana.
Römisch Viesel.



memoratae similis est, nisi quod magis erectum, teretem & concauum cau-
lem habet, qui ad altitudinem duorum cubitorum assurgit, atq; is admo-
dum pungentibus, incisil asperisq; folijs circumdatus est, inter quae flos ca-

Galiopsis.
Binsaug.

Lamium.
Tode Klesselen.



pillatus seu fibratus, partim rubicundus, partim subluteus uisitur, iuxtaq;
illum erumpunt nodi, seu globuli teretes, asperi, & aculeati, quibus semen
laeue inclusum est, primo gustu dulce, uerum postea pipere calidius. Hoc
urticae.

Heraclea.
Waldt Viesel.



urticæ genus in hortis ex se-
mine, quod aliquatenus li-
no conferri possit, planta-
re oportet.

Reliqua sex genera necq̃
pungunt, necq̃ urunt, & ad
formam urticæ magnę pun-
gentis accedunt, tam quo-
ad caulem, quam etiam
herbam. Quorū tria in cau-
le circumcirca flores. ^{5.}
rūt, eosq̃ alios albos, alios
croceos, alios uero purpu- ^{6.}
reos, nigri Marrubij flori- ^{7.}
bus nō absimiles, habentq̃
plerumq̃ quatuor triangu-
laris formæ oblonga gra-
na seu semina, uno in folli-
culo intercurfantibus mē-
branis instar crucis distin-
cto.

Triā alia genera pror- ^{8.}
sus cum superioribus con- ^{9.}
ueniunt, nisi quod grauit̃er ^{10.}
olent. Horum duo incul-
ta terra progignuntur, non
secus atq̃ urentes urticæ,
suntq̃ teneris, rotundis at-
que minimis folijs ornata.

Ex his urticis, altera cir-
ca caulem luteos habet flo-
res, in altera uero purpu-
rei, uerum minores quam
in urtica Germanis Bin-
saug uocata, quadrato cau

li adnascuntur. Folia ad cinereum colorem declinant.

Postrema & formosissima urtica ea est, quæ in syluis ac dumetis nasci-
tur, caule & herba uulgarī consimilis, grauissimi odoris, ac tamen grati,

quemadmodum & Melissa, purpureis floribus circa caulem usq; ad summitatem uestita, instar Spicæ uel Ocymi. Semen huius quoq; in folliculis continetur, teres, nigrum, minutius semine Rapi, per omnia Ocymi semen referens.

NOMENCLATURAÆ.

Duas priores urticas, quas magnas & urentes uocant, unius generis esse existimamus. Tertiam appellant Heyter Nessel ardentio rem urticam, propter æstuosam eius adustionem.

Quarta, Italica seu Romana, hortensis urtica nominata est, et fieri potest, ut ea sit quam Dioscorides syluestrem dicit. Alias omnium pungentium urticarum nomina hæc sunt ἀκαλύφη, κνίδις, Akalyphe, Cnide, Adice, Selepsio. Serapioni, Humure Vraith, cap. cl. Semen urticæ, Arabes, Bizeri Bango, ra seu Ragi, appellant.

Inter urticas non pungentes tria priora genera Germanis dicuntur Byn saug / Hanenkopff & Anonium, Dioscoridi γαλιόφις, Galeobdolon, Galephos, Anthepi, Urtica Labeo.

Quædam exemplaria legunt γαλιόφις per i. Reliqua genera Germanis Saub Nessel / Dodten Nessel dicuntur, Latinis, Lamium. Vltimam uero quæ in dumetis & syluis plerunq; gignitur, Herculeam Plinij esse arbitror, non tamen pugnari magnopere, propter grauissimum quem obtrinet odorem, quin firmiter teneo eam esse Galeop, sin Dioscoridis. Hebræi urticam חררל Charul Sopho. ה. & מלוח Malluach uocant, Iob. xxx capite.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Omnes urentes urticæ temperatura sua siccæ sunt, quamobrem resoluunt, discutiunt, & incidunt duros tumores ac pustulas, & si qua alia à Pituita deriuantur, idq; tam in internis q̃ externis corporis partibus efficiunt.

INTRINSECVS.

Urticæ folia uino decocta & pota, aluum emolliunt, discutiunt flatus, cohibent tormina, maxime ea, quæ non à constipatione alui orta sunt, urinam cient, purgant lumbos, Venerem stimulant.

Urticæ semen in dictis morbis efficacius est, sapa decoctum, aut si admixto melle ex illo Eclegma fiat. Aqua ex urtica distillata, aliquanto mitior & commodior usu, in memoratis ægritudinibus, purgat enim & abstergit omnia uulnera tam interna quam externa, si bibatur, uel si uulnera ex illa abluantur.

Radix.

Radix magnæ pungentis urticæ uino & melle decocta, haud uulgare medicamentum est contra frigidas tussis, & Orthopnoëas, purgat namq; fistulas spiritales pulmonis, & quæ in thorace sunt educit, pectorisq; uitia emendat, discutit Pleuritidas, & uuæ affectiones curat, aliosq; morbos, qui ex uiscoso humore suboriuntur, mensura iij. uel iijj. ligularum, pota ac gargarisata.

Semen tusum cum melle efficacius est ad purgandum pectus, quam radicis decoctum.

EXTRINSECVS.

Folia urticæ tusa, & cum sale ritu Emplastri imposita, uulneribus & canis rabiosi moribus medentur, experientia id attestante.

Pari ratione sordidis, putridis gangrænosus ac malignis ulceribus, ut sunt Carcinomata & Herpetæ, folia tusa & emplastri modo imposita auxiliantur. Quin & illa cataplasmata incidunt collectiones omnes & duritias, abscessus, frigidiosq; tumores, siue ij sint in articulis, siue in liene, aut secundum aures.

Urtica urens quam Germani *Beitter Nessel* uocant, uiribus inferior est, nisi ubi adhuc uiuens, externis corporis partibus adhibetur.

Urticæ inertes omnes eandem cum urentibus uim habent, plus tamen possunt in externis ulceribus, & tumoribus dissipandis, quapropter illis in balneis ad uaporationes & emolliendū uterum uti conuenit, præsertim syluestri, quæ aliàs *Heraclea* dicitur.

Experientia proinde certa de olentibus urticis, quæ in uetustis arboribus & sepibus proueniunt. Illæ enim si uiuentes adhuc contundantur, earumq; succus cum folijs, Cataplasmatibus instar, Phagedænæ, quam Germani *den wurm* uocant, imponantur, breui eam enecabunt.

Succus urticæ naribus admotus, sanguinem prouocat. Aestum & Pus, & las ab urtica excitatas restinguit, & sanat oleum Rosarum, idem efficit oleum Oliuæ.

Ex his quæ iam dicta sunt alia innumera colligi poterunt.

De Marrubio. Cap. II.

ARRVBII QVATVOR GENERA MIHI COGNITA

M sunt, quæ omnia quadrangulos caules habent.

1.

Marrubium maius nigricantis est coloris, & à magna urtica ni Marrubium hil differt, nisi folijs, quæ incisuris profundioribus, & conspectioribus maius.


A iij

Marrubium maius.

Groß und schwarz Andorn:

*Marrubium candidum.*

Weiß Andorn.



dissecta sunt quam urticæ . Flores caulem verticillatim ambiunt, per
 ternalla æqualia, non secus ac in urtica, quæ Germanis Hynsaug dicitur.
 Post florem semen nigrum oblongum & triangulare, idq; binum uel ternū,
 nec.

Marrubium agreste.
feld Andoin.

Marrubium aquaticum.
Wasser Andoin.



nec Aquilegiæ semen magnitudine excedens, in aculeato folliculo reperias.

2

Alterum & uulgare Marrubium albicat, folijsq; rotundis & squalidis, Marrubium:
caule quadrangulo, flore candido, in folliculis aculeatis uerticillatim per uulgare.

A v.

intercapedines æquales, caulem circumiacentibus præditum est: Porro utrunq; grauissimi & amari saporis, & incultis locis, secus macerías, sepes, & inter rudera nascitur.

3. •
Marrubium
campestre.

Tertium Marrubium genus est Gallitrichi sylvestris, de quo in Gallitricho plura. Planta est sæpe unico, eoque quadrangulâ caule prædita, folia eius plane hirsuta & magis albicantia superiori genere, ad folia maioris Balsamitæ accedentia, quod ad magnitudinem attinet: colore uero folia Verbasci (quod Gál wull appellant Germani, quo de infra cap. lxxij.) referentia. Flos in uasculis per omnia reliquis Marrubijs similibus, purpureo tantum colore differentibus, continetur. Semen minime aculeatum sed teres, ut est semen Brassicæ, Odor huius plantæ gratissimus.

4.
Marrubium
palustre.

Quantum Marrubium iuxta fluuios, lacus & fossas gignitur, & quod ad caulem, folliculos, folia ac flores attinet, primo non absimile, cubiti altitudinem haud temere superat, color illi prassinus. Folia prope complicata, instar foliorum Betulæ recens erumpentium, Flores exigui & albi, sicut & in Melissa, caulem circumdant,

NOMENCLATURAE.

Diosco. lib. 3.
cap. 108.

Nigro Marrubio Dioscorides hæc assignat nomina βαλλυτή, μέγα ήμίονον, Ballote, magnum aut nigrum Marrubium, Notianoscemi, Nosprasson, Nothera, Nothalis, Nochelis, Nophris, Gnothera, Asphos, Ixionis sanguis, Apnium, Medata. Herba Viceraria, Canthurinum. Atqui Marrubium album eidem auctori appellatur πρᾶσιον, ἀντατίριον, φυλλόραρι, Tripedilon, Camelopedion, Labeo, Asterion, Asterope, φυλλόραρι, Atyrberfia, Tauri sanguis, Horu genitura, Marrubium.

Diosco. lib. 3.
cap. 110.

Marrubij appellatio Tragorigna quoq; Germanis Dostentribuitur lib. 3. cap.

Nicander in Theriacis scribit Marrubium à pastoribus μελιπολλον uocari, quod quidam propter apes Melittænam interpretantur. Quæ sane uerba ego de urtica Germanis Bynsaug dicta, intelligo, quæ dubio procul uera est Melissa, neq; enim quæ uulgo dicitur, Melissa est.

30. Diosco.
Eupatorii uox
apud eundem cap.

Apuleius, Ægyptios Marrubium Asteriopen uocari tradit, quosdam etiam Melittænam: Serapioni album Marrubium, Marua Iantusa dicitur.

39. lib. 4. alteri
herbæ ascribitur

Tertium Marrubium, Germani feld scharlach/ feld Andorn nominant: Hoc ipsum tam suaue olens Marrubium, Stachyn esse existimo, quæ à Dioscoride lib. iiij. cap. cxi. describitur.

Apul. cap. 45.
Serapio cap. 285.

Quantum uulgo Marrubium palustre, Sentus, in Auicenna, Germanis Wasser oder weyer Andorn uocatur.

Marrubium quibusdam Hebraice, uel potius Chaldaice תמחא Tamchad dicitur, Vide Munsteri Aruch.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Quemadmodum urtica ita & Marrubij omnia genera calefaciunt, discutiunt ac desiccant. Candidum tamen plurimum apud nos commendatur, non tantum propter iuuamenta, sed & ob odorem gratissimum, quare & internis partibus corporis potius, quam reliqua, adhibetur.

INTRINSECVS.

Folia Marrubij candidi aqua aut uino decocta, cum melle despumato, mulq; elixo, dantur spiriosis, pleuriticis & tussientibus.

Marrubium epatis, lienis & matricis obstructions tollit, secundas expellit, uterum purgat, & menses euocat, præsertim si cum Iride decoctum fuerit.

Succus Marrubij eadem efficit, mensura trium cochlearium sumptus.

Idem etiam his qui uenenum hauserunt, & contra serpentium morsus apprime conducit, inprimis uero hoc præstat succus Marrubij candidi, quod in altissimis campis prouenit.

Quin & claritatem oculorum adiuuat, lumbricos & aurium uermes enecat.

EXTRINSECVS.

Omnia Marrubij genera siccata comode fomentis & balneis adiunguntur, quibus Phlegmaticæ mulieres albis mensibus, & dorsi, laterum, & crurum doloribus laborantes, utuntur.

Aqua in qua Marrubium decoctum fuerit, omnes malas scabies, & serpigines, præcipue porrigines, ac papulas sanat. Quamobrè capita puerorū, qui scabie, quæ Germanis *Udoim* & *Negerey* dicitur, uexantur, ea ablui debent, Lixiuum proinde in quo Marrubium nigrum decoctum est, manantibus capitis ulceribus, quod uicium pueris frequenter usuuenire solet, si colauentur, perutile est.

Puluis Marrubiorum mariscas perfanat.

De Melissa. Cap. III.


ELISSA QVAM GERMANI *Mütterfrant* APPELLANT;

M tam incultis quam cultis locis nascitur, cuius radix multis alijs coniunctis, ac coherentibus radiculis intra terram hinc inde serpit, quemadmo-

Melissa.

Mütter Kraut.

1.
Melissa dom-
estica.



2.
Sylvestris
Melissa.

Diosco. lib. 3.
cap. 109.

De Melittæna
uocæ uide cap. 2.
supra, nam &
Marrubio illa
tribuitur.

Mütter Kraut / Bergkraut / Frauenkraut / Immenblatt / Pfaffenkraut.
Dioscoridi ~~Marrubio~~, ~~Marrubio~~, Melittænum, Melittæna, Erythra, De-
mele, Meritemenon, Apiastrum, Citrago, & Citraria dicitur. Serapion,

Bede

quemadmodum urtica, plu-
resq; cubitales caulículos
ex se mittit, quadrangula-
res, breuiiores, ac tenuiores
nigro Marrubio. Folia eti-
am ad formam urticæ, ma-
xime illius quæ Bynsaug
Germanis dicitur, aut Bal-
saminæ Germanis Spitzen
Balsam/accedunt. Flos in
folliculis per interualla æ-
qualiter distantia; alius pur-
pureus, alius subluteus, cau-
lem ornat. Post florem in
ijsdē folliculis semen Aquil-
legiæ simile, longe tamen
illo minus, cōtinetur. Plan-
ta hæc admirando odore
prædita est, primum namq;
cimices redolet, quo uero
propius naribus adinoue-
ris, eo gratiorem odorem
spirabit.

Sylvestris Melissa radice
& caule iam dictæ consimi-
lis est. Folia autem maiori
urticæ, serratiora tamen
quemadmodum & Marru-
bi nigri, cubiti altitudinē
non excedens, sylvestris
grauissimiq; odoris frutex.

NOMENCLATURAE.

Melissam Germani uocant

Melissa vulgaris.
Gemein Mutterkraut.



Bederangie, Bedarungi, Turungen, Marmachor. Ia
cobo Manlio, Ocymum ci
tratum nominatur. *Serap. de Tempe
ra. Simp. cap. 22.*

Sylvestris Melissa à mul-
terculis nostris, *Hertzgespö*
& *Hertzkraut* dicitur, estq;
ea herba, quæ Germanis
Gäle Bynsaug appellatur,
de qua supra, capite 1 men-
tio facta est, an uero ea Ni-
candri Melissa sit, alijs discu-
tiendum relinquo.

VIRES AC TEMPE-
rumentum.

Melissa seu ut Barbari
uocant Matricaria, omnibus
ferme mulieribus notissi-
ma herba, calefacit, exiccat,
discutit, sanat, & congluti-
nat, utrinq; enim, hoc est, in
ternis externisq; corporis
partibus adhibitum magni
est usus. P. Ægyneta scribit
uires illi easdem esse, quæ
& Marrubio.

INTRINSECVS.

Melissa uino albo deco-
cta, et per aliquot dies pota,
pectus purgat, Astmaticis
prodest, cor confortat, tristi-
tias à Melancolia profectas
tollit, morbum comitia-

lem, & omnes prope morbos internos curat; quamobrem Clysteres ex illa
recte conficiuntur.

Melissa minutim concisa, perq; noctem uino albo optimo macerata, ac
deinde.

deinde in vitro distillata, inprimis commendatur, nam non tantum ad mulierum tormina, & uuluarum strangulatus seu præcipationes mire conducit, mensura trium uel quatuor coclearium pota, uerumetiam Cardiacæ, & fungorum strangulatibus auxiliatur. Oris exulcerationes si cum illa abluantur, sanat, claritatem oculorum adiuuat.

EXTRINSECVS.

Melissæ herba cum floribus Chamomillæ lineo sacculo imposita, uino aquaué decocta, deinde expressa, ac calida matrici inquietæ, & suo loco motæ, imposita, præcipationem eius cohibet, inq; locum suum reponit.

Melissa in decessionibus mulierum ad ducendos menses perutilis est, lumhorum dolores sedat.

Melissa uiridis cum sale illita, cataplasmatibus instar strumas discutit. Aqua Melissæ omni scabiei, ac pustulis medetur, quemadmodum & scorpionum, & aranearum ictibus, ac canis rabiosi moribus, si cum illa colluantur.


Melissæ aqua uino turbulento infusa, pristinæ illud claritati restituit. Eadem carnibus aspersa, à muscarum & tarmorum iniuria ipsas vindicat.

De Nepeta. Cap. IIII.

NEPETA HAUD ALITER QVAM VRTICA FRVTICAT, nam & caulis & folia formam ac magnitudinem illius æmulantur, nulla alia re ab ea differens, quam quod folia colore subcinereo sunt, tactu mollia, Althææ eatenus cognata.

^{1.} *Nepeta vulgaris* Planta agresti attamen non insuauis odore prædita est, ad Melissam propius quam ad Balsaminam accedens. Nascitur plerumq; ad macerias, & inter rudera alijsq; incultis locis, felibus admodum grata. Flos caulem ambit quemadmodum in Melissa fit, unde ego adductus Melissa eam esse speciem existimo, id quod iuuamenta eius quæ Plinius lib. xxx. cap. xxiij. annotauit, confirmare uidentur.


^{2.} *Salvia syluestris*. Quod ad alteram Nepetam attinet, quam Dioscorides lib. iij. cap. xli, Nepetam montanam uocat, dico ego eam esse quæ uulgo ab omnibus Germanica uoce wild Salbey/ id est Salvia syluestris dicitur, quam scioli quidam (qui omnem herbariam cognitionem à mulierculis uetulis accepere, quorum reprehensionem ut me effugere non posse satis scio, ita minime curo) Eupatorium uocitant, quod nomen herbe Germanis Odermenig dicitur, (de qua infra cap. clxxv) proprie conuenit. Porro hæc ipsa Nepeta seu Sal-

*Nepeta.**Nepet/zam Katzenfranz.**Salvia sylvestris.**Wald Salbey.*


Salvia sylvestris in sylvis passim luxuriat, folijs rotundis serratis, ac aliquantulum acuminatis, urticam fere referens. Caules plures una de radice germinant, ijꝑ quadrangulares & purpurei, floribus flauis atꝑ copiosis scemur.

tuq.

Balsamina agrestis.
Wild. Bogenkraut.



Nepeta agrestis.
Acker Nepet.



tuo excipientibus usque ad finem, ubi folliculo quodam semen teres continetur, ornati.

*Balsamina
agrestis.*

Tertia *Nepeta Balsaminæ* forma & odore prope similis est, folio *Basilici* agrestis,

ci agrestis, florem in summitate Stechadi, haud absimilem, partim purpureum, partim uero coloris mediꝝ inter candidum ac purpureum, gerit. Proinde hæc Nepeta in agris gramineis & ad fossas paludesq; in syluis etiam uliginosis nascitur, odoris suauissimi herba, & quæ in altitudinē magnam excrescat, maxime ea quæ ad fossas gignitur.

Quarta Nepeta planta est grauissimi odoris, circa humida loca proueniens. Folia habet similia Origano, de quo infra. cap. x. uerum minora, eaq; incana, gustu impense feruentia, & amara, flores rubei caulem circumdant. Porro duæ quas postremo loco commemorauimus, ad syluestrem Mentham pertinent.

NOMENCLATURAÆ.

Nepetam uocant Germani *Ratzenkraut* / Dioscoridi *ναρὰνθη* dicitur, Apuleio uero, *Minthe agria*, id est, *Mentha sylvestris*; *Míntheorinos*, *Diaula*, *Hæma hammonos*, *Gonos hammonos*. Serapioni deniq; *Calamentum*, & *Pulegium agreste*, quæ quidem omnia nomina postremis duabus Nepetis (quarum appellationes apud Dioscoridem hæc sunt *σνίγδιον*, seu *σνίγδιον*, *Pleuritis*, *ναρὰνθη ἀγρία*, *Chamædrys*, *Dysosmos*, *Mithridamos*, *Sanguis podotis*, *Apho*, & *Trixago palustris*) tribuenda mihi uidentur. Quod si quis iam dictas Neperas *Balsaminæ sylvestri* & *Menthæ*, quam Germani *wild fisch niünz* nuncupant, accensere uelit, cum eo non magnopere contenderim. Sed quod nonnulli ultimam Neperam *Pulegio sylvestri* adiungant, manifestus error est.

Diosco. lib. 3.
cap. 38.

Apuleius. cap. 93

Serap. cap. 31.

Diosco. lib. 3.
cap. 166.

VIRESCACTEMPERAMENTVM.

Nepetæ plus affinitatis cum Melissa, quam cum Mentha habent, possuntq; tam internis quam externis corporis partibus salubriter adhiberi.

INTRINSECVS.

Succus Nepetæ seu Saluicæ sylvestris (quæ uera est Nepeta montana) cum uino potus, expellit lumbricos, ueneno resistit, sudorem elicit, Iocinoris & lienis meatus adaperit, excalfacit renes frigida intemperie læsos, Matricis dolores sedat, menses ciet. Hæc omnia Nepetæ efficacius præstant uino decoctæ ac potæ, pectus etiam purgat huiusmodi potio, urinam prouocat, rupturas sanat, morbum regium incidit, Fluxū cholæræ cohibet, stomachūq; confortat, Febri tertianæ medetur, si stomacho prius purgato sumatur.

EXTRINSECVS.

Nepeta uino decocta, uel succus eiusdem nigræ cicatrices emendat, uermes aurium quos Græci *ἀρά* uocant, enecat.

Nepeta in defensionibus & fomentis muliebribus, foetum, menses, & secundinas expellit, matricis dolores mitigat, quod & Mentha efficit. Suffitu Nepetę serpentes, aliaq; uenenosa animalia fugantur.

De Menthis. Cap. V.

VANDOQVIDEM POSTERIORES DVAE NEPETAE

Q ad Menthas fere accedunt, de illis porro agemus, differentias illarum ordine explicaturi. Mentharum itaq; tria sunt genera domestica, rubea scilicet, crispa & acuta.

^{1.}
Mentha.

^{2.}
Mentha sativa.

^{3.}
Balsamina uulgaris.

^{4.}
Sylvestris Mentha prima.

^{5.}
Menthastrum.

^{6.}
Nepeta aquatica

Quod ad primam attinet eam esse existimo Simfybriū, quo de Dioscorides lib. ij. cap. cxvij. scribit, alteram hortensem, quę alias sativa dicitur, omniumq; nobilissima habetur, quā de Dioscorides lib. iij. cap. xxxvi. Postremam, deniq; uulgarem Balsaminam esse, siue acutam Mentham, quam Dioscorides lib. iij. cap. xli. describit, ego iudico.

His uero tribus Menthis, tria alia, uerum sylvestria subsunt genera, uliginosis locis fere prouenientia, agresti ac fortissimo odore prædita.

Sylvestrium Mentharum prima quadamtenus punicea, bicubitalis, rubris caulibus, folijs uiridibus ac nonnihil puniceis, iisdemq; rotundis, flore subpurpureo.

Altera quę proprie Menthastrum appellatur, per omnia nobili ac hortensi Menthæ similis, nisi quod illa magis crispa, hirsutior, mollior ac tenerior est, coloris cinerei, gaudet palustribus locis, & passim ad fontium scaturigines nascitur.

Tertia ad acutam Balsamitam accedit, minor tamen illa, folijs admodum ferratis & ualde odoratis, eadem loca quę reliqua duo genera, amat, quam non ubiq; proueniat. Proinde hæc ipsa Mentha Balsamitæ acutæ species est sylvestris, ad quam & alia pertinet, quę folijs, caule, flore ac odore, iam dicta sylvestrior, latior & longior apparet, in irriguis quandoq; campis fruticans.

NOMENCLATURA.


^{1.}
Sisimbrium alterum Sion cognominatur, & Serpilli quoque uox alijs plantis attribuitur Dio. lib. 3. ca. 4.

Priorem domesticam rubeamq; Mentham, Dioscoridis esse iudico, quod ille Coronam seu herbam Veneris, Serpyllū, & Australidem cognominat.

^{2.}
Secunda Mentha, nimirum quę uulgo domestica & crispa Balsamita dicitur, apud Dioscoridem sequentia sortita est nomina. Mentha, Mentha sativa, Nepeta, Perxo, Maçetho, Perithromoncho, Tis, Germanis

Beymenta/

Mentha rubra, seu Sisybrium.
Rote Münz.



Mentha sativa, seu crispa.
Brauß Münz.



Beymenta/Brauserbalsam/& Münz/Auerrohi, Haama, Serapioni Na
hamatauocatur.

Serap. cap. 288.

Tertia Mentha ea est quæ aliàs Balsamita acuta dicitur, de qua proximo

B ij

Mentastrum.
Bazen balsam.



Nepeta aquatica.
Spizerbalsam.



capite egimus, quam Dioscorides lib. iij. cap. xxxviii. satis descripsit, cum dicit, Est postremo & quædam agresti Menthæ similis, &c. Arabes & præcipue Serap. cap. cclxxxviij. Menthas satiuas, Nahanahe uocant, Auerroes Haama appellat Mentastrum, Alphocenus. Iam.

Iam ut de sylvestribus loquamur, primam ex illis quæ rubea est *asopodo* 4.
 ratum facile dixerim, quod tamen non intelligas uelim de uulgari Sio, cuius De altero odora
 descriptionem infra cap. lxi. persequemur, Germani Wild-basilgen/hoc est, to Sio, uide infra
 Basilicon sylvestre ob suauissimum quem spirat odorem, uocant. cap. 155. nostrorū

Altera agrestis Mentha, quæ domesticæ & crispæ Balsamitæ, uel Marru- commentariorū.
 bio candido, haud multū absimilis apparet, quamq; Germani Rosmüntz/ 5.
 Bagen Balsam/Bachmüntz uocitamus, ipsissimum est Mentastrum Dio- id'ioquos αγγελικον
 scoridis, quod aliàs Mentha campestris, & apud Apuleium Glechon Agri- Diosco. lib. 3.
 on, Osmites, Gonos Apollonos, Osthane, Hispanis Creobula dicitur. cap. 37.

Tertia agrestis Mentha, quæ & inter reliquas acutissima est, ad Nepetam Apuleius ca. 90.
 pertinet, de qua supra capite quarto diximus. 6.

Postremo hic mihi candidus lector monendus est, de ueterum in descri-
 ptione Mentharum iudicio, ñ namq; sine ullo discrimine, Menthæ, Ne-
 petæ Balsamitæ species ac nomina miscere sunt soliti, nunc Nepetas, nunc
 Menthas, aliàs Calaminthas illas appellantes, quod fortasse iam memora-
 tas plantas (id quod mihi tamen uerissimile non uidetur) discernere nequa-
 quam possent, uel quod ñ ipsi frutices easdem pene facultates obtineant.
 Quare proculdubio Sium Dioscoridis, Menthis annumerandum erit, nam
 gratissimi est odoris, teste eodem authore. Porro ea quam Germani Klein-
 bachmüntz uocant, sequenti capite explicabitur. Mentham nonnulli He-
 bræi מנטה Amisa, & מנתה Mentha appellant.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTVM.

Intèr Menthas crispæ inprimis commendantur, eadem nimirum cum Pu-
 legio & Melissa facultate donatæ, possuntq; utiliter tam foris adhiberi, quam
 intro sumi.

INTRINSECVS.

Succus Menthæ admixto aceto sanguinis excreationes, & uomitus reprimi-
 mit, tinea in uentre enecat.

Omnium Mentharum herba tam uiridis quam siccata supra modum sto-
 macho confert, sicut & aqua Menthæ distillata, non solum enim concoctio-
 nem adiuuat, sed & singultus, fastidia, ac nauseas inhihet, cholerasq; (præ-
 fertim si ex illa salsamenta parentur) sedat, Venerē stimulat, membra omnia
 confortat, odor deniq; illius cerebrum corroborat, ac memoriam conser-
 uat, augetq;.

EXTRINSECVS.

Herba Balsamitæ, uel aqua eius distillata, aut succus linteolis exceptus,

ac fronti impositus dolorem mitigat, similiter mammis mulierum à lacte infantes depellentium, si tendantur, aut lacte turgent imposita, lactis coagulationes discutit. Auribus instillata, dolores illarum tollit.

Mentha cum sale contusa, canis rabiosi moribus illita, citra periculum medetur.

Herba Balsamitæ siccata, & in puluerem redacta, ac fermento temperata, posteaq; instar emplastri illita, ac præcordijs quemadmodum Epithima imposita, eructationes stomachi, & uomitiones cohibet.

Breuitè omnia genera Mentharum magnam uim habent, excalfaciendi & resoluendi, ad fomenta, deflectiones ac balnea sudatoria, seu sicca, quæ à Celso Laconica appellantur, utilissima, quare à nonnullis balneis siccis, & clisteribus adhiçuntur.

Menthæ folia lacti immersa, coagulari illud, & in caseum coire non permittunt.

De Pulegio. Cap. VI.

Celsus lib. 2.

cap. 32.

Diosco. lib. 3.

cap. 31.

Plinius lib. 18.

cap. 25. lib. 19.

cap. 8.


PVLEGIVM MIRA FACVLTATE POLLET, NAM ET dormientes, & in ouiculis si illud florens degustauerint, balatum excitat. Æstate cum omnes aliæ plantæ nimio æstu torrentur, solum Pulegium in florem erumpit, etiam in aridissimis locis. Et, quod admiratione dignissimum in ipso die brumali Pulegium emortuum in carnarijs quasi reuiuiscens florere Plinius tradidit.

1. Est autem Pulegium frutex hinc inde proserpens, ac intra humum undiq; radicem agens, quemadmodum Serpentaria, ad altitudinem non assurgit, nisi dum floret, atq; tum quidem dodrantalem habet cauliculum, nec altior. Flos caulem circumdat usq; in summum, ueluti in Ocimo, plerunq; ex roseo albicans, quamuis in quibusdam illi rubicantem uidere sit. Neq; aliã plantam reperiãs, quæ perinde atq; Pulegium ubiq; adhærescere soleat, nam non tantum in ipsis sertis incrementum accipit, sed etiã ubicunq; terram solũ attigerit, ibi longe lateq; se propagat, totosq; campos breui occupat, uelutiq;. Locis uero humidis maxime gaudet. In sylua Brocomagi (qui uicus est prope Argentoratũ decantatissimus) flore purpureo, odore grauissimo, iuxtaq; suauissimo, affatim luxuriat.

2. Pulegium autem syluestre, quod Dictamnno Dioscorides annumerat, in herbidis & humectis passim campis inuenitur, satiuo per omnia simile, herba tamen caule, ac flore grandius, & ad formam fere Menthe exiguæ accedens, quo nomine Germanis Flein Bachmünz appellatur.

NOMEN.

Pulegium.
Poley.



NOMENCLATURA.

Pulegium latinis, *πύλεγιον*, uel *πύλεγιον* Grecis et *Ansenicanthon* & *Galeopsis*, Germanis *Poley* dicitur. Quibusdam alijs *Apolegium*, & *Abuolum*. Apu-

B iij


Diosco. lib. 3.

cap. 31.

Galeopsis urticae
ex inertis nomē
est, ut 1. cap. don-
cuimus.

Mentha aquatica, exigua.

Klein Bachmintz.



Apul, cap. 92. Iei^{us} alia quoq; adiicit nomina Poludon scilicet Hemiton, Panthagathon, Dimoron. Serapio cap. ccc. ait Fandenigi esse Origanum, seu Pulegium, insuper & alijs nominibus Pulegium dici Alnam, Alnegea, & Baluam. Sylvestre.

Sylueſtre Pulegium Plinius lib. xx. cap. xiiij. Diſtamnum appellat, Sero-
pio loco iam commemorato, uocat Diſtamum, & Diphthamum, et Alne-
gen Araba, & Bari, ac Meſcatremephir. Itali dicunt Polezolodu, Pouleor: *Sylueſtre*
Hiſpani, Poleo. Hebræi teſte Phriſio qui uertitur, à Iudæo doctiſſimo ap- *Pulegium.*
pellationes Hebræas herbarum didicit, חביב Habbiam uocant.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Pulegium acre & calidum eſt, quare ſomnum arcet, extenuat, ac diſcutit
craſſos thoracis humores, concoctionem adiuuat, internis & externis cor-
poris partibus utiliſſimum.

INTRINSECVS.

Pulegium optimo uino albo decoctum, ac ueſperi & mane potum, men-
ſes, foetus, & ſecundinam trahit. Huiuſmodi uero decoctio, non niſi in ſum-
ma neceſſitate uti oportet, maxime uero tum, cum menſes impediti ſunt, aut
cum palbis menſibus laborant mulieres, ita enim affectis remedium eſt ſalu-
berrimum.

Pulegium contra aceto & melle decoctum, menſes, nauſeas & uomitio-
nes cohibet.

Pulegium uino, melle, & Aloe decoctum, utiliſſima eſt potio ad educen-
dum atram bilem, & quæ circa pulmonem uiſcoſa ſunt Phlegmata, dolores
uentris, tormina inteſtinorum ſedat, uterum fouet, aduerſus ſerpentium
morſus uenenatos facit, Anginam incidit gargarifatum, ad oris exulcera-
tiones, ſi cum eo ſæpe abluantur, efficax eſt.

Pulegij aqua, & ſuccus quoq; claritatem oculorum adiuuat, & prurigi-
nes, ſi eo abluantur, ſedat.

EXTRINSECVS.

Pulegium podagræ impositum uſq; dum rubefcat, cutis dolorem ſedat,
pari ratione uſurpatum dolores capitis mitigat.


Deſectis animo & Lethargicis Pulegium contuſum admixto aceto, na-
ribus obijci, uel in os ingeri debet, & tum ſenſum ac intellectum illis redu-
cet.

Pulegium una cum ordeacea farina illitū, inflammationes omnes tollit:
Pulegium aceto & ſale contuſum, ſi membra illo perfricentur Spasmo
medetur, & contra araſneorum ac ſcorpionum icſus auxiliatur.

Proinde Pulegium herba eſt pulicaris, nam flos illius recentis incenſus,
pulices necat odore, quemadmodum Plinius teſtatur.

De Dictamno.

Cap. VII.

*Dictamnus Cretensis.**Diptam auß Creta.*

VM AGRESTE

C Pulegium à Plinio,
 Dioscoride, & Apu-
 leio genus Dictamni esse cō-
 stituatur, deinceps de Di-
 ctamno dicendum mihi cen-
 seo. Quapropter ante om-
 nia quidē scire oportet, Di-
 ctamnū ueram in Germa-
 nia haudquaquam nasci,
 quamuis superioribus an-
 nis ē Creta, & Venetijs ad
 nos deportata fuerit, quam
 dominus Georgius Ollin-
 ger Norinbergenfis, ac
 D. Coradus Gesnerus Ti-
 gurinus ad me miserunt,
 pro quo beneficio, quas de-
 beo, magnas optimis uiris
 ago gratias. Ea planta qua-
 dantenus Pulegio similis
 existit, ut testatur Diosc. lib.
 iij. capi. xxxij. Folia habet
 crassa, rotunda, & tomento-
 sa, ac utrinq; candida mol-
 liq; ac spissa lanugine obdu-
 cta, eaq; usq; ad summum
 omnia bina, duro, terefiq;
 cauli adnascuntur, et ē regio-
 ne se mutuō spectant, non
 aliter atq; in herba Nūmula-
 ria, semine et flore caret, odo-
 re suauissimo, gustu aliquan-
 tum subamaro prædita.

Verum enimuero radix
 illa

Dictamnus vulgaris.

Gemeiner Diptam.



illa, quæ hodie pro Dictamno uenditur, descriptioni Dictamni, quæ apud Dioscoridem, Apuleium & Serapionem extat, minime quadrat, quare alio reijcienda erit. Nihilominus tamen hæc ipsa Dictamnus, de qua modo sermo nobis incidit, planta est elegantissima, radicem habet digitum crassam, interim & minorem, albam, læuem, cubitalem, quandoq; longiorem, aliquando & breuiorem, fracidam, deniq; lignosam, qualis est Fœniculi. Ap-
 propinquante Vere herba spicatum prorumpit, uelut Asparagus, inde in cauliculis cubitalem fere teretem phœniceum, hirsutum, ac subasperum excrescit, folijs pulcherrimis, insq; expansis, uti in Fraxino arbore fieri uidemus, breuiter in frutice euadit, prope consimilem Glycyrrhizæ. Folia uero
 illius plus à se inuicem, sed per æquales intercapedines distant, & latiora sunt, quæ si singula seorsim inspicias folijs mali Cydoniæ comparari possint. In cacumine flores gerit pulchros & magnos, qui partim purpureo, partim candido colore, aut si mauius uermiculato ac roseo, emicant, nec differunt à flore Maluæ agrestis. Odorem spirat gratissimum ac dulcissimum, Cynomamum odorari ediceres. Post florem folliculi seu siliquæ
 quinq;

2.
 Vulgare Dictamnium.

Tempus.

Forma.

Odor.

quinq; aut quadripartita distinctione, intercurfantibus, membranis, diuise, relinquuntur. Singula uero folliculorum illorum receptacula, & nigra semina continent, semini Aristolochiæ maioris similia, nisi quod illud non perinde acutum & magnum est, atq; hæc. Postremo quod ad locum gentalem Dictamni attinet, amat illa altissimos saxosos, & aridissimos montes, quales cōspiciuntur in tractu Rheni prope Creitzgenach/Shaun/Byrn/ & in sylua quoq; Martiana, quæ Hercynia dicitur, & in hortis plantata prouenit. Soler autem quotannis nouos caules emitte.

LOCUS.

NOMENCLATVRÆ.

Dictamnus.

Dioscorides iij. libro capite. xxxij. appellat Dictamnium suam, agreste Pulegium, quod alijs eodem Diosco. teste Belouacos, Artemedeion alijs Herba Cretica, alijs Ephemeron, quibusdam Eldia, nonnullis Belotocos, Dordidion, Helbunion, Vstilago rustica, et Embactron ac *εὐσταλὸν* dicitur. Apuleius, cap. lxiij. Dictamnium, Artemedion, Creticen, Ephimeron, Labrum Veneris, Emenypsen Diplacon nominat. Serapio ut cap. vi. dictum est Dictamnium ac Pulegium uno & eodem nomine appellat.

Dictamnus agrestis à Plinio lib. xxv. cap. viij. Condris, à Dioscoride lib. iij. cap. xxxiij. & Apuleio *ψυδὸς dictamnus*, à Serapione uero cap. ccc. Mescatremesir (si modo ea lectio non sit corrupta) dicitur.

Quid autem ego de Dictamno alba quam supra descripsi sentiam, ultimo primæ huius libri capite cognosces.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Quæ de Pulegio dicta sunt, de Dictamno quoq; intelligi debent, sed longe uehementius, facit eñ ad omnia ad quæ Pulegium, sed multo efficacius, tam externis quam internis corporis partibus adhibitum.

INTRINSECVS.

Herba Dictamni ad modum Pulegij sumpta, non solum menses, sed & secundas ac foetus mortuos trahit. Idem efficit suffitus eius.

Succus Dictamni uel perse, uel in uino decoctus, omne uenenum expellit, mirificq; uulnera ex morsu uenenatorum animalium contracta, sanat, purgatq;.

Quia tanta herbe facultas est, ut olfacta abigat bestias, quæ uenenato icu scruant, & ut semel omnia dicam, Dictamnus uera est Theriaca.

EXTRIN-

EXTRINSECVS.

Sunt qui dicant Dictamnnum ea facultate esse, ut non tantum in corpore humano omnis generis infixas sagittas excutiat, illita, sed & uulneratis telopecoribus, eius herbæ cibo, tela cuspidesq; omnes ex corpore decidere, cuius rei testis est Vergilius xij. Æneidos.

*Dictamnnum genetrix Cretæa carpit ab Ida
Puberibus caulem folijs, & flore comantem
Purpureo, non illa feris incognita capris
Gramina, cum tergo uolucres hædere sagitte.*

Quæ quidem ego de tertia Dictamni specie intelligo, qua de Diosc. lib. iij. cap. xxxiij.

Dictamnus contusa ac instar emplastri illita leni, illud imminuit. Vulneribus ferro, uel feris uenenosis factis, infusus succus citra incommodum præsentaneo est remedio.

Altera Dictamnus qua hodie nostri utuntur Medici ad Pgoniam pertinet, neq; huius est loci.

De Basilico. Cap. VIII.


RIA SVNT GENERA OCIMI, QVORVM DVO SATI-
Tua sunt, ut quæ in hortis quotannis in Maio feri oporteat, tertium syluestre, Nobillissimum uero atq; pulcherrimum est Ocimum minus, multis ramulis conspicuum arbori surculosæ consimile. Folia Amara-
raco similia, paulo tamen maiora, odoris suauissimi præstantissimiq;.

Alterum caule & folijs maius est, cuius folia conferri possint Parietariæ minori, & herbæ testiculatæ, de qua cap. lxij. huius primi libri. Flos caulem circumdat, quemadmodum in urtica. Bynsaugdicta, fieri solet, atq; is alius candidus est, alius roseo tingitur colore.

Tertium satione opus non habet, nam è radice quæ haud aliter quam Lolij albi (de quo 2 libro, cap. xxxv.) in terra sese diffundit, quorannis fructat, neq; facile potest extirpari, ubi semel radices egerit. Proinde hoc ipsum folijs & odore cum una ex Menthis, quam primam agrestē appellauimus, & sub Sio, cap. v. supra descripsimus, magnam affinitatem habet, caules namq; habet hirsutos & lanuginosos, quadrangularis formæ, flore purpureo uestitos.

Hoc genus Ocimi circa Autumnum in solo aquoso ac humido plantauit, quo in loco cum in tertium usq; annum perdurasset, in minorem agrestem.

Basilica minor.
Klein Basilgen.



Item mentham, quam Germani Fischmüntz appellāt, commutatum est, & non in Serpyllū, quemadmodum Plinius lib. 19. cap. x. tradit, in quod tamen degenerare posset non dubitarim, si ter-
re siccae & uersus solem respicienti mandaretur. Verum cum id hactenus exploratum non habeam, ab ijs quæ Theophrastus lib. 3. de planta. caus. annotauit supersedebo.

NOMENCLATURAE.

Priores binas germanice Basilgen/latine herbas regias, Basilicas, & Ocima gariophyllata uocamus. Neq; tamen certus sum, an ea herba quam Dioscorides lib. ij. cap. cxxx. describit, Ocimum sit, quem scrupulū uerba illius apud me mouent, cum dicit, Ocimum planam esse uulgarem, quod aliter se habere experientia testatur. Magno enim labore, magna cura, plantatio eius opus habet, præsertim cum herba sit al-
fiosa, neq; hyemis iniuriam sufferre ualeat. Quod si omnino quid sentiam pronun-

tiandum sit, suspicor certe, quam uocamus Basilicam, eam esse Acinum Dioscoridis lib. iij. cap. xlv. Quod uero lib. ij. cap. cxxx. describit Ocimum ego potius pastum pecoris esse dicerem, quanquam super hac re cum nullo con-

Basilica maior.

Groß Basilien.



lo contenderim. De Ocimis
cap. xxv. libri nostri secun-
di, plura.

Ocimum fluviatile Aui-
cenna lib. ij. cap. cv Bedarun-
gi appellat, quæ nomi-
na tertiæ Basilicæ attribuen-
da existimo, cuius descripti-
onem in Menthis, sub Sio o-
dorato habes. Phrilius Basi-
licon Heb. lingua קלקמול
kalkamol dici testatur.

VIREB AC TEMPE-
rumentum.

Dux nobiles et odoratæ
Basilicæ hortenses, quarum
altera Germanica ac Crispa *Bacharis Germanica.*
Bacharis, altera Acinos ap-
pellari potest, uitio & ini-
quitate scriptorum indo-
ctorum penè in contemptum
deuenire, idque eo nomi-
ne, quod (ut illi affirmabāt)
non solum inutiles, sed & uten-
tibus noxiæ sint. Quæ sen-
tentia minime recipi debet,
quippe quæ erroris plena
sit, nam qui ita sentiunt Oci-
mum Catonis, cum hoc
nostro confundunt, atq; ita
decipiuntur. Nostra enim
Ocima gariosilata siue Basi-
lica, temperaturæ sunt calefacientis, quamobrem facultatem obtinent resol-
uendi ac discutiendi, viscosos lentosq; pulmonis et matricis humores, quare
utiliter utrinque adhiberi queunt.

De Ocimo et
Ocimaastro infra,
cap. 60. et in se-
cundo li. cap. 25.

INTRINSECVS.

Basilici herba siccata non aliter atq; Amaracus & Rosmarinus in cibis usurpari potest

Eadem musto imposita quousq; deferbuerit, uinum odore & sapore iucundissimo commendat, utq; Apianum, seu ut uulgo uocant Muscatelinum referat, efficit.

Basilicon uino decoctum, suspiriosis medetur, pellit inueteratam tussim, humoresq; crassos discutit, mane & uesperipotum, urinam ciet, menses proritat uti Pulegium.

Semen Basilici per noctem aqua rosacea maceratum in succum album seu gummi quoddā resoluitur, quod presentaneo est remedio, inflammationibus, exulcerationibus, & alcolæ oris, necnon labiorum scissuris & uerrucis mammarum, illitum.

Semen Basilici, & aqua distillata sumpta, cor confortant, & aduersus Lipopsychiam faciunt.

EXTRINSECVS.

Basilici herba uiridis fronti alligata, capitis dolores sedat, idem præstat aqua eius distillata.

Basilicon in decessionibus & fomentis muliebribus Pulegij & Menthæ facultates obtinet.

Aqua Basilici non tantum omnibus inflammationibus oculorum, capitisq; igni etiam sacro, qui tumori mammarum & pudendis adesse solet, auxilio est.

Basilicon agreste eiusdem facultatis est, cum Menthis & Balsamitis.


De Amaraco. Cap. IX.

^{1.}
Nobilis & exigu
Basilica.

VAE SVNT STIRPES QVAS GERMANI Maieron/ET
D Meyle uocamus, quarum nobilissima perexigua est, folia profe-
rens tenerrima, oboli latitudinem haudquaquam excedentia, cinerei
coloris, ac mollia, minutissimis atq; albicantibus flosculis, quos una cum
cacuminibus, quibus insident, decerpere solemus, ne interuentioni, cui fa-
cillime est obnoxia, detur tota herba. Est enim delicatissima, ac tenerrima
planta, frigorisq; impatientissima, quare aduentante hyeme, solo euellitur,
& figulinis uasis commissa, in cellis uinarijs aduersus iniuriā hyemis de-
fenditur. Quidam tamen semen ex illa, quod bullulis quibusdam contine-
tur,

Maiorana sativa.

Zamer Maieron.



tur, colligunt, unde rursus eam serere possint. Alij surculos duntaxat decerpunt, humoq; inferunt, ut in Rosmarino facere consuevimus. Mediolani in magna copia plantatur hic frutex.

Altera Maiorana, sylvestris est, quæ per hyemem illæsa in hortis perdurat, eius folia, cauliscacumina, necnon & flores crassitudine, longitudine et magnitudine superât priorem, utraque tamen eiusdem fere & odoris & temperamenti.

Puellæ nostræ hos frutices coronamentis & amaroribus suis plantare consueverunt.

NOMENCLATURÆ.

Dioscorid. lib. iij. cap. xliij. *ἀμύνη, ἀμύραν* uocat, traditq; alijs Trifolium, Agathides, Cnecion, & Acapnon dici: Pythagoræ, Thrambem, Ægyptijs Sopho, Armenijs Myuron, Magis Ichrei asinum, aut Hecigonon Isidis. Latini denique Maioranam appellari.

Proinde nisi stultæ temeratis argui me posse uererer, affirmarem certe, sylvestrem Maioranam, quæ apud nos nascitur, ad caput xliij. lib. iij. Diosco. pertinere, ac etiamnum exiguam & nobilem illam Basilicam Baccharim esse Germanicam, de qua

Maiorana syluestris.

Wilder Maieron.



Diosco. cap. xlvj. lib. iij; cuius etiam supra meminimus. Serapio Maioranam Merzenium appellat cap. cclxxxvi. Itali Gentilem, Galli Mariolaine uocant.

**VIRES AC TEM-
peramentum.**

Vtraq; Maiorana calidam & siccam temperaturam obtinet, et utrinq; omnibus hominibus applicari potest.

INTRINSECVS.

Herba Maioranæ uino albo decocta, potu utilis est incipientibus hydropicis, hoc modo usurpata dolores torminum sedat, menses & urinas ciet. Succus uel aqua distillata, naribus inditus, cerebrum confortat, sternutamenta mouet, Lethargicos, & Comitiales excitat:

Aqua Maioranæ distillata, linguae illita, loquelam amissam reducit, recreat cerebrum, & memoriam mirifice adiuuat, singulis uicibus mensura trium uel quatuor coclearis

pota. Porro herba ipsa condimentum est optimum omnium ciborum, ideoq; culinis minime abdicanda.

EXTRIN-

EXTRINSECVS.

Maioranę herba cum farina ordeacea contrita, in modum emplastri oculis imposita, inflammationes, tumores & dolores illorum tollit.

In puluerem redacta, & cum modico Gyngiberis naribus indita, sternutamenta proritat, & catharrum incidit.

Emplastrum ex illa factum & impositum, cardiacę opitulatur, luxata membra in pristinum statum reponit citra dolorem.

Oleum Maioranę nervos & induratum matricem molliccat, si eo inungantur.

Maiorana in fomentis & pessarijs mulieribus subdita, menses trahit.

Succus Maioranę sanguini concreto illitus, digerit illum, sugillatis prodest, & tumoribus lienis medetur.

De Origano. Cap. X.

O RIGANVM NOSTRVM QVOD GERMANI *Dosten* appellamus, gratissimi ac suauissimi odoris planta est, ex una radice plures, eosq; aliquando bicubitales emittens cauliculos, qui antequam in altum se erigant, folijs syluestrem Maioranam, ita imitantibus uestiuntur, ut discerni uix possint duo illa genera. Quod ad florem attinet, tria sunt Origani genera, quorum aliud phœniceum, aliud ex candido rubicantem, postremum uero plane candidum gerit, omnibus uero lanuginosus est caulis, & purpureus. Florent circa festum Ioannis Baptistę, Autumno ingruente minutissimum semen, Maioranę simile, in umbellis, quę in cacumine conspiciuntur, postquam flos aruerit, producit. Montibus, dumetis & senticetis, maxime uero ijs, qui aprici sunt, gaudet Origani num.

Est & aliud Origani genus, acutissimis folijs, flore phœniceo, caulem ut in Hyssopo, circumdante præditum, hirsutum ualde, et agreste, quod in quibusdam nemoribus inuenitur.

Præter iam commemorata Origana, duo alia pulcherrima peregre mihi allata sunt, anno 1549. quorum quidem forma, cum uulgari nostro cõuenit aliquatenus, magis tamen illo tenera ac mollia, caule breuiori, folijs angustioribus & acuminatioribus, odore suauiori, eoq; Thymum fere exprimente, flore, qui copiosus & coniunctim erumpit, cacuminibus Maioranę syluestris, consimili. Eorum maius saporem habet, iucundum & acrem, qualis est Gariophyllorum, aliquantulum tamen ad amarulentiam

1. Tria Origani
2. ni uulgaris
3. genera.

4. Origani quadratum sylvestre
genus.

5. 6. Peregrina duo
Origani genera.

Origanum.
Wolgemüt.



Origanum minus.
Blein Wolgemüt.



quandam uergentem. Odor illi gratissimus. Alterum odore, sapore, & Forma tota Thymo conferri possit, tamen maius, acrius gustu, & suauius odore illo sit, ita ut fere descriptio illi Dioscoridis quadret.

Calamentum montanum.

Wilder Kirch 3sop.



CALAMENTI MON-
tani historia, per Dauidem
Kyberum.

HVC PERTINET EA *Calamentum*
quoque herbula, quam *montanum offi-*
cinarum. officinae Calamentū mon-
tanum uulgo nominant,
cuius historia sic se ha-
bet. Planta est dodranta-
lis, nec temere dodrantem
excedens, fruticosa, ut quæ
ex una radice, quam habet
lignosam, & capillamentis
fibratam, ac intra humum
serpentem, sæpe senos, inte-
rim & pauciores coliculos
eosq; quadrāgulos, lanugi-
nosos & purpureos gigni-
nat. Ceterū hos ipsos coles
seni plerunq; per æquales
distantias è singulis genicu-
lis instar stellæ, rotatim aut
radiatim exeuntes flosculi,
è cæruleo purpurascetes,
instar florū Hyssopi, quod
Kirch 3sop Germanis di-
citur, ambiunt. Folia sub
singulis flosculorum rotu-
lis ut plurimū bina, quan-
doq; plura uisuntur, per
ambitū instar Basilici leui-
ter serrata, angusta, mucro-
nata, auersaq; parte uenis
distincta, herbaceo colore
pregita. Quod ad odorem

attinet, redolet hæc plantula Hyssopum, cuius nunc fecimus mentio-
nem, sed remissius, quo nomine ruri illa wilder Kirch 3sop/ hoc est,
sylvestre Hyssopum uocatur. Alij tamen wilden Poleyen, hoc est sylue-

stre Pulegium nuncupant, forte ob florum radiatorum seu sellatorum, habitudinem, qua Pulegio satis respondet. Præter has nullas alias à nostris hominibus appellationes Germanicas extorquere potuimus, fortassis non inepte Berg Münz nuncupabitur. Gustu acrimoniam quandam præ se ferre uidetur, cum amaritudine leui mixtam, ita ut uel ad Hysopum uel Origanum, quod ad temperamentum attinet, referri posse uideatur. Nascitur in montibus, & locis æditis ac apricis, inprimis uero gaudet agris frumentarijs, qui in alto siti sunt, cuiusmodi sunt ij, qui ad pagi Brünswickersheim non procul à Prusca, fluuij satis celebri, unde illi nomen, siti, & ad nobilissimam STVRMIORVM Mœcænatum meorum semper obseruandissimis, familiam pertinentis, dextram, ex Argentorato ad montana inferioris Alsatiæ proficiscentibus, primi sese offerunt, altero ab urbe fere lapide. Nam in illis Augusto mensē post mensem in magna copia Calamentum hoc reperi.

NOMENCLATURAE.

An uero appellatio Origani herbæ quam Germani Dosten uocant, conueniat, ex doctissimis Galliæ & Germaniæ uiris scire cuperem, quandoquidem quatuor Dioscoridis & Plinii descriptiones illi minime tribui possunt, nam Plinius lib. xx. cap. xvij. & Dioscorides lib. iij. capite xxx. folia quatuor Origanorum partim Hysopo, partim Serpillo, conferunt. Qui fit ut non parum suspecta mihi sit quam nos Germani Wolgemüt seu Dosten uocamus. Tametsi uidetur speciem illam Origani esse, nulla tamen ex his erit quas Dioscorides & Plinius Heracliam, Heracleoticam, Panacem, Onitida & Tragoriganon appellant, aut si omnino una ex his sit, Dioscoridi nostrā Origanum, quod minime crediderim, ignotam fuisse, necesse erit. Quam non ignoro Antonij Musæ sententiam, qui putat herbam nostram Dosten, Origanū esse Heracleoticam. Sed ut ut hæc sese habeant, nos paucis nomina quæ apud Dioscoridem extant, paucis recensebimus, Nam is ορίανον illam uocat Heracleoticam, Heracliam, Onitim, Panacem, Cunilam, Cunilā, Tragoriganum. Arabes, Fandenigi, Eradhiotica, Azaba, appellant. Itali Origan, Hispani Oregano. Plinius Secundus cap. xxxvi. lib. iij, tres commemorat appellationes, dicitq; Græcos Origanum aliud uocare Trigoricantum, aliud Eradium, tertium uero Oniten. Apuleius cap. cxxij Gallicā Cunilam, & Asclepion nuncupat, cætera subiiciens nomina quorum & Dioscorides meminit. Origanum Hebræis קרנית karnith uocatur, teste Aruch Monasteri, tametsi species Hysopi ibidem quoq; tradatur.

VIRESCIENTIA TEMPERAMENTVM.

Origanum et hysopum eiusdem pene sunt facultatis apud Dioscoridem calidæ

Diosco. lib. 3.
cap. 29 & 30.
Serapio ca. 300.

calidæ nimirum utrunq; temperaturæ, Quod ad me attinet, ego sic sentio, Origanum nostrum Dioscoridis esse Hyssopum, & uicissim quod nos Hyssopum dicimus Origanum esse Diosco. Porro utrunq; utiliter foris & intro adhiberi potest.

INTRINSECVS.

Origanum (quod apud Dioscoridem Hyssopum appellatur) cum ficis ruta, melle & uino decoctum & potum, mirifice conducit Peripneumonici, diuturnæ tussi, suspiriosis, & iis qui capitis destillationibus frigidis grauantur, nam non tantum pituitam detrahât hæc potio, sed & ut ea excreari possit, auxiliatur, tinea s uentris enecat, mane & uesperî bibita.

Idem præstat conferua ex Origano facta.

Origanum cum ficis uiridibus & cardamomo, ad subducendam aluū manditur, quibus etiam Irîm, si placet, addere potes.

Cum ficis decoctum angine gargarissatum, auxilio est.

Cum aceto cocta herba Origanî, dentium dolorem in collutione sedat.

EXTRINSECVS.

Origanum cum fico nitroq; contusum, & emplastri instar hydropicis imponitur.

In uino decoctum, inflammationibus imponitur, sed calidum, perinde atq; mulctra, Inflationes auricularum (hoc est, tinnitum aurium, quem Græci *οὐρίτις* quod dicitur appellant) uaporis suffitu discutit.

De Serpyllo. Cap. XI.

IN NOSTRIS REGIONIBVS TRIA SERPYLLI GENERA inueniuntur, quorum primum quidem, quod & maius est, non ita late longeq; per terram rependo se propagat, neq; passim obuium est, ut reliqua duo quæ undiq; secus itinera, iuxta sepes, & in petrosis locis luxuriant. Verum consuetus illi locus est in antiquis & incultis agris, frutex est surculosus, Maioranæ satiuæ consimilis, folijs qua terram spectant pallidi uiridis, floribus maioribus, quam Serpyllum habeat uulgare, odore Hyssopum fere referens, unde ego adductus Origanis hanc plantam annuero, eamq; Cumilaginem Plinij esse puto. Atq; hæc de primo Serpylli genere.

Alterum iam dicto altitudine, folijs, & caule surculoso simile est, nullo odore (ut mihi quidem uidetur) præditum. Hoc Serpylli genus in muris

^{1.}
Prima Serpylli species.

Cumilago Plinij lib. 20. cap. 16.

^{2.}
Secunda Serpylli species.

Serpyllum.

Quendel.



3. 4. inueni, omni destitutum flore, & parum abest quin illud Dictamnino ac-
 Tertia & quarta censerem, neminem tamen una mecum in errorem deducere uelim.
 ta Serpylli spe- Tertium uulgare est, quamquam & hoc ad minus duorum sit generum,
 cies. quorum

quorum alterum rotundis prorsus, alterum aliquantulum acuminatis, et angustioribus folijs circumuoluitur, Hyssopo quod Germani *Zwibel Hyssop* uocant, de quo cap. xii. infra, haud dissimilibus. Flos utriq; ut in Thymo, alius subpurpureus, alius uero roseus, alius deniq; prorsus candidus, sed & Serpyllum quod hoc postremo flore comat, non ubiuis locorum extat, si cut nec Origanum quod candido flore uestitū est. Ego quidem candidum, cuius iam statim meminimus, Serpyllū plantaui, uerū in tertio anno purpureos produxit flores, ueluti reliqua Serpylli genera.

NOMENCLATURAE.

Serpyllum Germani appellant *Quendel/Bünel/Bienlin/Bünerflee/Bünerföhl/wilder Poley/hünerferb*. Latini Serpillum: Graeci *ὑπναιος*, quæ appellationes, ut & Origanī, alijs quoq; plantis accommodantur, nam Dioscorides lib. ij. ca. cxvñ. Sisymbrium Serpillum uocat, & Plinius Sisymbrium agresti nomen Serpylli tribuit, rursus Dioscorides lib. iij. cap. cxvñ. Artemisiam Serpyllum cognominari tradit.

Serpyllum porro aliàs Cicer erraticū, Cicer rusticum, *πικνιον*, Mernopnos, Meronopus Apuleio cap. c. dicitur. Arabes teste Serapione, cap. cclxxxix. Serpyllum satium Ardas, Nemen, Ardanema, Zantor, Sijnabar, & agrestre Ragis uocant. Est deniq; & aliud Serpylli nomen, nimirum *συγίς*, quod tamen magis competit herbae quam Germani uocamus *Dosten*/ quare suspicor quod nos Origanum seu *Dosten* appellamus Serpyllum *συγίς* apud ueteres fuisse. Galli uocant Serpyllum Serpolet, & Pillolet. Serpyllum ut Phrissius tradit Hebraice *למבא* Lamba dicitur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Serpyllum calidum est, & si uerum fateri oportet, aliter apud me statuerenon possum, quam quod Serpyllum minimum & maxime exiguum genus omnium Origanorum sit, quorum facultates omnes Serpyllum obtinere iudico.

INTRINSECVS.

Herba Serpylli uino decocta, & calida pota, menses mulierum trahit, praeterea & lumborum ac uescicae per urinam uiscosos humores expellit, torminibus ita usurpata auxiliatur. Obstructiones pulmonis, iecoris & lienis tollit.

> Serpyllum cum melle & aceto decoctum, acut supra dictum est, sumptum, sanguinem excreantibus opiculatur.

Succus eiusdem pondere iij drachmarum aceto permistus et potus, idē præstat.

Serpyllum in omnibus cibis adhibitum Theriaca est præstantissima aduersus omnia uenena serpentium, aliorumq; venenatorum animalium.

Cum uino melle, aniso, glyzyrrhiza decoctum, medetur aridæ lentæq; tussi, stomacho conducit, eumq; conforrat, stranguriæ subuenit.

Non solum autem in medicina sed & culina haud aliter quam Petroselinum, viride serpyllum hodie magni est usus, nam illo et carnes et pisces conduntur.

EXTRINSECVS.

Odor serpylli cerebrū iuuat, vertiginiq; prodest, capiti impositum.

Aqua è floribus Serpylli distillata, cū aceto rosacco temperata, ac fronti illita Phreneticis maxime conuenit.

Reliqua, si qua alia desideres cognoscere Serpylli iuamenta, in Origano Dictamno & Pulegio quibus uiribus plane respondet, annotata reperies.

De Thymo siue Italico Serpyllo.

CAP. XII.

VONIAM SERPYLLI MENTIONEM FECIMVS,

Thymus quoq; adiungendus erit, quem nostri Romanum Serpyllum, *Welschen Quendel* uocāt, nec immerito quidem. Foliolorum enim et floris forma nec non odore, vltimum Serpyllum quod diximus refert, nisi quod folia Thymi magis exilia & angustiora, ac nigricantiora sint, odor illi grauior, at suauior Serpyllo. Thymi uero in germania nostra duo quoq; sunt genera, hortense scilicet & agreste. Hortensis quidem nō ita longo tempore apud nos moratus est, sed à diligentissimis hortulanis & archymagyris plantatus, & inter cæteras peregrinas herbas condimentorum causa in culinam receptus. Alter autem, nimirum agrestis, domesticū per omnia flore folijsq; imitatur, ac per terram hinc inde spargitur, non secus atq; Serpyllum exiguum, cuius meminimus, quæ res multos decepit, qui herbarum differentias non probe perspectas habent, putantes hoc esse Serpylli genus, atqui ex his quæ diximus falli illos, totoq; coelo aberrare manifestum est. Odor namq; huius Thymi longe est suauior, gratioq; quā sit Serpylli, cum Maioranam penè exprimat. Proinde amat hic frutex arenosa & sicca loca, cuiusmodi sunt nemora in comitatu Bitsch, maxime inter duos illos pagos, *Igelsbart* & *Niderborn*, deinde & inter *Niderborn* ac *Mertzweiler* in arenosis campis affatim profilit.

¹
Hortensis Thymus.

²
Agrestis Thymus.

Tempus

Thymus.
Welscher Quendel.



Tempus floris eius est circiter festum Ioannis. Flos illi purpurascens, in quibusdam ex purpura candicans, in alijs plane candidus, quem apes vehementer amant, perpetuoque circumvolant.

NOMEN.

NOMENCLATVRÆ.

Diosco. lib. 3.
cap. 39.

Dioscorides, Theophrastus, Plinius, Vergilius, & Columella, hoc Serpyllum seu Apiastrum (si quidem ita appellari ab apibus possit) uno consensu omnes Thymum uocant. Græce $\Theta\upsilon\mu\varsigma$, Dioscorides tamen Cephaloton cognominari, alijs Epithymida, alijs Thyrsion, Latinis Thymum, Aegyptijs Stephanen, Dacis Mosulam appellari tradit. Arabice, Halce, Serapio cap. cclxxi.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Thymus aliàs Romanum Serpyllum, calidæ ac siccæ est temperaturæ, quemadmodum & uulgare Serpyllum, illo tamen efficacius expellit, & usu facilior & tutior.

INTRINSECVS.

Thymus uino decoctus easdem plane uires obtinet, quas Serpyllo tribuimus, Orthopnoicis & Astmaticis auxiliatur, tineas uentris pellic, concretos sanguinis grumos dissicit, ueneno resistit, menses, secundinas & foetus mortuos extrahit.

Ex Thymo deniq; condimenta ac conseruæ utiliter parantur.

EXTRINSECVS.

Succus aceto permixtus, sugillata discutit, & sanguinem concretum, ulcera sui nominis & uerrucas tollit, ut emplastrum impositus.

De Satureia, seu hortenſi Hyſſopo.

CAP. XIII.

OST SERPYLLVM ATQVE THYMVM SEQVITVR

P Satureia hortenſis, & iure quidem, quod enim ad formam et temperamentum attinet, conſimiles pene apparent commemoratæ plantæ. Eſt autem hæc inter illas ſtatuenda differentia, quod Satureia maior & magis fruticoſa eſt ac ſurculoſa, & quæ inſtar arbuſculæ multis ramulis brachiatis, quotannis increſcit, pari pro operatione qua nobile & exiguum Baſilicon fruticat. Folia habet latiora & longiora Thymo, flos exilis, idēq; roſeus & ueluti expurpura candicans, quemadmodum uidere eſt in uno

Serpyll.

Satureia.

Satureia/oder garten Hysop.



Serpyllorum. Semen Chelidonio conferri possit, tametsi illo magis sit incanum colore. Planta est aestiua, neq; aliter quam quotannis satum in hortis inter cepas & brassicas prouenit, neq; per hyemem dura repotest, ueluti Serpyllum Thymus. & Hyssopum maius, quæcum sint lignosæ stirpes, & ad frutices potius referendæ, facile hyemis iniuriam sustinent, & longe facilius illarum est plantatio. Si namq; ab huiusmodi lignosis plantis, quales sunt Maiorana, Ros marinus, Hyssopum, Serpyllum, Thymus, Laurus, Salvia, Ruta, Abrotonum, & id genus aliæ surculos, decerpas & humo infigas, non magna cura, sed & exiguo labore opus habent, quin sponte erumpent, & fruticabunt. Verum enimvero Satureia non nisi fata prouenit, sicut Basilicon ut diximus. Agrestem Satureiam in Germania non uidi.

NOMENCLATURAÆ.

Satureiam appellant Diosco. lib. 3: Germani Saturey/ Zweibel Hysop/ garten Hysop. Apud Dioscoridem, & cap. 10. Columellam, Satureia, Cunila, & *Chamaedryas* dicitur. Marcellus Vergilius in Columella lib. 9. Tymbram annotans, ait, Satureiam, alias. Origanum agreste, Clinopodium, cap. 4. on,

on. Probation, Ageratum, & Cunilam rusticam nuncupari. Serapio capite cecij. Sahater, Rasis Carohon appellat.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Satureia plane easdem cum Thymo & Serpyllo vires obtinet, sed illis odore suauior, ac remissior, gustu autem & natura calidior, utiliter & utrinque adhibetur.

INTRINSECVS.

Satureia & Serpyllum condimenta sunt pauperum, nam omnibus edulis, tam carniū quam piscium concoquuntur, inducunt enim appetentiā ciborum, stomacho conferunt, Venerē stimulant. Alia si qua sunt Satureiæ iuuamenta iam pridem in historia Serpylli, & Thymi declarata sunt. Vnū hoc addere libet, consuetudinem nimirum esse pauperibus, in nostra Germania, ut hac herba brassicas, qua uulgo uocant capitatas, condiant, qui sit uti lile iucundissimum odorē, saporem etiam gratissimum inde accipiant.

EXTRINSECVS.

Thymbra seu Satureia eadem quæ Thymus & Serpyllum præstat, quæ reuna pro altera uti commodè possumus.

De Hyssopo quod Germani uocant

Bloster Hyssop. CAP. XIII.

QUAM NOS GERMANI Bloster Hyssop APPELLAMVS, planta est hortensis simul & uulgaris, lignosa, & quæ ex dura radice unum, interim & plures pro ætate caudices emittit, qui plurimos etiam thyrsos, ab imo usque ad summum folijs herbacei coloris uestitos proferunt, non secus atque Lauendula & Spica, de quibus infra cap. xviij. nisi quod folia Hyssopi uiriditate & latitudine iam commemoratas herbas excedunt, breuiora quoque & teneriora illis sunt. Iulio mense aduentante floribus ex æruleo purpurascens, hisque sese mutuo usque ad fastigium excipientibus, non aliter quam Echion sylvestre (cuius historia ca. lxxviij. primi huius libri extat) ornari consuevit. Qui cum deciderint, semen subsequitur minutum, folliculis quibusdam inclusum, ex cuius fatione Hyssopum plantari queat, multo tamen celerius, de surculis in Vere decerptis, ac terræ insertis, prouenit, ut supra de Rosmarino, & alijs id genus suffruticibus, differimus.

Agre

*Hyssopus.*Germanis *Kloster Hyssop.*

Agrestem siue Montan^{2.}
nam Hyssopum in nostris *Montana Hyssopus.*
regionibus in arenosis mō-
tibus, & calidissimis rupi-
bus reperi, odore plane syl-
uestri præditam, nectamen
uehementi, flore Hyssopo
iam dicto, herba uero
Origano minuto, seu Pul-
legio, consimilem. Quod
ad Hyssopum & Origanū
attinet, iam ante cap. x. sen-
tentiam meam pronuncia-
ui. Proinde uidetur sane
mihi, eum à scopo ueritatis
nequaquam aberrare, qui
dixerit agrestem Hyssopū,
quam descripsimus modo,
Dictamni Cretici alterum
genus esse, quod flores O-
rigani syluestris gerit.

NOMENCLATURAE.

Appellatur hic frutex a-
pud Germanos *Kloster*
Hyssop/Ysop/Birch Ysop/
apud Diosco. lib. iij. cap.
xxvii. *ἵσσαν* & Lauer, Cassia-
la, & apud Aegyptios Pesa-
lem. In Serapione cap. cclx.
Halculsa Cyse. Hebraei
אֵסוֹף, Esos, Chaldei *אֵסוֹף*
Esosa, & *אֵסוֹף* Osafion
uocant. Quanquam &
haec nomina ad præcedens

3. Regum. 4.
Leui. 14.

Hyssopi genus aptius referri possint, Thalmudistæ *שׁוֹמְשׁוֹק* Schomshok
appellant. Rabi David Kimhi cum uocem *אֵסוֹף* Esos in Dictionario suo
explicat, dicit inter cætera, Arabes illum uocare, Zeter, Vernacula uero sua
lingua.

lingua, hoc est, Hispanica, Origani appellari, herbamq; cam esse septem specierum. Hæc propterea adduco, ut melius considerentur quæ Author noster supra de Origano, in nomenclaturis, & temperamento commemorat.

VIRESCACTEMPERAMENTVM.

Hyssopus intrinsecus aduersus uenenum usurpatur, foris fomentis adhibetur, quibus tumores deprimi, & dolores sedari consueuerunt.

INTRINSECVS.

Hyssopus (quam nos Origanum supra interpretati sumus) uino decocta & calida bibita, ijs qui cicutam, opium, uel gypsum, & alia id genus uenena hauserunt, auxiliatur.

Cum uino, melle, & Saluia decocta, ijs quibus internæ partes corporis ruptæ, seu contusæ fuerint, bibita opitulatur. Eadem atram flauamq; bilem expellit.

Reliqua iutramenta si qua alia desiderabuntur, nō tantum in historia Origani descripta sunt, uerum etiam inter nomenclationes eos scriptores annotauimus, & loca, qui de hac & alijs, quibus uis plantis diligenter commentati sunt, e quibus tanquam uiuis fontibus studiosus lector necessaria cognitu peteret. Non solum autem hoc loco sed & ubiq; id fecimus, quod uel semel monuisse sufficiat.

EXTRINSECVS.

Ex herba Hyssopi fomenta, Epithimata, & balnea recte conficiuntur, clysteribus in passione colica utiliter adhibentur.

Aqua in qua Hyssopus decocta fuerit, omnes psoras scabies & mentagras sanat, si ex illa colluantur.

De Gallitrico quod Germani Scharlach

uocant.

CAP.

XV.

ALLITRICVM EX ODORATIS EST PLANTIS, ET

duorum generum, quorum alterum hortense, scilicet & uerum, in hortis satum, ex semine Raphano simili prouenit. Istud quidē in primis bina exigua, ac incana folia, ueluti Basilicon emittit, quibus succedunt alia admodū hirsuta, semperq; auferescentia, & longe magis hirsuta ac crispa, folijs Verbasci maioris consimilia, cinerei coloris. Caulis illi quadrangulus

1.
Gallitricum
fatium.

Gallitricum.

Scharlach.



drangulus, flos in candido subcaësius, ita ut quoad caulem & florem, Salui-
am maiorem referat. Rursus catenus ab illa differt Gallitricum, quod her-
ba, caule, flore & folliculis maius existit, radice lignosa, qualis est Hyssopi &

Saluix, non durat ultra triennium, odoris est grauissimi siue uiride siue sic-
cum sit.

2.

Agreſte Gallitri-
cum.
Marrubium
agreſte.

Agreſte Gallitricum iam dicto aliquantum caule ſemine & colore ſimi-
le, ſed longe illo minus eſt, quod aurem ad folia, flores & calyculos, quibus
ſemen includitur, attinet, plane cum candido conuenit Marrubio, qua de
cauſa non deſunt qui illud agreſte Marrubium appellent, locis enim incul-
tis gaudet, in quibus plerumq; uno uel ad ſummum binis cubitalibus cauſi-
bus excreſcit, ſed de hoc genere ſupra cap. ij diximus.

NOMENCLATURA.

Obſeruanda eſt
differentia inter
Gallitricū quod
hic deſcribitur,
& αλλήριον,
quod ad Adian-
tum ſpectat, uide
Dioſcoridem lib.
4. cap. 131. & As-
puleium cap. 47.
Syderitis appella-
tio & Verben-
a ſupine attri-
buitur. Dioſcori-
lib. 4. cap. 59.

Quodnam huic plantæ in Dioſcoride proprium ſit nomen, haud dum
mihi conſtat. Conſtantineus, Platearius, & omnes propè neoterici ſcriptores
uocant primum genus, Gallitricum hortulanum, alterum agreſte alias dici-
tur. Vitalis de Furno cap. cccxi ex Gallitrico uinum, ad id quod Apianum
ſeu paſſum Germanis Muſcateller uocamus, accedens, conſicere docet.
Quidam uocant Scarleam, Galli centrum, Bezomo, Germani ſam Schar-
lach, primum dicunt, alterum uero wild Scharlach/ & quidā ſeld Andorn.
Proferam et ego quid in hac re mihi uideatur, nam ſi res penitus conſidere
tur, perſuadeo mihi Gallitricum hoc noſtrum, eam eſſe herbam quam Dio-
ſcorides lib. iij cap. xxxij quæ ſequuntur nomina habere tradit, nimirum
αδριανική, Genitura ſeu ſanguis Titani, Cauda Scorpionis, Sendionor,
Vdedonium, Parmicon, Xantophonea, Oculuſ Bouis, Vertemnum, Sola-
ſtrum. Quid enim, amabo te, obſtare poſſit quo minus ita Gallitricum uoci-
tem, poſtquam deſcriptio illi Dioſcoridis optime quadrat. Poſtremo ſi qui
ſint qui hunc fruticem ὀρνιθον Dioſcoridis eſſe contendant, cum hiſ non mul-
tum pugnabo, quoniam hiſtoria & deſcriptio huic herbæ non male quadra-
re uideatur.

VIRESCIENTIA ET TEMPERAMENTVM.

Vtrumq; Gallitricum calidæ & ſiccæ eſt temperaturæ, ideoq; reſoluendi,
extenuandi & expellendi uim obtinet.

INTRINSECVS.

Vinum Gallitrico impoſito ſi efferbuerit & decoctum fuerit, appri-
me ſtomachi frigiditati conducit, nam phlegmata incidit & conſumit. Idē
potum frigidis & infœcundis ac albis menſibus laborantibus mulieribus
ſubuenit.

Sunt qui Gallitricum capiti ob odorem quem habet grauiffimum, noxi-
um eſſe dicant, id quod facile conceſſerim, ſed ita demum, cum quis intē-
perantius

perantius hoc uini genere usus fuerit : Sed per deos sulphurata illa uina longe magis nocent, quam omnia alia ex quibuscunq; herbis confecta id licet experientia testetur, nemo tamen non uinis sulphuris detestando suffitu infectis utitur, neq; quisquam, quæ est humani iudicii prauitas, his delictis carere uult. Sed de his alio loco plura.

Gallitricum in puluerem redactum, & naribus inditum, sternutamenta prouocat, catharrum tollit & cerebrum purgat.

Reliqua huius plantæ iuuamenta eadem pene sunt quæ & Dictamni.

EXTRINSECVS.

Gallitricum in aqua decoctum, in decessionibus mulierum utile, ad trahendos menses, secundinas, & alia id genus, non aliter atq; Dictamnium.

De Salvia. Cap. XVI.

INTER OMNES FRVTICES, VIX ALIVS, QVICVN-
I que tandem sit, cum Salvia comparari potest, non enim tantum medico, coquo, promo condock uini, inseruit, uerum etiam tum pauperibus quam diuitibus commode usurpatur. Quin & condimenti uice ipsa esse potest Salvia, quibus per uitæ rationem Francofortum siue Venetias adire non contingit, quare recte illi sibi consulere mihi uidentur, qui in hortis suis aroma istud germanicum plantant, quo nimirum non solum cibos, sed & uina utiliter condire possint.


Porro Salvia duorum est generum, hortensis siue domestica, & syluestris, rursus quod ad primam attinet, ea quoq; alia est maior, alia uero minor. Maior quæ à Germanis groß Salbey/uel breit Salbey (id est lata seu maior Salvia) dicitur, caulem propemodum, folia, flores & semen Gallitrici habet, à quo tamen ita differt, ut contractior & magis exigua, nec non uiridior illo sit, quæ res in causa fuit, ut olim antequam Gallitrici nomen in Dioscoride mihi cognitum foret, ipsum Salviæ genus, & maximè quidem esse iudicaerim.

1.
Salvia latifolia.

Minor autem Salvia folijs uestitur magis exiguïs & acuminatis, angustioribusq; cætera Latifoliæ per omnia similis. Proinde hæc ipsa folia magnitudine uiscum, aut Malo granatum æquant, binisq; in extremitate quæ à petiolo dependent auriculis ornantur pleraq;. Herba ubi consenuerit, subalbida cinereaq; hirsuta, rugosa, & exoletæ atritæq; planæ uestis modo scabra conspicitur. Proinde utraq; iucundo optimoq; odore prædita est, plantatur uero quemadmodum & Hyssopus atque Maiorana, & semine & furculo decerpto, ac in humum immisso.

2.
Salvia angustifolia.

Salvia latifolia.
Breit Salbey.



Salvia angustifolia.
Spiz Salbey.



3. Restant uero binæ aliæ sylvestres-Salviæ, quæ Germanis wild Salbey
Salvia sylvestris uocantur, quarum altera eademq̃ uera sylvestris Salvia, secus itinera, in
 uera. agrorum limitibus & collibus iuxta cultos agros sitis provenit. Ea quod
 ad radi-

Salvia sylvestris.

Wild Salbey.



ad radicem, caulem, florē,
& semen attinet, cum do-
mestico Callitrico conue-
nit, colore, quem habet qua-
si nigricantem, ab eodem
diffidens, sicut & scabritie,
nam non est perinde lanu-
ginosa, uti Callitricon.
Florem ex purpureo coeru-
leū gerit, uti Consolidare-
galis. Hanc ipsam Salui-
am quidam agreste Calli-
tricon & Ambrosiam uo-
cant.

Altera, quam nostri do-
ctores, ex traditione nimi-
rum uetularum quarundā
mulierum, agrestem Salui-
am appellant, genus est Ne-
petæ, cui nomen est Cala-
minthæ montanæ, sed de
his supra cap. iij.

4.
Salvia sylvestris
adulterina.

NOMENCLATURAE.

Germani maiorem Sal-
uiam groß Salbey / breiter
Salbey / exiguam autem
klein Salbey / ozech Sal-
bey (id est auriculatā) spitz
(id est acutā) Salbey / Edel
(id est nobilem) Salbey. *Tussilaginis ap-*
Latini Saluiam, Tussilagi- *pellatio ad ungu-*
nem appellant. Dioscori- *lam caballinam*
des lib. iij. cap. xxxv. unum *proprie pertinet*
tantum Saluiæ genus com

memorat, quod uocat *αἰόφυκον*, Elaphoboscon, Phacon, Ciosmite, Phag- *Apul. cap. 101.*
non, Becion, quibus appellationibus Apuleius Cission addit. Theophra- *Theophrastus de*
stus duo Saluiæ ponit genera, quorum secundum, *spéuider* ab illo dicitur. *hist. planta. lib.*
Mesue Saluiam Brui appellat. *D iij 6. cap. 2.*

VIRESCENTIA TEMPERAMENTVM.

In medicina imprimis commendatur acuta, seu auriculata Salvia (quare, & iure quidē, omnibus alijs herbis, in cibis condiendis apud Germanos preferatur) deinceps secundum locum reliquæ obtinent, omnes quidem ex calefactum & desiccantium ordine.

INTRINSECVS.

Multi in ea sunt sententia, ut credant se, postquam ieiuni, tria acutæ Salviæ cum sale folia, mane deuorauerint, toto illo die, à ueneno, in iuriacq; acris corrupti tutos fore.

Vinum ex Salvia confectum, siue herba ipsa in uino decocta, atq; pota, uniuerso corpori prodest, uenenum namq; expellit, tussim emollit, pleurisi medetur, iecur & matricem excalfacit, urinam cit & menses.

Decoctio Salviæ in Dysenteria intestinis purgandis multum conducit.

Salvia siccata inq; puluerem redacta, ac cibis adhibita, condimenti uice, maxime illos commendat, & utiles reddit, pauperibus utilior, omnibus peregrinis & exteris aromatibus.

EXTRINSECVS.

Salvia in aqua decocta, si illa caput abluatur, nigros capillos efficit, porrigines tollit, ulcera & morsus uenenatos sanat, si inde colluantur.

Hoc modo usurpata scabiei medetur, tumoresq; genitalium deprimit.

Salvia in deflectionibus stranguriæ auxiliatur, urinam prouocat, dolores in dysenteria alijsq; morbis compefcit.

Salvia agrestis eiusdem est cum Gallitricæ, & Nepetæ agrestis facultatis, mitior tamen & commodior utraq;.

De Rosmarino. Cap. XVII.


ROSMARINVS NON TANTVM CORONARIA EST
R planta, cuius rei gratia à puellis nostris plantari consuevit, sed & in coquina, ac cella uinaria, necnon officinis seplasiarijs magni

us, frutex admodum iucundi odoris, & thus propemodum referentis, qua de causa *λίβανωτις* dicitur. Eius duo sunt genera in Germania, sed ita cōsimilia, ut uix discerni possint, quanquam alter ex his Rosmarinus, ligno, caule, folijs, & flore aliquanto copiosior sit, & maior atq; efficacior, surculosq;

Libanotis.

Rosmarinus.

Rosmarein.



culosq; crassiores, & folia
latiora altero obtinet. Rur-
sus uterq; longa, angusta,
& densa, inferne candida,
superne uero uiridia folia
habet. Bis in anno, Vere
scilicet et Autumno florem
candidum, tactuq; resi-
naceum gerit, quem semen
sequitur minutum, quod
seminari posset, uerū enim
uero multo foelicius Vere
ex surculis decerptis plāta-
tur Rosmarinus.

NOMENCLATURAE.

Rosmarinus à Dioscoti
de lib. iij. cap. lxxix. et lxxx:
λεβανotis dicitur, inq; tria ab
illo genera distribuitur, sed
unum tantū, coronarium
scilicet, Germanis cognitū
est, atq; hoc ipsum ante pau-
cos annos ex Narbonensi
Galla, quam uocant pro-
uinciam, & Germanice
Langendoefen, ubi tanta
Rosmarini est copia, ut eius
incolę sicut alijs lignis, Ros-
marino focum foueant, ad
nos allatum est. Sunt qui
uelint Rosmarino Zeę ap-
pellationē attribuere, quę
tamen ad genus frumentī
ti quod Germani Spelz
uocant, pertinet, uide Diosc. li. ij. ca. lxxx. Alij Dendrolibanum & Campso-
nemam. Itali Coronam montanam uocant. Autor luminis maioris super
conf. Dianthon appellat. In Serapione cap. cccxvij. hæc quoq; habet nomi-
D iij

Agripp. de occ.
cul. phi. lib. 2.
cap. 23.

na Xaïeralmerien, Arbor Marię, Apinalphach, Cachola. Auicenna secund.
cap. lxx. uocat Rosmarinum Buchormarien, cui reclamationem Serapio capite
ccxlix. aitq; Ciclamen esse Buchormarien. Orpheus Libanotida Solis Thy-
miamia, cui hanc herbam subesse tradunt, uocat. Quid porro de Rosmarino.
Dioscoridis sentiam, in Stoechade aperiam.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Herba hæc calidi est temperamentī, discutit enim & extenuat, subtiliatq;
ut uulgo loquuntur omnis generis crassos humores utrinq; usurpata.

INTRINSECVS.

Rosmarinus tanquam germanicum Aroma in culina usurpatur, nam il-
lo condiuntur, non solum cibi sed & potus, unde optimum saporem acqui-
runt, & multis ægritudinibus medentur.

Vinum etenim ex Rosmarino confectum, mane, uesperiq; calidum pota-
tum, si postea tribus uel quatuor hōris ieiunaueris, alba mulierum proflu-
uia ab abscessu aliquo profecta, erosionesq; muliebriū locorū persanat; pa-
ri ratione morbo regio medetur, suspiriosus prodest, fistulas pulmonis spiri-
tales adaperit, excreabilia efficit uicia thoracis, concoctionē adiuuat, uene-
no resistit, sedat dolorem torminum, sanguinem purgat, emendatq; sudo-
rem deniq; si postquam potaueris in lectum te componas, contextusq; &
tranquillus intra illum te contineas, elicit. Eadem efficit herba Rosmarini
cum floribus in uino decocta.

Conserua ex flosculis Rosmarini confecta, & usurpata, quemadmodum
zuccarum Rosarum, hoc confortat mirifice in lypopsychia. Aqua Rosmari-
ni distillata, præter id, quod pota, loquelam amissam reparat, omnes fere fa-
cultates supra commemoratas, obtinet.

EXTRINSECVS.

Rosmarinus potu uel illitu, Syncopim tollit, tremori & uertigini resi-
stet, faciem clarificat si eo lauatur, pelliculas oculos obducentes discutit,

Aqua Rosmarini, siue decoctio eiusdem cum Dictamno mundificat, &
persanat putrescentia uulnera, qualia sunt carcinomata, herpes & fistule.

Fomenta ex Rosmarino parata, eadem possunt quæ & Menthæ satiuæ,
Dictamnū & Pulegium.

De

De Lauendula & Spica.

Cap. XVIII.


Lauendula.

Lafander.



QUANQVAM DVO
 isti frutices quod ad for- *Cassia.*
 mam pertinet radicis, li- *Nardus.*
 gni, foliorum, caulium flo-
 rum & seminum, consimi-
 les uideantur, tamen quo-
 ad partes iam dictas Spica
 Lauendulam longe supe-
 rat. Præterea non esse uni-
 us generis has ipsas stirpes,
 neminem latere arbitror,
 cui utriusque odor quem
 Spica grauiorem Lauen-
 dula habet, perspectus fue-
 rit. Hoc tamen fatendum
 est, caulem utriq; esse qua-
 drangularem; ac aliquātū-
 lum concauum, folia plane
 cineracea, latiora & lon-
 giora Rosmarino, florem
 uero copiosum, & ex pur-
 pureo cæruleum in cacumi-
 ne caulium è spicatis folli-
 culis Tritici instar, copio-
 sum prodeuntem. Semen
 denique ex incano atrum
 Psyllio consimile, ex quo
 utraq; repullulascere que-
 at, multo tamen dexterius
 ex furculis decerptis, achu-
 mo in Vere uel Autumno
 infixis plantatur. Cæte-
 rum ut paucissimis rem to-
 tam expediamus, hoc pa-
 cto inter se differunt Spica
 & Lauendula, nimirum

Spica.
Spica Nardi.



Casia germanica
Nardus germani
ca.

quod hæc folijs, flore, spica, caule, odore, angustior, breuior, humilior, rarior, mitior, suauior, ideoq; usu proculdubio præstantior illa reperiatur.

NOMENCLATVRÆ.

Sed bone Deus quonã referemus nobilissimas germanicarum plantarũ stirpes, posteaquam apud multos ita constitutum est, Dioscoridem & Theophrastum eas neutiquam descripsisse, quod cum uerum est, nonne consultius fuerat Cicutam potius, quam insignes hos frutices, prætermissæ? Netamen nomine prorsus destituantur, audebo aliquid breuibus, saluo tamẽ doctiorum iudicio, uocaboq; Lauendulam, Casia Germanicam, nihil interca Casia lingnæ & Casia fistulæ, ut uulgo uocant, detrahens, Spicam uero, Nardum itidem germanicam, sin aliter statuendum sit, cõficiam vtrancq; in caput Dioscoridis lxxix lib. iij dicãq; eã esse quæ prima λεβανωρίς à Dioscoride uocatur, sed de

his infra in Stœchade plura, Germani Lauendulam, Lauendel, Spicam uero Spicanard appellant.

VIRE S

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Spica & Lauendula calidi sunt Temperamenti, Spica tamen plus caliditatis habet. Porro utraq; calefaciendi, discutiendi & educendi uim obtinet, quæ omnia Diosco. lib. 1 Nardis & Calijis attribuit.

INTRINSECVS.

Flores Lauendulæ uino decocti, urinam cient. Pari modo calidi poti, ita ut postea aliquandiu ieiunes, per triduum, uel quadriduum usurpati, secundinas & menses trahunt, Cardiacæ medentur, flatus discutiunt, morbo regio uti & Rosmarinus auxiliantur.

Flores Lauendulæ cum Cinnamomo, Caryophyllis, Macei, Cardamomo, Cubebis, & folijs Rosarum uino decocti ad omnia superiora commemorata efficaciores sunt, ita ut etiam Apoplexiæ opitulentur, loquelam amissam reducant, dolorem dentium sedent, exulcerationem oris persanent, & mundificent.

Eadem præstat aqua Lauendulæ. Flores Spicæ iisdem morbis adhiberi, ac pari ratione usurpari possent, propter caliditatem ac acrimoniam, quam habent, quamuis mihi quidem nihil certi ea in re constet, Nolim enim temere quicquam affirmare, cuius uel nulla extet experientia, aut euidens ratio.

EXTRINSECVS.

Lauendulæ simul & Spicæ aqua dolorem capitis, & uertiginem, à frigida intemperie ortum, uertici uel fronti illita, tollit, id quod Spica maiori efficacia facit.

Ad paralytica membra, & quæ frigidityte læsa fuerint, conducit aqua distillata, & herba Spicæ frictu ac fotu, ita enim membra non tantum calefiunt, & pristino uigori restituntur, uerum etiam tremor illorum aufertur.

Breuitè, omnibus modis flores & herbae iam dictæ, paralyticis membris, & imbecillitati capitis apertissimæ commodissimæq; sunt.

De Valeriana. Cap. XIX.

Q VONIAM NARDORVM MEMINIMVS, OPERAE pretium fuerit, reliquam illorū historiā attexere, quamobrem à Spica ad Valerianā deuenio, cuius quatuor exsūt genera, maius scilicet:

*Valeriana vera, seu Nardus agrestis.*Græce *σν.*

Baldrian.



scilicet, uulgare, exiguum, & minimum, quæ ordine singula describemus.
 Maximam ac ueram Valerianam nostri in hortis plantare solent. Eius
 radix

Valeriana vulgaris.

Gemein Baldrian.



colliculos exeunt. Et quemadmodum fragaria in superficie, per terram serpendo iuuenescit, ita hæc radix intra terram, hinc inde radicando quorannis renouatur. Nascitur in humectis agris, pratis, & fossis, atq; hoc est uulgare illud Phu.

radix digitum crassa, uillosa, in nigri Veratri (de quo cap. cxxxv. huius primi libri) modum, capillamentis inuicem contextis, candidior, formam Bistortæ (qua de infra cap. cv. primi libri) æmulans; odoratissima. Folijs uestitur herbaceæ uiriditatis, latioribus altera Valeriana, dissectis instar filicis. Caulis illi teres, concavus, læuis & geniculatus. Florem gerit in summitate caulis elegantissimum, instar Ebuli Semen ubi maturuerit, in auras auolat, non aliter atq; Lactucæ & Endiuæ:

Nardus agrestis.

Altera, uulgaris nimirum *Serpyllum maius* Valeriana, folijs; caule, & *Karben* flore, non multo minor est *wurzel*. hac, nisi quod folia habet nigricantiora, multisq; ac frequentibus incisuris diuisa, haud aliter quam Anserina. Radix huius multo minor existit, ac infernæ quasi præmorsa, aut succissa apparer, uillosa, ac capillamentis fibrata, quorannis se inuertens, nouasq; è lateribus radículas, sicut & Lolium (cuius infra secundo libro historiam habes) procreans, quæ postea in nouos

Tertium.

Valeriana exigua.

Bleiu Baldrian.



Tertium iam commemorato radice caule folijs et flore magis exiguum est. Hoc in montibus inter arbuscula quædam, nec non in syluis cæduis, quas rustici alternis annis frumentis cõserere solent, uulgo Rõt & Reuttenen Germanica lingua uocant, prouenit, folio cinereo cuiusmodi et Anserina habet, flore ex candido purpurascente, odore tam floris quàm radice gratissimo.

Omniū autem minutissima Valeriana, pene eadem quoad formam, cum reliquis esse apparet, nisi quod illis radice, & caule, & flore multo minor existit. Caulis namque eius uix culmum crassus est, ad altitudinem duorum palmorum circiter assurgens, folio acuto, ueluti Cressio hortensis, quando is floret. Nascitur in pratis lacunosis, in primis uero humecta & candida terra gaudet. Odor illi cum Phuscundo communis. Aprili mense in pratis floret.

NOMENCLATURAE.

Primum maius ac nobilissimum Phu, haudquaquam uulgare est, siquidem in hortis feri & plantari necesse habet. Mulierculæ hodiè herbariæ, maxime uero Argentoratenses hortulanæ pro calamo aromatico uenditare solent, non alio sane iudicio

dicio, quam si Basilicon loco urticæ exhibeas. Alteram uero Valerianam Germani appellant, *Baſen wurzel / Zugen wurzel / Wendwurz / Deſenmarck* / ea nimirum uera est Serpentaria herba, aut Serpyllum. Sunt enim qui eo quod hinc inde serpat, seq̃ conuertat, ut diximus, Serpyllum maius uocent. In Dioscoride lib. j. cap. x. dicitur *ῥίζη ἡ ἀγρία ῥάδιος*, Phu & Nardus agrestis. Hieronymus *Braunſchweig* Marinellam, Genicularem, Herbam Benedictam, & Valerianā nuncupat. Autor luminis maioris supra Vng. Alaba. Amantillam & Potentillam cognominat. In Serap. ca. lxxj. & Rale, cap. xliij. Sistra, & Spica syluestris dicitur.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Omniū Phu herbæ & radices calefaciendi, & aperiendi uim obtinent, in primis uero maioris, deinde minoris montanæ, postremum gradum tenet uulgaris, quæ ad ripas fluuiorum, & in humectis pratis prouenit.

INTRINSECVS.

Valerianæ radix in puluerem redacta, ac in uino pota, urinam ciet, lateris & dorsi dolores mitigat, menses elicit. Eadem præstat uino decocta.

Tempore pestis pota & odorata contra aëris intemperiem utilis est.

Eodem modo usurpata ad stranguriam seu stillicidium urinæ prodesse à multis affirmatur.

Quidam Valerianæ radicem cum foeniculo, aniso, & dulci radice discoquunt, contra tussim & difficilem anhelitum.

EXTRINSECVS.

Herba & radix Valerianæ uiridis contusa & imposita, dolores capitis, & impetus ac compunctio nes eius sedat, tollitq̃, & ad Erysipelata efficacissimum remedium præbet.

Vinum in quo flores aut radices Valerianæ decoxeris, oculorum claritatem adiuvat, instillatum, uulnera & ulcera, ut sunt mariscæ, & id genus alia, sanat.

Breuitè Valeriana oculis amicissima est radix, & uisus imbecillitati in primis opitulatur, id quod uel feles nos satis docere possunt, quos admodum hac planta delectari, uisus proculdubio instaurandi gratia, multorum experientia comprobatum est.

De

De Asaro. Cap. XX.

Baselwurz.



A SARVM CVM EX NVMERO PLANTARVM SER-
pentium sit (nam magis supra terram, quam intra humum hinc
inde serp

Inde serpendo se propagat) non inepte facturum me arbitratus sum, si post Valerianam, quæ & ipsa ex Serpentarijs herbis una est, illud collocarem, maxime cum Nardus sit odoratissima.

Est autem Asari radix odoris gratissimi, transuersim hinc inde sparsa, ac inter sese contexta, multisq; capillamentis fibrata, ueluti Polypodium. Folia uiolæ, quam Germani *Mergen violen* uocant, uel Limonio fere similia apparent, sed multo formosiora & densiora, Hederam exprimentia, superne nigricantis uiriditatis, inferne uero pallidioris ac subalbide, plurimisq; uenis ac neruis prædita. Inter radices & folia flores purpurei in uasculis exiguis, uti in Hioscyamo, in quibus semen continetur angulosum, acinos uuarum, uel Crocum Saracenicum emulans, sed multo magis exiguum, prorumpunt.

Vmbrosis locis, & humo limosa gaudet Asarum, quare plerumq; subter corylos, & nonnunquam in humidis syluis, maxime uero ea quam Germani den *Beerwaldt* uocant, prouenit.

Quod in montibus nascitur Asarum, odore optimum, & magis exiguum esteo, quod in uallibus reperitur. Huic Nardo odoratissimæ maxime insidiatur opiliones.

NOMENCLATURAÆ.

Asarum Dioscoridi. lib. i. ca. ix. *ἀσάρων, ὀσπύς ἀσπίν*, Nardus rustica, uel agre *Baccharis* appellatis, Sanguis Martis, Thesa, Cercera, Succinum, Perpenfa, aut ut Hermola *latio Asaro* minus Barbarus legendum existimat, Perpresa & Bacchar dicitur. *me conuenit, sed* Aemylus *alteri cuidam ac* Macer Asarum latine Vulgaginem dici scribit. Asari historiam fusius persequuntur, Plin. lib. xij. cap. xij. & vi, & Serap. cap. ccxliij. *peculiari herbæ, uide supra nonnō caput, ubi sententiam nostram de Bacchare deprehendes.*

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Asarum, quod nūq; non fragrantissimum spirat odorē, Nardo Indice minime cedit, temperamenti est calidi & sicci: eius usus in medicina, tam ad interiores quam exteriores corporis partes est frequentissimus.

INTRINSECVS.

Ex Asari radice in puluerem redacta, Zaccaro, Cinnamomo, alijsq; aromatis admixtis tragema confectum, ac Drachmæ pondere sumptum, nauseam & uomitiones prouocat, Choleram & Phlegma, per inferiora & superiora expellit.

Radix cum uino & melle decocta & bibita, discutit uiscosos pulmonis humores, astmaticis & tussientibus auxiliatur, id quod instituto opilionum

animaduertere licet, qui hanc radicem in puluerem tusam, saleq; permixta, affectis ouiculis lingendam exhibent. Alij quoq; Veterinarij eodem modo armētis, & maioribus pecoribus purgandis, iam dictū remedium adferūt.

Eodem modo cocta & pota radix Asari hydropicis mirifice conducit, obstructions namq; iecoris, pulmonis, & lienis, adaperit Asarum, uescā, renes, & uterum purgat, menses prouocat, & si immodice usurpetur secundinas ac foetum, tam in hominibus quam pecoribus expellit.

EXTRINSECVS.

Lixiuio, in quo Asari radix decocta fuerit, cerebrum & memoria iuuatur, calor sedatur, si ex illo caput abluatur.

Aqua Asari distillata easdem obtinet uires, in primis uero caligini oculorum instillata, modica Tutia eaq; præparata admixta conducit.

De Garyophyllata. Cap. XXI.

VM HACTENVS NARDORVM MENTIONEM Fecerimus, proferam & ego meam Nardum, eam scilicet quam uocant Benedictam. Hanc quia odoris gratissimi est, iplis etiam Nardis adnumerandam censeo. Radix illius, siue sicca, siue uirens, eundem cum Garyophyllis obtinet odorem. Folium habet incisuris dissectum, hirsutum, nigricantis uioris, quadamtenus Agrimoniam æmulans. Caulera gignit rotundum, horridum & lanuginosum, flore comantem luteo, formam ocelli referente, quo succusso caput extuberat circinatis acinulis cumulate stipatum, purpureo colore, ad magnitudinem & formam Auellanae accedens, atq; hoc est semen illius. Radix quasi succisa quoq; & quasi præmorfa, intus uero subruissa apparet, ea quotannis nouum, iuxta ueterem qui hunc me aruit, caulem protrudit, & quo plures illa annos habuerit, eo odorator euadit, quamobrem merito quidem in censu odoriferarum stirpium habetur.

NOMENCLATURAE.

Quoniam hæc herba referenda sit, aut quod illi apud Dioscoridem nomen sit, pleriq; certant, alijs hanc ei tribuentibus apellationem *nardum*, Peleporis, Germanice *Hasenfüß*/alijs uero Agrimonie nomine, cum qua satis conuenit historia, illam uocantibus. Ego uero, hoc tempore litem istam, nullus dirimam, interea Nardum agrestem, Garyophyllatam, & Benedictam appellaturus, uel etiam ut multis placet, Sanamundam, Germanice *Benedigsternwurz*.

VIRES.

Garyophyllata.
Benedicten wurzel:



VIRES AC TEM-
peramentum.

Quod si hæc radix Nardus
agrestis sit, uti putant, certe
uim calefaciendi, discutiendi
et confortandi, internas
ac externas corporis par-
tes obtinet, quemadmodum
Nardorum fert natura.

INTRINSECVS.

Vfus huius radicis uul-
garis is est, ut Vere in uinum
imponatur, quod optimo
ac iucundissimo tum odo-
re & sapore commendat.
Hoc uino cor exhilarari, &
obstructiones iecoris aperi-
ri, necnon frigiditate &
crassis humoribus affectum
stomachum iuuari multi ce-
stantur.

Radix Benedictæ uino
decocta, ac calida pota, do-
lorem uentriculi & intesti-
norum à frigiditate, aut fla-
tibus ortum sedat.

EXTRINSECVS.

Vinum in quo radix Be-
nedictæ decocta fuerit, pur-
gat & mundat omnia uul-
nera, cuiusmodi sunt Fistu-

læ, & carcinomata. Idem scædas maculas exterit, si illo facies aliquandiu, sin-
gulis diebus abluatur, maxime uero in primis diebus puerperij. A hæc Em-
pyriæ de hac herba quotidie inueniri possunt.

De Ruta. Cap. XXII.

Ruta domestica.

Jam Rauten.

Plin. sec. lib. 4.
cap. 3.



1.
Ruta minor &
prestantior.

2.
Ruta vulgaris.

RUTA, OMNIBVS
pene hortis ubiq; locorum
familiaris cernitur, non
quod culinæ inseruire, aut
iucundo, quem non habet,
odore, homines afficere
possit, sed quod omni pene
ueneno resistat. Est enim
Ruta peculiaris Theriaca
pauperū, id quod nō tantū
Mithridatis regis Pontici
exemplū docet, sed & ipsa
quotidiana experientia cō-
probat.

Ruta in duo genera di-
rimitur, ita ut alia horten-
sis, alia montana seu sylue-
stris dicatur. Rursus horten-
sis in duas species secatur,
sed adeo inuicem consimi-
les, ut nemo facile illas di-
scernere queat, nisi singula-
ri diligētia illas perspiciat.

Ruta ergo omnium no-
bilissima tenerior, nigrican-
tior, ac longe exilior vulga-
ri existit. Eius folia ex mul-
tis alijs rotundis, lenticu-
lamq; imitantibus foliolis
constant. Hæc raro florem
profert, ferroq; incisa faci-
le inarescit.

Vulgaris autem Ruta iam
descripta, per omnia ma-
ior, folijs uestita latiori-
bus, frequentibus, cæsi co-
loris.

Ruta sylvestris.

Wild Rauten.



loris. Vtraque florem gerit luteū, forma stellatum, qui deinceps in siliquis capitulis latas quadripartitas, interrim etiam quinquepartitas fructum rubrum arboris lugalis (qua de infra lib. iij cap. xvij agemus) æmulantes abeunt. Porro in his quos diximus angulosis calicibus semen includitur nigrum, quo feri ruta possit. Seritur & furculo, & multo quidem foelicius, non secus atque Salvia, Spica, & id genus aliæ plantæ. Radix Rutæ lignosa, sicut & caulis, sub cortice uero sublutei coloris, ueluti Buxus, Locis apricis quibusuis nullo negotio affatim nascitur, quare fisco adiuncta minime opus habet.

In Germania nostra moris est Rutam Salviæ ad iungere, cuius hæc afferunt rationem, Buffones amare loca Salvia consita, qui ut a bigantur Saluiam Ruta muniri oportere.

Sylvestris Ruta in Germania non sæpe uisa, ple-
risque nunc innotescere coepit. Eius semen primus ad me misit doctissimus uir Doctor Conradus Gesnerus,

Ruta sylvestris.

Tygrinus, quod ubi seruissimam, plantulæ mihi exiguae natæ sunt, qui tertio primum anno floruerunt, Quod ad formam pertinet, ad uulgarem penecedit hæc, folijs tamen, & nodosis floribus, ac semine multo illa exilior, tene

rior, mollior, & magis incana. Caule præterea prædita frequentiore & altiore, deinde & odore grauiore, ita quidem, ut etiam capitis dolores proritet, Saporem obtinet ingratum, & ad amaritudinem quandam uergentē. Augusto mense floret, Autumno uero maturefcit.

NOMENCLATVRAE.

Mirum sane uide-
ri potest, quo pa-
cto Rutæ appel-
latio ad Tussila-
ginem peruene-
rit. Vide Diosco-
ridem lib. 3. cap.
#7.

Rutam satiuam quæ Germanis Kauten & Wein Kauten dicitur, Dioscorides lib. iij. cap. xlvij. *πύραρον* Rhyten, Epnubum, Harmalam, Befasam, et Churmam nominat, quamuis posteriora tria nomina ad syluestrem Rutam pertinere uideantur, Apuleius cap. lxxxix. vtrancq; Rutam, Eriphion nūcupat, Serapioni cap. cxc. Sadeb. Quidam semen Rutæ Bizeri Salgagel dicunt. Phrisus Hebræa lingua Rutam שחפ Schafef uocat, Chaldæi & Thalmudistæ מרחל Mechul & מרגם pigam uocant.

Syluestris Ruta *πύραρον ἄγριον* Græco sermone dicitur, non tamen ea est quam Dioscorides ab initio capitis xxxviiij. lib. iij. Androsæmon, Hypericon, Chamæpytin, Hederalem, Corion, Centonalem & Churma semma/ced appellat. Fieri autem potest, ut ea sit quam dicunt Harmalā & Befasam & quam Galenus Moly uocitat.

De Ruta Muraria infra capite clxxxij. dicemus.

VIRESC TEMPERAMENTVM.

Ruta ferculis abdicata est, quod odorem & saporem obtineat feruentem.

Ex calefacientium & desiccantium est ordine & ad omnia uenena & repimenta & expellenda apprime conducit. Utillissima quoq; aluo sistendæ. Quin tantarum est uirium, ut eas neminem satis describere possit arbitrær.

INTRINSECVS.

Aduersus omnia uenena Ruta maxime commendatur, quam obrem solemus Germani folia Rutæ, Iuniperorum grana siue baccas, iuglandem nucem, & ficos, æquali pondere simul contundere, ac deinde infuso rosaceo uel alio quocunq; uini aceto, percolare illum succum, eoq; pro antidoto contra uenenum uti. Est hæc peculiaris & pretiosa Theriaca aduersus uenenum haustum, & infectum peste grassante aërem, si quotidie mane mensura unus coclearis ieiuno stomacho usurpetur.

Folia rutæ una cum semine in uino decocta & calida pota, ueneni uires inefficaces reddunt. Pari ratione sumpta ad pectoris & laterum dolores faciunt, nec non pulmonis inflammationem, tussim, difficultatem spirandi, coxendicum deniq; articulariūq; cruciatus, & horrores febrium circuitu repetentes.

Ruta cum.

Ruta cum Anethi semine in uino decocta, & pota, torminibus prodest, modo alui astrictio illi non sit coniuncta. Idem efficit aqua Rutæ distillata. Qua de causa herba Rutæ, oleumq; ex ea confectum clysteribus, quibus aduersus tormina & colicam passionem utimur, adhiçi debent.

Porro & urinam ciēt Ruta, uerum si continuo ea utaris, genituram extinguit. Quare eam Cœnobitæ & Monachi (qui castitatem ac coelibatum temeraria præsumptione, præter uerbum ac mandatum Domini uouere solent) in cibo ac potu suo perpetuo usurpare debebant.

Ruta aqua pluriāli cocta & pota, fluxum uentris, quem Diarrhœam uocant, cohibet. Herba cum oleo decocta, & sumpta, uentris tinea excutit.

Folia Rutæ uiridia commanducata, cepæ alliq; acrimoniam domant.

Ruta syluestris plane nullius est usus in cibo, sed in medicina efficacior satua.

EXTRINSECVS.

Quancūq; Ruta uiridis, si nudam carnem illa confricaueris, pruriginē ac rubicundas pustulas excitet, earum tamen est uirium, ut non solum omnē pene tam internum quam externum dolorem mitigare possit, sed & quasuis malas pustulas, uerrucas, scabies, & impetigines persanet, tumoresq; detumescere faciat. Testatur etiam Dioscorides Rutam cum ficis in uino ad dimidias partes decoqui, eamq; aquæ intercutem auxiliari potu & illitu.

Folia Rutæ uiridia, cum purissima farina ordeacea contusa, ac emplastri modo imposita, graues oculorū dolores leniunt, eorumq; caliginem discutiant, & uisus aciem excitant.

Capitis doloribus cum rosaceo aceto illita auxiliantur.

Ruta cum Laureis folijs contusa, emplastri modo imposita, inflationes, & tumores locorum muliebrium, & uirilium discutit, mitigatq; dolorem.

Succus auribus inditus, ad illorum dolores mirifice facit.

Succus cum alumine, nitro & melle permixtus, lichenibus, eruptionibus papularum, necnon ulceribus capitis manantibus efficaciter illinitur.


Plura alia, ex his quæ diximus, colligi possunt.

De Hyperico. Cap. XXIII

ULTI IN EA SVNT SENTENTIA, VT STATVANT
M Hypericum Germanis Barthaw dictum, Rutam esse syluestre,
asserentes eam dæmones fugare, non aliter atq; ueneno satua re-

Herba perforata.

S. Johans kraut.

*Hypericon exiguum.*

Klein Barthaw.



fistat. Hac superstitione uetulae nostrae mulierculae fascinatæ, uersiculos sub-
scriptos patria lingua recitare consueuerunt.

Dost/Barthaw/ond weisse heide/

Thut dem Teuffel vil leidt. Hoc est,

Ort.



Hypericon vulgare.

Hyperici duo genera, in dume-

tis nascentia;

Gemein Barthaw.


Zwei Barthaw in den hecken.



Origanum, Hypericum, & Erica, multum Demonibus aduersantur. Ex quibus sane uersiculis satis apparet, quid maiores nostri, cum adhuc genti.

Hypericum pulchrum.

Das schön Hypericon.

Hypericum
exiguum.22
Vulgare
Hypericon.

les essent, de his plantis sen-
serint, & ad quos illas usus
adhibuerint.

Sed relictis superstitio-
nibus ad Hypericum rede-
amus. Eius mihi quidem
ad minus tria uel quatuor
genera cognita sunt. Exigu-
um scilicet, uulgare quod
incampis passim progigni-
tur, & magnum quod in
dumetis ac apricis locis na-
scitur, quæ sane uniuersa ge-
nera per omnia consimilia
apparent.

Hypericum exiguum
quod haudquaquam pas-
sim obuium cernitur, fru-
tex est breuissimus, uix ad di-
midij palmi altitudinem
excreescens, exiguo, tenuiq;
cauliculo, eoque rubescente
flore luteo, folio minori &
angustiori Ruta satiuæ præ-
ditum.

At uulgare Hypericum
huic per omnia fere respon-
det, nisi quod magnitudi-
ne, longitudine, ac crassitie
caulium, foliorum (quæ sin-
gula uelut acuminatim
puncta, quasiq; pertusa, seu
perforata uidentur, si soli
obiecta ea perspicias) exi-
guum genus superat, exce-
ditq; . Flos illi in fastigio lu-

teus, Siliquas gerit subhirsutas, in longitudinem rotundans, hordei magni-
tudine, & semen in ijs nigrum, Plantagine rubea minus. Odor his binis fru-
ticibus, floribusq; & seminibus ipsorum, resinaceus est.

Tertium

Tertium deinde Hypericum, in sylvis, dumetis, apricis collibus, & umbrosis locis nascitur, caule plerumque unico, quadrangulo rubescente, quamvis non raro tres uel quatuor habere conspiciatur. Folia ipsius rotundæ sunt figuræ, oboli latitudine, instar Nummulariæ herbæ, pertusa quoque. Breuiter hæc tria Hyperici genera, a se mutuo fere nihil differunt, nisi magnitudine. Et quod admiratione dignum est, hæc ipsæ herbæ omnes trita manus truentant, id quod in nulla alia fieri uidemus, nisi his, quibus natura rubicundum colorem tribuit, cuiusmodi sunt, Sanguisorba, Nigra Beta, Blitum nigrum &c. qua de causa iure Hypericum Androsæmos dicitur.

3.
Tertia Hyperici species.

Miraculum nature.

Quartum Hypericum rarissimum, sed formosissimum est frutex, caule terete, tenuissimoque, cubitali, nonnunquam & altiori, flore fuluo, ac magis exiguo quam reliquorum. Folia ipsius non per omnia respondent superioribus, quæ depinximus Hypericis, sed potius Tithymalo maiori, sed magis exigua. Surculos multos, quamplurimis foliis Rutæ similibus uestitos, profert hæc plantula, quam ego certe existimo uerum Androsæmon Dioscoridis esse, trita namque resinolum odorem proprie exprimit.

4.
Hypericum elegantissimum.

NOMENCLATURA.

Sylvestris Rutæ nomina, quæ apud Dioscoridem extant, præcedenti recensuimus capite. Hyperico proprium caput dicauit Dioscorides, quod uocat Androsæmon, Corion, & Chamæpithyn. Huic ab autore aliud subiungitur, in quo describitur herba *ἀνδροπέον, ἀνδροπέον*, & Androsæmon appellata. Rursus aliud subiicitur caput, quod peculiariter Androsæmo dicat Dioscorides, quod & *διωρσάδα, & ἀνδροπέον* appellari tradit, atque hoc ipsum caput ego de ea herba intelligo, quam Germani groß Barthaw appellant. Præterea antequam de Hyperico ageret Dioscorides, meminit herbæ Onobrychis, cui Hyperici, & Chamæpityos appellationes similiter ascribit. Ex his citatis locis apparet quatuor frutices à Diosc. Androsæmi uocem nuncupari, quinque item plantas in commentarijs illius extare, nomine Hyperici insignitas, nimirum Rutam sylvestrem, Onobrychin, Hypericum, Ascyron, denique & Coryn, qua de Dioscorides lib. iij. cap. clxv. Vnde liquido constare puto has ipsas plantas, ad unum genus referendas esse, sicut & P. Ægyneta monet, quanquam ueteres de unaquaque seorsim egerunt.

ἡ ἰνδική.
Diosco. lib. 3.
cap. 162.
ἀνδροπέον, ἀνδροπέον.
Χαμαίπιθος.
Corion Coriandrum proprie est, de quo suo loco.
Diosco. lib. 3.
cap. 163.

Germani has plantas uocant S. Johans kraut / Barthaw / Waldehoff / unferfrawen Betstro. Latini Fugam dæmonum, & Perforatam. Serap. ca. cclvij. Reofricon. Auicen. lib. ij. cap. ccclxv. Hypericum appellat Alharib, Vuam dæmonis. Auerrhoes de simpl. sylvestre Rutam, Halsedep, & Hypericum, Heufericon, Nelifricon, Mellisigon, & Cordialem nominat. Hebræi teste Phrisio *אֶרְבֵּי חַיִּים* Alarif.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Pulchrum
Hypericum.

Omnia genera syluestris Rutæ, quæ Germani uocamus *S. Johans/vnd Bartham Freutter*/ easdem fere facultates obtinent, quas & Ruta satiuæ, nā ex ordine calefacientium & desiccantium existunt, uerum utrinq; corpori magis accommodata, si & odorem & saporem spectes. Porro id Hypericum quod fuluo caule & flore, ac folijs Rutæ præditum est, primum habet locū, secundum uero, quod in campis & incultis agris nascitur. Proinde omnia huius plantæ genera trita, cruentum reddunt succum, quamobrem unum & idem pene habent temperamentum:

INTRINSECVS.

Quidam aquam Hyperici distillatam contra Apoplexiam & morbum comitalem bibendam exhibent,

Hypericum uim habet peculiarem educendi uenenum, urinam, & menses, uino decoctum & potum.

Eodem modo sumptum Febri tertianæ, & quartanæ medetur, Ischiadicis contra dolorem coxendicum utiliter datur, excreationes sanguinis finit, uulneribus & erosionibus internis auxiliatur.

Semen Hyperici (maxime illius quod in syluis prouenit) contusum, & singulis uicibus mensura ij. dragmarum potum; choleram per aluum ducit,

EXTRINSECVS.

Herba omnium Hypericorum cum semine illita ambustis efficaciter medetur.

Multi præterea homines Hypericum secum portant, aduersus præstigiæ dæmonum & tempestates. Et, si naturam ipsam cōsideres, forte non abs re ista de Hyperico prædicantur.

Aliæ si quæ Rutæ sunt syluestris, seu Hyperici uires, superiori capite commemoratæ sunt.

De Chamæcyparisso.

Cap. XXIII.

CHAMAECYPARISSI MENTIONEM DEINCEPS
V faciam, nō solum Ruta syluestris me admonet, sed & hoc ipsum, quod frutex iste quem modo tractamus, Chamæpitys sit, resinosum fundens odorem, sed longe uehementiorem Androsamo, quo nomine uera Chamæcyparissus censeri debet.

Est autem

Chamæcyparissus.
Cypressen,



Est autem *χαμαίπριος* lignosum genus fruticis, nō secus atq; Maiorana, Lauendula, Hyssopū, ac Thymus, quod quacuncq; terrā contigerit, facillime radicitur, instar Saluæ & Serpylli. Folia habet cineracea, incana, exilia, prælonga, ac rotunda, folijs Semperviui minoris (uti Dioscorides testatur) similia, at multo tenuiora, hirsutaq; perq; omnia Ericam primum incanempis erumpentem, æmulantia. Iunio mense flores cogmat, auri instar fulgente. Ceterum singuli flosculi singulis pediculis, ueluti caseoli quidam (nam illorum rudimentum satis representant) suffulciuntur. Herba est coronaria, quam nostrates puellæ aduentante hyemē, ne illius iniuria pereat, in figulinis uasis plātare, ac in cellis uinarijs conseruare solent.

Diosco. lib. 3.

cap. 166.

Tempus

NOMENCLATURAE.

Chamæcyparissus (quæ à Germanis Cypressen dicitur) nobilis est *χαμαίπριος*, quanquam illius plura alia extent genera, nimirum Hypericon, Androsæmon, & *χαμαίπριος*.

ea, de quibus paulo post diceretur. Dioscorides ultimo in lib. capite hunc fruticem Chamæpityn, Cupressinam, Bryoniam sylvestrem, Pityforysin, Orizelon, Olocyron, Ioniam, Sideritin, Docheiam, Sanguinem Palladis, Aiu-
Pro Cupressina,
alia exemplaria
Cypripum le-
gam, gunt.

gam, seu Abigam appellat. Apuleius cap. xxv. Orozelon, Holocyrtion, Bryon agrion. Hæma Athenas, Abigam, Rapam, Cypressum nigram, Spiculam, Mamum alem, Nemenepa. Serap. de Chamæpity cap. clxxix. scribit. Non desunt autem qui Chamæpityr suam Moschatam esse contendunt, Ego uero hunc nostrum fruticem Chamæcyparissum esse iudico, necnon Chamæpityr, id quod odor ipsius satis arguit.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Chamæcyparissus, & Hypericum easdem obtinent facultates, sicut & eodem fere odore, & sapore commendantur, quare alterum uices alterius in medicina obire potest.

INTRINSECVS.

Folia septem diebus in uino pota, regio morbo, urinę difficultati medentur, obstructions iocinoris tollunt, renum uesicę & coxendicum uitij profunt. Chamæcyparissus ueneno aduersatur, non secus atq; Hypericon & Ruta.

EXTRINSECVS.

Quę de Hyperico & Ruta, hæc eadem fere de Chamæcyparisso dici possunt, sed ut ea repetamus minime consultum uidetur. Transeamus ergo ad Chamæcyparissum agrestem.

De Chamæcyparisso agresti. Cap. XXV.

VM NVLLA FERRE SIT OFFICINA, QVÆ NON PROPRIAM aliquam Chamæpityr ostendet, uerisimile uidetur, illas uix unam aut ullam habere Chamæpityr, maxime earum quas uel Dioscorides, uel Plinius describere. Quam enim Seplasiarij hodie Chamæpityr uulgo affirmant in Germania, ea sane herbula est agrestis, omnium saporem cum odore prorsus destituta. Quod si omnino Chamæpityros sit genus, certe syluestre admodum est, quanquam ut hoc ipsum credam adduci non possum. Ego certe toto ferme quadriennio hinc inde uagor, omnesq; non modo seplasiarios, uerum etiam circulatores, & qui herbas apud nos circumferunt, diligentissime percontatus, nihil certi inuenio, tandemq; uulgarem, de qua iam diximus plantam, quę in agris passim nascitur, pro Chamæpyti ab illis accipere cogor. Posteaquam uero uniuersa de Chamæpyti ueterum scripta exacte pensitasset, certo certius Chamæcyparissum nostram

Chamaecyparissus agrestis.
Feld Eypressen.



nostram priorem Dioscoridis Chamæpityn esse deprehendi. Alteram uero eam, Altera Dioscori quam modo præ manibus ²¹ *ridis Chamæpitys* habemus. Vt uero ita sentirem, experientia me docuit, nam pro Chamæpyti illâ efficaciter ægris nonnullis exhibui. Hęc in quibusdam frumentarijs agris, præsertim ijs qui zea uel auena cõsiti fuerant, Iunio mense quærenda erig, est enim rarissima, quare in posterum illam in hortis plantare constitui, id quod alij quoq; meum exemplum imitati, facere debebunt. Porro elegantissima est herba, simul & iucundissima, quoad formam & odorem. Ea in arbusculam quasi, neq; tamen Satureiam magnitudine superans excrescit, nigricantibus folijs, ijsq; tenuibus ac incisis instar crucis, ad similitudinem Absinthij accedentibus, multo autem illis minoribus atq; elegantioribus uestita. Quadrato caulii multi adnascuntur surculi, quos ex folliculis purpurei flores prorepentes, ambiunt, ueluti in Hyssopo, quod uocant Germani *Floster Hyssop*. Semen illi teres,

Locus & Tempus.

Forma.

coloris incani, sed ad nigredinem uergentis, nec maius semine Rapæ. Radix in rectum expansa, paucis capillamentis fibrata, nec distans a radicis Satureiæ forma. Frutex est aliosus, qui quotannis ex semine proprio repullulat. *Gustum.*
scit.

Chamæpitys tertia.

Feld Cypressen das dritt.

Odor.

3.
Tertia Chamæpitys.

indigitis
• *Cratæus*
Diosco. lib. 4.
cap. 33.

scit. Saporem habet amarū,
odore uero iucundo, Te-
rebinthinam, aut Camo-
millam pene æmulante præ-
dita.

Tertia Chamæpitys exi-
gua quoque et exilis est herbu-
la, quam Seplasiarij Iuam
appellant, asserentes eā ad
propriū genus referen-
dum, quod nos facile da-
mus. Folia enim ipsius acu-
ta & cineracea, quadamte-
nus Pini folijs conferri pos-
sint, quare non immerito
Chamæpitys uocatur.

NOMENCLATURAÆ.

Quæ nomina Chamæpi-
tys habeat, supra indicaui-
mus. Quia uero iam descri-
pri fruticis nomen germani-
cum nondum cognoscere
potui, libuit mihi Feld Cy-
pressen uocare, tantisper dū
commodius inueniam no-
men. Proinde postquam
exactius huius herbæ histo-
riam inquirō, Saxones au-
dio in ea esse opinionē, ut
existiment eam esse tertiam
Sideritis speciem, quæ Cra-
teus ascribitur à Dioscori-
de, quorum sententia mihi
non improbat.

Altera quam Seplasiarij Iuam Moschatam dicunt, aiunt Ibigam, & Ibi-
cam aliquando uocaram fuisse.

Tertiæ Chamæpityos appellationes superiori capite enumeratæ sunt.

VIRE

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vtraq; Chamæpitys temperaturæ est calidæ & siccæ, tam internis quam externis corporis partibus accommodatissima, ideoq; non aliter atq; Ruta sylvestris, & Chamæcyparissus usurpari poterit, quarum vires cum supra recensuerimus, hoc loco eas repetere superuacaneum esse putamus.

De Cardamo. Cap. XXVI.

ASTVTH TRIA GENERA GERMANIS COGNITA
N sunt, Hortense scilicet seu satium, aquaticum, & pratense.

Nasturtium hortense planta est vulgo notissima, & quæ semine ^{1.} *Nasturtium hortense.*
fata ocius citius prorumpat, colore uiridis, folio incisuris multis, & Petroselinum longe minutoribus dissecto. Coliculis assurgit cubitalibus, ac rotundis, flosculis candidis, semine luteo exiguis in siliquis contento, cui maior inest acrimonia quam herbæ.

Alterum quod aquaticum uocant, hyeme acetarijs adijcitur. Hoc in fontibus calidioribus aquæ supernatat, maioribus folijs hortensi Nasturtio, ^{2.} *Nasturtium aquaticum.*
magisq; laciniatis, uiridibus. Pro radice habet tenuissimas candidasq; & capillatas fibras, filum sericum imitantes. Maio mense ingruente flosculos admodum exiguos & candidos profert, semine minutissimo, & quod Seriphium Germanicum haud temere excedat, fuluoq; prægnat. *Tempus.*

Tertium Nasturtium quod agreste seu pratense uocatur, sylvestre Nasturtij est genus, in quod aquaticum non raro degenerat. Nam ubi forte fortuna inundationibus Nasturtij aquatici herba pratis inuecta, semine uento ^{3.} *Nasturtium pratense.*
disiectum fuerit, herbula isthæc progigni consuevit flore uel prorsus albicante, uel ex candido leuiter purpurascente emicans. Cæterum, & caulis & folia *Forma.*
necnon sapor illius hortensi Cressioni respondent, nisi quod folia huius & *Tempus.*
angustiora, & breuiora existunt. Floret Aprilii mense unico caule.

Præter iam commemorata Nasturtij genera, duo alia extant, quorum alterum ^{4. 5.} *Sinapis rusticum.*
passim in campis nascitur, uasculis seu seminum receptaculis loculi, aut peltæ formam imitantibus, in quibus semen admodum exiguum, luteumq; continetur, conspicuum. Alterum in uetustis areis, ruderibus, & secus itinera prouenit, palmi altitudinem haudquaquam attingens, multis incisuris dissectum, semine perexiguo, luteo, acerrimi saporis, sicut & cætera Nasturtij genera.

NOMENCLATURAÆ.

Hortense Nasturtium Dioscoridi *καρδαμύνη, καρδαμύνη*, Iberis, Cardaminaca & Semeth dicitur. Apuleio Cardamina. Serapioni Norph, Archep, Machira. Auerrhoi Alcharf.
F

Nasturtium hortense.

Garten Creß.

Nasturtium aquaticum.

Wassr Creß.



Aquaticum quidam *ἄγριον ἀγροδαιμον*, hoc est, agreste Nasturtium appellant, quamuis ad pratense referenda uideatur hæc appellatio. Iacob. Man. Nasturtium agreste, Sataragi, Senation, & Lepidion, unius & eiusdem plantæ nomenclaturas

Nasturtium pratense.
Gauch blüm.

Thlaspidij genus.
Besem frant.



menclaturas esse censet. Non desunt (inter quos & Simon Ianuen. est) qui
Nasturtium hoc Tapsiam Indam, Scessabram, Ozimum Carmenum, Ho-
almaram nuncupatum uelint. Lombardi (teste Mancio) Crisoum nomi-

Serap. cap. 73.
Scexabra.

nant. Mesue Scellabram Ozimum maius esse, Serapioni Ozimum Carmentum dicitur. Sunt qui Nasturtium aquaticum, Nasturtiarum, Cardaminem, Sifymbrium, Sium & Lauer appellent.

Diosco. lib. 2.
cap. 116.
Plinius lib. 20.
cap. 22.

Quid uero de his posterioribus nominibus sentiamus, suo loco dicitur: Eorum autem sententiæ omnino subscribo, qui Sifymbrium alterum, aquaticum Nasturtium, aut certe eam plantam esse affirmant, quæ infra cap. lxi describitur, quam Crateus *οίον*, & Plinius Thymbræum appellauit, qui sit ut Sion, cuius nunc meminimus & alterum Sifymbrium Plinij, unam et eandem plantam esse existimemus.

Tertium Nasturtium, Germani (nam primum *Gartenfressen*, alterum *Brunnfressen* ea in lingua dicitur) *Gauchblumen* nominant quod & Agriocardamum, & agreste Nasturtium commodè appellari posset, nec absurdum quid, mea quidem opinione is commiserit, qui illam sub caput cxlvi lib. ij. Dioscoridis retulerit.

Diosco. lib. 2.
cap. 143.

Duo postrema quæ attigimus Nasturtij genera, Germani *klein Seckel Fraut* uel *Teschelfraut*, & quod in his maximum est, *Besemfraut* uocitant. Porro utrunq; sub Thlaspidio comprehenditur.

VIRE SAC TEMPERAMENTVM.

Nasturtium omne calidæ est temperaturæ, Germani Nasturtio adhuc teneo & incocto, sed oleo ac aceto perfuso uestuntur, fastidia discutiendi, et appetentiam ciborum inducendi gratia, Æstate quidem hortense, at in hyeme aquaticum commendatur, potestq; utrunq; in Medicina utiliter usurpari.

INTRINSECVS.

Vniuersa genera Nasturtij intro sumpta, vrinam cient, aluum turbant, renes & vesicam purgant, obstructions Lienis & Iocinoris aperiunt, interna vulnera mundificant, & persanant, ex oleo vsurpata uenenum expellunt.

Nasturtium cum uino & melle decoctum, mane, & uesperis potum lentos & crassos humores discutit, ad tussim & suspiria conducit.

At cum lacte caprino decoctum & potum uitia pectoris persanat, Sucus eius in ore detentus humores prauos ex dentibus affectis extrahit.

EXTRINSECVS.

Nasturtij succus uel herba ipsa illitu uel imposito scabiei & carbunculis medetur, maculasq; foedas emendat. Eodem modo usurpatum dolorem lumborum & coxendicum sedat, tumores dissipat, tela infixæ & aculeos extrahit, porrigenes impositum, ulcera & furfures capitis sanat, si caput coabluatur,

abluatur. Viceribus quæ depascunt purgandis succus Nasturtij remedio est.

Ad paralyfim linguæ semen tusum, ac in ore retentum, summo opere facit. Idem naribus indurum sternutamenta prouocat, Lethargicos excitat.

Semen cum aceto decoctum, & impositū, strumas & parotidas discutit.

Semen ad omnia efficacius, calidius & ualentius herba, quare intra corpus minime sumendum erit, nisi genituram frigiditate nimia tentatam ex-
calfacere, ac ad pristinum uigorem reuocare uelis.

De Thlaspidio, & Alliaria. CAP. XXVII.

LEGANTISSIMA PLANTA APRILI MENSE PRO-

¹
E uenit, locis incultis, uidelicet muris, collibus, sepibus & cauer-
nis, quæ sunt lacertarum, aliorumque uermium habitationes.

*Alliaria
Thlaspidium
cornutum.*

Ea in initij Maij mensis, flosculos fert candidos, qui in siliquas oblon-
gas abeunt, Sinapi aut Chelidoniæ haud absimiles, atro semine refertas.
Folijs uestitur primo exortu uiolæ Martiæ similimis, at latioribus, herba
cei coloris. Caulem producit tenuem, rotundum, ac prælongum, in cuius
summitate flosculi omnes congestim positi extuberant. Radix illi breuiuscu-
la, recta, tenuis & lignosa, instar Centauræ minoris. Herba manibus fri-
ta, porri sectiui cum Nasturtio contusi odorem representat, quare quod ad
odorem attinet, Nasturtium, uel Porrum sectiuum, aut etiam Cæpa cense-
ri possit, unde mulierculæ nostræ Leuchel patria uoce illam uocitare solent.

At uulgare Thlaspidium in noualibus, & agris Rapis confitis, alijsque hu-
mectis hortis prouenit, prælongis angustis, & pinguiusculis folijs, unico
caule, qui in fastigio exiguo flosculo & candido comat, qui ubi deciderit,
in rotundas, latas, ac ueluti conquassatas crumenulas exit, non secus atque
Atriplex, in quibus singulis ubi maturuerint, plerumque xij nigra, & acris sa-
poris semina reperiuntur, forma & gustu non multum à Nasturtio distan-
tia.

²
*Vulgare Thlaspi-
dium.*

³
Præter hæc quæ iam diximus genera, aliud quoque huius plantæ extat,
magis exiguum, sed & surculosius, arbusculam referens, quod & ipsum a-
gris Rapijjs gaudet, sapore amaro ueluti Centaurea præditum.

*Aliud Thlaspi-
dij genus.*

NOMENCLATURAE.

Primum genus, quod ego hætenus pro Thlaspidio secundo Crateuz
habeo, quodq; latino uocabulo Cornutam dicere possemus, Germani
Leuchel/ & Saffraut appellant.

*Allearia.**Letichel.*

Dioscor. lib. 2.
cap. 164.

Capparim quoq;
Thlaspi nomi-
nat. Est ex pes
gallinaceus alte-
rius cuiusdam
plantæ nomen,
ut suo dicetur lo-
co.

Serapio ca. 3. 49.



Alterum uero quod semen
habet latum uerū est Thla-
spi quod Diosc. lib. ij. cap.
cxlv. *Θάσπι, Θασπίδιον, σιν-
πινάριον*, Sinapi Persicum,
Myiten, Dasmophon. My-
opteron, Bytron, Suitem/
psum, Scandulacium, Ca/
psellam, Pedem gallinace/
um vocat. Porro mea sen-
tentia Thlaspi & Alliaria,
Nasturtium Tectorum Se-
rapionis fuerit, quod ille
Græce Talaphion uocari
tradit, sed iudicent doctio-
res, nihil enim affirma-
mus.

Diosc. sane lib. ij. capite
cxlv ipse testatur Crateuā
hanc herbam Thlaspi uo-
casse, à quibusdam uero Si-
nape Persicum appellatā.
Ea nimisum est quam ego
Alliariam Germanis *Let-
schel / Saffraut* appellatā
esse existimo, quæ & Thla-
spi cornutum Crateuæ di-
ci poterat, uti supra attigi-
mus. Autor Pandectarum
Ranam marinam, Alliari/
am, & pedem Asininum
uocat.

**VIRES AC TEMPE-
ramentum.**

Alliaria & ea quam Sinapi Persicum dici, docuimus, ad Nasturtiorum
naturam accedunt, calidæq; sunt temperaturæ, Semina uero eorum feruen-
tioris, quare rectius externis corporis partibus quā internis adhibebuntur.

INTRIN.

Thlaspi.

INTRINSECVS.



Alliaria commode torti
uis succis, quæ Embamma-
ta seu intinctus uocant, ad-
iungitur, debet autem ace-
to, sale, & gingibere condi-
ri. Eiusmodi certe Embam-
mata (ut obiter hoc dicam)
quæ hoc pacto ut diximus,
ex Alliaria conficiuntur,
nō sunt nimium feruentia,
& meo quidem iudicio gra-
tiora, ac etiam utiliora ijs
quæ ex Sinapi fiunt. In me-
dicina eadem facultates Al-
liariæ tribuuntur, quæ &
Nasturtio & Sinapi, multo
tamen illis mitior, & usu
commodior existit.

Utraq; uero planta, ma-
xime ea, quam Germani
groß Seckel frant dicunt,
clysteribus recte adiungi-
tur, aduersus coxendicum
affectionem, quæ à Græcis
ιγχιὰς appellatur.

EXTRINSECVS.

Semen earum cum aceto
emplastri modo, mulieri-
bus strangulatu uteri labo-
rantibus impositum, & uul-
uæ admotum prodest, ac
easdem excitat.

Succus utriusq; uel semen in puluerem redactum, naribus inditum, ster-
nutamenta prouocat, & eos qui morbo comitiali, & Lethargico concide-
runt, excitat. Reliqua harū plantarū iuuamenta in Nasturtio pestrinamus.

De *Lepidio*, *sive Piperiti*.

CAP. XXVIII.

Lepidium.
Pfefferkraut.

LEPIDII APPELLATIO, uarijs modis quondā explicata fuit: quidam enim Sinapis, alij Nasturtij genus esse crediderunt. Sed ut cunctq; hæc quidem se habent, sane Lepidium non abhorret à descriptione Seitaragi, quod & Hausab à Serapione cap. cccxij. dicitur. Quid uero ego de Lepidio sentiam, paucis aperiam. Dico itaque Lepidium esse fruticem, quem Germani Pfefferkraut/ hoc est, Piperitum, appellant, qui caule bicubitali, tereti, & concauo, foliis autem maiori, & latiori, pinguiori, uiridiori, ac molliori Persica malo, seu (ut Plinius lib. xix. cap. viij. testatur) folijs laurinis, sed mollibus, quod quidem sententiā meam confirmare uidetur, flores deniq; lacteo, ac exiguo, instar Raphanis sylvestris affurgit, gustu acri & estuoso, quiq; linguam magnopere uellicet. Proinde facile fruticat, ac ubi semel plantata fuerit, uix unquam eradicari se patitur, non secus atq; Raphanus sylvestris, cui fere per omnia similis est, nā quemadmo.

quemadmodum ex illo, ita & ex hoc optima conficiuntur Salgama.

NOMENCLATURAÆ.

Lepidium Germani Psefferkraut / & Senffkraut / hoc est, Piperitum (ut Latini loquuntur) nam ad Sinapi referri posse neminem latere puto, cui saltem utraq; sit planta cognita, & qui saporem utriusq; examinavit. In Dioscoride hæc illi ego ascribo nomina, *καλιδιον, γγγιδιον*. Reliqua eius nomina sunt in Nasturtio aquatico annotata sunt. Quod ad Gingidij uocem attinet, eam ad Lepidium quoq; referendam censebam, nisi Dioscorides, Plinius, Paulus Ægyneta & Galenus, aliam quandam plantam hoc nomine uocare uoluissent. Quamuis fieri potest, ut Gingidium quod in Syria provenit, quod ego, nisi me ut dixi uirorum doctissimorum autoritas moueret, idem esse cum Lepidio censebam, acrius sit nostra Piperitide. Nolo autem de ignotis quicquam disputare. Gingidio uero Diosco. lib. 2. cap. cxxvi. alias quoq; appellationes adijcit, uidelicet Dorysatriū, Adoriū, Tirieta, Infacutū. Paulus Ægyn. addit Biriada. In Serapione. uidi Lepidium Seitaragi Indū, & Hausab appellari cap. ccclxij. nolim tamen super hac re cū quoquam contendere. Plinius lib. xix. cap. xij. Piperitum, Siliquastrum uocat, sed cum aliud sit genus, de illo infra dicetur. Cordus Lepidium, Piperinam, & Zinziberinam appellat.

Diosco. lib. 2.
cap. 165.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Lepidion ex calefacientium est ordine, uim habet acrem, & exulceratricē, cuti enim illita, ruborem & pustulas excitat. Herba est culinaria, & salgama idonea, hoc pacto namq; intro sumitur, foris uero emplastri modo imponitur.

INTRINSECVS.

Lepidion apud nos tortiuīs succis, siue Embamatis adhibetur. Solet autem admixto sale & aceto. carnibus assatis adiungi, sapore acrius & feruentius Alliaria.

EXTRINSECVS.

Lepidij herba cum Elenio tusa, ac emplastri instar imposita, coxendicis affectibus prodest, ita ut post quartam partem hore pustulis quibusdam excitatis, dolorem soluat. Similiter & lienosis eodem modo usurpata, remedium affert.

De Persicaria, uel Hydropipere.

CAP XXIX.

Persicaria foemina.
Stöckfraut weible.

1.
Primum Persica-
riae genus.



QVAM MODO TRA-
 ctamus plantam iure quib
 Piperitin uocare posset, si-
 quidem ob insignem suā
 acrimoniam plus uellicat
 linguam, quam uel Piper,
 uel Aron. Proinde quotan-
 nis ex suo semine progig-
 nitur hic frutex, non alier
 atque urtica, Germanis
 Beitter Nessel dicta, so-
 letq; ad duorum palmorū
 altitudinē ex crescere, quan-
 quam nō raro humilior in-
 ueniat, prout natalem
 humum occuparit hume-
 ctam, pinguemq; aut ari-
 dam & macram. Folia
 frondibus salicis, uel Persi-
 cæ mali similia gerit, quo-
 rum nonnulla rubenti a-
 spera sunt macula, non ali-
 ter ac si guttula sanguinis
 decidisset super ea, id quod
 in alijs quoq; herbis ani-
 maduerri poterit, nimirū
 in quodam urticæ inertio
 genere, Aro, Satyrio, &
 Ranunculo. Caulem ha-
 bet nodosum, ac instar fru-
 gum cerealium genicula-
 tū. Flore comat congestim,
 in racemum acutum, uel
 spicam quasi exiliente, in
 quibus

Persicaria altera.

Das ander Flöckfraut.



quibusdam ex roseo rubicante, in alijs colore Bersilici prædito, in nonnullis candido. Tres uero in quas iam distinximus Persicariam, species omnes semen pulchrum, fuscum & latius, quodq; linguam maducatum erodat, ferunt, locisq; humidis, lacustribus, palustribus, alijsq; id genus gaudent. Expellendis muscis, uix quicquam efficacius reperiatur, nam quæcunque in pecoribus uulnera uel ulcera succo Persicariæ oblita fuerint, ea ab iniuria muscarum tuta manent, etiam feruentissima æstate.

Aliud deinde Persicariæ inuenitur genus, quod à priore caule, folijs & macula, necnon natalibus locis nihil plane dissidet. Vnus est sapor, qui differentiam inter prædictas plantas constituit, qui huic postremo non adeo acris est, ut linguam mordiceret, sed subacidus, qualis est Acerosæ. Radix eius per terram serpendo se propagat, unde agris frumentarijs, & hortis magnum damnum afferre solet hæc herba.

Tres Persicariae
prioris species.

Alterum Persicariæ genus.

NOMENCLATURAE.

Germani nostri patria lingua has plantas, Kessel- & Flöckfraut (id est pulicares

licares herbas) quod pulices abigant, uocarunt, possent & *Muskenfraut* (id est, muscarum herbæ, ob causam quam supra attigimus, necnon wasser pfeffer/hoc est, piper aquaticum appellari. Dioscorides quidem (ut mihi uidetur) illas lib. ij. cap. cl. descripsit, *ὁδονύκτιον*, hoc est, Aquaticum piper eas nuncupans. Neque uelim intelligi de his, quæ Ruel. lib. ij. cap. xcij. annotauit, quo loco herbam Menthe folijs præditam depingit, quod idem in Dioscoride legas. Cæterum non desunt apud Germanos qui hanc plantam *Pfaffenfraut*, uel *Pfawen spiegel* (id est Pauonum speculum) à maculis, quibus est notata nominent. Latini quidam *Perficariam*, ob foliorum quam cum *Perfica* arbore habent, similitudinem, & herbam sanctæ Mariæ uocant. Iacobus Manlius Saguinem Christi, Auicenna lib. ij. cap. 748. Zinziber caninum dixit. Sunt autem hæc propria illius nomina, *Perficaria*, *Molybdæna*, *Maculata*, & *Plumbago*, quod maculis resperfa sit, ut diximus.

Alterum *Perficariæ* genus, quod in hortis & agris fructiferis nascitur, uolunt quidam esse *Crateogonon*, & *Theligonon*, uide, Ruel. libro ij. cap. lxiij. is ab Hypocrate *Polycriton*, & à uulgo Gallorum *Curaginem* dici attestatur. Ego ad *Hydropiper* illud referrem.

VIRE S A C T E M P E R A M E N T V M.

Tres ex plantæ quas proximis capitibus descripsimus, deinde *Perficaria*, & qui statim insequuntur *Ranunculi*, hæc omnes inquam, gustu acriores. ac feruentiores tum inueniuntur, maxime cum uirides extiterint, quare potius foris imponi, quam intro sumi debent.


E X T R I N S E C V S.

Perficaria linguam manducata, uehementius uellicat ac incendit, quam uel ullum *Piper* faciat. Quamobrè ea trita, uel succo expressa, utiliter uulneribus putridis hominū pecorumq; auxilium adfertur, præsertim si ex succo abluantur, & mundificentur. Mulierculæ rei familiaris administrandæ peritæ, hac ipsa herba, tarmos, aliosq; uermes à carnibus abigere solent. Quin & succo eius omnia uulnera purgantur, ac ab iniuria tam muscarum, quam aliorum uermium uendicantur, certissima id approbante experientia.

Si mane rorulentam hanc herbam per conclauiam & cubicula dispergas, proculdubio pulices abiges, sed oportet sine mora scopis conclauiam expurgare.

De *Apio aquatico*, & *Ranunculo exiguo*.
CAP. XXX,

Apium aquaticum.
Wasser Epff.



QVONIAM HACTE
nus de plantis singulari a-
crimonia insignibus, ora-
tio nobis instituta fuit, ui-
debatur operæpretium nos
facturos, si et *Apij aquatici*,
& *Ranuncolorum*, porro
mentionem faceremus.

Apium itaq; aquaticum, *Apium aquaticum*
ut ab illo ordiamur, in palu-
stribus, humidis & areno-
sis locis, plerumq; uero ijs,
in quibus ranę degere solent,
nonnunq; & in humectis
campis, præsertim ubi an-
nus paulo humidior fuerit,
nascitur. Frutex est admodum
tenellus, uix palmi altitudi-
nem excedens, caule unico,
folio uiridi, molli, & haud
multo aliter quam *Corian-*
non fisso, flosculis subluteis
Ranunculo minoribus. Her-
ba gustu acri & feruente præ-
dita. Semen lappaceum mul-
tisq; cuspidibus, *Erinacei* in-
star horridum gerit.

Iam ut & ad *Ranunculos* ue-
niamus, principio notandum
est, plura eorū extare genera,
quę ordine in hoc, & sequen-
ti, capitibus describentur.

Primus itaq; *exiguus*,
idemque sceleratissimus *Ranunculus exi-*
Ranunculus, sæpenumero quæ-
mihi

Ranunculus luteus.

Geel Ranensfuß.



3.
Altera Ranuncu-
li species.

mihi risum lachrymis mis-
xtum, siue ut prouerbium
habet Sardonium excitauit,
tantas nimirum uires in ex-
ulcerando, urendo, & con-
trahendo neruos, obrinet.
Est autem frutex admodū
paruus, per terram proie-
ctus, folio quinquepartita
incisura dissecto, nigricāte,
leuiterq; hirsuto, parte sui
auersa ranam uiridem refe-
rente. Caulem profert rotū-
dum, flore luteo emicantē,
radicem uero teretem, fabae
magnitudine, multis capil-
lamenti fibratam. Quo-
tannis (quod admiratione
dignum est) solet haec herba
ueterem radicem in terram
profundius detrudere, su-
pra quam noua gignitur.
Proinde tam herba quam
radix, linguam non aliter at-
que Euforbium uellicat.

Alter deinde Rāunculus
folia quoq; dissecta, sed ma-
iora, quae unguem auiculæ
forma sua exprimant, ha-
bet. Radix illi oblonga, fi-
bris capillata, quemadmo-
dum Plantaginis. Tenuem
exsc, longum, & concauum
emittit caulem, aureo & ua-
sa ænea constringarum imi-
tante flosculo, collucescen-

tem. Efficat autem cultura ut hoc genus Ranunculi, quod in limitibus sim-
plici compage florum oriebatur, struētili quodam densosq; foliorum stipa-
tu (unde a Germanis non inepte Gcsülter ranensfuß, quasi dicas multiplex

Ranuncu-

Ranunculus candidus.

Was Aprilen blümen.



Ranunculus, uocetur) pas-
sim in hortis appareat, fa-
ctumque est ut à puellis ob
insignem floris multipli-
cis gratiā, in coronariarū
herbarum numerum ascen-
da fuerit. Quidam uero hu-
ius generis frutices macu-
lis, nō secus atque *Perficaria*
quam *Plumbaginem* uo-
uocant, notati reperiuntur
uehementer acres, & qui
pustulas ignis modo exci-
tant.

Tertium denique *Ranun-
culum* in siluis nascitur, in
cisis etiam ac fissis folijs, Sa-
niculæ pene similibus, ni-
gricantibusque. In initijs A-
prilis mensis, unicum è me-
dio folij fundit florem è cā-
dido purpurascens, qui
color flori arboris *Malifa*
miliaris esse cernitur.

Radix transuersim intra
humum culmi crassitudi-
ne fibris inuicem cōtextis
serpit. Huius generis qui-
dam *Ranunculi* luteos ge-
runt flores, Vis illis cum
superioribus exulceratrix,

4.
Tertia *Ranun-
culi species.*

*Duo sylvestris
Ranunculi gene-
ra.*

NOMENCLATURAE.

Dioscorides libro ij. ca-
pite c. *Ranunculum*, *βάρβα* *Hermot. coroll.*
Hermolaus Barbarus se- *lib. 2. cap. 410.*
quentia *Ranunculo* nomina assignauit. *Apiastrum*, *Strumen*, *Polyanthes*,
mos, *Horatius* *Sardcam* herbam, *Apulcius* cap. viij. *Gelotophyen*, *Mileſ*,
Coriaumon

πικρὸν & σαρδὸν ἀγγέλον, hoc est *Apium* sylvestre uocat. *Hermolaus* *Barbarus* se-

Coriannon, Corion, Staetycen, Causticen, Clonon, Rhufelinon, Catasta-
cticen, Hephæstion, Lycopnon, Selinon agrion, Selinon hydation, Syn-
chon, Carcadana, Nemecon, Apium rusticum, Apium risus, Herbam scle-
ratam, Apiastellum, Dentariam, & Auricomum uocat. Serap. cap. cccxliij.
scribit Senation esse Apiū aquæ, aliasq̃ uocari Koreathalmi, & Hameanel
la, quamuis Senationis uox, Nasturtio quoq̃ tribuatur, ut supra memi-
nimus.

De alio Apij
aquatici genere,
uide infra cap.
155. lib. primi no-
strorū comment.

Primum Ranunculum, Germani, wasser Epff/Latini Apium aquaticū,
uel palustre, uocant, sed de hoc, proprijs ipsius appellationibus infra, cap.
xl. plura. Exiguū Ranunculum uocamus Germanice Fleinen Hancensfuß/
propter florem quem Ranunculo similem fert, ut sequenti dicetur cap. Se-
quentem similiter uocamus Hancensfuß/propter florem & folia, posteriōre
autem, qui candido aut luteo flore in syluis proflit, Aprilen blumen (hoc
est Aprilis florem, tum em̃ fere florere, conspicitur) uocamus: alij wald hen
le, D. Otho Brunfelsius piæ memoriæ exiguum Ranunculum, Flammu-
lam, & Batrachium nuncupauit.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Batrachium Exiguū, omniaq̃ quæ sub illo comprehenduntur gene-
ra, necnon singulæ eius partes adurunt, & exulcerant efficacissime, non se-
cus atq̃ ea quæ Corrosiua uocant. Quare non nisi externis corporis parti-
bus adhiberi debet.

EXTRINSECVS.

Omnia Batrachij genera recentia, trita, cutiq̃ imposita, pustulas excitant,
quare erodendis & exulcerandis duris tumoribus, mirifice conducunt. Ver-
rucas formicantes & pensiles, & id genus uitia citra incisionem seu adustio-
nem, succus illitu tollit.

De reliquis Ranunculi speciebus, deq̃ eo, qui
Coronopus uocatur. CAP. XXXI.

11
Ranunculus
pratensis.

P

RATENSIS MAIORQVE RANVNCVLVS PASSIM
prouenit, herba exiguū Batrachio, quod præcedente capite pri-
mum descripsimus, quadantenus consimile, sed longe maius,
hinc inde per terram repens. Radix illius, quæ multis fibris capillata uisitur,
frequentes subinde & nouos frutices procreat, quemadmodum & Fraga-
ria.

Ranunculus dulcis seu pratensis.

Süßer hancensfuß.



ria. Caulis & flores huius prædicti Ranunculo adeo forma respondent, ut uix discerni possint. Hinc sane error illorum manasse uidetur, qui eam herbam Ranunculi superioris genus esse contendunt, sed differentia utriusque uel à cæco deprehendi posset. Nam quā nunc præ manibus habemus plantam, dulcis est, neque linguam uellicat, quā obrem mulierculæ nostræ Aprilī mense illam tenerā adhuc una cum alijs olcribus, decoquere consueverunt. Huic si accedat cultura sique transplantetur multiplices quoque flores ædet, quemadmodum proximo capite descriptus.

Est & alia huius generis herba, quæ Martio mense in syluis ac senticetis nascitur, folijs primo exortu instar pene Violæ Martiæ rotundis, nullis enim fissuris dissecta, conspiciuntur, quæ uero proxima sequuntur finduntur ueluti Pes gallinæ, illa quo altiore in caule locum occupant, eo propius ad similitudinem pedis coruini aut gallinæ accedunt. Caule, radice,

^{2.}
Ranunculus syl-
uestris.

flore & semine, per omnia luteum & multiplicem Ranunculum æmuletur. Planta hæc est gustu dulcis & innoxia. Maio mense sicut pleræque aliæ cunescit.

Ranunculus sylvestris.

Mertzen Hanenfuß.

3.
Coronopus.4.
*Coronopus
sylvestris.*


A Ranunculo ad Coronopum venio, quamvis ea herba non usq; adeo nota sit, non enim ubiq; nascitur, ut quæ in hortis Germaniæ nō ita pridem Acetariorum gratia plantari cœperit. Semine prægnat perexiguo, Maioranæ nō dissimili. Coronopus statim à satione è terra erūpit, foliolis instar graminis tenuissimis, & acutissimis. Quæ uero prima subsequuntur folia, ea oblonga, angusta, in multas partes laciniosa, atq; adeo auiculæ pedē, aut ut mihi uidetur, laceram referentia, quæ & humi ita sparsa procumbunt, ut stellæ effigiem non inepte repræsentent. Ad hanc formam alludentes quidam Græci Coronopum dubio procul, *ἀσπρον* uocitant. Iuxta folia nudi quidam & niuei coliculi in spicas, ueluti Plantago lanceolata (quam & flore imitatur) exeuntes, assurgunt. Ex semine quod perexiguum habet plātari Coronopus solet. Radix illi recta, tenuis & brevis est. Sylvestrem proinde, & congenere huic herbam, satiuo

Coronopo multo minorem, inter fruges enascentem reperi.

NOMEN

Coronopus.
Rappenfuß.

NOMENCLATURAE.



Quem Germani Rappenfuß, hoc est, pedem coruinum uocamus, is Dioscoridi lib. ij. cap. cxix. *νορόνους*, Sanguinaria *ἀγγύριον*, Ammonos, Atirsi uox, acerrimote, Caciatrix, Stilago, & quem depinxi. Sanguinaria dicitur. Plinius Ranunculus, libro xxi. cap. xvi. *Coronopus* competit. *ronopum*, inter aculeatas refert, quo nomine, nihil absurdi eum committere iudico, qui Coronopum herbam aculeatam, seu stellariam nominaret. Apul. cap. xliij. Ranunculum Galli crus uocat, quod ego de illo potissimum intelligo, qui Martio mense in syluis reperitur.

Apud Treuiros, Morguntinos, & Metenses, primum dulce Ranunculi genus, quod & coctum estur olerum modo: patria uoce, *Schmalzblumen/Wegzel/hanenfuß* & *wisenblumen* appellat uulgus. Democritus hanc ipsam plantam Batrachium & Chrysanthemon (id est, florē aureum, Germanis *Goldblumen*) nuncupat, aitq; facile aquam inueniri posse ijs locis, ubi illud proueniat, &

recte quidem, nam locis humidis in primis gaudet. Quod autem uerum Chrysanthemon sit infra in Buphthalmo indicabitur, uide Ruel, lib. ij. cap. centesimo secundo.

Ranunculi maioris species omnes minime acres sunt, quare citra periculum & noxam utrinq; corpori adhiberi possunt.

At Coronopus una cum radice ex desiccantium est ordine, astringenti uel præditus, ideoq; in cibo cæliacis utilissimus. Herba alias acetarijs adjicitur.

INTRINSECVS.

Sic etiam Mediomatrices mulierculæ uerno tempore dum adhuc tenellæ sunt plantæ, Ranunculi maioris herbam colligunt, ac inter cætera olera decoquunt.

EXTRINSECVS.

Folia Ranunculi maioris tumores quacumq; in corporis parte ortos discutiunt, ac resoluunt imposita. Alias Ranunculorum facultates quotidiana usus docebit.

De Sinapi & Eruca. Cap. XXXII.

LVRIMAE SANE EXTANT PLANTAE, QVAE PARSIM apud authores Sinapis nomen sibi uendicarunt, Sinapi scilicet uulgare, Alliaria, quam ego Thlaspidion nominaui, germanis Leuchel oder Saasfraut dicta, Capparis, Lepidium (quod Germani Senffraut appellant) & Eruca. In germania tamen usus ita obtinuit ut Sinapis hortensis & ueri duo genera uulgo numerent, quorum alterum pullo seu fusco, alterum uero albicante prægnat semine. Porro utroq; innō nullis locis totos agros & hortos conferunt, ex eo namq; usitatissima ciborum condimenta, quæ tam carnibus quam piscibus adiunguntur confici solent. Pythagoras quoq; nec non discipuli eius, Sinapi admodum commẽdarunt, semperq; usurparunt, ob insignem, qua in sublime fertur uim, quã artē nostrates rustici imitati sunt, nullis, n. plane sarciminibus sine condimento sinapis uescuntur, fortasse propterea, ut purgato cerebro sapientiores euadant. Sed finitionem absoluiamus.

Vtraq; Sinapis hirsutis, lanuginosis, nigricantibusq; ac dissectis folijs Raphanoq; similibus uestitur. Caulem habet prælongum, & surculosum, floribus expallido luteis usq; in fastigium emicantem, quo decusso siliquæ subsequuntur digitum longæ, semine referto, ita ut flore & semine Rapas imitetur.

Duo alia Sinapis agrestis genera in agris auenæ ac Raporū reperiuntur, quorum alterum candidos, alterum luteos fert flores, uiolis non dissimiles. Herba caule, & siliquis Sinapi satiuum referunt, nisi quod non in tantā magnitudine & altitudine excrescunt. Nec desunt, qui putent sementē rapitiā maxime.


1. 2.
Sinapi satiuum
duplex.

Forma.

3. 4.
Sinapi agreste.
duplex.

Sinapi luteum, sativum.
Gäler Senff.

Herba S. Barbara.
Senffkraut/oder S. Barbel kraut.



maxime ubi inueterata fuerit, siccis & arenosis agris seminatam in agreste
Sinapi conuerti, ita ut uel hinc appareat hanc plantam, natura sua partim
cum Sinapi, partim uero cum Rapis communicare. Eadem ratione Brassicæ

Ῥηύσιμον.

Verbena foemina.
Eisenkraut das weiblin.

Eruca, siue Rucula marina
maior.
Groß Rauchen.




semen non raro in deterrimum quoddam genus Raporum transire consue-
uit, quod non solum Plinius lib. xix. decimo, capite testatur, sed & ego saepe
experientia deprehendi,

Præter.

Eruca, siue Rucula marina minor.

Klein Raucken.



Præter iam commemorata Sinapis genera, alia duo in littoribus, & ad fossas proueniunt, quorum alterum luteis, alterum candidis comat floribus. Hæc quod ad herbam, caulem, florem, siliquas, semen, & saporem attinet, a satiuo Sinapi minime diffidet. Nec tamen adeo acris, sed gustus subamari, coloris uero herbacei, molliora reliquis. Folliculos denique gerunt exiguos, in quibus minutissimum semen Nasturtio aquatico simile, continetur.

Septimum Sinapi plerumque incultis locis nascitur, secus sepes scilicet, & in areis, cuius herba caulis & flores angustiores sunt albo Sinapi. Siliquæ etiam breuiores, & magis exiguæ: semen uero luteum, et ualde minutum Seriphio Germanico, cuius historia infra cap. cxi. huius primilibræ habes, simile, sapore acri & austero, siue aspero, Sinapi representans gustatum.

Rucula autem marina inter Sinapis genera, nobilissima est, præsertim antequam

5. 6.

7. *Verbena foemina.*

8.

Rucula marina maior.

in florem exeat, tunc enim cum Lactuca, seu Portulaca in acetarijs estur, proculdubio ea de causa, cuius meminit Martialis his uerbis,

Et uenerem reuocans Eruca morantem.

Breuit̃ hęc herba, sicut & semen eius, cibis accommodatissima est, agreſti Sinapi per omnia conſimilis, cuius pallentes uiolę, ea qua terram ſpectant parte, purpureas ſed admodum nigricantes uenas obtinent. Semen profert luteum, ſed minus ipſo Sinapi.

9.
Rucula marina,
minor.

Eſt & aliud Ruculę genus, ſed magis exiguum, & tenerius prædicto. Dereliquis herbis, quas Sinapis quoq; nomine dignamur, ut ſunt Thlaſpidia bina, quę tam Sinapi quam Naſturtium guſtu referunt, ſupra diſſe- ruimus cap. xxvij.

NOMENCLATURÆ.

Satium Sinapi apud Dioſcoridem lib. ij. cap. cxliij. *σινάπι*, & *σινάπ*, Latinis Sinape, Germanis *Garten ſenff* uocatur. Sinapis appellatio à Dioſcoride tam Cappari, quam Thlaſpidio attribuitur, nā utramq; plantam Sinapi perſicum appellat. Serap. cap. cccxij. Sinapi Cardel appellat. Nam & Hebreiſic illud nominant, ſed paulo alijs uocalibus, dicunt enim *חרדל* Char- dal, quemadmodum in canticorum cap. vij. Rabi Salomo teſtatur.

Dioſco. lib. 2.

cap. 129.

Serap. cap. 214.

Sinapi candidum, quibuſdam Eruca eſt, Dioſcoridi *ἰνίσκου*, Ethreicem, & Aſurite. Serapioni uero Iergir dicta.

Atqui ut ingenuę dicam quod ſentio, ego Eritcę nomen ubicunq; offendo, de Rucula, Germanis *Rauſen*, & non de albo Sinapi intelligo, neque quid in hac re Seplaſarij & Doctores ipſorum pronuncient, magnopere ſollicitus ſum.

Verbena. foemina.
na.

Agreſte Sinapi, Germani *Senffraut* nominant, pabulis armentorum præcipue natum, Serapio Abhacaz dixit. Duo uero Sinapis genera, quę ad aquas naſcuntur, Germani *Waſſer Senff* appellant, quę ſane ſylueſtria genera Naſturtij aquatici, ſimulq; Sinapis recte ſtatuuntur. Vltimum denique genus, quod propter ſepes prouenit, quidam Germani *Eiſenfraut* d; *weiblin* uocitant, hoc eſt, Verbenam foeminam, referuntq; ad Verbenam, cum qua non aliter conuenit, quam Vrtica cum Roſmarino. Hic mihi ne ſuccenſeant quoscuq; rogatos uelim: ſcio enim non defuturos, qui non ſolum egre hoc ferent, ſed & præcipiti iudicio miſerum condemnabunt, quod Verbenam foemellam in cenſum Sinapis retulerim. Verum enim uero ut ita ſentirem ratio me coegit, cum, ſcilicet uiderem hanc herbam ſubſtantia ſua & ſapore cum Sinapi conuenire. Quo uero à Sinapis tractatione tandem nos expediamus, appellabo in præſentia hanc plantam *ἰρίων*, ſiue Irionem. Huius Dioſcorides libro xij. cap. cxlvj. & Serapio, cap. cccxlvj. meminert. Hic uero perpendant, qui oculis ſaltem & communi ſenſu non deſtituuntur, annon deſcriptio Irionis, aptius quam Verbenacę ſupinę, ad foemellam noſtram Verbenā accedat. Semen Sinapis à quibuſdam Bizeri Cardel dicitur.

VIRE.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Vtriusq; Sinapis satiuū semen calidam obtinet temperaturam, ideoq; discutiendi extrahendiq; facultate utrinq; adhibita pollet.

INTRINSECVS.

Sinapis semina ob insignem suam acrimoniam in culinas accersita sunt. Vbi enim locorum tam apud diuites quam pauperes, cum omnibus fere ferculis non apponitur Sinapis. Id quod dubio procul ab omnibus ideo obseruatur, quod Sinapis in primis valetudinem bonam promoueat & conseruet, nam & cerebrum purgat, & stomachum excalfacit, & concoctionem adiuuat, præterea uenerem quoq; stimulat, & febrium horroribus resistitui non potum.

Sinapis album, uelco siue pullo mitius est, & si in cibo sumatur, genitale semen auget, & in uenerem stimulos addit, urinam cit. Quin utilissimum est his hoc semen in cibo deuoratum, qui continuis torminibus uentris laborant.

In uino decoctum, his qui scorpionis, aliorumue uenenatorum animalium ictus senserunt, potum cōducit, non enim uenenum dominari permittit.

Sinapis uero syluestris, quod ad aquas nascitur, semen efficacius, præsertim ad ciendam urinam.

Semen Sinapis illius, quod quidam Verbenam foemellam uocant, uino & melle temperatum, remedium est Astmaticis, nam tussim mitigat, fluxiones thoracis continuas in pulmonem à capite descēdentes inhibet, Arthriticis conducit, morbum regium dissipat, discutitq;. E' uino potum ueneno hausto, quominus noceat, resistit. Sed cur remediij tam excellentis usus respuatur, nihil aliud in causa esse existimo, quam quod nullo ære cōparetur, & passim erumpat, profuturū quidem, ubi pluri ueniret. Dioscorides libro ij. ca. cxxix, de Cruce semine ita scribit. Semine ad condimēta utuntur, quod, uti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos.

EXTRINSECVS.

Emplastrum ex semine Sinapis & aceto confectum, ac impositum, pustulas rubras excitat. Fere impetigines eo cum aceto, quemadmodum meminimus, perunguntur.

Farina Sinapis cum melle & aqua decocta, contra præduros tonsillarū tumores, ac ueterem callosamq; arteriæ scabritiem conuenienter gargarisatur.

Emplastrum ex eadem farina factum, & tumentis lieni impositum, tumorem illius discutit, & Ischiadicis medetur.

Eadem ex melle illita, alopecij medetur, faciem purgat, sugillata rapit. Alię Sinapis vires (si quę desiderari possent) in Nasturtio descriptę sunt. Radix Erucae in uino cocta & imposita, ossa contusa & contrita extrahit. Succus Sinapis oculis inditus, claritatem illorum adiuuat.

Semen Verbenę foemellę cum melle & aqua tustum, emplastri ritu paratidibus utiliter imponitur, sicut & duritijs mammarum, & testium inflammationibus, clysteribus quibus dolores sedamus, recte adiicitur.

Reliqua Sinapis genera eadem cum hortensibus vires habent. Nec tamen magni usus sunt, nisi quod pecoribus in pabulis dantur.

Proinde quicquid de Sinapi diximus, de Rucula utraq; intelligi debent.

De Chelidonia. Cap. XXXIII.

DE CHELIDONIO DEINCEPS NOBIS AGENDVM
D erit, cuius duo reperiuntur genera, maius scilicet, & minus.


1.
Chelidonium
maius.

Et primum quidē folio tenero, amplo, & dissecto, Aquilegię non multum dissimili uestitur, colore herbaceo: altera uero parte ex castio uiridi. Ceterū si seorsim decerpra foliola spectes, quercus frondem forma representabunt. Caules proferet teretes, hirsutos, albicantes, multis ramulis instar arbusculę brachiatos, flore luteo uiolę luteę similimo secundū singula folia prodeunte conspicuos. Flos in oblongas siliquas, ceu corniculati papaueris, quibus semen pallidum recluditur, tandem abit. Folia, caules & flores Chelidonię cum inciduntur croceti stillant lac, ac in primis uero radix, quę & ipsa aureo est plane prædita colore, multisq; fibrata capillamentis si lædatur, succum similiter croceum, lentum, gustu uero amarum, grauissimiq; odoris sudat. Nascitur passim in parietinis, muris & uetustis ædificijs, inter cætera herbarum uitia.

2.
Alterum Chelidonię
genus.

Altera Chelidonia, quemadmodum & prior inter rudera, in tectis, rupibus, opacis, ac incultis locis prouenit, apparetq; maiori Chelidonio, caule, radice, folijs, flore, & siliquis, per omnia pene consimilis, nisi quod illo omni modo magis exigua est. Radix illi fusca, breuis, multis capillata fibris. Caulis uero rubius, lanuginosus, geniculatus, & nodosus, surculosusq; cuius folia inferiora, nempe ea quę humi procumbunt, nec excole procedunt, similiter rubent, quin & flores eius purpurascunt, instar uiolarum. Siliquis in superiore parte parum acuminatas, alteri ex Geranijs pene similes gerit. Planta grauissimi est odoris, & qui Melissam adhuc uiuentem ex-
primat.

Chelidonium maius.
Schölkwurz.




primat, Porro utraq; Chelidonia, floret eo tempore anni, quo hirundines nidulantur.

NOMENCLATURA.

Chelidonium maius, *χελιδόνιον μέγιον* Germani uocant Schölkwurz/nonnulli alij Goldwurz/cui Dioscorides libro ij. cap. clxxij. sequentia ascribit nomina, *χελιδόνιον μέγιον*, Glaucia, Othonion, Crataea, Aubium, Pandios radix, Philomedion, Othonna, Mohoth. Crustana, Fabium, Hirundinaria. Serapioni Chelidomonthoma, Kauroch, & Curcuma, cap. cxcvi. dicitur. Leonhartus Fuchsius errore xxvi Memite, Arabum, Chelidonium, Memithe uero Glaucium esse contendit. Rursus Plinius lib. xx. cap. xix. Papauer Ceratites, Glaucion cognominari tradit, atque hinc uidemus concertationum huiusmodi nullum esse finem, etiam inter doctissimos quosq;. Chelidonium *χελιδόνιον μέγιον* minus, quod Latini Gratiam dei. Germanici Blein Schölkraut / Gots gnad/

Schäcken Fraut/nuncupant, quidam non sine magno errore Geranijs accensent. Ego quoq; aliquando foliorum similitudine, quam cum Petroselinio habet, adductus, Aprij genus esse credidi, sed cum singula diligentius inspexissem.

*Gratiadei, uel Geranion, ut quibusdam
videtur, nonnullis Sideritis iij. Diosco.
Ropertiana alias.
Gotts gnad.*



Spexissem, deprehendi mi-
nus recte me tum sentire.
Quidam Ropertianā, her-
bam Roperti, nonnulli eti-
am Rubeam; & Acum mu-
scatam uocant. Nec desunt
qui illam pro tertia Sideri-
tide, Dioscoridis lib. iij:
cap. xxxij. habeant, quod
mihi maxime placet, sed il-
lorum opinionem plane
improbo, qui pedē colum-
binum uocatam hanc plan-
tam uelint. Sed utut se hæc
habeant, certum est illam
Chelidonij speciem mino-
rem esse. Hebræi ut placet
Phrisio, Chelidonīā מֵרֵי
Merech appellant. Atque
hæc hætenus.

**VIRE AC TEMPE-
rumentum.**

Succus amarus herbæ
& radicis Chelidonij ma-
ioris, calidæ est temperatu-
ræ, iecorisq; obstructions
introsumptus adaperit, fo-
ris uero impositus putrida
uulnera purgat, oculorūq;
caliginem discutit. Herba
uero uulgo Gratia dei nun-
cupata, quam ego ob for-
mæ similitudinem, & tem-
pus quo floret, Chelidoni-

um minus uocaui, frigidi est temperamenti, & resoluendi, ac extenuante fa-
cultate prædita.

INTRIN-

INTRINSECVS.

Chelidonij maioris radix, cum Aniso in uino albo decocta, ac pota, obstructos epatis meatus adaperit, morboq; regio medetur. Idem efficit & aqua eius distillata, per aliquot dies pota. Radix Chelidonij maioris, quantum eius manus hominis capere possit, purgata, in sextario (quem Germani in halbmäß exponunt; hoc est, dimidium cantharum) rosacei acetis decocta, ita ut deinceps percoletur, decoctoq; adijciatur Theriacæ uncia cum dimidia, cyathiq; uulgaris mensura exhibita à peste correptos (attestante id certa experientia) liberabit, si postquam biberunt, in lectum sese composuerint, & sudauerint.

Alterum Chelidonium raro intro sumitur, propter nimiam quam oblinet frigiditatem.

EXTRINSECVS.

Succus Chelidonij Maior mense collectus, in q; uase æneo cum melle decoctus, oculis claritatem instillatus adfert, remedio efficacissimo.

Idem præstat aqua distillata, oculis indita, quorum maculas etiam rubras emendat, sicut & faciei, si inde colluantur. Eodem modo anthraces pestilentes sanat, serosi humoris ad articulos uulneratos decurrentis, fluxum sistit (quem Germani das glidwasser nominant) Succus eiusdem fistulas per sanat, & carcinomata, & Phagedænas, dentium etiam dolores sedat, cū aceto in ore fetentus.

Herba Chelidonij cum radice tusa, ac umbilico imposta, torminibus opitulatur. In puluerem redacta, uulnera purgat, sanatq; inspersum.


Alterum Chelidonium, quod uocant Gratiam dei, nobilissima est herba, efficacissima namq; Erysipelatis imponitur tusa. Succus illius, sicut & aqua distillata, quibusuis exulcerationibus oris, mammillarū, & pudendorum, tam muliebrium quam uirilium medetur, si affectæ partes hac aqua, uel succo colluantur, aut si lintheola in his madefacta imponantur.

Succus Chelidonij minoris, mariscas mundificat, sanatq; tumores deprimit, duritias mammillarum, aliorumq; membrorum, si forte conuulsa fuerint, discutit. Sacris ignibus hæc herba tusa, & uiridis imposta, ualenter auxiliatur.

De Fumaria. Cap. XXXIII.

P. LINIVS LIB. XXV. CAP. XIII. DVAS FVMARIAR species describit, alteramq; ex his in parietinis prouenire, & pedes

Fumaria.
Erdranch.



pedes gallinaceos uocari ait. Verum enimvero cum ea mihi non satis cognita sit, nolo de illa quicquam dicere. Germanis ita unica duntaxat *Fumaria* cognita est, ea nempe quæ est herbula fruticosa, præterea *Melanthij* similis, quod ad dissecta attinet folia, quæ tamen habet candidiora, cineræ racis coloris, teneriora denique & molliora. Hæc purpureum gerit florem, frequen-

frequentem, ac racematim compactum, instar florum Ligustri (quo de infra lib. iij. cap. xxvi) Semen illi rotundum prorsus, quemadmodū & Coriano. Radix uero unica, brevis & recta. Gustus herbæ amarus, ueluti Abrotini, qui oculorum claritatem adiuuat, sed & delachrymationem deducit, unde Fumaria à quibusdam dicta esse affirmatur. Proinde succisa lachrymas emittit, quemadmodum uites Martio mense putatæ.

In hortis, segetibus hordeaceis, inter linum, cæpas & Brassicas, primum. Maio mense, deinceps autem in Autumno, in rapidis agris prouenit.

NOMENCLATURAE.

Germani hanc plantam sequentibus nominibus insigniunt, *Erdranch* / *Saubentropff* / *Käzen Fössel*. Dioscorides, Capnon, alijs Corydalion, *Diosco. lib. 4. cap. 105:* aut Corion, hoc est, Coriandrum, fortasse foliorum similitudine) alijs syluestre Corydalion, alijs Capnon in hordeis, alijs Capniten, alijs Marmariten, alijs Capnogorgion, alijs Ghelidonion micron, alijs Peristerion, alijs Cantharidi, alijs Chalcocri, Romanis Apium seu Fumariam, *ναπύς, ναπύον* *ναπύτης.* *Sunt qui Fumariam ad Apium referre uelint, sed errant illi, sunt enim diuersi omnino generis Apium & Fumaria.* Aegyptijs Cnyx, alijs Tussin appellari illam tradit. Latini uulgo Fumum terræ nuncupant, ea procul dubio de causa, quod sponte sua ex pingui illa & humida agrorum exhalatione nasci uideatur, tamen si non raro & ex semine deceduo propagetur. Frisius in Synonymis suis Fumū terræ, Hebreis *חֲבֵל־הָאֵשׁ* Nahialhimen uocari testatur, mihi sane ignoto Etymo. Serapioni cap. lxxi. *Scehiterius* dicitur:

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Fumaria herbula tenerissima quidem, sed nobilissima, temperamento calido & sicco prædita est, discutiendi, extenuandi, subtiliandi, & penetrandi facultatem obtinens.

INTRINSECVS.

Fumaria scabiei & morbo Neapolitano, quem Gallicum uulgo uocant, ** sanando accommodatissima* est, quicumque enim huiusmodi morbos curare instituunt, ij aliquot diebus antequam ad curationem accedant, egrotis Fumarie aquam distillatam Theriaca admixta, bibendam propinant, & a potione sudare iubent, quo remedio sanguinem corrigi & mundari credunt. Eodem modo usurpata aqua Fumarie contra pestem præseruatio est optima, necnon aduersus uenenosos & immodicos sudores prophylacticū est haud poenitendum. Multi antequam balnea sudatoria intrent, prædictam aquam pari ratione usurpant non infelici successu. Succus Fumarie & ra-
dix.

dix Efulæ in puluerem redacta & præparata, æquis portionibus, hoc est, pondere drachmæ ex calida aqua hydropicis, & quibus uomitiones ciere uolumus, utiliter exhibetur.

Aqua Fumarię Aphthis & oris exulcerationibus medetur, collutu. Decoctio Fumarię adhibito Foeniculo, obstructions epatis aperit, perq; urinam Icterus ducit. Sepalsiarij Syrupum ex ea conficere solent, quimedatur scabię, & malis pustulis.

EXTRINSECVS.

Succus uel aqua distillata Fumarię, oculis inditus, caliginem illorum, scabię & rubedinem discutit, emendatq;. Idem cum Gummi illitus pilos palpebrarum euulsos renasci facit. Succus Fumarię cum succo Lapathi acuti, admixto modico aceti, & mellis temperatus, ita ut unguentum fiat, omnis generis scabię persanat, illitu.


De Chelidonio minori. Cap. XXXV.

SED AGE HIRVNDINARIAM MINOREM HERBAM Martio mense proflientem nunc consideremus, cui Chelidoni minoris nomen imposuit Dioscorides. Ea planta sub finem Februarij erumpit, ad humectos colles, in uineis, & pratis quibusdam herbaceo, uiridique colore conspicua. Vestitur autem foliolis minoribus, rotundioribus, tenerioribus, & mollioribus Hedera, per terram sparsis, quod tennis noua radice, folijs & flore sicut Satyriones & Aron reuiuiscit. Quod ad radices attinet, sunt illæ torosæ, ac instar grani hordeacei oblongæ, plerumq; ternæ aut quaternæ acervatim multis capillamentis, quibus humi hærent, fibratæ. Cauliculum acquirit exiguum, breuem & prætenuem, flore luteo, pulcherrimo, & qui stellulam plane referat emicantē, qualē Ranunculus fere habet. Maio mense marcescens, euanescit, folia floresq; amittens, radiculis interim usq; ad principia Februarij, anni sequentis humilaticantibus,

NOMENCLATURAE.

Germanis hæc herbula, Feigblatern Eppich/ Feigwarzenfraut/ Meisenfraut/ Schorbocksfraut/ Biberhödlin/ Kammenhödlin/ Pfaffenhödlin / quas appellationes partim à Ficis & mariscis quibus medetur, partim uero à tempore quo floret, partim deniq; à testiculatis radiculis sortita est.

Chelidonium minus.
Seigblatern Eppich.



est. Dioscoridi uero libro ij. cap. clxxij. *χελιδόνιον μινον*, & à quibusdam
μινον άγρον, dicitur, hoc est *Chelidonium minus*, & *Triticum agreste*, ex qua
 appellatione animaduerti potest, non semper illi *Chelidonium* nomen fuisse,

nam neq; Chelidonij genus esse potest. Quod si omnino Chelidonium uocari debeat, malim eam Germanice, *Schwalben Fraut.* i. Hirundinariam appellare. Nec defunt qui illam exiguum quoddam Scrophulariæ genus esse statuunt, Serapio hanc plantam sub uoce Meniten cap. ccxcvi describit.

VIREs AC TEMPERAMENTVM.

Chelidonium minus naturam habet calidam cum acrimonia coniunctam, quare linguam, uti Ranunculus, uellicat, soletq; potius externis corporis partibus adhiberi, quam intro sumi.

EXTRINSECVS.

Herba Chelidonij minoris una cum radice in uino decocta, melle admixto, caput purgat, & glutinosos ac lentos humores trahit gargarizzata. Idem efficit succus radicis cum melle tritus, & naribus inditus.

Proinde herba ipsa, radice, succoq; puluere, & aqua distillata, in extercendis sicibus mariscisue, magna utilitate & experientia medici nostræ ætatis utuntur, nam impostu, collutu, & inspersu, mirifice ficos & mariscas sanat; herba, aqua distillata, & puluis. Alia huius plantæ iuuamenta & uires ex commemoratis animaduerti possunt.

De Coriandro.

Cap.

XXXVI.

Coriandrum.

C

IMEX, INSECTI GENVS, QVOD GRAECIS *νίπερ* Dicitur, non tam graue olet quam uiridis Coriandri herba, qui sit ut ob odorem teste Dioscoride Coriandrum latere non possit, ut eam uel cæcus cognoscere queat. In hortis & agris prouenit, folio primum Petroselinii aut Chærefolij, deinde uero quo magis in altum excreuerit, eo subinde minori, & tenerioribus incisuris dissecto, caule aliquando binos cubitos superante, ramoso, umbellis ac floribus Petroselino simili. Porro flores quibus emicat candidi sunt, grauiusq; olēt, semē gerit plane rotundū & concauum, odoris gratissimi, quo loco naturæ occulta miracula uidere & admirari est, quæ ex foetore turpissimo, odorem fragrantissimū producit. Hoc semen Seplassiariorum Manna est.

NOMENCLATVRÆ.

Germani Coriander & Coliander uocant, Aniculæ agri Metensis, & Teruirensis.

Coriandrum.

Covander.



utrensis, hoc semen *anis*/
hoc est, Anisum appellant,
ea haud dubie de causa,
quod Anisum uerum ipsis
incognitum sit. Dioscori-
des lib. iij. cap. lxiij. *ἀνίσον*,
(quæ appellatio Hyperico
& Rutæ sylvestri quoque tri-
buitur, ut supra memini-
mus) & *ἀνίσον*, Apuleius
cap. ciiij. Ochion, Serapio
uero cap. xxxiij. Kusbor,
Auerrhoes, Cusbera ap-
pellant. Laurentius Phri-
sius lingua sua Hebraica, &
Arabica, *ḡ Gad*, Dyabo-
ra, Cumbora, & Curbur.

DAVIDIS KYBERI

ad Lectorem admonitio.

DE APPELLATIO-
ne Hebræa Coriandri, hu-
manissime lector, paucis te-
stimonia Hebræorum pro-
feram, qui in xi. cap. Nume-
rorum, ubi dicitur, Porro
Man erat sicut semen Co-
riandri, & aspectus eius si-
cut aspectus Bedolach &c.
ita scribunt, Man erat ro-
tundum sicut Gida, id est,
semen Koliandri, Bedo-
lach autem nomen est lapi-
dis preciosi, qui dicitur
Cristallus hæc, Rabi Salo-

mo, ex cuius interpretatione obiter id quoque notandum est, quod Man cum
dicitur, Exodi xvi. & ipsum Man sicut Coriandrum, album, cum Corian-
dro non quoad colorem conferritur, sed quoad figuram & rotunditatem.

H ij

Rabi uero David Kimhi in Dictionario suo in radice **קורי**, non solū hanc Coriandri adfert appellationem, sed & Arabicas supra commemoratas, cuius uerba hæc sunt,

והיא כוסברתא בלשון רבותינו וכן בש"ס וקרא אלכסבור וקרא בלעו קוליינורי

Hoc est,

Gad, est ea herba, quæ à Rabinis nostris Cosberta, & ab Arabibus, Elcosbur, & in lingua uernacula (id est, Hispanica, fuit enim Kimhi Hispanus) Koliandri dicitur. Hæc ille.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Herba Coriandri graueolens & uenenosa, refrigerantem & desiccantem habet uim, maxime recens, ideoq; intro non sumitur. At semen eius maturum calidum obtinet temperamentum, & utrinq; usurpari potest.

INTRINSECVS.

Semen Coriandri per noctem uino uel aceto maceratum, rursusq; desiccatum, stomacho inprimis confert, uenenatas enim eius exhalationes, ne caput tentent, reprimat, Quare ex Coriandro, pro stomacho præstantissimus puluis confici potest, qui tamen pro uoluntate, cuiusq; comunicetur, uel Saccaro condietur, uel non condietur.

Admonendi mihi sunt hoc loco Seplassarij, ne semen Coriandri cuiquā, nisi prius eo quo diximus modo præparatum (ut isti loquuntur) fuerit, uel cum Saccharo uendant, nisi uenenum loco remedij exhibere uelint.

Coriandri semen cum passo potum, menses ciet, & tineas interaneorum expellit.

EXTRINSECVS.

Coriandri herba, cum fabæ & uiciæ farina, & oleo rosaceo tusa, & emplastri ritu imposita, inflammationes & tumores, tum omnium locorum, tum uero genitalium discutit.

Coriandrum cum Lactuca, albo oui, oleoq; rosaceo, conquassatum, & impositum, ignibus sacris, erysipelatis, alijsq; id genus calidis affectionibus medetur.

Coriandri semine, subtrito cum aceto, caro salsa, non solum à tarmis, sed & foetore uindicatur, & longo tempore odorata conseruatur.


Coriandrum per se, & uiride sumptum, mentem uehementer commouet, furorem quendam, quali corripiuntur ebrij, inducens. Quisquis igitur per imprudentiam forte Coriandrum non præparatum sumperit, is statim muriam potet, cui adiungere poterit putamina ouorum contrita, quod cum fecerit, proculdubio liberabitur.

De.

De *Nigella*. Cap.

Schwarz Coriander.

XXXVII.



MELANTHION IN
duo dirimitur genera, quo
rum alterum sylvestre, alte ¹ *Nigella hortens*
rum uero hortense cēsetur. *sis.*

Satiuum quidem cubiti al/
titudinem in hortis assequi
tur, folijs laciniatim disse/
ctis uti Fumus terræ, sed ui
ridioribus uestitur, floribus
in fastigijs emicat rotundis
rotæq; non absimilibus, ex
candido cæruleis, qui ubi
deciderint, in capitula quæ
dam intercursantibus senis
mēbrāis intus distincta, fol
liculis lini catenus similia a
beūt, ceterū his receptaculis
semen pullum, & Cæpaceo
consimile, ex ordine collo
catum includitur. Proinde
ipsa herba, radix, sicut &
caulis & flos, omni odore

carent, solumq; semen ma- *Miraculum natu*
re.

turum admodum odora/
tum deprehenditur, quo lo
co rursus naturæ miracula
contemplari & admirari
debēt rei herbariæ studiosi.

Sylvestris *Nigella* spon
te sua inter fruges cereales
prospicit, folijs satiuo Melan
thio plane dissimilibus.

Sunt enim illa admodum
acuta, & plurimum disse/
cta, anethum potius quam

^{2.} *Sylvestris Nigella.*
la.

Nigella alteram referentia, cineracea, Hæc unicum caulem palmi altitudi

nem non temere excedentem profert, florem uero satiuæ Nigellæ nonnihil respondentem, sed ad cæsum colorem plus accedentem. Capitula uero que in summitate, quaternis uel quinis corniculis discriminata sunt, Aquilegiâ imitantur, ita tamen ut singulæ calycis cellulæ, semina sua, à reliquis plane segregata contineant. Hoc semen odorem spirat gratissimum, & à messe plerumq; maturefcit.

3.
Nigella Damascena.

Tertia, eademq; elegantissima Nigellæ species, quæ Damascena cognominatur, substantia sua maior, odore remissior, forma præstantior prædicta, ex semine nigro, quod & ipsum dolore destituitur, in horris plantari cōfuevit. Eam plantam D. Georgius Ollinger ex Norimberga ad me misit.

NOMENCLATURAE.

Melanthion satium, Salusandriam uocitare solent. Dioscorides lib. iij. cap. lxxxiiij. *Μελάνθιον, μέλαινα ἄγριον ἢ μέλαινα*, id est, Nigellam, Papapauer agreste, uel nigrum appellat. Germani *schwarzen Coriander* hoc est, nigrum Coriandrum nuncupant. Serapio cap. cccxviiij. Xanium uocat. Auerrhoi Scaunix dicitur. Quidam semen eius Gith uocant. Tertia Nigella ex Damasco aduenisse fertur, unde Damascena cognominatur. Quandoq; mihi persuadebam Nigellam Papauer esse cornutum, sed rem aliter sese habere tandem cognoui. Sed de Corniculato Papauere paulo post.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vtruncq; Melanthion ex calefacientium est ordine, discutiendi & expellendi, si moderate intro sumatur, & foris imponatur, uim obtinens.

INTRINSECVS.

Ista quoq; semina recentia, seu uiridia assumi intra corpus non debent, sed ubi plane maturuerint ac arida euaserint, possunt panibus compinfi, si cut semen (ut uulgo uocant) Carui.

Nigellæ semen cum uino aliquot diebus potum, urinam & menses trahit, tiueasq; uentris pellit, nutritibus lactis copiam affert, spirandi difficultatem leuat, pulmonum pectorisq; uicia purgat, & tormina sedat. Quod si uero largius, uel uiride hoc semen usurpaueris, nocumentum tibi ipsi afferes.

EXTRINSECVS.

Vtracq; iam dicta semina, externis corporis partibus adhibita, Coriandri

ari facultatem obtinent, nam tumores, duritiesque ueteres imposita, tollunt. Serpiginem sanant, & inflammationes discutunt.

Semen cum Rosaceo aceto tritum & fronti impositum, Phrenesi succurrit.

Obseruandum Nigellæ syluestris semen (quod in corniculis contineri diximus) efficacius esse altero.

Suffitu Nigellæ serpentes, alijque uenenati pelluntur uermes.

De Argemone, quam Germani Klapperrosen
appellant. CAP. XXXVIII.

ARGEMONE IN OMNIBVS PROPE SEGETIBVS, A
Maio mense usque ad Autumnum reperitur. Eius duo extant genera, maius scilicet & minus.


Vulgaris itaque, ut quæ passim in aruis obuia est Argemone, nihil aliud est, quam syluestre papaueris genus. Nam flauum succum, incisa emittit, folijsque uulgari Papaueri similimis, at minoribus, angustioribus, magis dissectis instar Cichorii, ita quidem, ut superiora, quæ capitulis uiciniora fuerint, eo exiliora & serratiora appareant, serramque exiguam, pulchre referant. Caules sicut & furculos adnascenciasque lanuginosas profert, quemadmodum uulgaris auricula muris, Pilosella uocata. Capitula ex quibus flos prodit, binis cuticulis uiridi colore præditis, hisque lanuginosis, contegitur, quod in fati uo quoque Papauere deprehenditur. Vbi uero flos ipse exitum molitur, diuisa illa tegumenta protinus decidunt, atque tum puniceus, quatuor diuisus foliolis profilit flos, quem ego nonnunquam multiplici stipatu foliorum contextum uidi. Porro folia illius quamprimum defluunt, dein exiguum Papaueris capitulum, in ambitu nigris capillamentis, sed protinus deciduis circumdatum se profert. Demum uero ubi calyculi, quos diximus maturitatem suam assecuti fuerint, membranulis multis intercurstantibus, ac peculiare, & ab alijs seiunctas cellulas facientibus, distincti hiant, semine Papaueri similimo, sed magis fusco, ac longe minori prægnantes. Radix quandoque digitum crassa, nunc lutea, nunc uero alba euadit, eaque dum adhuc tenera, est uulnerata croceum lac, amarum gustu fundit.

Argemone autem exigua iam descriptæ consimilis est, & ad Papauera pertinet, sed caule, radice, herba, flore, & capitulo per omnia exilior, foliolis admodum laciniatis. Flos illius exiguus, quaternis quoque foliolis constat. Capitulum habet longius quam prior. Principio Maii semper floret, nec facile ubiuis locorum inuenitur, Gaudet segetibus triticeis, siligineis & hordeaceis.

*Gesülte Klapperrosen/
hoc est, Argemone multiplex.*

Argemone exiguâ.

Argemone.
Blapperrosen.



Est & alia quædam, & tertia Argemone, folio scœniculi, fuluo flore, aculeato capitulo conspicua, cuius nomenclationem & descriptionẽ cap. xl adferemus.

NOMENCLATVRÆ.

Major Argemone, Germanis Groß Blapperrosen & Kornrosen & à mulierculis agri Spirensis, & Vuormatiensis. Grindt-magen Dioscoridi uero libro ij cap. clxviij *argemone* dicitur. At minorem Argemonem quam ego uero tantum tempore inter segetes deprehendi, existimo cam esse, quæ à Diosco. lib. iij cap. lxiij *anemone* dicitur & erraticum Papauer nominatur. Quæ appellatio priori Argemonæ tribui quoq; posset, propterea quod Dioscorides Papauer erraticum vere in hordæacis segetibus, capitulo longiori quam habet at Argemone (nā sic ego lego Diosco. locum, & nō Anemone) nasci testetur.

Hæc sane descriptio nō maiori Argemonæ quæ per totam æstatem reperi-

tur, sed minori potius competit. Tertiæ Argemonæ nomenclaturas capite adreconscribimus.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Vtraq; Argemone refrigeratorem habet uim, doloresq; sedandi, somnumq; inducendi facultate prædita. Proin tam semen quam aqua distillata earum, utrinq; commode (modo temperate id fiat) adhiberi possunt.

INTRINSECVS.

Quina uel sena Argemones capita in uino ultra dimidias decocta, & pota, mediocriter somnum conciliant. Linteola in ea decoctione madefacta, capitiq; circumligata, somnum efficacius inducunt.

Semen Argemones contusum, & cum melle commanducatum aluum leniter emollit.

Aqua eius distillata, contra omnes internos calores facit, potestq; in febribus calidissimis citra periculum bibi. Nam eius modi aquæ distillatæ refrigerant iecur, inflammationes colli restinguunt, & ardores faucium tollunt, potæ & gargarissatæ.

EXTRINSECVS.

Argemones aqua sacro igni medetur, Erysipelatis prodest, stupa cannabina iecori imposita, sanguinem e naribus fluentem sistit.

Aqua non solum ardores faucium, sed & aphthas, aliasq; oris & pudendorum exulcerationes sanat, si cum illa lauentur. Similiter & pudendorum tumores detumescere facit.

Temporibus illita, seu fronti alligata, phreneticis somnum adfert, illorumq; furores sedat. Calidos oculorum dolores linteo, uel stupa cannabina imposita mitigat.

Succus floris cum sulphure & nitro permixtus, contra scabiem facit, omnesq; maculas extergit.

Sed quid multis, nemo satis hanc plantam laudibus extollere poterit.

De reliquis Papaueris generibus.

CAP. XXXIX.

E SYLVESTRI PAPAVERE DICTVM SATIS PVTO,

D quare ad descriptionem papaueris satui accedamus. Postquam uero illius genera diligētius inuestigare statuissem, singula dum florerent, appensis schedulis signavi, posteaq; ubi maturuissent, rursus contemplatus sum, scaposq; ut lactum succum gustarem, incidi: quæ res ne-

Papauer.
Magsamen.




Vulgare
Papauer.

quaquam sanguinis effusio-
nem, uti Tarquinius ille de
cussione Papaveris sig-
nificabat, denotabit, quin
potius ad cognitionem
plantarum exactam faciet.
Papaveris itaq; quinque ge-
nera, herba quidem, caule,
radice & succo, admodum
similia, at flore ac semine sa-
tis differentia deprehendi,
quæ omnia ordine percen-
sebimus, si prius de comu-
ni omnium forma mentio-
nem fecerimus quâ paucis-
simis, ab ipsis solijs, quibus
vestiuntur initium facien-
tes. Ea omnibus Papaveri-
bus lanuginosa, subhirsu-
ta sunt, incisa ac lacinjata,
lata, lactucacea, cineraceiq;
coloris.

Caulis uero digitū cras-
sus, teres, similiterq; lanugi-
nosus. Radix, recta, unica,
& candida. Flos omnium
magnus, elegans, Argemo-
neq; similis. Capita quæ in
summitate scaporum pro-
tuberant, antequam ad ma-
turitatem perueniant, inte-
gris amygdalis cõsimilia
apparent. Folia prius deci-
dunt, quam semen matu-
ruerit, id quod in alijs stir-
pibus minime contingit.

Sed his expeditis genera Papaveris flore et semine, ut diximus distincta, enu-
meremus. Primum ergo, quod & uulgatissimum est, florem gerit in supe-
riori parte candidum, inferne uero qua calyculo iungitur, purpureis ma-
culis

Papaver sylvestre, corniculatum.
 Wilder gebünter Magsomen.



culis notatum. Semen huius maturum, quasi exitum medicans, caput quo
 cōtinetur, rumpit, & hiare cogit, protinusq; sua sponte in terram rursus se-
 se coniicit, colore incanum, sicut semen Hyoscyami.

Alterum ..

2. **Album papauer** Alterū flore emicat candido plane, capite oblongiori, semine itidē candido.
Tertium similiter candidum florem ac inferne rubris maculis infectum,
sem enuero flauum profert.
3. **Luteū papauer:** Quartum flore proorsus rubeco comat, semine prægnaus fusco.
4. **Rubeū papauer.** Quintum flore rosco punctis purpureis inferne maculato, semine autem nigro præditum est.
5. **Nigrū papauer.** Præter hæc quæ iam commemorauimus Papauera, duo alia extant, alterum candidis floribus, semine albo, alterum uero rubcis, hîsq; per ambitum superne incisus & dissectis, semine fusco.
6. **Papauer. candidum alterum.** Proinde omnium horum Papauerum capita, quæ seminum sunt receptacula, clausa manent, excepto eo, quod uulgare nominauimus, cuius alabastra superne, qua serrato & quasi stellato operculo clauduntur, per se undiq; rursus adaperiuntur, sicut & Argemones capitula.
7. **Papauer rubeū aliterum.** Restat & aliud Papaueris genus, quod in magna copia in agro Vangionum ad oppidulum Zellen, quod appellant auff der Pfrimmen/ uidere mihi contigit. Hoc circa festum Ioannis inter segretes caule hirsuto, flore q; aureo conspiciendum se præbet. Porro quoddā huius generis flore destitutū, quoddam siliquis aliquantum inflexis, instar sceni græci, sed longioribus præditum animaduerti. Semen illius magnam cum uulgari Papauere affinitatem habet. Folia gerit cineracei coloris, hirsuta, ac profundis incisuris dissecta, siue potius lacinata, ut Carduum Benedictum seu Eupatorium prope emulentur. Cum hæc omnia delineamenta pressius inspicerem, cogitabam apud me hunc fruticem Dioscoridis esse Papauer cornutum, atq; ita rem se habere cognoui, ubi primum Dioscoridis descriptionem uiuæ imaginis contuli. Nec me mea decepit opinio, nam non multo post tempore, per literas præstantissimi uiri D. Georgij Oellingeri ciuis Norimbergensis mihi significabatur, istud Papaueris genus in Anglia prouenire, corniculis cubitalis longitudinis, aliudq; rubeos aliud uero roseos flores gignere.
8. **Papauer corniculatum.**

NOMENCLATURAE.

Germani omnia Papaueris genera patrijs uocibus *Mägle/Mön/Mag* semen, & quidam etiam *Olfsamen* appellant. Dioscoridi lib. iij. cap. lxiij. *μῆλον ἡμῶν καὶ πικρὸν*, hoc est, Papauer satium, hortense dicitur. Alijs quoq; nominibus appellari Papauer idem autor testatur, ait namq; *ἢ δι' ἡμασίον*, *ἢ δι' ἡμῶν ποδῶν*, *ἢ δι' ὀξίτονον* hoc est aliqui ficum terrestrem, alij Papauer Rhœa/cia, alij Oxitonon, appellant. Ex his uidere est, quod ueteres omne fere Papauer *ποδῶν* appellarint, & Oxitonon. Quod uero ad appellationem Chamæsyces attinet, tribuitur illa alijs quoq; herbis, uidelicet Astragalo, & spumco Papaueri, ut iam tres terrestres ficus habeamus.

Alia

Alia siqua sunt nomina Papaueris, ea ad Cornutum pertinent, quod a Dioscoride lib. iij. cap. lxiij. *μικρον καρινος* uel *αγρια*, hoc est, Papauer Corniculare, uel agreste, Fabulum marinum, Sifimaca. Alijs Memitha dicitur. Serapio cap. cccxiiij. Alnucharam appellat. Apuleius cap. liij. plura recenset nomina, quæ nihil attinet in medium adferre.

VIRE S A C T E M P E R A M E N T V M.

Omniū Papauerum uis refrigeratrix est. Inprimis uero candidum commendatur, post hoc, rubrum, ultimum locum uulgare occupat. Porro omnia dolores sedant, somnum accersunt utrinque adhibita. Corniculatum autem naturam calidam & siccam obtinet.

I N T R I N S E C V S.

Papauer candidum panis compinfi potest, sicut & Cuminum pratense, lucundo enim sapore cibos commendat quosuis, & citra periculum usurpari potest.

Prodest & ijs qui uerrigine laborant, experientia hoc testante, quietem inducit, somnumque conciliat, tam iuuenibus quam senibus, quocunque modo assumere libeat. Quin & infantibus, quando inquieti, & insomnijs laborauerint, in lacte, uel pulce concoctum exhiberi potest hoc semen.

Opium quod ex Papauere conficitur, ad eadem efficacius est, sed quantū ego quidem intelligo, si intro sumatur, nocentius.

Papaueris nigri semen, per se uel cum uino sumptum, in tussi leuamentū præbet, arteriæ fluxiones, cæliacorum, & foëminarum profluuiā cohibet, sistitque. Idem de succo huius Papaueris intelligi uolumus. Breuiter, Narcoticum est hoc Papauer haud uulgare, & quod utrinque commodè usurpari possit.

Dioscorides corniculari Papaueri tantas inesse uires tradit, ut radix in aqua ad dimidias decocta, coxendicum & iocinoris affectus potu sanet, proficitque his qui crassas, asperas, aut arenosas, & cum difficultate urinas reddunt. Semen etiam in aqua mulsā, uel melle potum, aluum leuiter purgare, idem Diosco. auctor est.

E X T R I N S E C V S.

Omne Papaueris genus, tam syluestre quam fatium, & non solum herba eius, expressusque succus, sed & aqua distillata, Phreneticis, & his qui in somnijs laborant, utilissima sunt, emplastrī modo fronti, uel temporibus imposita.

Si Errhinon (quod Barbari Nasale uocant) in succo herbæ Papaueris intinctum naribus indas, somnum quamprimum induces, eodem muliebribus locis subiecto, profluuiâ illarum cohibebis, dolore mitigato, ac somno accersito.

Aqua in qua capita Papauerum decocta fuerint, easdem facultates obtinet, sacris etiam ignibus imposita, opitulatur. Aurium dolori cum oleo amygdalino uisiter instillatur. Aqua ex herba floribus & capitibus Papauerum distillata, ad eadem omnia efficax est.

Succum Papaueris, quod Pharmacopolæ Opium appellant, quidam hoc pacto faciunt, capita ipsa & folia uiridiatundunt, & prælo exprimunt, succumq; expressum soli exponunt, quo ad densetur.

Alij lacteum tantum succum ex incisis scapis demanantem, excipiunt, itidem donec densetur soli exponentes.

Folia Papaueris corniculati, cum oleo tusa, argema & nubeculas iumentorum impositu abstergunt, oculorumq; claritatem adiuuant, sed moderate his utendum est, ne nimium ualenter abstergant, & ipsam quoque carnem eliquent, uti monet Galenus.

*De Rosa Mariana, Pseudo melanthio, Ocimoide,
& alijs quibusdam. CAP. XL.*

ROSAE MARIANAE SATIVAE DVO SVNT GENERA, quorum alterum rubeos, alterum uero candidos fert flores.

Folia utriusque crassa, mollia, tomentosa, ut Verbascum, sed teneriora, lata, & in formâ linguæ acuminata, cineracei coloris. Caulem geniculatū, habet & lanuginosum, tales sunt & ramuli, seu furculi adnati. Floribus decidētibus capitula Papaueri similia protuberant, superne in acumen, instar glandis quernæ & exigue desinentia, in quibus semen cinerei coloris, Hyoscyami adeo simile, ut discerni uix possint, continetur.

In dumetis, & ad sepes nonnullas reperiuntur duo genera florum, Rosæ Marianæ haud multum dissimilia, sed caule ac folijs magis exigua & angustiora, colore uero uiridiora. Flōs alteri candidus, alteri rubeus, ut colore Bersilicum quod uocant imitetur. Quo decusso caliculi eiusdem cum præcedentibus formæ, in quibus semen incanum includitur, subsequuntur.

His consimile quoddam genus in syluis, aruis quibusdam & parietinis, multis geniculis distinctum, ueluti superiora duo genera, inuenitur, cuius folia teneriora sunt, magis acuminata, uiridis coloris, tactu q; molliora, ac pinguiora. Flores hic frutex gerit candidos, ex inflatis quibusdam quasi

facculis

2. 2.
Mariana rosas
una duplex.

R


3. 4.
Lydwich/
quibusdam Been
album et rubrū.

5.
Daube tropff

Rosa Mariana.

Märgen Rößlin.

*Githago, seu Lolium, ut multis
videtur, Germanis
Groß Raden.*




faculis prorepentes, quibus decidentibus, uascula rotunda, magnitudine
Pisum singula æquantia, semine incano prægnantia, in his ipsis quos dixi-
mus.

Anemone agrestis.
Feld Rößlin.

6.
Groß Raden.
Githago.

7.
Anemone.
Agyptia.

8.
Anemone.



mus oculis delitescere, conspiciuntur. Radix huius, et superiorum omnium candida, & ut plurimum digiti minimum crassa, recta, paucisque capillamentis fibrata.

Sextum Marianæ rosæ genus, inter segetes nascitur, uoceq; Germanicâ groß Raden dicitur. Hoc folijs uestitur acutissimis, instar Porri, at breuioribus, lanuginosis, ut eo nomine Pilosellam luteam imitetur, colore cinereo, & quasi nigricante præditis. Florem profert purpureum, cui decusso, capitulum nigro semine referunt, succedit. Antequam uero flos exeat, solet hic calyculus quinis fere, uel quaternis supernè cuspidibus herbaceis, & prominentibus conspici. Scapum plerumq; unicum, geniculatum, agnatis furculis quibusdam, ex geniculis prodeuntibus, habet.

Porto inter triticeas & Speltaceas segetes, herbula quædam perelegans, ad palmi altitudinem assurgens, folijs Nigellæ, seu Geranio exiguo consimilibus uestita, prouenit. Ea sub initia Iunii mensis, flosculos quatuor foliolis distinctos, minij colore tinctos, aliquando candidos, per omnia Argemonem minutam, exprimentes, gerit. Postquam autem defloruerit, capitula aculeata, seu Echini quidam in summitate protuberant, hocq; semen eius est, nam singula semina instar Bliti, aculeis horrent, cumq; numerosa aculeorum congerie stipentur, Echinos quos diximus efficiunt.

Postremam huius generis plantam, in horto quodam forte fortuna repertam uidi, anno supra sesqui millesimum, trigesimo nono, cuius descriptionem paucis accipe. Hæc ex radice recta, leui, & digiti minimum crassa, caulem habebat teretem, & instar Been albi
(utuulgo

*Anemone hortensis.**Anemone rōglin.*

(ut vulgo uocant) geniculatum, folijs herbacei coloris, hisq̃ plurimum dissectis, instar Chamomillæ vulgaris, seu Cotulæ, ad fastigium usq̃, quod florerutulo, & quasi aureo, forma Argemonem planereferente, comabat, uersutura.

Polygonaton.
Lydwicif.



Polygonaton.
Polygonaton.
Xanthoxylon.

Atq; hæc hæctenus, nunc
 & nomenclationes horum
 fruticum subiiciamus.

NOMENCLATURAE.

Priores duas uocant
 Germani *Merien rößlin*;
 hoc est, Rosas Marianas:
 Conradus Gesnerus in ea
 omnino est sententia, ut pu-
 tet, ad Iouis florem Plinij re-
 ferendas. Quibusdam alijs
luxurians, & *lyuallie* dicitur, sed
 quam recte, ipsi uiderint.
 De Diosantho siue Iouisa
 flore, uide Ruellium, lib. ij.
 cap. cxxxv.

Duas uero syluestres
 plantas, Germani *Lyd-
 weich*/ eo quod illa Chirur-
 gi nostræ ætatis, ad articu-
 los ac neruos, utantur, no-
 minant, alijs præsertim in-
 colis Sebusij oppidi, uulgo
Weissenburg uocant, *Wi-
 derstoß* appellatæ. Quidam
 persuadere mihi conaban-
 tur, hos frutices ea esse *Be-
 hen*, quæ Auicenna lib. ij.
 cap. lxxxvi. & Serapio cap.
 ccxij descripsere. Nec de-
 sunt qui ad *Ocimoidem*,
 (quam appellationem ego
 herbæ infra cap. lx. descri-
 ptæ tribui) illas referant.

Ego quidem has plantas ad *Polygonaton*, de quo Dioscorides lib. iij.
 cap. vi. referrem, nisi alijs rursus *Polemoniam*, quæ & *Philæteria*, & ob insi-
 gnes quibus pollet uires, *Xanthoxylon* dicitur, appellandas censerent. Quo-
 rum

rum

rum sententia forte admitti posset, si Rutæ folia hæc herbæ haberent. Officina hodie hanc Been album, illam Been rubrum uulgo uocant.

Quintam Germani similiter *Lydweich* appellant, suntque qui dicant ueram esse articularem, seu ut loquuntur Germani *Glydweich*/ alijs *Sauben Fropp*/ propter inflata & concava seminis receptacula, Confluentiæ uero oppido, in Rheni tractu sito, *Splyspettel* nominatur.

Sextam Germani *Roin roß* / *Groß raden* appellant, multis *μαύρη*, *Nigella* *ψευδαύρη*, & *Githago* dicitur, sed perperam. *Nigella* enim odoratū fert semen, uti suo loco diximus. Neque etiam *Lolium* esse potest, ut multi arbitrantur.

Argemone uero minima, quam *Echinata* proferre capitula docuimus, quas habeat appellationes, haud dum à quoquam rescire potui. Quare dum commodius nomen repertum fuerit, interea *Anemonem* agrestem, quæ *Plinio* *Aculeata* uocatur, nominabo, Germanice *Flein Klapper rôßlin* / *Seld oder a cfer Anemone*. Huc pertinet *Apium* aquaticum, supra inter *Ranunculos* descriptum.

Ultimam denique ego *Anemones* genus esse existimo, quod à *Dioscoride*. lib. ij. cap. clxvij. his nominibus describitur, *ἀνμών*, *agria* aut *nigra*, *Anemone Phoenica*, *Enemion*, *Meconion*, *Tragoceros*, *Terræ parinæ* aut *Barbyla*, *Osthanes* *Berilion*, *Orinois* *Ceranion*, *Atractylis*, *Cnicus agria*, *Chuf sit*, *Orcitunica*, quæ appellationes partim ad alias pertinent plantas.

VIRESCAC TEMPERAMENTVM.

Quantum dulcedinis ac iucundi saporis omnia papauera obtinent, tantum uicissim semini *Rosarum* *Marianarum*, tum omnium, cum earum maxime, quæ in hortis plantantur, ingrata inest acrimoniæ, simul & amaritudinis. Quare externis corporis partibus, quam internis adhiberi ea consultius, ac utilius fuerit.

INTRINSECVS.

Semen uino decoctum, amissum nutritibus lac, potu recuperat, augetque. Quod efficacius quidem præstabit, si foeniculum addas.

EXTRINSECVS.

Succus ex radicibus expressus, calidissimus & acerrimus est, qui si naribus excipiat, sternutamenta elicit, cerebrumque efficaciter purgat.

Idem si in uellere, uel pessario subiiciatur locis muliebribus, menses suppressos euocat.

Semen omnium Marianarum rosarum contusum, nec non succus earundem, inflammationes doloresq; oculorum sedat, si linteo loco imponantur.

Succus suppurantibus oculis illitus, purgat illos, ac propediem perfanat. Idem omnis generis scabiei, præsertim uero serpenti, quam Græci Leporam uocant, medetur illitu, uel si ex illo loca affecta colluantur. Proxima autem quæ nunc commemorauimus remedia, ex ultima Anemone confici debent, neq; enim ab alijs Marianis petenda erunt, quod monere placuit.

Reliquæ herbæ his congeneres, quas Germani Glydweich / & Raden appellant, una cum seminibus Chirurgicæ inseruiunt, nam ex his fomenta & balnea sudatoria, quibus induratos neruos & articulos emollire consueuimus, utiliter parantur. Quidam his hordeaceos uel triticeos furfures adiungunt, eosq; cum herbis prædictis, oleo, & aceto, uel uappa decoctos, calidos, affectis membris imponunt.

Innumera alia horum fruticum iuuamenta, ex his quæ annotauimus, colligi possunt.

De Hyoscyamo. Cap. XLI.

^{1.} **Hyoscyamus seu cundus Galeni.** I N GERMANIA NOSTRA VNVS TANTVM HYOSCYAMUS notus est, is nimirum, qui mediocriter flauum habet semen, & secundum à Galeno censetur Hyoscyami genus. Est autem hic ipse Hyoscyamus frutex, radice candida, recta, digitumq; crassa, ex qua caulis crassius prosilit, folijs uestitus primo exortu latis, pinguibus, mollibus, lanuginosis, concisis, instar frondis quernæ, nigricantibus, seu cineraceis. Hæc quo altiore in caulibus locum occupant, eo angustiora euadunt, quin is septenis uel lacinijs dissecta, ut manu explicatæ simillima appareant. Pro flore, campanulas quasdam pallidas, atq; luridas, primum ex uasculis rotundis exilientes gerit. Quæ quidem decusso flore in muricatos calyculos operculo quodam, instar pileoli contractos, intus uero semine Papaueri non absimili, sed magis pullo, refertos, secundum caulem acramos, continua serie prodeuntes, desinunt.

^{2.} **Hyoscyamus albus.** Candidus uero Hyoscyamus qui & satius dicitur, uulgaris consimilis est, nisi quod superiora folia magis exigua, semenq; candidius habet.

NOMENCLATURAE.

Diosco. lib. 4. Germanis hæc planta Bülsenkraut / Sawbonen / Schlaffkraut / Dollkraut appellatur. Dioscorides Hyoscyamum, alios Pythonion, aliquos Dyoscyamon uocare, alios Adamanta, alios Adamenon, alios Hypnoticon, alios

Hyoscyamus.

Bülsentraut.



con, alios Emmanes, alios Atomon, nonnullos Dithiambrión, magos Pythagoram & Osthane, Xeleo, Zoroastrem, Typhonion, magos Raponiticam, Romanos Inananoentariam aut Appollinarē, Ægyptios Saphtho,

Candidus Hyoscyamus.

Weiß Bülsen.



Hetruscos Fabulum, Gallos Bistuntiam, Dacos Diellam, nuncupare testatur. Apuleio cap. iij. Augmon, Alterculum, Symphoniaca, Calicularis, Pentaria, Ginga, Remenia, Fabulonia, Ligea & Insana, Serap. cap. cccxxx: Bengi.

Bengi. Auerrhoi, Elsoc, dicitur. Plinius lib. xxv. cap. iij. Arabes Hyofscya *Atomi appellatum, Altercum, & Altercangenon uocare scribit. Matheus Syluaticus plura alia Hyofscyamo nomina tribuit, uidelicet Dens Caballinus, Equinus, Roßzan/ Cassilago. Papienses medicos Hyofscyamum, Herbam Pinulam, aliosq; Canicularem, & Caniculatam appellare, testis est Iacobus Manlius. lib. 4. cap. 145. Semen Hyofscyami Bizeri Bengi appellant Arabes. Rhapontica non men ad eam plantam pertinet, que lib. 3. cap. 2. a Dioscoride describitur.*

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Hyofscyami herba, flores & semina, necnon & radices frigidam obtinet naturam, maxime uero primum genus, ubi namq; immodice his utare, noxam tibi afferes. Nam & brutis animantibus nocere comāducatam hanc herbam, solisq; passeribus ac coturnicibus prodesse in cibo, Vitalis de fur, no cap. xxvij. docet. Quare consultius fuerit raro intra corpus eam sumere, nisi periculo nos obhircere uelimus. Quam uero noxia sit planta, uel hinc intelligere possumus, quod a piscibus deuorata, neci eos tradat. Eam aræcirculatores sycophantæ quidam probe didicerunt, ut enim facilius pisces miseros decipiant, solent illis Hyofscyamum, & coculas elephantis (ut uulgo seplaxæ uocant) præbere, quibus degustatis è uestigio in tantum stuporem conijciuntur, ut exiliendo tandem concidant, ac supini manibus nullo negotio comprehendi possint. Quin & gallinæ suffitu Hyofscyami percepto, amentia afficiuntur, ut etiam de sedibus suis protinus decidant.

His fraudibus utuntur nebulones illi perditissimi, qui se Ægyptios appellant, uagabundi per regiones errant, sentina nimirum flagitiosissimorum hominum, qui ultra Sauromatas & glacialem Oceanum ablegandidudum fuerant, si nostris rebus recte consultum unquam uoluissimus.

INTRINSECVS.

Dioscorides Hyofscyami semen cum uino sumptum, contra tussim & acres destillationes capitis apprime conferre testatur, idem præstat & Papauer candidum.

EXTRINSECVS.

Herba Hyofscyami, necnon flores eius & semen, somno conciliando, dolori sedando profunt, sed si immodice quis illis utatur, alienationem mentis pariunt.

Lineola madefacta succo herbæ expresso, calidis ac manantibus oculis imposita, inflammationem, fluxionem, ac dolorem illorum tollent.

Succus herbæ, uel oleum seminis, auribus inditum, dolorem & punctio-

nes illarum crebras aufert. Folia recentia locis tumidis imposita, remedium (ut uocant) repercussuum præstant, dolorem etenim sedant, tumoresque quosuis deprimunt.

Folia Hyoscyami cum polenta contusa, dolores omne genus mitigant, Podagris subueniunt. Ad eadem facit & oleum Hyoscyami. Si ex Hyoscyamo lauacrum pedum, uel uaporationes conficies, somnum accerces. Idem efficit oleum eius cum aceto fronti uel temporibus illitum. Confert hoc idem remedium testium inflationibus, & mammis à partu turgentibus, impositum.

Aqua ex herba Hyoscyami distillata, supra dictas facultates obtinet.

Breuius folia Hyoscyami recentia, semen & aqua eius distillata, debent tantum foris usurpari, doloribus leuandis, & somno conciliando.

Radix aceto decocta, si cum illa dentes affecti colluantur, utilis est.

Postremo si quis uel herbam, uel semen Hyoscyami hausisse se suspicetur, is quamprimum caprinum lac, uel aquam mulsam, potet, uel pineos nucleos, aut cucumerum semina cum passo sumat. Sin uero hæc desiderentur, urticae uel Nasturtij uel Sinapis semen, aut Raphanos, cæpas, aut allium è uino bibat, quod cum fecerit, infamia, ac stupore, quem Hyoscyamus generat, liberabitur.

De Aquilegia, & Rhapontica. Cap. XLII.

^{1.}
Aquilegia.

AQUILEGIA PLERVNQVE IN HORTIS APVD NOS nascitur. Inuenitur tamen & in altissimis syluis, & collibus saxosis, necnon in petris & muris. Planta certe elegantissima. Folia eius prima Chelidonio maiori consimilia apparent, suntque illa circumquaque incisa, ac dissecta, humi strata. Iunio mense in caulem rotundum ac leuem, cubito altiore exilit. Is in fastigio florem gerit perpulchrum, duplici foliorum ordine stipatum, in quadam sua parte in corniculum inflexum desinit, non aliter quam Consolidæ regalis, & quæ Germanis Eisen hûrtlin/ de qua infra, cap. lxxxij. Flos præterea alijs candidus, alijs purpureus, uulgaris uero cæruleus est, campanulæ non dissimilis. Eo decedente capitula, quaternis uel quinis acuminibus coniunctis, haud secus atque Melanthij, oblongo, atque, ut eo nomine pulices referat, semine referta subnascuntur. Radix illi candida, prælonga, nonnunquam digitum crassa, fibris capillata. Gustu tam radix quam herba, flores & semen, ad dulcedinem quandam uergunt.

NOMENCLATURAE.

Ego in ea sum sententia, ut Aquilegiam nostram Centaureum Germanicum esse censeam, non tamen illud quod Diosco. lib. iij. cap. vi. describit, quodque

Aquilegia.
Aglicblumen.



quodq; alijs Narcen, alijs
 Limnession, Maronem, nō
 nullis Plectroniam, alijs
 Chironiam, alijs Limne/
 fim, magis Herculis san/
 guinem, Romanis Phieri,
 & Vnferam, & fel terræ
 nuncupari tradit. Quancq;
 & Gentiana, radix Centau/
 ri, Aloe Gallica, Narce, chi/
 ronion, Aloitis, Cicendia,
 & Ciminalis, ab eodem li/
 bro iij. cap. iij. nominetur
 Est autem *à vâpux* apud eun/
 dem Dioscoridem lib. ij.
 cap. xv Torpedo piscium.
 Neq; hoc prætereundum,
 uerum *à vâpux* *à pandionis*, Crocū
 esse quemadmodum libro
 i. cap. xxv testatur Diosco/
 rides. Apuleius cap. xxxiij
 Centaureum maius sequen/
 tibus insignit appellationi/
 bus, Pelethronia, Limnites
 Limnestis, Apogorisapo,
 Polytidios, Hemerotos,
 Antiamas, & Fel terræ, qd
 nomen ad Centaureum mi/
 nus proprie pertinet. Idem
 Author Enulam quoq; Pa/
 nacen, Centaurion uocat
 cap. xcv. Serapioni capite
 cccij. Centaureum maius
 kanturion, kibir dicitur.
 Autor libelli de Centaurca,
 maiorem Centaurcam soli

dam dici affirmat. Porro quæ Germanis *Ucfelei* & *Agtei* (quancq; ego Cen/
 taureum Germanicum esse puto,) ca neotericis *Aquilegia*, *Alkaleia* *Vsi*, &
Osir appellatur. Quidam eam *Aegilopa* Dioscoridis lib. iij. cap. cccxiiij.

esse autumant, sed decipiuntur illi, totoq; coelo aberrant.

Quod ad Rhaponticam radicem attinet, non desunt inter doctos, qui Centaurium maius esse assererent (vide Antonium Musam) quod si ira est, nobis quoq; Germanis in altissimis Helueticæ alpibus, maxime uero in montanis Sedunorum, nobilissima illa ac decantatissima radix prouenit. Eius historiam Antonius Musa diligentissime descripsit. Quod si uero quis quærat, cur Aquilegiam nostram Centaurium appellem, eum uicissim ego interrogabo, quare Dioscorides Hyoscyamum, Rhaponticum, & Gentianā Centaurium uocauerit.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Aquilegia tametsi nobilissima sit plāta, tamen apud doctissimos usu fere abdicata est, sed iniuria, nam temperamentum habet mediocriter calidum, ideoq; ad multa utilissima est planta.

Sed Rhapontica radix ex calefacientium & astringentium est ordine.

INTRINSECVS.

Rhapontica radix, quæ hodie Centauria maior censetur, uino decocta, & pota ruptis, conuulsis, & ex alto delapsis medetur. Suspiriosis & hydropicis eodem modo sumpta prodest, affectibus pulmonis succurrit, nec non pleuriticis. Sanguinem excreantibus auxiliatur, omniaq; interna uulnera persanant. Quod si his morbis, febris coniuncta sit, in aqua cui zaccarum adiectū fuerit, radix decoqui debet.

Radix desiccata, inq; puluerem redacta, & drachmæ pondere è uino bibita, tormina sedat, tam uiris quam mulieribus.

At Aquilegiæ semen tusum, ac pondere drachmæ cum Croconummi pondere è uino bibitum, præstantissimū est medicamentum aduersus morbum Regium, experientia certa id attestante, si postquā sumpseris, in lectum te composueris, probe contectum, ac sudorem eliceris. Eodem modo usurpatum meatus iocinoris obstructos, unde multæ ægritudines oriuntur, aperit.

Aqua florum Aquilegiæ distillata, pota, eadem efficit, præstatq; leuamentum aduersus Syncopen, Abscessus proinde internos discutit, uenicum qd uis expellit ac tormina mitigat.

EXTRINSECVS.

Succus Rhaponticæ radice sicut et herbæ miram habet uulnera glutinandi uim, si cum illo colluantur, atq; is etiam dein imponatur. Quod uerum esse inde facile probari potest, quia cum carne decocta, uniuersa eius frusta in unum coire facit.

Pellari/

Pessarium hoc succo madefactum, locisq; muliebribus subditum, menses & mortuos foetus euocat.

Succus & aqua distillata, dolores capitis punctorios illitu finiunt. Idem succus aceto permixtus capitiq; salsa aqua prius abluto, illitus, furfures tollit.

Caligini oculorum succus idem optulatur. Auribus quoque affectis instillatus remedio est, uermesq; & pulices ibi latentes enecat. Naribus inditus, fistulis medetur, alijsq; malignis ulceribus, nec non oris exulcerationibus si ex illo colluantur. Liuentia, lichenasq; tollit, inflammationesq; omnes ueteres dissipat succus, illitu. Idem de radice uino albo ultra dimidias decocta, si linteo in ea decoctione madefactis imponatur, tibi pollicere.

Plura Centauriae maioris iuuamenta si cognoscere cupis, uide libellum de ea conscriptum.

De Centauria minore. Cap. XLIII.

CENTAVRIAE MAIORIS EXPLICATA HISTORIA,
C de minore deinceps agendum uidetur. Est uero Centaurium minus herba caul recto, palmum excedente, flore in summo ramulorum ex puniceo in purpuram uergente, quo decusso siliquæ exiguae, nec auenæ grani magnitudinem superantes, farina loco seminis (nam an ea sit semen eius, ex quo nasci possit Centaurium, mihi quidem minime constat, tamen si non semel illud terræ mandarim, sed frustra, qui sit, ut ex singulari quadam humiditate, cœlestiq; inclinatione, Centaurium e terra proflire iudicem) refertæ, subnascuntur. Folia habet primum humi sparsa, ut stelulam quandam exprimat figura, ipsamq; uulgarem Pilosellam, aut Anagallida prorsus imitentur, insuper & cineracea. Sub initia Iunii, in coliculusum dodrantalem assurgit. Radicem habet exiguam, unicam, tenuem, perbreuem, rectam, lignosam, ac in medicina inefficacem, prorsusq; inutilem. De loco natali contraheritur, ueteres namq; rei herbariæ scriptores illam secus fontes, & propter lacus nasci, & rigua amare loca, ideoq; Limnion uocaram tradunt. Rursus manifestum est hodie in Germania illam rarissime in humectis locis, quin frequentissime, ac ubertim in graminosis agris ac aridis nonnunquam herbaq; destitutis campis prouenire.

NOMENCLATURAÆ.

Quæ Germanis *Sausent gulden*/ea Latinis Centauria Plinio lib. xxv, cap. vi, Fel terræ, Exacon dicitur, Dioscorides lib. iij. cap. vii. *αἰνιόριον*.
αἰνιόριον.

Centaurium minus.

Dausent gulden.



Serap. cap. 101.

Λαγύριον, Helleboriten, Amaran-
 ton, Herculis sangui-
 nem, Febrifugiam, Aurā,
 Multiradicem & Tulbe-
 lam nominat. Quod autē
 Dioscorides Centauream
 minorem, multiradicem
 appellet, mirari satis non
 possum, cum ex unica tan-
 tum radícula singuli Cen-
 taurij fruticuli exsiliant,
 quare ea appellatio uel in
 caput xlvj. lib. iij. aut cer-
 te in caput cvij. eiusdem li-
 bri apud Dioscoridem cō-
 iicienda erit. Rursus neq;
 Amaranti nomen huic her-
 bae quadrat, cum enim a
 diutina duratione tractum
 sit, tribuendum potius He-
 liochryso, & Chrysoco-
 mae, quae non ita cito ta-
 bescunt. Vide Dioscoridē
 lib. iij. cap. liij. lv. Febrifu-
 gae deniq; uox matricariae,
 Germanis Metter/ā non
 nullis ascribitur, cum et Di-
 oscorides lib. iij. ca. cxxvij
 eam Conyzae quoque at-
 tribuat. Apul. cap. xxxv.
 Centaureum a Dacis Stir-
 fozila uocari ait. Serapio-
 ni, Kauturion Sege Segir.
 Qui de Centaurea libellū
 conscripsit, Limuscum quo-
 que uocari affirmat.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Magni ac frequentis usus est, Centauriū quantumuis amarum, nec inlu-
 ria

ria quidem, cum discutiendi, educendiq; crassas pituitosas, & cholericas humiditates, facultatem obtinet, temperamento suo calidum & siccum existens, utrinq; corpori humano utilissimum.

INTRINSECVS.

Manipulus herbæ Centaurij una cum floribus, dimidia mensura uini albi, uel aquæ ad dimidias decoctus ac potus, bilem, crassosq; humores per aluum exigit.

Qua de causa utilissima est hæc decoctio, ijs, qui morbo regio, continuisq; febribus laborant.

Eadem potio uesper ac mane per aliquot dies sumpta, iecoris, lienisq; obstructions soluit, omnia corporis uitia expellit, tineas uentris enecat, menses, foetusq; mortuos euocat. Eodem modo usurpata tormina, choliam passionem, aliasq; uentris affectiones perfanat, maxime eas cum quibus nulla est coniuncta alui astrictio.

Aquæ ex herba & floribus faciliior usus, sed non perinde efficax, quare delicatiorum ac puerorum esto remedium, qui lubricis infestantur, quos si commode pellere uelint, singulis uicibus mensura trium uel quatuor cochlearium haurient illam.

Quidam herbam in puluerem redactam è uino ad omnia ea quæ diximus bibunt, nonnulli pillulas conficiunt ex ea, quæ quidem Ischiadicis, neruorum uitijs, & podagris adhiberi possunt. Quin & clysteribus haud inuoliter adijcitur.

EXTRINSECVS.


Succus herbæ expressus cum melle, oculis caligantibus in collyrijs illinitur efficaciter. Idem in pello mulieribus subditus, menses, & secundinas trahit, inueterata purgat ulcera, si cum illo abluantur, & cicatrice obducit, idq; non cunctanter.

Recens Centaurij herba tusa, ac cataplasmatibus modo imposita, uulnera glutinat, citoq; perfanat.

Veteres Centaurij succum expressum soli, donec crassesceret, exposuerunt, eoq; ad affectiones quas enumerauimus postea usi sunt. Alij tamen succum eum hoc modo conficiunt, legitur, cum semine prægnans est, & diebus quinque aqua macerata decoquitur, ultra dimidias, mox ubi refrigitur linteolo exprimitur, herbaq; detracta rursus coquitur usque dum mellis crassitudinem consequatur. Pari ratione de omnibus herbis & floribus, succus excipi, confici, & conseruari, teste Dioscoride poterit.

De Caltha Vergilij, Germanis Dotter blümen
dicta. CAP XLIII.

Caltha primum
genus.



EX PLANTIS

quæ in capitulis semen cō-
clusum habent, illa quoq;
est, quæ uerno tempore in
humectis pratis, & ad fon-
tes prouenit, Germanis
Dotterblüm dicta. Folijs
ea uestitur herbaceis, rotun-
dis, & forma ab Asaro nō
abluentibus, per terram
sparsis, leuiter serratis. In
caulem dodrantalem, te-
recem excrescit, ramulis
brachiatū, culmi magnitu-
dine præditum, qui in fasti-
gijs rotunda gerunt capitula,
magnitudine Pisum æ-
quantia, ex quibus cum
rumpuntur, flosculi luteo-
li, instar Ranunculi, at pau-
lo maiores & elegantiores
prodeunt. His deciden-
tibus alia capitula, caules
& surculi proferunt, sed ob
longa, ternis uel quater-
nis discriminata diuisioni-
bus ueluti Aquilegia, semi-
ne flauo, milioq; magis ex-
guo prægnantia. Radix illi
multis alijs adnatis radicu-
lis contorta & implicata,
digitum crassa, crebrisq; fi-
bris capillata, instar Helle-
bori albi. Sapor herbæ, flo-

rum radictisq; idem est qui & olerum, unde existimo, posse illam oleribus
culinarijs in cibo adiungi.

Alterum genus caule & flore præcedenti similitimum est, sed magis exiguum, nec perinde luteum ac illud. Folia gerit leuiter dissecta, in modum *Ræ* ^{2.} *Calthæ* alterum nunculi. Herba gustu quandam præ se fert acrimoniam. Præcis similitur genus gaudet humectis,

NOMENCLATURAE.

Hunc florē sæpenumero *Dotterblumen* & *Bäl wisen blümen* ac *Gelbe blümen*/propter colorem nimirum quo nitet, & *Noßblümen* ac *Matten blümen*, quod frequenter in humidis pratis inueniatur, appellari audiui. Latinum quodnam habeat nomen ignorare me fateor, tamen si cum flos sit vulgaris, *Caltham* uocari posse puto cuius in *Alexi* his uerbis meminit *Vergilius*. *Mollia luteola pingit uaccinia caltha*. Sed quid de uera sentiam *Caltha* suo loco dicitur.

Caltha Vergilij.
Chrysanthemum
Democriti.

Alterum genus non male *Chrysanthemo* *Democriti* respondet, sed & de uero *Chrysanthemo* postea.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Pueri maxime his floribus gaudent. Neque hodie in *Medicina* ullum usum habent.

De Belli maiore Barbari.

CAP. XLV.

VO ISTIVS PLANTAE GENERA IN AGRIS NO. *Belli maior* *Bar*
D *fris* uisuntur, quorum alterum luteis plane floribus, formamque *bari*, oculi magni, referentibus emicat, alterum uero flores luteos in star capitis, foliolis candidis illos cingentibus, non secus atque cilijs oculi ambiuntur, gerit. Vtraque tenuem habet caulem, folijs teneris ac mollibus, sed in priore pinguioribus, ac aliquantulum serratis, *Senecionis*que herbæ quadam tenus similibus. Radix illis multis capillamentis fibrata, qualis & *Tanacetum* est. Sub finem *Maij*, & *Iunio* mense in graminosis agris proueniunt, quam ab eo tempore inde usque ad initia *Novembris*, non raro reperiuntur, maxime uero ea, cuius flores albis foliolis circumdatos esse docuimus, quæ & aridioribus pratis plurimum gaudet.

Lutea autem dumtaxat in aruis inter aenæ & tritici segetes, peculiare mundem uicium, nascitur. Vnde satis demonstrari potest, hanc ipsam plantam non esse (ut multi putarunt) congenerem illi, quam præcedente statim capite depinximus.

NOMEN

Bellismaior Barbari.

Kalbs aug.

NOMENCLATVRÆ.



Germani Gänß blüm,
Moguntinenses Sanct Jo-
hans blüm, hoc est, florem
S. Ioannis uocant, quia cir-
ca festum Ioannis Baptistæ
erumpat, Metensibus, Tre-
uirenſibus ac Spirenſibus,
Kalbs aug/hoc est vituli/
nus oculus dicitur, idque
haud iniuria, cum buphtal-
mus sit, sed non is, de quo
Dioskorides libro iij. capite
cxlvj, & nos infra capite
xlviij. Cum uero non satis
mihi constet, quonam præ-
sens planta collocanda sit,
libet interea dum commo-
dius nomen emergat, cum
doctissimo uiro Hermolao
Barbaro, Bellium maio-
rem illam appellare,

PROinde cum de Tem-
peramento ac uiribus eius
nihil certi habeam, eam
prouinciam alteri deman-
dabo. Volui tamen eam
Calthæ de qua adhuc sub
iudice lis est, ob hanc ipsam
causam subijcere.

De Caleno

De Calendula, Germanis Ringel blümen.
CAP. XLVI.



C **CALENDULAM NOXIAM ESSE PLANTAM PLER-**
que putauerunt, quam obrem nos quoq; breuiter illam pestrin-
K

genus. Est itaq; Calendula, herba fruticosa, caule binos palmos seu cubitos, interdum alto, radice candida & recta, quemadmodum Leucoion, cuius folia etiam imitatur, nisi quod illa in Calendula aliquantum longiora, latiora, & magis herbacea sunt. Frutex unicaulis est, sed furculosus, instar arbusculæ ramosæ, in cuius fastigijs globuli quidam protuberant, qui folliculos lini uirides referunt, quibus croceus erumpit flos, odoris grauis, at non ingrati. Quo decidente capitulum, Monachi caput exprimens, relinquitur, atq; id est semen eius, quod si discerpseris singula semina inflexa præ segminibus unguum, uel unguiculis auicularum similia apparent. Porro semen intus candidum, & dulce est. Maio mense flōret, quo in statu usq; in rigidam hyemem perdurat, quamobrem non inepte Calendula uocari potest.

NOMENCLATURAÆ.

Germani non solum ob floris, sed & seminis in circulum acti figuram, Calendulam, Ringel blumen appellant. Recentiores rei herbariæ scriptores Calendulam, Caltham, & Calthulam, nonnulli etiam caput monachi, ea de causa, quam in descriptione herbæ attingimus, uocant. Hermolaus Barbarus uir doctissimus scribit se quondam uidisse in Dioscoride peruetusto depictum Leontopodium, eamq; picturam cum Calendula cōuenire, unde eā Leontopodiū esse affirmat. Manardus aliquandiu alterius fuit sententię, putauit enim illam esse Lyfimachium Dios. Iacobus Manlius herbam blancam uocat. Matheus Syluaticus, uir alioqui optimus, putauit eam esse herbam Paralyfin, uel Primulam ueris, asserens illi nomen esse Charamos. Alij Heliotropion, Sponsam solis, Solsequium, seu Verrucariam appellat, atq; hi quidem maiori in errore uersantur. Hactenus aliorum de nominibus Calendulæ sententias recitauimus, superest ut & nostram proferamus, quæ si à ueritate & ipsa aberrauerit, uenia tamen dignam esse arbitror, posteaquam uel doctissimi quicq; sæpenumero in re tam obscura & dubia hæsitauerunt. Calendulam igitur à Dioscoride lib. iij. cap. cxxix. descriptam, & Catanances alterum genus esse existimo. Sed nomenclaturas eo loco propositas promōre recensebo, *καταναγνη*, Damnamete, Dionysias (quæ uox Androsæmo quoq; lib. iij. ca. clxiiij. à Dioscoride tribuitur) *δίσκορον* (quo nomine & Thymus appellatur, uide Dioscoridem lib. iij. cap. xxxix) Demos, Cemos, Crotion, Archaras, Archopus, Herba filicula (qua appellatione & Polipodion, lib. iij. cap. cxxx. insignitur) Datisca, & Caropithla.

VIRE S AC TEMPERAMENTVM.

Calendula calidam siccamq; habet naturam, qui sit ut in medicinararo usurpetur.

usurpetur. Sin uero ea uti contingat, hoc in externis potius corporis partibus fit. Ad amorum ueneficia, & superstitiones his floribus utuntur nonnullæ mulierculæ.

EXTRINSECVS.

Aqua ex floribus Calendulæ distillata, præsentaneum adeoq; expertum remedium præstat oculorum rubori & inflammationi instillata, mane uespereq; uel si linteola in illa madefacta oculis imponantur.

Flores in puluerem redacti, inq; uellere dentibus inditi, dolorem illorū sedant.

Flos perinde, atq; ipsa herba, secundas educit mirifice, si aridus suffitibus admotus fuerit.

De Chamomillis. Cap. XLVII.

C HAMOMILLÆ CANDIDÆ ORBICVLIS AVREIS, siue ocellis in medio præditæ, quatuor in Germania nascuntur genera, quorum duo odorata, unum foetidum, aliud postremo omnis odoris expers est.

1.
Parthenium
nobile.

Nobilissima ex his, siue recens, siue arida fuerit, iucundissimum spirat odorem, non secus atq; malum probe maturum & odoratissimum. Forma sua ante florem Millefolium exprimit, cum uero floret, Cotulæ quam Germani Krotten dyll dicunt similima existit, per terram sparsa procumbit, ac facillime ubicunq; humum attigerit, radicitur, haud aliter quam Serpyllū, quare è surculis decerptis sine negotio plantari potest. Radices habet candidas & capillatas. Hæc Iunio mense appetente in coliculos assurgit, haud temere palinum excedentes, tenues, in quorum fastigijs flores stellati, partim candidi, partim lutei, uulgari Chamomillæ quam maxime similes emicant, nam intus aurei sunt, forinsecus uero orbiculato ambitu candidi. Gustu admodum amara est hæc Chamomilla, haud aliter quam Absinthium, seu Matricaria, frigoris & hyemis quantumuis duræ contemptrix. In muris, sepibusq; & alijs quibusdam locis prouenit. Cæterum cœpit illa iam pridem Bipontij, Hornbachij, & Sebusij passim plantari. Mihi uero primum omnium a quodam bono uiro, qui illam ex agro Metensi, ubi in hortis, ob iucundum odorem, serî consueuit, secum adportauerat, communicata fuit.

2
Cotula foetida.
Altera Chamomilla, quæ grauiter olet, meo quidē iudicio, iā dictæ syluestre est genus. Sunt namq; forma penecōsumiles, nisi qd Cotula (ut uulgo uocant) foetida, admodum male olet, alteraq; procerior & grandior eua-

Chamomilla vulgaris.
Camillen.

3.
Chamomilla
vulgaris.

4.
Chamomilla
fatua.

Miraculum
natura.



dit. Nascitur hæc plerunq;
inter fruges.

Tertia, eademq; uulgaris. Chamomilla, alsiosa est planta, nam quotannis ex semine deciduo, quod Tanaceto simile est, repululascit. Bis in anno floret, Vere scilicet inter segetes, et Autumno in agris rapitijs. Folia huius teneriora, & magis laciniata, & ad uiriditatem nigricantem uergentia.

Quarta iā dictæ adeo cōsimilis est, ut solo odore animaduerso, discerni possint. Hæc enim posterior plane inodora existit. Ad sepes plerunq;, & in quibusdam agris nascitur. Proinde pereunte huius (quod de proxima similiter intelligi uolumus) flore, & caulis, una cum radice emoritur, demumq; ex semine reuiuiscit. His itaq; explicatis ad nomēclaturas accedemus, ubi prius naturæ miraculū quod in binis his posterioribus Chamomillæ generibus contingit, & à Plinio animaduersum, ac literis mandatū est; lib. uidelicet xxi. cap. xvij. annotauimus. Mira & Anthemidis

(inquit) natura, quod à summo florere incipit, cum cæteræ omnes, quæ particulatim florent, ab ima parte sui incipiant. Hæc ille. Sola itaq; Anthemis, & Pyrethrum apertas habet internas floris partes, quibus foliola deinceps adnascuntur.

Parthenium, nobilis Chamomilla.
Die Edel Chamill.



adnascuntur, cum ceteræ
rosæ, flores, & lilia antequā
floreant, uasculis inclusa cō
tineantur. Atq; hæc hæcte
nus.

NOMENCLATVRAE.

Prior Chamomilla, uel Parthenion Ge
rum ac nobile est *πάρθενιον*, manis edel Cho
Dioscoride lib. iij. cap. mill,

cxlvi. descriptum. Odore

etenim mali esse Partheniō

à Celfo Perdicium, & mu

ralium, ab alijs uero, Leu

canthem, & Tamnachum

appellatum Plinius testa

tur lib. xxi. cap. xxxi. No

stram sententiam Galenus

etiam confirmare uidetur,

cum lib. vi. de simp. medi.

Facul. Parthenij appellatio

nem ad Helxinem refert,

quam & Sideritim & Hera

cliam alijs nuncupari tra

dit. Atqui Heracliae appel

latio pluribus alijs plantis

attribuitur in Dioscoride,

quem uide lib. iij. cap. viij.

xxvi. xxix. l. & lib. iij. capi

tibus. xxxiij. clxvi. xxxviij.

liij. lxxv. Quæ omnia eo

mihî commemorata sunt,

ut intelligatur non minus

Parthenij nomenclaturam

multis herbis, ut supra cap.

Perdicij & mu
ralij appellation
es ad parietari
am proprie spe
ctant.

Helxines uox ad
parietariam uo
rius pertinet.

Diosco. lib. 2.

cap. 176.

xxviij attigimus, & infra l. dicitur, ascribi, quam ipsius Heracliae. Parthe
nion Dioscoride teste, alijs Amaracon, alijs Anthemida, alijs Leucanthemon, latio proprie ad
alijs Chamæmelon, alijs Chrysocatin, alijs Melabathron, nonnulli Campe

Maio ranam per
tinet.

K iij

strem florem, Romani solis seculum, aliqui Millefolium, Hetrusci cautam, Aphri thamath. Quodq; ad has appellationes attinet, tribuuntur & ipsæ alijs stirpibus, ut uerissime dicas, multa nomina multorum errorum sæpe numero esse causas: Nam Anthemis nomen duabus alijs communicatū est, uide Dioscoridem lib. iij. cap. cxliij. & cap. cxlv. ut idem de Millefolio, alijsq; nominibus, quæ nihil attinet hic ad longum repetere sentias.

Altera Chamomilla quæ grauiter olet, latine Cotula, Cauta uel Chamomilla foetida, Cynobotane, Cynanthemis, Germanis Brotten dyll/hunde dyll/uocatur, fieriq; potest, ut ista Chamomilla seu Cotula Thalictrum sit Diosco. lib. iij. cap. xcij. Neque enim est Parthenium, ut multi putarunt.

Θάλλιστος

Anthemis, Germanice Chamomillen.

Tertia uulgaris, seu agrestis Chamomilla Dioscoridi lib. iij. cap. cxlv. *ἀνθῆμις*, Theophrasto uero Anthemon appellatur. Atq; hanc ego, uerum Leucanthemon, seu Melanthemon, Plinij lib. xxij. cap. xxi. esse existimo. Estq; hæc altera odorata Chamomilla quam Dioscorides loco citato *ἀνθῆμις*, Callian, Chrysocomen et *χρυσάνθεμον*, appellat.

Quarta Chamomilla, quia odore prorsus destituta à reliquis quasi degenerat, Chamomilla fatua, insipida, non odorata, Cotula non foetida, uocari potest. Hæc postrema Chamomilla mihi plane ea uidetur esse, quam Dioscorides lib. iij. cap. lvi. *χρυσάνθεμον*, uocat, cuius plura alia nomina eodē loco uide, simul & Ruellium lib. iij. cap. cij.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Hortensis uera & satia Chamomilla, ea nempe quæ odoratissima est, et Parthenion uocatur, cæteris longe præstat. Secundum locum uulgaris Chamomilla occupat. Hæc binæ Chamomillæ calidam & siccam habent temperaturam, discutiendi, extenuandi, doloresq; sedandi facultate præditæ.

INTRINSECVS.

Chamomillæ odoratæ, flores cum herba decocti in uino & poti, iocundis & lienis obstructions soluunt, bilem suffusam purgant, menstrua pellunt, aduersus ilei tormenta auxiliantur, renum, uesicæ uitia sanant, & matricis internos dolores leniunt. Eodem modo sumpti, pulmonis apostemas sanant, suspiriosis profunt, renum calculum propellunt, alui fluxum, quæ Lienteriam uocant, Chamomillæ cohibent, stomachum frigidum excalesciunt, multosq; internos dolores auferunt.

Eadem omnia efficit aqua Chamomillæ florum distillata. Puerperis uero primo loco posita in primis utilis est, nam per eam efficaciter purgantur.

Qui.

Qui morbo comitiali continuo uexantur, hīs flores Chamomillæ aceto & melle decocti, propinari in potu debent, quo si usi fuerint, statim confurgunt, morboq; per aliquot tempus liberantur.

EXTRINSECV

Non est uisitatior in medicina ulla planta apud omnes homines, quam Chamomilla, nam uulgu eam ad quosuis morbos adhibere solet.

Flores Chamomillæ aqua decocti, cum oleo Chamomelino clysteribus utiliter adiunguntur, Nam quosuis dolores sedant, renum, matricis, iliorū, & uesicæ. Quare ex his aduersus uteri affectiones, fomenta, deflectiones, & sacculi recte conficiuntur, Breuiter utilissimi sunt hi flores, emolliendi, et menses impeditos euocandi uim magnam habent.

Chamomillæ odor, aqua eiusdem stillatitia, necnon lixiuium in quo illa decocta fuerit, debilitati capitis & cerebri conferunt.

Decoctio Chamomillæ, inueteratis malignis ulceribus lauandis utilissima est.

Oleum ex Chamomillæ floribus confectum, ad multa facit, induratos enim tumores & collectiones emollit, ac detumescere facit, doloresq; mitigat. In summa nemo omnes Chamomillæ uires facile explicuerit.

Cotulæ autem foetidæ decoctio, non aliter quam Castoreum, contra præfocationem uteri, in essu, fomentationibus ac odoratu, saluberrima est.

Cotula foetida rufa & emplastri instar uulneribus imposita, illa conglutinat, ac per sanat.

De Buphthalmo, qui Germanis Streichblumen

dicitur. CAP. XLVIII.

ANC STIRPEM IN AGRO VORMACIENSI, PROPE oppidum Alzei / in altis ac petrosis agris, qui per aliquot annos inculti iacent, primum reperi. Solent autem mulierculæ illam, cum in flore optimo fuerit, Iunio mense colligere, siccare, & ad usus quotidianos recondere. Estq; hæc planta tota sua substantia uulgari Chamomillæ consimilis, nisi quod radices, caules, folia, & flores habet crassiores, proceriores, latiores. Folia ad cineraceum colorem uergunt, Tanacetum similia, sed minutoribus incisuris dissecta. Florē gerit in ambitu, per

Bupthalmus, Germanis.
Streich blumen.



Est et aliud her-
 ba genus, quo li-
 nimenta lectorū
 tingere solent
 mulieres, sed de
 illo suo in loco.

Siphium.
Diosco. lib. 3.
cap. 147.

pulchris foliolis orna-
 tum, ueluti Bupthalmus,
 cuius supra meminimus,
 eosq; intus & foris aurei co-
 loris, non aliter atque Cy-
 donia mala. Folia & flores
 huius plantæ iucundo com-
 mendantur odore, & Ar-
 temisiā rubram dum flo-
 ret, uel Achilleam æmulan-
 tur.

NOMENCLATURAE.

His floribus utuntur mu-
 lierculae ad linimenta sua,
 quibus lectos illiniunt, qua
 ratione croco parcunt. Ea
 etiam de causa solent hanc
 plantam patria uoce *Stein*
blumen / Streich / oder
Sterckblumen appellare,
 neq; ego aliud potui extor-
 quere nomen: nostræ enim
 officinae, cum ne rem ipsam
 quidem cognitam habeāt,
 quo pacto appellationem
 eius nos docerent? Quam
 uero in Dioscoride no-
 menclaturam habeat, facile
 intelliget, qui flores, caulē,
 folia & radicem huius pres-
 sius considerauerit, cumq;
 Bupthalmo Dioscoridis
 cōtulerit. Est itaq; hæc plan-

ta, non *Eranthemum* Hippocratis, ut multi putant, sed potius *Bupthalmus*
Dioscoridis uerus, quem ille *Balsamenam*, *Hæmorrhā*, *Mercurij* genitū-
 ram, *Aphitis* semen, aut *Mnesitheum*, *Cappacoraniā*, & *Narat*, necnon
Cachlan.

Cachlam cognominari tradit. Serapio Bichar uocat, capite. clviij.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Buphthalmus calidum fere & siccum obtinet temperamentum. Vires illius partim sub Chamomilla odorata descriptæ sunt, partim nunc explicabuntur.

INTRINSECVS.

Flores Buphthalmi, uino decocti, interaneorum animalia pellunt, dolores uentris mitigant, potu. Reliqua sub Chamomilla uulgari, require iuuenta. Dioscorides & Serapio aiunt flores hoc uino decoctos, à balneo statim per aliquot tempus potos, suffusis felle coloris bonitatem reddere. Proinde hæc potio uomitum prouocat.

Sed antequam ad alia transeamus, placet experimentum de hoc frutice adferre in medium, si forte Buphthalmus iste sicut & Parthenium meum hoc pacto innotesceret. Vfus sum itaq; hac herba in uino decocta aduersus inueteratam fellis suffusionem, potu illam decoctionem calidam, hoc morbo laborantibus tanquam concoquens & discutiens remedium exhibui, ceratq; deprehendi eam extenuandi, discutiendiq; & educendi citra dolorem, & periculum, ui præditam.

EXTRINSECVS.

Habent hi flores omnes facultates odoratæ Chamomillæ, possuntq; loco florum Absinthij usurpari. Eosdē cum cerato tritos, tumores, duritiasq; discutere, auctor est Dioscorides.

De Flore tinctorio, Germanice Schartenkrant appellato. CAP. XLIX.

QUAM MODO PRÆ MANIBVS HABEMVS PLANTAM, ea in tractu Rheni, in quibusdam pratis, Iuniperorumq; nonnullis colliculis, ac montibus prouenit. Iulio & Augusto mensibus legitur, posteaque uenundatur. Caulem habet purpureum, tenuem, folia instar falcis plurimum dissecta, & calycibus squarosis instar florum Cyani, sed maiorem prodeuntem. Sunt autem istius plantæ, si penitus rem consideremus, quatuor genera, quæ ordine recensēbimus.

Primum itaq; & nobilissimum caulem habet purpureū, ex radice recta, modicēq; fibrata, cubitalem, herbaq; lanuginosa, partim incana, partim nigricante, primum Cichoreo minori non absimili, uestitū, binis, ternis, aut quaternis flosculis (quorū orbiculi foliolis purpureis cinguntur,) ipsq; radiatis, & maturi mali odore præditis, rutilantem.

Tinctorius flos.
Sparten traut.



Alterum iam commemorato haud ab simile, sed per omnia magis extenuatum, (ut ita dicam) & nigricantius, flore uero lanuginoso, qui si praematurus fuerit, decidit sua sponte, ac instar florum Hieraciorum in auras euanescit.

Tertium primo per omnia respondet, nisi quod florem profert prorsus luteū. Nascitur in petrosis collibus, & locis montanis.

Quarta huius generis planta, alio referri potest, nam odore Absinthium se re æmulat, folijs cineraceis, dissectis atq; incis, non secus atq; Artemisia, seu Absinthium. Florem fere radiatum, totumq; similiter luteum. Nascitur in altis ac incultis locis, caule cubitali. Quod uero istam stirpem praedictis annuerai, in causa fuit quod nō solum flore esset stellato, sed & quia forma, ac odore cū illa conueniret. Neq; etiam quisquam erat, qui nomen illius me edoceret. Sed iudici herbariae rei hoc quicquid est committo, si enim soli mihi iudicium permitteretur, (id quod fieri nec

potest, nec debet,) hanc stirpem Absinthio adscerem. Non desunt autem qui eam ad Solidaginem Sarracenicam referant, quemadmodum dicitur.

NOMEN

NOMENCLATURAE.

Tinctores Spirentes, nec nō & vulgus patria uoce fruticem istū *Schärr* ten frant appellant. Sunt autem qui cam *Heidnisch wundkraut*, hoc est Solidaginē Sarracenicā, nominatam uelint. Ego primum illius genus terrā Chamomillæ, cuius nomina supra annotauimus, speciem esse iudico. Postremo loco descripta herba ad Absinthium seu Artemisiā ut diximus referri potest.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Tria huius herbæ genera eodē effectus cum Chamomillis, quas supra descripsimus, obtinent. Et de priori quidem ac purpurea Chamomilla ita scriptum reliquit Dioscorides lib. iij. cap. cxlv. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ florē fert purpureū, cuius amplitudo maiuscula est. Hanc proprie heranthemon uocant. Hæc ille.

Quæ uerba de primo huius nostræ plantæ genere intelligi debent, quod plerumq; in asperis montibus inter Iuniperos, & dumeta reperitur. Altera uero quæ in pratis nascitur, à Germanis *Schärr* dicta, quæq; tinctioribus tantum usui est, quo nomine apud autores rei herbariæ appelletur, mihi hodie nondum constat. Quare his relictis ad alia transeamus. Nam quæ proximis tribus capitibus disputata nobis sunt, ea ad Chamomillas pertinent, de quibus satis superq; dictum existimo. Nunc ad Matricariam nos conuertemus, quæ & ipsa haud postremum inter radiatos flores locum obtinet.

*De Matricaria.**Cap. L.*

D MVROS, ET SECVS SEPES MATRICARIA NASCITUR, uideturq; mihi genus esse Tanacetī potius quam Chamomillæ uel Artemisæ, ut multi putarunt, species. *Matricaria hōr* Vt uero ita *tenfis* sentirem, affinitas formæ & odoris, quæ Tanaceto cum Matricaria intercedit, me permouit.

Antequam in caulem & florem erumpat, folia habet dissecta sicut Coriandrum recens enatum, uiridis diluti. De una radice quæ fibris capillata multis adnatis radiculis implicata & contorta existit, sexpenumero quaterni uel quini exiliunt caules, nq; cubitales, in quorum sagittis flores frequentes intus melini, per ambitum albi, radiati, instar Belli illius cuius capite xlv supra meminimus, sed maiores, emicant. Odor illi grauis & ingratus, sapor uero amarus, qualis Absinthio est. Ex semine suo quod Tanacetī simile est,

Matricaria.
Metterkraut.

2.
Matricaria syl-
vestris.



le est, quotannis repullula-
 scit, hiemis contemptrix, li-
 cet uel sex annos nata sit, id
 quod Chamomillæ nō pos-
 sunt. Ex enim ubi deflorue-
 rint, protinus pereunt, sin-
 gulisq; annis ex semine deci-
 duo renascuntur, haud ali-
 ter quàm Cyanus.

Est & Matricariæ sylue-
 stre quoddam genus, quod
 in syluis cædus, quorum
 ligna ex ordine composi-
 ta incenduntur, ut ignis ca-
 lore terra sationi frugum
 idonea reddatur, Germani
 Brandtrödem uocant, flo-
 re intus & foris melino, qui
 postquā defloruerit in pape-
 pos instar Senecionis euane-
 scit, folio dissecto, cinerej co-
 loris, ut Artemisiæ simile
 appareat, prouenit.

NOMENCLATURÆ

Non satis mihi constat,
 quo nomine uulgaris hæc
 planta appellanda sit. Par-
 thenij enim appellationem,
 quæ à doctissimis quibusq;
 illi tribuitur, iam ante Cha-
 momillæ nostræ horten-
 si impertiti sumus. Sed ut cur
 que hæc schabeant, cum ali-
 is uocabo illam *nagelnap* Ma-

triciam, Germanice *Metter/Mütterkraut* und *Maidblumen*. Nectae-
 men prætereundum est, Galenum lib. vi simplicium Helxinæ alteri, Apu-
 leium uero cap. lxxxij & lxxxij Mercuriali ac Parietariæ, Parthenij nomen
 ascribere.

ascribere. Neq; etiam multum refert siue Parthenium, siue Artemissiam, illam uocaueris. Azenim eos, qui Linozostim & Parietariam, Parthenium appellant, rogatos uelim, ne eam nomenclationem, odoratæ meæ Chamo millæ, quæ per æstum & frigus incolumis perdurat, detrahant. Porro autem Matricaria Iacobo Manlio, Febrifuga, Autcennæ lib. ij. cap. 723. Vchu en. Serapioni ca. ccxliij. Achuen, Laurentio Phryfio in Synonimis, Amarrella, & Hebraice מולסה Molusa; Amaration, et Lāpuesia dicitur. Cordus existimat Matricariam, Amaracum; Galeni esse. Sit itaq; Matricaria Parthenium, uel Gauta nomine, tamen forma & temperamento, non Artemissiam tenuifoliam, (ut quidam sentiunt,) sed Tanacetigenus esse deprehendet, qui singula in utraq; stirpe penitus considerauerit. Et ut uno uerbo dicam, Parthenium Dioscoridis & Plinij, ac præsentem Matricariā, unam & eandem esse plantam sentio.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTUM.

Matricaria calidæ, siccæq; naturæ est, potestq; in medicina, non aliter q̃ Centauria, uel Absinthium & Tanacetum usurpari.

INTRINSECVS.

Parthenium aluum soluit; bilem & lentam pituitam per illam detrahitis, uentris tineas expellit intro sumptum, id quod & de herba, & de succo expresso intelligendum erit. Quare à prudentibus matronis comendari solet Matricaria: frigidioribus enim febricitantibus, & immundis mulieribus purgandis stillatitiā aquam, succum aut herbam in puluerem redactam exhibent.

Pecoribus etiam Matricariam desiccata cum sale uesperis, aduersus inflationes, & difficultatem spirandi, utiliter præbent mulierculæ ueterinarię.

EXTRINSECVS.

Valet decoctum ad insidendum in dñritia uuluarum, & inflammationibus.

Herba Matricariæ recens tusa, sacro igni & collectionibus, & uentris doloribus efficaciter illinitur. Reliqua, si qua sunt huius herbæ iuuamenta in Centauria, & Absinthio annotata reperies.

De

De Tanaceto.

Cap. LI

Tanacetum.

Reinsarn.



Tanacetum vulgare, luteum.

ETSI TANACETUM quod ad folia attinet, Filicem referat, tamen quia non solum partim ad Matricariam, partim vero ad Absinthium, seu Artemisiam pertinere uidetur, sed etiam radice, caule, folijs & odore, non usq; adeo Matricariae dissimile apparet, nisi quod illa grandior euadit, iucundiorq; odore aridet, propter has inquam causas, uolui post Matricariam illius historiam persequi.

Tanacetum è radice longelatèq; serpente, caule puniceo & multiplici, eoq; interdum bicubitali, ac in summo multis ramulis brachiato, profluit. Flores in fastigijs frequentes erumpunt, comantibus auri fulgore, nudis, foliolisq; carètibusbullis, qui quidem nodosus flos nihil aliud est quam ipsum herbe semen, id cum maturuerit, quod Iulio mense fieri consuevit, nigrescit, seminiq; Chamomillae non absimile, sed maius tamen & odore grauius, còspicendum se præbet. Marginibus ac litioribus aquarum nonnunquam

Tanacetum album, seu acutum.
Weisser oder spitzer Keinsarn.



nunquam in hortis ad se-
pes, & muros quosdam,
maxime autem incultis gra-
minosisq; locis nascitur.

Aliud porro extat *Tanacetum album*.
Tanacetum album.
nacetum, quod in pratis &
ripis fluuiorum reperitur.
Illud æque extenso, atq; alte-
rum, caule, & qui Cichore-
um fere æmuletur, sed non
perinde fruticoso, exurgit.
Folijs uestitur acutis, angu-
stis, per ambitum serratis,
angustifoliae Salicis simili-
bus, nec tamen adeo latis,
quin potius exiguas in alis
auicularum pinnas expri-
mentibus. Flos illi itidem
copiosus, candidus, ra-
diatus, Millefolio per om-
nia consimilis, cuius inter-
næ partes, quæ forma qui-
dem Matricariam, odore
uero Tanacetum referunt,
ex pallido albicant. Ex his
intelligi facile potest, folijs
maxime, bina hæc Tanace-
ti genera discernenda, radice
enim, & odore fere nihil
differunt, quanquam id
quod pinnata gerit folia,
non tam grauius olet, neq;
tam amaro gustu præditum
est, quam alterum.

NOMENCLATURAE.

Si temeritatem nostram (cuius enim criminis nos à quibusdam insinua-
lari

2.
*ισχυρὸν ἄλλο.
 Diosco. lib. 3.
 cap. 144.*

*Anthyllon her-
 bam Plinius lib.
 21. cap. 29. Anti-
 cellion quoq; uo-
 cat. Solastri uox
 Sideriti quoq; at-
 tribuitur, uide
 Dioscoridem
 lib 4. cap. 33.*

2+
*πράσιον ἄλλο.
 παραμυκή.*

lari non ignoramus) ueniam consequi posse considerem, non certe dubita-
 rem una cum Matricaria Tanacetum (quod Germani *Rein farn* & *wurm*
fraut, quod semen eius lumbricos pellat, appellant) sub Anthyllidis de-
 scriptionem referre, quoad doctissimus aliquis. ueram Anthyllida de-
 monstret. Quamquam non ita pridē audiui Anthyllida quibusdam Cha-
 mæpityn censeri. Quare quoscunq; commune factos uelim, ne nostra scripta
 ita legere uelint, quasi nunquam ab illis discessuri, ubi ueritas & ratio ipsa
 hoc postulare uideatur, neque enim in hoc à nobis eduntur. Nostram senten-
 tiam in medium afferimus, quæ si rationibus firmis & ueritate confirme-
 tur, recipiatur, sin aliter, sequatur quisq; quod libuerit, aut quod ueritati ma-
 gis consonum uideatur. Cæterum Anthyllida, alij teste Dioscoride An-
 thyllon, alij Anthemida, alij Eranthemin, alij Leucanthemon, alij Soratin,
 alij Campestrum florem, Romani Solastrum, nuncupant. Quidam uolunt
 Tanacetum Ambrosiam esse, quibus reclamationem Marcellus Vergilius, asse-
 rens nostro tempore Ambrosiam non reperiri. Iacobus Manlius Tanace-
 tum Danetam cognominari ait. Nec desunt qui Artemisiā, quæ Mono-
 clonos dicitur, Tanacetum esse statuunt.

Alterum Tanacetū genus quod albo emicat flore, instar coronæ, quo no-
 mine & quo loco à me habeatur, infra in Millefolij descriptione aperiam.
 Errant autē qui hanc stirpem ad Pyrethrum referūt. Posset uero illi descriptio
 Parmicæ apud Dioscoridem lib. ij. cap. cli. non inepte accommodari, ta-
 meti alij eam lib. iij. cap. xlvij. tractatam à Dioscoride existiment.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTVM.

Matricaria & Tanacetum eiusdem sunt temperamenti, nimirum calidi
 & sicci, eundem etiam fere in medicina usum habent.

INTRINSECVS.

Semine cum melle & uino potu uentris lumbricos pelli, eiusq; dolores
 sedari, sudorē deniq; elici, uulgo etiam dictitante manifestius est, quam ut
 indicari debeat.

Alia Tanacetū iuuamenta in capite superiori, & xlvij. require.

Alterum Tanacetum ad caput clx. libri primi nostrorum commentario-
 rum pertinet.

De

De *Primula Veris*. Cap. LII.

Maß lieben/ oder Zeitlosen.



AD RADIATOS,
 seu stellatos flores redeo, in
 ter quos haud postremum
 locum occupat, quæ uulgo
 primula Veris appellatur.
 Nas citur ea in humidis pra-
 tis, & humectis hortis, inue-
 niturq; per totum fere an-
 num, maxime autem Vere
 appetente. Radicem habet
 candidam, multis tenuissi-
 mis radiculis & capillamē-
 tis fibratam, qualis in Plan-
 tagine apparet, folia herba-
 cei coloris, mollia. Hæc, an-
 teq; floreat Primula Veris,
 humi stellæ modo radiata
 procumbunt, Pilosellæ lute-
 æ folijs paulo latiora;
 Cum florere incipit, primū
 omnium capitula uiridia
 quæ seminum lini recepta-
 cula referunt, tenuibus, ro-
 tundis coliculis, hisq; dodra-
 talibus suffulti in altū mit-
 tit, qui ubi aperti fatiscere
 coeperint, discum hō est
 mediam sui partē, quæ se in-
 star oculi habet, eamq; lute-
 am, non secus atq; Chamo-
 milla, exiguis albis, uel ex
 candido rubris foliolis in
 orbem cinctam ostentat, at-

que hic est eius flos, ex cuius media parte, quam luteam esse tradidimus, quæ
 & seminis uice huic stirpi est, cum prematura deciderit, sponte sua plantatur,
 ueluti uulgaris Chamomilla.

Quid autem cultus Mangonium in Primula Veris efficere possit, commemorare operæ precium duxi. Siquidem hodie uersicolores, & multiplici barbularum contextu stipatos, uti & in Ranunculo factum uidemus, puellæ inter coronarios, hos quoque flores plantare solent.

Quidam etenim ex his rubri, & multiplices, alij, simplices, quidam cando re emaculato, ac rursus uel simplici, ita tamen ut medium luteo colore emicet, uel multiplici barbularum stipatu conspicui. Postremo nonnulli ex albo & rubeo mixti, alij intus rubri in ambitu albi, itidemque uel simplices, uel multiplices spectantur.

Est & hoc in his floribus admiratione dignum, quod ubi in ualde humido loco diutius hæserint, nec alio transferantur, in uiridem plane colorem degenerant.

Quin & candidi flosculi, quæ nimirum qui multiplices cultura euadunt, nisi citius carpantur, ex se alios generant, ita ut sæpe ex uno capitulo, seu (ut ita loquar) cerebro primi floris, quatuor aut quinque alij erumpant, qua in re naturæ foelicitas & mirauis nobis commendatur.

*Miraculum
nature.*

NOMENCLATURAE.

Quo nomine appellata sit ueteribus hæc planta, mihi sane non constat, nec enim diuinando, nisi oraculo Delphico adiutus, assequi me posse confido. Sed interea utamur uulgaris appellationibus, quibus Plinio & Ruellio, Bellius & Bellis, alijs uero Primula ueris, Solidago, & auctori Pandectarum, Arthritica, (proculdubio propterea quod experientia docuerit, illam ad articulorum calidos affectus facere) Germanis *Maslieben*/Mediomatricibus autem *Zeit lößlin*, & Spirensibus *Masßßellen* dicitur.

VIRESCACITATE ET TEMPERAMENTVM.

Flores, herba & radix Primulæ utiliter utrinque usurpantur.

INTRINSECVS.

Aqua Primulæ distillata, iecur refrigerat, calores internos restinguit, reprimat cholera, pustulas linguæ ab ardore faucium profectas, orisque exulcerationes sanat potu.

Herba ipsa adhuc tenera cum sale oleo & aceto commanducata aluum astrictum laxat.

EXTRINSECVS.

Folia recentia, quibusuis calidioribus uulneribus imposita profunt.

Herba Primulæ tusa, tumoribusque genitalium imposita, calorem repellit, leniterque dolorem sedat.

Quidam & herba & floribus Primulæ, quibus Ebulum & Eupatorium adiungunt.

adiungunt, ad balnea sudatoria utuntur, atq; ea membrorum resolutioni, Græci Paralyſim uocant, mirifice conducere aſſerunt.

De Alifmate, Germanis Frauenkraut.

CAP. LIII.



MIRARI SATIS nequeo, qui factum fuerit, quod rei herbariæ antiqui ſcriptores huiusce ſtirpis nullam mentionē fecerint, præſertim cum non tantū paſſim in cœmiterijs, ac hortis à mulierculis plārataproueniat affatim, ſed etiam ſiue recens ſiue ſicca, odoratiſſima ſit, ſimulq; iucundiſſimum condimentum, quo menſe Maio præcipue, placentas Germani condimus, quas ex ouis & herbis conſtantes, & in ſartagine cum butyro frixas, patria uoce *Pſannküchen/oder eier küchen* appellamus. Quod itaque ad hiſtoriam eius attinet, paucis expediemus. Hæc primo vere cum ſupra humum ſe extollit, folijs Plantaginis lanceolatæ, per ambitum inſtar Betonicæ crenatis apparet. Radix illius multis capillamentis, & adnatis radiculis fibrata, cōtorta & implicata, nō ſecus atq; *Veratrum nigrum*, qđ Germanis *Chriſtwulzel* dicitur, per terram ſparſa ſe ſe propagat, odore grauī,

gustu ad amaritudinem quendam, uergente prædita, è qua Maio mense appropinquante quaterni, aut quini profiliunt caules bicubitales, ab imo usq; ad summum frequentibus & angustis folijs uestiti. Cæterum circa inferiores caulium partes numerosa, satisc; lata, & quæ Solidaginem (ut uocant) Sarracenicam, imitentur, folia, proueniunt. In fastigijs caulium flores seu capitula potius quædam nuda, floribus Tanacetii per omnia similia protuberant. Proinde, herba ipsa, caulis & flos huius plantæ odore suo Balsaminam quandam aut Mentham referunt, gustu uero Absinthium quoddam modo æmulantur.

Alterum quoddam illius genus fertur in syluis nasci, quod Plinius xxv libro cap. x. describit, mihi uero haudum cognitum.

NOMENCLATURAÆ.

*Ænopa Fræwen
Fraut. Dioscor.
lib. 3. cap. 160 Al
ceæ uox ad eam
propriæ plân-
tam pertinet,
quam Diosco. li.
3. cap. 155 descri-
bit. Damofonij
uox Halimo
quoq; attribui-
tur, uide Diosco
ridem li. 1. cap.
105.*

Quid in huius plantæ nomenclatura mihi uideatur, pronunciare non dubitabo, tamen in reprehensionem quorundam incidere sententiam meam non ambigā. Habemus itaq; præ manibus uerū Dioscoridis Alisma, qd ille quosdam Damafonion, alios Alceam, nonnullos Acyron, alios Lyron appellare tradit. Phrisio lingua Arabica Cazimbrium nominatur. Quod uero nonnulli Alismatis nomen ad Plantaginem aquaticam pertinere contendunt, nullam aliam rationem demonstrare possunt, quam quod Alisma ad loca aquosa prouenire dicatur. Nec desunt qui Fistulam pastoris, alij Bisfolium (quod aquaticæ plantagini quadantenus simile sit) Alismatis uoce appellandum censeant. Sed de his, maxime de Bisfolio suo dicitur loco.

VIRESC TEMPERAMENTVM.

Non sine causa, certe, à puellis odoratissima ista planta in hortis seritur, siquidem odore iucunda, uiribus admiranda, temperamento uero calida & sicca, ueneno resistens intro sumpta, foris autem imposita collectiones quas uis discutit.

INTRINSECVS.

Herba dum adhuc tenera extiterit, epulis adhibetur, non secus atq; Salvia nobilis, propter odoris nimirum & saporis quo commendatur præstantiam.

Eadem uino decocta & pota, his conuenit qui Opium aliaue uenenata hausserunt, aut Leporem marinum deuorarunt, aut à rubetis ranis demorssi sunt. Inprimis uero radix in puluerem redacta, adiecto semine Pastinacæ syluestris, inq; uino pondere æquali, hoc est ij. Drachmarum pota, non solum

uenenum

uenenum pellit, sed & alui profluvia cohibet, uentrisq; tormina tam in mulieribus quam in uiris sedat, & ut paucis omnia comprehendam, uiribus Parthenio minime cedit.

EXTRINSECVS.

Herba hæc defessibus & balneis sudatorijs adhibita, menses cit, doloresq; ex eorum retentione ortos plane tollit.

Eadem tusa, ac emplastri modo imposita, duritias, tumores, aliasq; id genus affectiones, quocunq; loco ortæ fuerint, discutit.

De Conyza, Germanis Dürrountz/
Pssyllo. CAP. LIIII.

VLTI EX NOSTRIS SCRIPTORIBVS IN GENTIA
M uolumina de Balsamo, ligno Paradisi, Amomo, Nardis, alijsq; peregrinis, ac exteris radicibus herbisq;, quas uix unquam scitatas in officinis uidere, conscripserunt. Sed qui nobilissimarum Stirpium quæ in Germania nostra foeliciter proueniunt, quæq; ita passim obuiæ sunt, ut pedibus illas conculcemus, illarum inquam historiam qui describendam susciperet, nemo est, scilicet officio suo probe functos existimant magni Doctores, si in Scholis & scriptis suis, quo nomine quæq; herba apud hunc & illum authorem, ex ueteribus, qui & ipsi nonnunquam dormitarunt, appellata sit, inuestigarunt. Hinc uero quam peregrinarum rerum, quarum nec notitiam, nec copiam habemus, omnes studiosi simus, liquido apparer. Qui sicut præstatissimas Dei opt. max. creaturas, quæ assatim apud nos, ex singulari Dei beneuolentia, luxuriant, tanquam superfluas & inutiles contemnamus. Id quod cum in alijs stirpibus, tum uero hac in Conyza maxime usu uenit. Tametsi non prorsus ea incognita sit, præsertim uero aniculis, quæ non raro cognitione simplicium doctissimos quosq; (ut sibi quidem uidentur) Magistros superant. Solent enim illam die Assumptionis Mariæ, ut uulgo uocant, colligere, suisq; sagminibus, & quas uocant Verbenis adiungere, ac cōsecrare, aduersus Diaboli præstigias, tēpe statumq; iniurias, sibi persuadentes ijs locis tonitrua, grandinesq; minime nocere posse, in quibus Conyza seruetur. Sed relictis his superstitionibus, ad historiā Conyze transeamus. Ea in duo diuellitur genera, quæ ambo in locis humectis ac graminosis, cuiusmodi sunt margines fluuiorum, paludibus sole exiccatis, humidioribus pratis, & ad nonnullas sæpes nascuntur;

*Conyze duode
nera.*

*Conyza.**Stirpium.**Conyza maior.**Conyza minor.*

Quod in his maximum est nonnunquam in caulem se-
squicubitalem assurgit, cri-
spis lanuginosis & angustis
folijs, Salici aut Mentastro
quod Germani Katzenbal-
sam uocant, non multum
dissimilibus, ab imis usq;
ad summas eius partes ue-
stitum. In fastigijs caulium
flores radiati, lutei aut rari
coloris, emicant, qui ubi
præmaturi fuerint, & ad in-
teritum iam inclinauerint,
in pappos euanescent non
aliter quam Senecionis aut
Scariolæ, Atq; hoc illius se-
men est, vagum & instabi-
le quod nullo loco cõstans
manet.

Minor uero Conyza fru-
tex est furculosus, instar ar-
busculæ ramosæ haud teme-
re dodrantalem procerita-
tem excedens, radice recta,
breui, nec multis fibris ca-
pillata, folijs nigricantibus,
hirsutis, modice serratis si-
cut Senecio. Flores gerit si-
militer rotundos sed non
radiatos, pullo fere colore
præditos, formâ Tanaceti
flore non multum dissiden-
tes. Qui cum maturuere se-
men spargunt, sicut & Ta-
nacetum. Porro utraq; Co-

nyza eundem fere cum Mentha aquatica habet odorem, sed grauiorem &
uirosum ac syluestrem. Flos utriusq; Augusto mense reperitur, qui & inter
illas discrimen statuit, ita ut primam, marem, secundam autem (quæ de
Theo.

Psyllium.
Flöhkraut.



Theophrastus libro vi. de
 plant. histo.) foemellam esse
 existimem.

Sed & medium quoddā
 Conyzæ genus extat, qđ
 substantia sua alteram ex-
 cedit magnitudine, rursus
 primo magis exiguum
 est, cæterum folijs & flori-
 bus utriq; consimilis, nisi
 quod teterrimi est odoris,
 maximeq; fastidiendi.

Quod ad Pulicariam at-
 tinet, qua hodie utuntur of ^{3.} *Conyza media*
 ficinæ, paucis quædam in ^{4.} *Pulicaria*
 medium adferemus. Plan-
 tatur illa hodie in hortis a-
 pud nos Germanos, ac ubi
 primum Maio mense è ter-
 ra erumpit, binis aut ternis
 acutis graminibus cōspici-
 endam se præbet, non aliter
 atq; Coronopus, at folijs
 maioribus, hirsutioribus,
 magisq; ad canum colorē
 uergentibus, quę indies ma-
 iori in copia è radice terete
 rectaq; enascuntur. Sub
 mensē autem Iuniū cau-
 les tenues, multis geniculis
 distincti, per q; ambitū plu-
 rimis acutis, ac asperis uelu-
 ti graminibus uestiti, exili-
 unt, hq; in uertice capitula
 rotūda ac incana gerūt, quę
 Iulio et Augusto mēsisibus,

ueluti minor Lanceolata Plantago florere incipiunt. Aduentante Autum-
 no semine maturo prægnat, forma pulices referente. Herba eius recens, ad
 modum amara & acris est, id quod paulo postquam gustaueris, deprehen-
 des.

NOMENCLATURA:

Quis uero in turba Herbariorum, quo nomine hæc plantæ, quas uulgo in agro Spirensi, uernacula lingua *Stürwurtz*, oder *Sonderwurtz* appellat, in Dioscoride nominatæ sint, indicabit. Sed ne nomine prorsus careant, afferam ego in medium, quid mihi uideatur. Quisquis itaq; has ipsas plantas cognitæ habuerit, is conferat eas descriptioni Conyzæ, quæ apud Dioscoridem lib. iij. cap. cxxvij. extat, quod cum fecerit, luce clarius (nisi inuidia iudicium, uisumq; impederit) uidebit, commemoratos frutices cum illa pulcherrime per omnia conuenire, nisi quod de uiribus illarum nihil dum nobis constat. Sint itaque Conyzæ nec ne, mihi tamen Conyzæ erunt tantisper dum commodius nomen aliquis demonstrat. Ad quid uero adhiberi possint progressu temporis addiscemus. Conyza, quæ mea est Pulicaria (Germanice *Flöhkraut*) quam Plinius lib. xix. cap. viij. iniuria Cynilam uocat, nam quo illa pertineat appellatio supra capite. xij. docuimus, Dioscoride teste, quibusdam Cinozematis, alijs Danaïs, alijs Tanachion, aliquibus Phycos, alijs Ischys, alijs Dinofmos, magis Brephoctonos, quibusdam Anubias, nonnullis Hedemias, Ægyptijs Ceti, Romanis Intybi, aut militaris, aut Deliarium, aut Febrifuga, alijs Phragmosa, alijs Musteros, alijs Pissa nuncupatur. Atq; hæc sunt nomina maioris Conyzæ nam minor Diosco. *πικνις, ητοι λιβανωρις* dicitur. Atqui Libanotidis uox Rosmarino quoque tribuitur, uide Dioscoridem lib. iij. cap. lxxix. & lxxx.

Postrema deniq; Germanis seminis ratione, *Flöhkraut* & *Psyllienkraut*, Latinis Pulicaria, Herba pulicaris, Græcis *ψύλλιον*, appellatur. Psyllium Dioscoride teste, aliqui Cataphysin, alij Cynoccephalion, alij Chrysalion, alij Cynonyam, alij Psyllerin, alij Sicelioticon, Siculi Conidim, Romani herbam pulicarem, aut Silbacium. Aphri Vargungum nominant. Serapio cap. cxx. Bazarachatonæ, Auerrhoes uero cap. xlij. Bescarcoton uocauit.

VIRESCENTIA TEMPERAMENTVM.

Conyzæ omnes calidâ ficcâq; temperiem obtinent. Psyllion maxime aut semen medium quiddam inter humiditatem & siccitatem obtinet, ad refrigeratorem tamen facultatem uergens. Herba testante id Mesue, cui ego assentior amarissima, calida, uenenosa, ac nocentissima deprehenditur, quæ reabiecta illa semine tantum uti solemus.

INTRINSECVS.

Conyzæ binæ priores cum floribus uino decoctæ, ac calidæ potæ, men-

ses suppressos, foetus mortuos & secundinas efficaciter trahunt. Videant terea, qui hoc medicamine uti instituunt, ne quid aliud Christiano & pio homine indignum hac herba efficere conentur.

Eodem modo usurpatæ efficaces sunt ad stillicidium urinæ & Stranguriam, morbum regium valenter discutunt, quare iecori eiusq; obstructionibus utilissimæ censendæ sunt.

Conyzae aceto decoctæ, ac sumptæ, excitâteos qui morbo comitiali conciderunt.

Psyllij semen tusum, ac aliquandiu aqua maceratum, tumq; bibitum, erosiones internorum uiscerum sanat, dysenterias, aliq; id genus alui profluuia a medicamentis immodice calefacientibus, quale est Scammoniu, (solent enim sæpenumero immites & inepti medici huiusmodi negotium ægris facessere) profecta cohibet.

EXTRINSECVS.

Suffitu, substratuq; Conyzae serpêtes fugat, culices abigit, et pulices necat.

Stulta anicularum superstitio credit eo suffitu præstigias diaboli, lemuresq; expelli, neq; fulmine feriri eam domum in qua Conyzae seruentur.

Herba recens tusa, & cataplasmatibus instar imposita uenenum serpentum plagis extrahit, aliq; uulnera morfu uel ferro inflicta persanat. Pari ratione fronti adalligata Conyza, maxime minima, Phreniticis medetur.

Psyllij autem semen tusum, inq; aqua rosacea per noctem maceratum, in glutinosum uiscum abit, qui illitu linguæ exulcerationes, & inflammationes tollit ualenter.

Prodest id remedium & ijs qui capitis doloribus calidis tentantur, si lineis panniculis fronti eorum alligetur.

Psyllij semen tusum, rosaceaq; aqua, aceto uel uino uulgarî temperatiss ac emplastri modo impositum, parotidas discutit, luxata item membra, eodem usurpata in integrum restituit. Enterocelis infantium, & umbilico prominenti ex aceto illitum medetur, ita tamen ut postea ligamenti affectu partes coerceantur. Breuiter Psyllij semen præstantissimum est remedium aduersus calores immodicos, ignes sacros, & maligna uulnera, si emplastri modo ut diximus illis imponatur.

De Elenio. Cap. LV.

LVRIMOS SANE RADIATOS FLORES E' STIRPIB.

P. bus, natura miraculis plena progignit, quorum nonnullos hætenus explicauimus, reliquorum deinceps historiâ profecturi.

Sed dum, quam ex ijs plantis nunc in manus sumerē, circumspicio, comode

Elenion.

Alant wurzel.



fese Enula campana (ut uulgo uocant) offert, inter stellatas herbas, non solum magnitudine, sed & elegantia facile princeps. Atq; hanc eam esse radicem quidam putarunt, quam Mercurium Vlyssi aduersus ueneficia Circes, demon

demonstrasse, Homerus testatur. Atqui ex uerbis Homeri, quę subijciemus, & ex descriptione Elenij, ueritas ipsa facile elucebit. Sic igitur scribit Homerus decimo Odysseę libro,

Ὡς ἄρα φωνήσας πρὸς φάρμακον ἀγχαφόντας
 Ἐν γαῖῃς ἱρύσας καὶ μοι θύσιρ αὐτοῖς ἰδαίην
 Ρίζην μίλαρ ἴσκι γάλακτι δ' ἐκχυλὸν ἄνθος
 Μῶλον δ' ἐμὴν καλῆσαι θεοὶ χαλκῶν δ' ἔτ' ὀρύσσων
 Ἀνδράσι γε θνητοῖσι. θεοὶ δ' ἴτε πάντα δύνανται.

Hoc est,

Sic dicens dedit herbam Mercurius

Ex terra euellens, & mihi genus ipsius ostendit.

Radix quidem nigra erat, lacti uero similis flos.

Moly quidem ipsam uocant Dei, difficile autem effodere

Viris mortalibus : Dij autem omnia possunt.

Hactenus Homerus. Nunc & descriptionem proponemus, initium a radice (nam omnis Enulę facultas, meo quidem iudicio, in radice posita est, quando herba, caulis, flores & semen, odore plane destituta sint) facientes. Ea siquidem cum fuerit tres aut quatuor annos nata, nouas propagines emittit ex se, & ad minus singulis annis, singulos gemmantes oculos protrudit, qui si excisi alio transferantur in altum excrescunt, instar Raphani maioris, qui & ipse eadem ratione plantari consueuit. Colore pullo, aut eodem omnino, quo humus illius natalis, prædita est foris, intus uero perpetuo candida. Obseruatum est mures hyeme elitando radicem hanc excauare, uel famis coercendę, aut medicinę inde petendę gratia, qui sicor radicis læserint, caulem quidem proferet, sed nullo flore comantem, atq; hæc est causa quare Enula raro flore suo ornata appareat. Proinde in fine Aprilis mensis ex gemmantibus quos diximus radicis oculis folia acuta cinerei coloris prorumpunt, quę si auctiora euaserint, magnitudine & forma, Verbaſcum maius imitantur: Quod si radix primaria a muribus & uermibus non fuerit excauata ut diximus, Maio mense in caulem & teretem, & bene altum asurgit (nam quandoq; tres cubitos altitudine æquat) adnatis circumquaq; per interuallum folijs, latioribus quidem & longis ijs quę prope terram nascuntur, magis uero exiguis angustioribus, & acutioribus, his qui superiores caulis partes occupant. Porro ita adherent cauli folia, ut per illa quodammodo quasi per foramina protrahi uideatur, eoq; nomine aquam retinere possit illa capacitas, ueluti & Carduus fullonum. In cacumine caulium flores magni radiari, aureo colore fulgentes emicant, magnitudine florem, quem uocant S. Iohannis, uel Buphthalmum, de quibus supra xlv. & xlvij. capitulis, superantem. Vbi autem defloruerit Elenium in uertice caulium.

Tempus.

Forma.

Caulium capitula quædam capillata, seminis (quod Cardui fullonum simili est) receptacula, usq; ad Autumnum permanent, vnde Elenium plantari potest ex isto semine, nō minus quam ex oculis à radice decisis, utraq; enim rationem successum habere experientia ipse didici. Postremo quod ad locū natalem Elenij attinet, nascitur illud fere quouis solo, maxime autem illo, quod limi plurimum habet, cuiusmodi multi sunt horti limosi. Prouenit itaq; sponte sua incultis collibus, pratis, senticetis in Alsatia, ad montem ut uocant Pharetratum, alias Concordiæ, apud Mediomaticas in pratis aridis, & hortis pomiferis.

NOMENCLATURÆ.

Quam uulgus Enulam Campanam hodie uocat, ego aliquando Panacis & Chironij nominibus appellandam suspicabar, quam suspicionem Apuleius cap. xcvi, quo loco Enulam ita nominat, mihi pariebat. Verum enim uero si radicem Inulæ, formam eius, odorem saporisq; acrimoniam, colorem deniq; & uires descriptioni Elenij quæ apud Dioscoridem lib. i. capite xxvij extat, diligenter & cum iudicio conferas, certissimo deprehendes illam uerum esse Elenium, quod ille aliquos Symphyton, alios Persicam, alios Medicam, alios Orestium, alios Nectarion, alios Clegniam, alios Idæam baton, uel Phlomm Idæam, Latinos terminalium, aut Enulam Campanā Ægyptios Lenen nuncupare tradit. Apuleius Panacen Chironion, Panacen Centaurion, & Inulam Campanam uocat. Serapio Iasim, & Zinziber de Sem. Auerrhoes Alisan. Laurentius Phrissius præter alia nomina, Hebraicum addit *אֵלְנָא* Elna, quod mihi literis inuersis rectius *אֵלְנָא* Enula scribi posse uidetur. Quam autem nihil certi habeant nomenclaturæ non solū Apulei, qui tres plantas Enulæ siue Inulæ nomine appellauit, ut testatur illius v. lix. xcvi. capita: uerum etiam Dioscoridis, inde existimare licet, Quod illæ subinde alijs herbis ab eodem authore attribuantur. De Verbasco namq; quod Phlomos alias dicitur, lib. iij. cap. xcix proprium caput scribit. Tres item stirpes nomine Persicæ ipsemet uocat, uidel. lib. i. capi. xxvij cxi. cl. Quatuor etiam Symphyta in illo authore reperias, uidelicet, lib. i. cap. xxvij. lib. iij. cap. v. lib. iij. cap. x. & xi. Quid quod tres ille Medicas herbas descripsit, quarum una hoc loco, reliquæ duæ, lib. ij. cap. cxxxvi & lib. iij. cap. xx inueniuntur? Idem iudicium est de Idæa, quæ apud eundē tribus quoq; locis extat, uidelicet lib. i. cap. xxvij. lib. iij. cap. cxxxij & cap. cxxxvi. Sed relictis hijs ad explicationem uirium & Temperamenti propere mus, si unum hoc monuerimus, non solum hoc loco Dioscoridem Helenion Nectaream (quæ uox à Nectare deriuatur) radicem appellare, sed & uinum ex illo confectum Nectarites ab eo dici lib. v. cap. xxx. De uino uero Nectarite qui plura cognoscere desiderat, legat quæ Plinius lib. xiiij cap. xvi. annotauit.

Vires

*in uop.**Apul. cap. 95. Serapio cap. 328.**Centaurij uox**cui stirpi proprie**competat supra**cap. 42 docui-**mus.*

VIRESC TEMPERAMENTVM.

Radix huius plantæ duntaxat hodie in usu est, folia & reliquæ partes rousurpantur. Est autem illa calidæ & humidæ temperaturæ, quemadmodum ex Galeno Serapio demonstrat, potestq; utrisq; corporis partibus adhiberi.

INTRINSECVS.

Radix Elenij Astmaticis, orthopnoicis, & tussientibus prodest, necnon his qui frigiditate stomachi laborant.

Vinum quod in Autumno impositis Elenij radicibus deferbuerit potum continuo, suspiriosis conducit apprimere, necnon sanguinem excreantibus, facit & aduersus tussim, pleuriticumq; morbum. Calculum, uenenum, & menses trahit. Easdem facultates obtinet aqua ex ijs radicibus distillata, quæ & peculiariter stomacho male concoquenti confert.

Radix Elenij cum recens adhuc est, Saccharo condiri potest, quemadmodum Gingiber, & calamus aromaticus.

Siq; illa desiccata, & in puluerem redacta, Saccharo uel melle misceatur, ut ita fiat Eclegma, quod uulgo Lohoch (uoce nimirum ab Hebræis, quibus לח Lachach lingere est, deducta) uocant, benedictam præstat medicinam aduersus suspiria, & lentam tussim. Hoc namq; Eclegmate crassi & uiscosi thoracis humores inciduntur, & excreabiles fiunt. Eodem remedio internæ exulcerationes & abscessus pulmonis, matricis, aliorumq; uiscerū, (sic usurpato) persanantur.

EXTRINSECVS.

Cataplasma ex Elenij uiridi radice confectum & impositum, serpentium canumq; moribus uenenatis medetur. Quin tumores & inflammationes locorum muliebrium & genitalium detumescere facit.

Folia Elenij ex uino decocta, utiliter membris dolentibus, præcipue uero Ischiadicis illinuntur, uel imponuntur.

De Gentiana.

Cap. LVI.

NON EST HODIE IN GERMANIA NOSTRA NOTIOR
uel usitator radix, ipsa Gentiana, siquidem non tantum Chirurgi, in strictis cauissq; uulneribus dilatandis, illa uti consueuerunt, uerum

*Gentiana.**Zntian.*

uerum etiam nullam com-
modiorem Theriacam, &
Stomachi medicinam, no-
uit uulgus, quam Gentia-
nam. Quicquid enim inte-
riorum & stomachi affecti-
onum senserint, statim ad
Gentianā, Gingiber et Cala-
mum odratū tanquā sacra
anchoram confugientes,
remediū sibi ipsis afferūt,
soletq; saepenumero hæc, li-
cet rudis & uulgaris medi-
cina illis efficacius opitula-
ri, quam si uel omnia phar-
maca officinarum, & om-
nes etiam pilulas Arabicas
deuorassent. Atqui amabo
te, quid ob stare posset, quo-
minus præsens auxilium
Gentiana, & id genus sim-
plicia præstarent: postquā
Deus Opt. Max. benignissi-
mus, & almus creator, cui
que terræ, non solum quæ
ad uictum, sed & quæ ad ua-
letudinem tuendam perti-
nent, liberalissime donaue-
rit? Nec præterea tantum in
Germania tam animanti-
bus brutis, quam homini-
bus etiam, quorū nonnulli
eam, adiunctis lauri baccis
& alijs quibusdam radici-
bus, melle conditam, pro
Theriaca uendunt, utiliter

usurpatur, ideoq; merito commendatur, sed etiam apud alias nationes, & à
ueteribus cognita, ac magno loco habita fuit semper. Nam & Serapio testa-
tur, se nihil præstantius aduersus rabidi canis uenenosos morsus, expertum
esse.

esse, Gentiana. Cum itaq; tantarum sit uirium, & a ueteribus mirifice com-
mendata (quibus & hoc accedit, quod uiliori precio, quam Rhabarbarum,
quæ & ipsa nobilissima est radix, cõparari possit) merito a nobis amari de-
bet, præsertim cogitantibus, eam nos e clementissima patris nostri cœlestis
manu accepisse.

Sed ut ad descriptionem Gentianæ tandem ueniamus, nascitur illa in al-
tissimis montium iugis, præsertim uero Herciniæ syluæ, nec non in umbro-
sis interdum uallibus, inter Filices. Radicem in terram recta defigit, præ-
longam, teretem, foris pullam, intus uero luteam, gustu amaram, non ali-
ter atq; Centaurium minus. Folia eius quæ primo exortu iuxta radicem
erumpunt, humiq; strata iacent, ad formam foliorum Plantaginis latæ, seu
iuglandis accedunt. Caulem habet teretem & concuum, folijs exiguis,
& parum serratis uestitum, qui uiri proceritatem quandoq; æquat. Sub
Iulium mensem luteum Gentianæ florem arefcere uidi, quod in Linaria
quoq; contingit, deinceps uero excusso flore, semen exiguum, tenue & latũ,
uiolæ luteæ semini haud absimile, quod in caliculis seu uasculis quibusdam
claudebatur, reperi.

^{1.}
Gentianæ prima
species.

In alpinis uero Helueticorum altissimis duæ alia proueniunt Gentianæ
genera, quæ ambo iam commemorata multo magis exigua sunt. Alterum
ex his Gentianam quam descripsimus uulgarem, per omnia refert, excepto
flore, qui subcæruleus illi est, & gustu quem amariorem habet, quo nomine
in medicina efficacior proculdubio fuerit.

^{2.}
Gentianæ secun-
da species.

Alterum longā, & admodum amaram radicem profert, ex qua tenues,
teretesq; coliculi exiliunt, ab imo usq; ad summum uiridibus, læuibus, acu-
tis & angustis, ijsq; binis semper, & e regione se mutuo aspicientibus, folijs
uestiti, in quorum uertice campanulæ quædam oblongæ cæruleæ, aliquan-
to minores, ijs, quas Herbam uenti (de qua infra cap. cxxxvii) gerere uide-
mus, proinde tota hæc planta amara est gustu. Atq; has binas Gentianas
D. Conradus Gesnerus e Tiguro ad me transmisit.

^{3.}
Gentianæ species
tertia.

Postrema huius generis planta, quæ Germanice Bitter wurtzel appella-
tur, gustu amara est, herba & flore Cruciatæ, Germanis Modelgeer/ (de qua
infra cap. lxxxiiij.) per omnia feresimili. At folia illius humi sparsa iacent,
inter quæ, e radice statim flos cæruleus, digitum longus emergit, intus di-
uersicolor, ueluti Iris cœlestis. Nascitur autem hæc Gentiana in altissimis
solum alpinis, quales in Diocœsi Curiensi sunt, nam in eo tractu prope
Cœnobium Germanis Psaffers appellatum, quo loco Thermæ sunt decan-
tatissimæ, primum mihi sese obtulit.

NOMENCLATURÆ.

Gentianam a rege Illiriæ Gentio, inuentore ipsius primo, nomen suum
traxisse.

Plin. lib. 25.

cap. 7.

Diosco. lib. 3.

cap. 3.

γάρνιαν.

De Centaurij.

Chironij, et Nar-

ce appellationi-

bus, suo loco di-

ximus.

traxisse, & Plinius & Dioscorides testati sunt. Alias & Basilica dicitur, ut scripsit Serapio cap. cclij. Gentianam Dioscorides quosdam & Centauriam radicem, alios Aloen Gallicam, alios Narcen, alios Chironion, Dardanos aloitin, Romanos genus aut Cicendiam, alios Ciminalem uocare tradit. Germanis Gentian/Entian dicitur, & quibusdā Bitterwurtz/ quamuis ea sit alia quædam planta, radice tenui exigua & capillata apprime faciens ad febres putridas ex Stomacho ortum habentes, ea in alpinis Helvetiæ reperitur, præsertim ijs in quibus Coenobium Einsyden uocatum, situm est. Atq; hæc una cum secundo (quod aiunt ueram esse Gentianam minorem) & tertio quod posuimus generibus, ab incolis loci illius Entian dicuntur. Vulgaris Gentiana eisdem Verlacham uocatur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Gentiana Germanorum Theriaca est, calidæ, siccæq; temperaturæ, utilis non tantum hominibus, sed & iumentis, intro sumpta, & foris adhibita.

INTRINSECVS.

Gentianæ desiccata radix contusa, ac in puluerem redacta, sæpiusq; cribrata, una drachma, admixta myrrha & cancri fluuiatilis in cineres redacti æquis portionibus, hoc est, duabus drachmis, uino pota per quatuor ex ordine continuos dies, ijs efficaciter medetur, qui morfu rabidi canis læsi fuerint. Præter iam indicatam medelam, danda est opera ut uulnera aperta maneant, erunt & lauanda aceto, uel aqua falsa, ac uenenum etiam cucurbitulis impositis extrahendum. Nonnulli eiusmodi uulnera ferro candenti adurunt.

Radix Gentianæ in puluerem redacta, duabus drachmis, cum Pipere & folijs Rutæ desiccata, contra morsus serpentium, aliorumq; uenenatorum animalium præseruat & auxiliatur.

Hepaticis & Stomachicis, qui cibum sumptum retinere non ualent, Gentianæ radici puluis è uino potanda exhiberi debet, quod qui fecerit, auxilium præsens sentiet.

Extracti succi radici Gentianæ recentis drachma, laterum doloribus, rupturis internis prodest, sanguinem concretum dissoluit, in ijs quæ alto de turbati fuerint.

Pessarium, ut uocant, è radice Gentianæ sicca factum, & subditum, Secundinam trahit, mortuos partus eijcit.

EXTRINSECVS.

Succus radici Gentianæ uulnera sanat, & ulceribus cuniculatim depa-
scentibus

scntibus medetur illitu, & si cum eo mundificentur. Lintheolis impositus, oculorum inflammationes tollit.

Idem & illitu uiriliginis & uitia cutis emendat, emaculatq̃.

Succi extrahendi ratio apud Dioscoridem extat, cuius uerba subscribimus. Contusa radix (inquit) quinq̃ diebus in aqua maceratur, postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices: & ubi refriguit aqua, lintheo excolatur, mox discoquitur, dum mel lis crassamentum contrahat, picatoq̃ uase repositus seruat.

De Aristolochia longa. Cap. LVII

QUAM NVNC TRACTAMVS PLANTAM, GERMANIS Osterlucey, nomenclatura proculdubio ab Aristolochia uoce tracta, dicitur. Atq̃ hæc ea est quæ Dioscoridi lib. iij. cap. iij. Mascula & Dactylitis appellatur. Quanquam autem uerborum Dioscoridis consequentia ad foemellam potius quam ad masculam spectare uideatur, tamen lectio seriesq̃ uerborum genuina, & deprauata, & immutata hoc loco mihi omnino uidetur. Quare quod ad me quidem attinet, sic ego meum in posterum legam Dioscoridem.

Aristolochia genera sunt duo, longum & rotundum, quod Ex uersione Marcelli Verglij hæc desumpta sunt.
foeminam uocant. Longa quæ & mascula & dactylitis dicitur, folia Hederæ habet, cum acrimonia odorata, tenera & modice
rotunda, pluribus ab una radice erumpentibus germinibus. Viticulæ illi longæ sunt, flores in candido pallidi, pileolis similes, in quibus quod rubet graui odore sentitur. Alterum uero Aristolochia genus, quod à figura mali Melocarpon, alijs Teuxinon, foemina est: hanc Romani herbam Aristolochiam uocant. Mascula longiora habet folia, quam rotunda, ramulosq̃ tenues, dodrantali longitudine, flores fert candidos grauius odoratos, Pyro non dissimiles. Rotundæ Aristolochia radix, in globum Rapi rotundatur. Longæ uero crassitudine digitali est, longitudine dodrantali, & aliquando maior. Buxeus utriq̃ intus color est, gustu amaræ sunt, & uiroso odore. Et reliqua.

*Aristolochia longa.**Osterlucey.*

Quod si hoc pacto, ut ostendimus, Dioscoridē legamus, controuersia quæ hoc loco suboritur, componi poterit. Quod enim de longa Aristolochia apud illum dicitur, non de uulgari nostra, sed de ea quæ *Osterlucey* Germanis uocatur, necesse est ut intelligamus. Illa enim intus luteum habet colorem, grauiter odorata, digitum crassa, dodrantali longitudine. De una item radice multa exurgunt germina. Folia habet tenuia modice rotunda, uti *Hederæ*, flore ex candido pallente, & oblongo, instar pileoli acuti, aut *Pyrri*, qui in baccas demum rotundas abit. Et ut paucis absoluam, tota illa planta grauissime odorata est, qd idē de nostra *Osterluceyen*/ seu *Aristolochia longa*, quam uere dicatur, neminem dubitare existimo, qui illam uel semel uiderit. De rotunda *Aristolochia*, secundo libro cap. lxxvñ. differemus.

NOMENCLATURÆ

Aristolochiæ lōgg (nam de rotunda tam uera quam uulgari suo dicitur loco) nomenclaturæ supra sere explicatæ sunt, quare nō est opus ut hoc loco prolixiores simus; perstrin-
gemus igitur breuibus uulgaras eius appellationes. Dicitur illa Græcis

Aristolochia longa à *γῆλυ*, & *λαυρόνισσι*, Latinis *Aristolochia longa*, mascula & *Dactylitis*, Germanis *Osterlucey*/*Biberwurtz*, & *Kynschkraut*. Sed de potestate hac Germanica uoce capite xciij. secundi libri agemus fufius.

VIRE S A C T E M P E R A M E N T V M.

Aristolochia longa ex ordine calefacientium & exiccantium est. Mulieribus in primis confert, ad erosiones & suppurat ones uuluarum, deinde et ad maligna putrida, ac fluentia ulcera utilissima.

I N T R I N S E C V S.

Aristolochia longa cum Pipere & Myrrha uino cocta & pota, à partu purgat mulieres, omniaq; onera matricis expellit. Quare operæ precium cenfeo, ut omnes puerperæ radice eius utantur in potu, quo minus de purgatione dubitare queant.

Radix per se uino decocta & pota, conuulsis, ruptis, pulmonum, lateris, locinoris & matricis uitijs medetur, & quasuis à pituita & cholera ortas humiditates prauas expellit.

E X T R I N S E C V S.

Aristolochia longa in pello subdita, menses ciet.

Vinum in quo illa decocta fuerit, mundificat ulcera putrida & fordida, præsertim genitalium, si ex illa decoctione colluantur, quod ut foelicius exequantur, radicem in puluerem redactam inspergere oportet.

Idem uinum admixto modico mellis, calidum auribus inditum, parotidas earum sanat, doloremq; mitigat.

Radix *Aristolochiæ longæ* in puluerem tenuissimum redacta, adiecta radice Iridis, æquali pondere, melle temperata, ac instar emplastri imposita, carnem generat, uel ut alias dicitur, Sarcoticum est, ita tamen ut uulnera prius purgentur & colluantur decoctione herbæ ipsius.

Eadem recens cusa, & imposita, aculeos, spicula, surculos, aliaq; id genus extrahit, uulneraq; ad suppurationem & sanationem perducit.

Breuiter *Aristolochia longa* & rotunda quibusuis fluentibus & fordidis ulceribus hominum & iumentorum apprime conducit, quo nomine hoc die frequenter ab equarijs medicis in medendis equorum uitijs usurpatur.

De *Hirundinaria*. Cap. LVIII.

Schwalbenwurz:



HIRVNDINARIA
 caule & folio Aristolochi.
 am longam per omnia re-
 fert, radice tantum odora-
 ta. Nascitur in altis, areno-
 sisq; montibus & syluis, in
 nonnullis etiam rupibus,
 imprimis uero incultis ac
 desertis locis, Hercynia sci-
 licet sylua, ad Mosellam, et
 in Vuaigoia. Radicem ha-
 bet multis capillamentis fi-
 bratam, frequentibus radi-
 culis adnatis contortam &
 implicatam, instar Helle-
 bori nigri, adeoq; interdū
 ponderosam, ut decem li-
 bras æquet, cuiusmodi a-
 meiam olim in sylua, quā
 Germani den Ydar uocāt,
 prope arcem Birkensfelde
 reperta est, Radix hæc raro
 in hyeme moritur, mulieri-
 bus ad mensium prouoca-
 tionem magna efficacia in
 desessionibus semper iulur-
 pata. Ex illa frequentes
 etiam palmites cubitales,
 non secus atq; in Aristolo-
 chia longa, exiliunt, folijs
 teneris, solidis, & modice
 & in longum rotundis,
 quemadmodum Hedera,
 quæ arboribus adhærescit,
 sed magis acuminatis uestita. In quorum cacuminibus Iunio mense exigui
 flosculi

filiculi ex candido pallescentes emicant, quibus decidentibus succedunt acutæ & oblongæ filiquæ ciconiæ rostrum imitantes, intus candida lana, & lato semine Gentianæ simili refertæ, quæ si ad maturitatem suam peruenerint, & apertæ hiauerint, lanuginosum, & quasi pinnatum semen protinus in auras euanescit.

NOMENCLATURA.

Hirundinaria Latinis, Schwalben wurz Germanis, haud dubie inde nomen suum sortita est, quod acutæ & apertæ eius filiquæ, cum candida lanugine uolanti hirundini ferme similes sunt. Inde ergo Hirundinaria radix dicta uidetur, quamuis ea ipsa appellatio ad Chelidonium minus (quod cap. xxxv. supra egimus) potius sit referenda. Quo nomine ueteribus sit appellata nondum satis constat, ego tamen, si omnino sit pronuncianda sententia, non inepte nos facturos existimo, si Asclepiada eam nominemus, quam Plinius lib. xxv. cap. v. & Dioscorides lib. iij. cap. xcvij. hisce nominibus describere *ἄσκληπιας, κισσός*, id est, Hederula, *κισσός, ὄλλος*, id est, Hederæ folium, propter foliorum, quam cum Hedera habent, similitudinem. Quamquam postremæ duæ uoces ad Hederam proprie spectent, uide Dioscoridē lib. ij. ca. clxxi. Asclepias Theophrasto Pelecinus dicitur, quod nomen alijs quoque plantis attribuitur a Dioscoride lib. iij. cap. cxxxvij. & lib. iij. capite clvi. Quod si itaque Hirundinaria Asclepias sit (sicut minime dubito) eximium illa certe inuentorem habuit, Æsculapium nimirum, eum, qui apud ueteres propter medicinam a se in artem redactam, in numero deorum habitus fuit, quemadmodum Cornelius Celsus in prologo, & Plinius libro xxxvi. cap. iij. testantur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Eisdem plane facultates Hirundinaria obtinet, quas Aristolochia longa. Radix illius utilissima est, euocandis mensibus mulierum. Potest uero intro sumi, & foris quoque tuto adhiberi.

INTRINSECVS.

Radices Asclepiadis in uino decoctæ, & potæ, subueniunt torminibus. Arcet & hæc potio uenenum, ne cor petat, in his præcipue qui rabiosi canis, aliorum uel uenenatorum animalium morfu infestati fuerint.

Hæc radix pondere semilibræ, per noctem in uino macerata, & deinde usque ad tertias decocta, mane ieiuno stomacho calida pota, sudore interim prouocato, mirifice expellit aquam intercutem, adeo ut illa per pedum plan-

tas erumpat. Estq; hoc singulare experimentum.

EXTRINSECVS.

Radix Asclepiadis in defensionibus mulieribus utilis est, matricis enim dolores iuuat, & menses euocat.

Herba cum floribus tusa, mammis tumentibus cataplasmatibus instar imposita, tumorem deprimit. Puluis ex herba & radice, sordidis ac putridis ulceribus medetur, non secus atq; Aristolochia: potestq; hæc illius loco usurpari, & uicissim illa uices huius obire, si alterutra desit.

De Salicaria. Cap. LIX.

SALICARIAE DVO EXTANT GENERA. PRIMVM
 S quidem flore luteo, seu aureo, sed prorsus inodorato, in fastigio caulis emicante, folijs Hirundinariae, ijsq; per interval-
 la binis, selemutuo respicientibus, & geniculatim e caule prodeuntibus. Flore decusso acini teretes Coriandro non absimiles, post Iulium mensẽ gignuntur, gustu subamari, asperi, linguamq; uellicantes, non aliter quam Pruna syluestria, quæ Germani Schlehen uocant.

Altera uero Salicaria purpureas fert uiolas, folijs uestita angustioribus, acutioribus, nigricantibus, ad formam Salicis accedentibus. In longis siliquis, sicut & uulgaris purpurea Viola semen condit. Porro utraq; in caulem teretem duum cubitorum, ad fluuiorum margines, locis palustribus & humidis, quandoq; muris nascitur.

NOMENCLATURAE.

Salicaria Latinis, Weyderich Germanis, Λουσιμαχία, a rege Lyfimachio inuentore eius, Lyfimachia, & ὀφρυον Dioseoridi lib. iij. cap. iij. dicitur. Leonticenus in erroribus Plinii scribit Corneolam illam uocari, atq; eam in agro Ferrariensi ad fluuium Padum a Tinctoriis uiridi colore inficiendarum uestium gratia legi. An uero illius Lyfimachia cum nostra eadem sit, mihi non constat.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Sanguinis eruptiones cohibendi uim habet Salicaria, tam foris imposita, quam intro sumpta. Quod si illa (ut a multis proditum est) feritatem bestiarum,

Lysimachia.

Weyderich.



bestiarum, & effectorum hominum, edomare, suffituq; serpentes & muscas pellere posset, digna plane foret, ut in usum reuocaretur.

INTRINSECVS.

Folia uino decocta, & pota, sanguinis excretiones, & dysenterias sistunt.

EXTRINSECVS.


Herba tusa, locis mulieribus imposita foris, uel in pello, qui ex succo eius conficiatur subdita, abundantiam mensium supprimit.

Naribus indita sanguinis profluuium, & uulnerū cruorem cohibet.

Suffitu Salicariæ desiccæ, uenenata animalia & serpentes fugantur. Neq; etiam muscæ in ullo conclaui incolumes manere possunt, in quo suffitum, insensæ huius herbæ senserint.

Alia si qua sunt iuuamenta ex supra recitatis colligi poterunt.

De Ocimastro, Germanis Braunwurcz.
CAP. LX.



OCIMASTRVM IN
duo distribuitur genera, fo-
lijs, caule & odore confimi-
lia, quanquam minus folia
habet plane purpurea, gra-
uioreq; est odore. Cōtra ue-
ro maius caule & folijs uiri-
dioribus præditum est, ad
proceritatem sæpe uiri as-
urgens. Nascitur autem
istud in fossis, lacubus, &
humectis pratis. At alterū
quod & uulgaris est, hu-
midis, siccisq; perinde gau-
det locis, ad sepes & anti-
quos muros proueniens,
sicut & Salices, quæ omni
fere terra enascuntur. Theo-
phrasto lib. j. id attestante.
Radix utriusq; candida, no-
dosa, testiculata instar Saty-
rij. Caules qui in utroq; ter-
ni aut quaterni ex una pro-
siliunt radice, in minori
purpurei, in maiori uero
plane uirides, & angulosi
apparent. Folia utriusq; Ba-
silicę similia, per ambitum
modice serrata, ueluti falx
uel urtica. Flores in uertice
caulium, concaua testu-
dinum domicilia imitari-
tes, colore purpureo emi-
cant, qui tandem in rotun-

da & acuminata capitula, seminis copiosi receptacula Hyoscyami uulgaris
similia.

similia abeunt. Porro tam hoc quam illud odorem habet grauem & iniucundum, gustum admodum amarum. Radices uere appropinquante nouos caules emittunt, floret autem utrumq; Ocimastrum Junio & Iulio mēfibus.

NOMENCLATURAÆ.

Hieronymus Braunschueig, hanc plantam mediam Scrophulariam, Satyrion maiorem, Filipendulam autem minorem Scrophulariam esse putauit. Acqui si propter radicem torosam hæc planta Scrophularia censeridebet, nonne eadem ratione Saxifragia candida, (de qua infra cap. clxxx) nec non Chelidonium minus, Scrophulariæ dici merebuntur.

Afferam & ego in medium meam sententiam, saluo tamen aliorum iudicio, neminem enim, ut idem mecum sentiat cogi uelim. Existimo itaq; quæ Germanis Braunwurtz dicitur, eam apud Dioscoridem lib. iij capite xxxix *ὀκίμοειδης*, & Ocimastrum (quæ nomina quidam Basilicæ agresti attribuant) appellari.

Maius autem huius plantæ genus, quod quadrangulis caulibus in fossis aquosis progignitur, ad caput xxx prædicti libri Dioscoridis referrem, ubi stirps eo loco descripta, *ὀκίμος, ὀκίμοειδης, ὁδὸν πορὸν*, Ocimum aquaticum, Herba aquatica, nominatur, nisi unum me impediret, nimirum quod Dioscorides Erinon minora folia. Ocimo habere testatur, quamuis suspicer pro *ὀκίμοειδης* legendum esse *ὀκίμοειδης*. Quod si hæc lectio probaretur pulchre cum planta huius generis maiore, Germanis Groß Braunwurtz appellata, descriptio conueniret. Siq; binæ hæc stirpes, sint Ocima, certe prius Basilica syluestris & male odorata fuerit, posterius uero Basilica palustris, & fortasse Alcbium ultimum Nicandri.

Quadam exemplaria *ὀκίμοειδης* per v scribunt.

Libet paulisper hoc loco digredi, Ocimorumq; discrimina fusius explicare, licet illorum mentionem supra quoq; fecerimus. Siquidem quinque plantæ Ocimi nomine apud autores passim ueniunt. Ocimum ergo quod odoratissimum est, & Garyophyllatum cognominatur, Basilica est faciuæ seu nobilis, & à nobis capiti xxxv lib. iij Dioscoridis ascribitur, quicquid dicat doctissimus Marcellus Vergilius, qui Epimetron, quo de Theophrastus libro viij cap. viij & Acinum unam & eandem plantam esse iudcat. Alterum Ocimum non Garyophyllatum quibusdam Solanum dicitur. Tertium, Ocimum citratum, Melissæ genus est, Iacobo Manlio. Quartum Ocimum carmenum, quibusdam Nasturtium aquaticum. Quintum quod Ocimum domesticum uocatur (quod & à Serapione cap. clxxv his nominibus describitur Hamehim, Amachim, Selichi, Ocimum nabati) fieri potest ut sit Ocimum Catonis, estq; illud alterum Ocimum de quo nunc egimus, neq; obstat quicquam, quod illud alijs Solanum interpretentur. Sed de Solano

ὀκίμος, ὀκίμοειδης

alio loco dicitur. Atq; hæc de Ocimis dicta sufficiant, si prius paucis comprehensa in ordinem redigantur.

Ocimum	Garyophyllum,	} est	Basilicæ species:
	Non Garyophyllum,		Solani genus ut quibusdā uidetur.
	Citratum		Melissa, Iacobo Manlio.
	Carmenum,		Nasturtium aquaticum:
	Domesticum,		Ocimum Catonis, ut uidetur nobis.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vtrumq; Ocimastrum hodie exterioribus corporis partibus frequentius adhibetur, quam internis.

INTRINSECVS.

Semen vularis Ocimastri è uino potum, uim habet, qua uiperarum & cæterorum serpentium moribus medeatur.

Semen drachmæ pondere tusum & usurpatum lumbricos uentris pellit. Idem cum Pipere & Myrrha in uino potū, Ischiadicis apprime cōducit.

EXTRINSECVS.

Ex Ocimastro præstantissimum unguentum conficitur, ad omnis generis scabies utilissimum, quo ipse scabies lepræ simillimas sanari uidi. Cum uero charitas Christiana id requirat, ut proximis nostris in quacuncq; re adsimus, uolui compositionem eius subiungere, quæ sic se habet. Maio mense sumatur herba cum radice, sordibus diligenter expurgata, & lota, eaq; contundatur post succum inde expressum in angusto uitro probe obturato per annum conseruetur. Cumq; unguentum parare uolueris, tum expressi succi ceræ, & olei æquis portionibus tantum accipe, quantum unguenti parandum erit, quod ubi feceris coniunctim illa super carbones decoquantur, & eo usq; temperentur, donec unguentum fiat, quo ut diximus scabiei medeberis.

Aqua ex Ocimastro distillata, faciei ruborem collutu exterit, etiam in ijs qui ob deformitatem elephantici fere esse uidentur.

Eadem

Eadem, nec non & puluis Ocimaſtri, marifcas ſanant, experientia id atteſtante.

Semen Ocimaſtri maioris, quod ad ripas fluuiorum prouenit, tuſum, melle mixtum, ac emplaſtri modo impoſitum fronti, fluxiones oculorum cohibet. Succus herbæ cum ſulphure & nitro temperatus, auribusq; inditus, dolorem illarum finit.

Veterinarię mulierculę alligantes eo Ocimaſtrū pecoribus vermes, quibus illa nonnunquam ſcatent, depellunt. Quantum autem ſuperſtitionis hac & alijs plantis exerceant, nihil hic attinet dicere, nunc ad Sion non odoratum nos conferemus.

De Sion non odorato. Cap. LXI.

ION GRÆCIS, GERMANIS Bachbungen IN DVO generadiſtribuitur, quorum prius atq; idem uulgaris fruti-^{1.} coſa eſt planta, caule rotundo, qui ubicunq; terram attigerit, facili^{2.} eradicatur, multisq; capillamentis fibratur, haud aliter quam Pulegi-^{3.} um, folijs craſſis nigricantibus ſerè, pinguib; ac ſucculentis, ut catenus Fabæ folia imitentur, unde nonnulli eam Germanice Bach bonen, hoc eſt aqua-^{4.} ticam fabam nominant. Flores fert non in uertice caulis, ſed in ſurculorū utrinq; adnatorum ſtagijs, eoſq; cæruleos, ut per omnia ſorum quibus Chamædrys uulgo Gamandraea dicta emicat, ſitum æmuletur. Guſtu ſub amara eſt, uel uti Creſſio fontanus, quare acetarijs à nonnullis adhibetur. Fontibus gaudet calidis, ijsq; ſoſſis quę per hyemem à gelu tutæ eſſe conſue-^{5.} uerunt.

Alterum uero quod & magis exiguum eſt, ſimiliter ad magnas aquas, nec non fontes, inprimis autem eos qui ex rubra & arenosa terra ſcaturigenam ſuam ducunt, naſcitur. Folijs uestitur minutis Pulegio ſimilibus, caule quadrangulo, quibus omnibus Anagallidi adeo reſpondet, ut ab illa uix diſcerni poſſit, niſi quod plurimis undiq; candidis, & capillatis radiculis, uelut Pulegium, quod in Anagallide non fit, humo nititur. Per hyemem totā incolumi uiriditate in calidis fontibus uiget, omni fere odore & ſapore deſtitutum, quo nomine reliquis oleribus, quibus in cibo utimur, annumerandum uidetur.

NOMENCLATURAE.

Vtrumq; Sion Germanis Waſſer bungen / Bach bungen / & Pungen. Dioſcoridi libro ij cap. cxvi *ειρ. άναγallis ινυδ πο*, hoc eſt, Anagallis aquatica Germanice Waſſer Hauſheil / (quod nomen ego ad ſecundum, à nobis deſcripti.

*Sion non odoratum.**Bachpungen.*

scripti Sij genus, proprie pertinere existimo) appellatur. Nec desunt qui Sion, Iuncum aromaticum, seu odoratum, uocent, quod mihi sane mirum uidetur, praesertim cum Sion neq; odoratū, neq; Iunci genus existat. Quare hoc ipsum nomen ad caput liij. lib. i. Dioscoridis coniiciendum censeo. Præterea uoluerunt nonnulli Sion, Daren & Lauer dici, tamen si a Sio Lauer separauerit Plinius, cui & ego astipulor. Lauer etenim Apij aquatici genus est, quo de suo dicitur loco. Porro uulgare et maius Sion, Germanis groß Bachpungen / quod primo descripsimus loco, mea quidem sententia, Sion non odoratum, quisquis appellauerit, eum a ueritate haud multum aberrare, existimarem.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Quanquam utrunq; Sion humidæ temperaturæ sit, tamen non minus atque Nasturtium aquaticum calescientem quoq; obtrinet

facultatem, quare utiliter in cibo & medicina usurpari potest.

INTRIN-

INTRINSECVS.

Sion tenerum adhuc acetarijs adiungi commode potest, sicut Nafurtiū aquaticum, id quod de utroq; intelligi uolumus. Nam in cibo comman-
ducatae hae stirpes calculos uesciæ rumpunt, urinas cient, foetus mortuos ex-
trahunt, neq; non menses.

EXTRINSECVS.

Sion cum aceto & butyro tostum, ac calidum impositum, & subinde re-
nouatum, tumoribus quibusuis, & sacris ignibus prodest.

Apud Veterinarios Sion in magno est usu, eo namq; in discutiendis tu-
moribus, & sananda equorum scabie, alijsq; id genus affectibus curandis
utuntur. Ac certe ad multa conferunt Si hæc bina genera.

De Mercuriali. Cap. LXII.

ERCVRIALIS DVO EXTANT GENERA, DOME-

Mesticum scilicet, quod in uinetis maxime nascitur, & syluestre,
quæ & ipsa in alias distribuuntur species. Vulgaris itaq; seu do-
mestica Mercurialis, ut ab ea initium faciamus, in uinetis & campis quibus-
dam ita luxuriat, ut ubi semel radices egerit, non facile deinceps eradicari
possit. Atq; ea partim in densos frutices, surculosos, ramososq; instar Parie-
tariæ, flore candido quandam racemulorū imaginem præbente, qui non
nunquam nullo post se relicto semine euanescit, quemadmodum foemella
Canabis (de qua cap. cxv. libri primi infra dicitur) partim uero in stirpem
euadit semine Sinapi quod ad magnitudinē attinet cōsimili, cæruleo, rotun-
do, geminorum testiculorum modo connexo, & quod impetu quodam et
repente ruptis folliculis exiliat, prægnantem. Planta est alsiuosa, iniurijs prui-
næ facile obnoxia, ita ut per hyemem minime durare possit, nam & pruinis
facile aduritur, & quotannis ex semine repullulascere necesse habet. Proin-
de radice unica, recta, & parum capillata, qualem uulgaris Basilica habet,
utraq; huius generis planta nititur.

Quæ uero in syluis prouenit, palmi altitudinem raro excedit, cauliculo
ternis aut quaternis folijs, Basilicæ, uel Parietariæ haud dissimilibus, uestito. Loco fructus, quem Maio mense maturat, bina producit granula, coniun-
ctim in folliculis, qui se testiculorum instar habent, contenta, quæ cum præma-
tura fuerint, rumpuntur, atque tum rotundum & cæruleum exilit semen,
quod cum Raphani semine, quoad magnitudinem, conferi possit. A.
Maio


1.
Mercurialis
uulgaris.

2.
Mercurialis
testiculata.

3.
Mercurialis
syluestris.

Mercurialis.

Bengelkraut.



4
Mercurialis syl.
uestris altera.

Maior postea mense tota illa stirps marcescere incipit, nihilq; de illa relinquatur, præter solam radicem, quæ hinc inde serpendo se propagat, uti & Lolium cædidum, quod & Ægilops dicitur (quo de in ra in cõmentarijs nostris lib. ij. capite xxxv) & anno sequente in Aprili mense novos ex se mittit coliculos. Hoc genus Mercurialis in quibusdam altissimis & saxosis montibus ac syluis, herba flore & folijs, uulgaris consimilis nascitur.

Est & alia quædam sylue stirps Mercurialis, quæ in humectis & umbrosis syluis, tenebrosisq; uallibus nascitur, caule geniculato, & nodoso, tereti, tenero, molliq; ita ut quod ad caulæ artinet, hæc iam dictæ non dissimilis appareat. Flores gerit luteos, ac recuruos, quales profert Consolida regalis aut ea quæ Germani Eisenhûrlin uocant, post quos exiguæ teretes, & oblongæ siliquæ sequuntur, quæ anteqm maturitatem suam assequantur, protinus rumpuntur, qui fit ut semen eius, quod præcedenti generis semini

non absimile est, sed oblongius, excidat, quod cum accidit, folliculi contra cæta quodam modo crepando dissiliunt, non aliter quam uermiculi in cascis nati, conuinctis utrisq; sui extremitatibus, à loco se mouere solent, ut qui

ista non

Mercurialis sylvestris.

Wald Bengel frant



ista non uiderit, nec exper-
tus sit, facile terreri possit.
Neque etiam ista Mercuria-
lis hyemis patiens est, sicut
nec ea quæ à nobis secun-
do loco descripta est.

NOMENCLATURAÆ.

Mercurialis, ut inquit
Plinius lib. xxv. cap. v. Mer-
curij inuentum est, qua ra-
tione postea Hermupoa,
& Hermubotane, seu ut
Manlius ait, Hermiporo-
na, Paternius, Mercorela,
& Linosostria uocata fuit.
Omnes Mercurialis speci-
es, Germanis Bengel freite-
ter / quibusdam uero utpo-
te Vormaciensibus Win-
tergrün / quæ uero semen
in folliculis, testiculorum
formam referentibus con-
tinent, merito ab Apuleio
cap. lxxxij, masculæ & testi-
culatæ appellantur. Sed ut
& uulgaris nomina profe-
ramus, dicitur illa apud
Dioscoridem. lib. iij. cap.
clxxxij *αἰνιστρίς* (quod & A-
pio seu Raphano agresti tri-
buitur. cap. clxx. eiusdem li-
bri,) *αφλόχο*, (de quo supra
cum de Chamomilla et Ma-
tricararia ageremus, dictum
est.) *αἰνιστρίς*, (sed et illa appellatio alteri plantæ tribuenda est, nimirum Aizoo
maiori, & Chrysocomæ, seu Saryrioni, uide Dioscoridem lib. iij. capite
lxxxv. & liij.) Herba Mercurialis, *αἰνιστρίς*, *αφλόχο*, *αἰνιστρίς*, *αφλόχο*, Aphlopho-
Alumes.

Alumes. Apuleio. cap. lxxxiij. Linozostis Arren, Clibadion, Arguminos, Hermu Basilion. Auerrhoi Alibleb, Oribasio denique, Lineum costuum, (pro quo Linozostis legendum censeo) nuncupatur. Obscuræ hæc licet sint & incognita nomina, tamen nullas nobis tenebras offundere debent in hac notissima stirpe. Vt ut enim appelletur Mercurialis, tamen non tantum nobis, sed & ueteribus cognita fuit. De Cātone etenim proditum est memoria, quod is familiam suam rusticam Mercuriali deſcere aluum docuerit.

Porro autem prior ex ijs quas sylueſtres diximus Mercuriales, quæq; in saxosis nascitur syluis, apud Dioscoridem lib. iij. cap. clxxxiiij. *κυνια, κυωνορα* 6. (quo nomine & Apocynon. lib. iij. cap. lxxix. dicitur) *κυνος σαρξ* ἀγρία ἄγρια Canina, Canina Brassica Mascula, seu sylueſtris Mercurialis, Aphris Harmas, alijs Alumeslabon, Germanice Hundsfraut / Hundsſöl / Wild bens gelfraut nominatur.

Postrema quæ in umbrosis uallibus nascitur, a quibusdam Germanica uoce Spring fraut dicitur, sed de nominibus & genere eius, cum ad Esulas peruenerimus, plura. Phriscus in Synonimis suis Hebræa uoce Mercurialem *תלמי* Thalpi Etymo mihi sane ignoto, nominat.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vtraq; hortensis Mercurialis, aquam & bilem educendi uim obtinet, atq; hic fuit earum apud ueteres usus.

INTRINSECVS.

Mercurialis domestica prior, necnon & sylueſtris prior, aqua decoctæ, calidæq; potæ uentrē purgant, bilē et aquosa trahunt. Quod, si iucundiorē usu hanc potionem efficere uelis, decoques cum illa Saccharum, quantum libuerit. Debent uero istiusmodi plantæ clysteribus adhiberi, suntq; perinde utiles, suo modo, atq; folia Senæ. Posterior sylueſtris, uomitiones magis prouocat, ideoq; ad Esulas referenda erit.

EXTRINSECVS.

Mercurialis omnia genera discutiendis inflammationibus, collectionibus, & tumoribus, abscessibusq; imposita, uel per se, uel cocta cum pinguedine quapiam profunt. Dioscorides de Mercuriali uulgarī, quæ in duo secernitur genera, quorum alterum Mercurialis mascula, altera foemina appellatur, mirum quid scribit, cuius uerba hæc sunt. Cōstat ut mares gignantur, hunc facere: ut foeminæ, illam, si a purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueantur.

De *Parietaria*.
S. Peters fraut.

Cap. LXIII.



PARIETARIAE
duo quoq; genera inveni-
untur, maius nimirum &
minus, raro tamen simul
eodem in loco.

Exiguum coliculismol-
libus subpurpureis, folijs *Parietaria*
Ocini, herbacei coloris, a-
speris, ita ut uestibus facile
adhærescant, flore, quo Iu-
lio mense comat, admodū
exiguo, inter folia, ueluti
Atriplex ad muros nasci-
tur. Semen profert minuti-
us Portulacæ semine, nigri-
cans. Luxuriat uero hoc
Parietariæ genus (quod
nō raro hyemis frigora sal-
uū ac incolume sustinet) in
tractu Rheni inter Bingiū
& Confluentiam oppida:

At maior *Parietaria*, iā
descriptæ in omnibus simi-
lis, nisi quod illa procerior
est, latior, crassior & teneri-
or. Gaudet umbrosis locis,
affatimq; in Alsatia, Argen-
tinæ maxime nota, proue-
nit.

Tertia deniq; quæ a Li-
psensibus medicis uera Pa-
rietaria existimatur, altera
us est generis & loci.

25
Parietaria uul-
garis.

30
Parietaria
Lipsensium.

NOMENCLATURA E.

Parietaria, Germanis S. Peters fraut / Tag vñ nacht / Oribasso, Elxine, i. n. n.

Celsus lib. 2.
cap. 32.

& Vitrago. Cornelio Celso, Perdicium, Muralis herba, Parthenion, Alijs autem Paritaria Victorialis, Vitriolaris, Perdicaria, Muralium, Herba uenti maior, Herba uitri, Vrccolaris, & Veraghium, appellatur.

explicatur.

Quod ad Parthenij appellationem pertinet, duo uidentur hoc loco annotanda, nimirum Etimologia eius, & contentio authorum super hac uoce, cui occasionem id dedit, quod illa multis alijs plantis attributa fuit. Leonicenus siquidem, Collinurius & Rudolphus Agricola, omnes uiri doctissimi, dubitarunt an Parietaria Parthenij nomine uocanda sit, nec ne. Sed me hercule quicquid isti quærant, & disputent, certum tamen est apud Galenū lib. vi. nec non Æginetam lib. vii. Parietariam Parthenion dici. Neq; illis locis Matricaria per Parthenion intelligi debet, ut à multis obijcitur, sed potius Parietaria, quæ cum plurimis alijs herbis, nimirum cum Maiorana, Matricaria, Artemisia, Chamomilla nobili (cui propriissime assignatur, ut supra cap. xxxvii docuimus, quæq; à Serapione Matricaria nominatur, quo loco nonnulli Matricariam intelligendam contendunt, sed perperam) & Mercuriali appellationem Parthenij communem habet, ut septem Parthenia numerare liceat. Sed nec immerito Parthenion dicitur Parietaria, nam ut Perdicium à perdicibus, quæ eam esitare solent, ita Parthenion à Minerva uirgine nomen obtrinet, quemadmodum Ruellius lib. iij. cap. xciiij testatur, cuius hac de re uerba subiiciemus. Parthenion (inquit) dicta, quoniam à Minerva somno contra præcipitia lapsusq; monstrata est. Pericli Atheniensium principi, cum in arce templum ædificaret: vernula charus supra altitudinem fastigij repisset, unde cecidisset, hac herba dicitur sanatus. Quare Parthenion uocari cæpta est, assignaturq; ei deæ. Hæc ille.

VIRESC TEMPERAMENTVM.

Parietaria mediocris est temperamenti, neq; nimium calida, neq; abunde frigida, unde Oribasio docente, inter ea quæ mediocriter refrigerant, collocanda erit.

INTRINSECVS.

Parietaria in uino seu aqua cum melle uel Saccharo decocta, ad inueteratam aridamq; tussim pota facit. Idem aqua eius distillata efficit, quare ueteres Parietariam in puluerem redactam aduersus tussim & Astma exhibuerunt, uti de Absyrtio quodam Græco prodiderunt historiæ, qui ad tussim iumentorum ea herba usus dicitur.

Parietaria decocta iocinoris, lienis, & renum obstructions tollit, inter nos meatus, & matricis præcipue uitia expurgat.

Eadem omnia præstat aqua Parietariæ distillata.

Pota

Pota etiam hæc decoctio, tormina matricis sedat, urinam expellit, ne chō
menfes & alia id genus.

Herba adiecto melle, confillis inflammationem sentientibus utiliter &
gargarissatur, & oblinitur.

EXTRINSECVS.

Succus ē Parietariæ herba expressus, auribusq; inditus, punctorios illa-
rum dolores aufert. Idem succus necnon & aqua Parietariæ distillata, sa-
cris ignibus, abscessibus calidis, tumoribus, alijsq; inflammationibus, &
adustis medentur, linteolis in illis madefactis, ac impositis.

Succus cum Cerussa temperatus, mirifice ad prædictos morbos facit,
quin & ulceribus quæ serpunt, papulis, serpigini, & depascentibus malis me-
detur. Qua de causa infantes scabiæ serpente, unde macrescere solent, (quæ
Germanis die Negerey dicitur) laborantes, hac herba lauari debent.

Parietariæ herba cum Nasturtio aquatico, & uino in sartagine tosta, ac
calida imposita uesticæ, urinam ualenter ciet. Ventri imposita, pari ratione
tormina sedat, modo illis nulla sit coniuncta alui astrictio.

Parietaria cum farina fabacea, malua & furfure triticeo, oleo & uino to-
sta, & emplastri ritu imposita, lacertos, neruos, & Musculos contusos resti-
tuit.

De Elatine, Germanis Kletten kranz.

CAP. LXIII.

N VORMATIENSI AGRO PROPE OPPIDVM Alzey,

I in agris frumētarijs, frutex ramosus & furculosus plane nascitur,
Senetioni non dissimilis, folio non prorsus rotundo, at minori
folijs Elxines exiguae, cuius statim meminimus, aspero, ita ut uestibus facile
adhereat, lanuginoso, cineracei coloris, instar Lithospermi, quod uulgo Mi-
lium solis nominant. Flosculos gerit cæruleos, qui tandē in echinos lappa-
ceos uestibus adhærescentes abeunt, quod & semen eius est, Coriandrum
magnitudine æquantes.

Sub Autumnum plerunq; hæc stirps in ijs aruis reperitur, quæ rapis con-
sita sunt, radice recta, qualem habet Basilica, & Mercurialis.

NOMENCLATVRÆ.

Quam modo descripsimus plantam, alteram esse Helxinem Galeni, & Simp.

Galen. lib. 6.

Aegin lib. 7.

Elatine.

Kletten fraut.



Aeginetæ, quam Cissampel-
lum cognominant, eamq;
quæ a Dioscoride lib. iij.
cap. xxxvii. *idatiru* dicitur,
neminem ambigere puto,
qui delineationes eius cum
descriptionibus Galeni &
Dioscoridis cõtulerit. Pos-
set & Aparine uocari, cum
ut diximus semen & folia il-
lius uestibus adhærescant.
Vnde incolæ agri Vormatien-
sis prope Dalsheimiũ
illam patriâ uoce Kletten-
fraut / quasi Lappaceam
herbam, nominant.

VIRE AC TEM- peramentum.

Elatine refrigerandi, exic-
candi & sanandi uim obti-
net, eoq; nomine tenerri-
mis membris utrinq; utili-
ter adhibetur.

INTRINSECVS.

Elatines herba in uino ru-
bro decocta, ac pota, inte-
stinorũ erosionibus, a dy-
senteria profectis medetur,
dysenteriam sistit, dolorẽq;
mitigat per aliquot dies cõ-
tinuos pota.

Herba uino decocta, &

gargarissata exulcerationes oris & colli persanat.

Quin & stulta superstitione nonnulli persuasi, quorum supra mentionẽ
fecimus, ab oris ulceribus, quæ Græcis Aphthæ appellantur, eos liberari cre-
dunt.

dunt, qui hanc herbam saltem secum gestauerint, testanturq; id experientia comprobatum.

EXTRINSECVS.

Elatine uiridis adhuc, tusa, ac fronti imposita, oculorum inflammationibus & fluxionibus auxiliatur.

Alia iuuamenta quotidie inueniri, & ex ijs quæ annotauimus colligi poterunt. Quare relictis his ad Betonicam transeamus.

De Betonica. Cap. LXV.

BETONICAE DVO GERMANIS SVNT GENERA, PURpureum scilicet, & candidum. Radix utriusq; capillamentis fibrata, uti & Plantaginis. Folia prima earum humi sparsa iacent, nigricantia, aspera & lata, per ambitum ut querna, serrata, sed altero latere minoribus crenis, uenis plurimis distincta, iucundi odoris. Iunio mense exeunt in caulem asperum, quadrangulum, cubitalem, uel eo ampliorem, qui interdum binis sese mutuo spectantibus per interualla, maxime autem prope florem, folijs uestitur. Mense Iulio plerunq; florem absolutum omnibus numeris proferunt, hæc quidem purpureum, qualem purpureum trifolium gerit, aut Stoechas, illa uero candidum. Mirum autem uidetur, quod cum diligentissime Betonicæ historiam persecutus sit Dioscorides lib. iij. cap. j. non tamen florum colorem indicarit, fortasse ideo quod in flore Betonicam non uiderit, uel potius quod illam ex uerbis quibus Betonicæ semen ueluti Satureiæ spicatum inesse tradit, animaduerti facile posse arbitratus est. Sed ut ut hæc quidem se habeant, satis erit, si eas, quas iam descripsimus, ueras Betonicas esse nullatenus dubitemus, quicquid interim Ægineta lib. vij. de sua Betonica folijs Pulegij uestita, dicat: credibile est enim & ipsum non omnia uidisse de quibus scripsit. Et ut reliqua in descriptione Betonicæ persequamur, habet utraq; semen oblongum, angulosum in spicis quibusdam Marrubij instar occultatum.

Iam ut de candida Betonica spectatim aliquid dicamus, illa singulari Dei benignitate è sylua quadam Mediomatricum ad me allata est. Neque enim passim obuia est, nec ut arbitror multis in Germania uisa, tamen si postquam à me plantata fuit, plurimis quoq; dū albo flore emicaret, Iulio mense, demonstrata fuit. Ego uero istiusmodi beneficium Dei magnifico, atque quam enim hanc Betonicam uidere mihi contingeret, doctissimi quicq; uiri, è nuda descriptione persuaderem mihi conabantur, eam quæ sequenti a

Betonica.
Betonien fraut.

*Betonica quæ-
 dam bina cam-
 pestres.*



nobis tractabitur capite,
 Betonica esse candidam.
 Atqui Deo sit laus ueram
 iam inuenimus Betonica
 candidam, quæ ab altera
 uulgarî solo florum colo-
 re differt, cætera eidem simi-
 lis per omnia. Proinde ut-
 raq; inter densa & tenebro-
 sa arbuscula, in uallibus opa-
 cis, ac pratis, alijsq; grami-
 nosis locis enascitur.

Antequam ad nomen-
 claturas Betonice perga-
 mus, de alijs quibusdam
 Betonice speciebus, quas
 fere præterieramus, admo-
 nendus erit optimus Lector.
 Nam inter Argentinam &
 Spiram urbes Germaniæ
 celeberrimas, secus itinera,
 & in collibus nonnullis bi-
 næ reperiuntur plantæ, Be-
 tonice per omnia similes,
 nisi quod folia & caules
 breuiiores habent. Flos hu-
 ic purpureus, illi candidus.
 Coliculi ab imo usque ad
 summum minutioribus,
 serratis & asperis circumda-
 ti sunt folijs. Odor utriq;
 gratus, gustus subamarus.

NOMENCLATVRÆ.

Betonica Dioscoridi,
 Galeno, & Æginetæ *ῥυχόρροπον*, quod frigidis locis & uallibus gaude-
 at, & *κισσρον*, Antonio Musæ, Britannica, Prionites, Pyrines, Adianthos, Thy-
 ariza, Scropodion, Pandiona, Hierabotane, Serrata, & Rusmarina, dicitur.
 Britannica.

Britannica quidem & Adianthos nomina sunt. peculiarium quarundam stirpium, de quibus suo dicitur loco. Lonchitidi etiam Dioscorides lib. iij. cap. dii. Cestri appellationem tribuit, & Plinius Trixaginem quoque suam, *ῥιζὸν ἁγρίαν*, Serratam uocat. Serapioni denique cap. cccxij. Rastata, Auerrhoi, Alchifon, *Orminum campestre*, Beragnes, Manlio, Lingua Bubali, & lingua equi appellatur. Germani *Braun Bathonien kraut*, & *Weiß Bathonien kraut* uocant. Duæ potestemæ Betonicæ non male ad caput cxxxvi. lib. iij. referri posse existimo, ita ut Ormina campestris dicantur. Quod si cui hæc mea sententia displiceat, is meliorem adferat.

VIRESC TEMPERAMENTVM.

Ex ordine calefacientium sunt Betonicæ uniuersæ, ad omnes prope morbos utiles.

INTRINSECVS.

Quisquis continua eructatione, & imbecillitate stomachi laborauerit, et quorum uentriculus cibos retinere nequit, quicunque denique acida ructant, eorum uitio frequenter molestantur, si perpetuo Betonica uti debent, ac uel herbam cum floribus in uino decoctam bibere, aut aquam distillatam, uel cum Saccaro flores conditos, instar conseruæ uti uocant, usurpare.

Quod si huiusmodi conseruis, aut aqua distillata destituaris, arida Betonica folia in puluerem redigere, si quæ uel per se uel melle admixto uti poteris.

Mulieres uulvæ malo opportunæ, ad laxandos uteri strangulatus, remedium ex Betonica præcipue petant.

Breuitè Betonicæ flores, folia & radices, decocta, ac pota, aut quoquo modo, illa in ecligmati, conseruis, serapijs, potionibus & pulueribus, sumantur, utilia sunt internis stomachi affectionibus, iecoris lienis, renum & uesicæ. Matricem obstructione liberant, omnesque noxias humiditates educunt. Quamobrem puluis Betonicæ pondere drachmæ unius in uino propinari debet his, qui uenenum hausisse se suspicantur, quod cum fiet, uenenum per urinam & aluum expelletur.

Isterici quoque Betonicam frequenter usurpare debent, quocumque tandem modo ex his quos supra recensuimus.

Furiosis & comitiali morbo laborantibus Betonica in aqua decocta potui dari debet, necnon & Ischiadicis, & Paralyticis.

Phtificis, pulmonisque uitij laborantibus, suspiriosis, ac tussientibus, & ad Hydropisim pronis, quicunque continuis & putridis a stomacho ortis febribus infestantur, Betonicæ flores & folia, in aqua multa decoquantur, & bibantur calida, per aliquot tempus, mane & uespere, quod cum fecerint, præsens auxilium sentiant.

Linteola linea in aqua Betonicæ distillata madefacta, ac capiti imposita, dolorem mitigant. Oculis quoq; instillata, eadem efficit Betonicæ aqua.

Folia Betonicæ recentia, uel tusa, uel decocta, capitisq; uulneribus illita, non solum sanandi, sed & celerius conglutinandi uim habent, ossiumq; fragmenta extrahendi.

Aures per infundibulum decocto Betonicæ utiliter fouentur.

Betonicæ folia in uino & aceto æquis portionibus ultra tertias decocta, gargarissatu dentium putrescentium doloribus medentur.

Betonicæ folia cum uino nigro tusa aut decocta, uulneribus cataplasma tis instar imposita, uel sic cū illa decoctione uulnera colluantur, uenenatos serpentum, aliorumq; eius generis animalium, & rabiosi canis morsus persanāt.

Plura qui de Betonica scire cupiat, is scripta ueterum de illa perlegat. Nos præcipuas eius uires paucissimis comprehensas enumerauimus.

De Herba paralysi. Cap. LXVI.

ERBA PARALYSIS QVOD AD FOLIA SVBALBI

Hda, seu incana & rugata petinet, quibus hyeme etiam in pratis humi sparsa iacet, non aliter quam Plantago, haud multum Be-

tonicæ dissimilis est, unde adducti quidam Betonicam candidam illam appellatam uoluere. At si diligentius non solum formam, sed & saporem ac odorem herbæ istius, quis examinauerit, is certo deprehendet nihil illam cum Betonica, præter folia commune habere. Quanquam si exactius respensitetur, folia illa ipsa magis cum Lapatho acuto, quam Betonica conueniunt. Nulli ergo dubium esse debet, quin nō tantum plurimum a Betonica diffideat, sed & peculiare per se stirpis genus sit hæc herba. Dirimitur autem illa in duas species, quarum altera uulgaris, altera syluestris censetur. Prima quæ & passim in pratis conspicua est, folijs uestitur minime crenatis per ambitum, nullo odore præditi, sapore subdulci. Flores interdum duodeni, pediculo seu stylo unico, tereti, dodrantali, læui insident, lutei, & ad formā Cymbali rotundi, uel clauis, ex sacculo quasi concavo singuli prorepentes. Quibus ubi deciderint Papauerū similia capitula, nigro semine repleta, succedunt. Radix illi Plantagini consimilis. Sub Aprilem mensē folia candicantia eriguntur in altum, & cum illis quoq; flores exurgunt, dulces, odore mellis præditi, quare illos nonnulli legere solent, Zaccharoq; condire. Gaudet uero aridis pratis, & quibusdam graminosis hortis.

1.
Herba paralys
uulgaris.

2
Herba paralys
syluestris.

Altera huius generis planta, quæ in syluis prouenit, latiora habet folia, coloris ex luteo pallentis, & quodammodo albicantis. Floret citius altera, flore omni fere odore destituro.

NOMEN

Herba paralytica.
Schlüsselblumen.



NOMENCLATURAE.

Germanis utraq; Simelschlüssel/ oder S. Peters schlüssel/ & ad No-
crum quibusdam Weiß Barbonien/ (hoc est, Beronica candida) propter fo-
N x

Antiqui
Diosco. lib. 4.
cap. 2.

Apuleius. cap. 29
Auicenna lib. 2.
cap. 106.

liorum similitudinem, Officinis Herba paralyfis appellatur. D. Otho Brunfelsius uir doctissimus in ea fuit sententia, ut existimarit hanc stirpem, Margaritam esse Hermolai Barbari, & eā quæ Plinio Bellis, seu Bellius dicitur. Quod uero in Dioscoride & Plinio nomen habeat, nondum mihi constat, nisi forte Britannica sit Plinij lib. xxv. cap. iij. descripta. Nam in antiquis Dioscoridis exemplaribus nulla sit Britannicæ mentio, quodq; hodie in Dioscoride legitur, fieri potest ut illa adulterina sit, & supposititia lectio, quod cum alibi tum uero hic Diosc. contigisse mecum testabitur Marcellus Vergilius doctissimus uir. Quanquam Apuleius de Britannica quadam scribat, quæ Græcis Damasonios, alijs Beta plantaginis, alijs Bibo dicatur. An uero nostra herba Paralyfis Britannica sit Plinij, aut Bertanich Auicennæ, doctioribus discutiendum relinquo, ab illis enim erudiri de ueritate cupio. Apud Phrisum, Primula ueris (de qua appellatione suo loco egimus) Chelidis, Taxifilon, Opipera, Chelidii, & Germanica uoce, *Jaſten blumen* (hoc est quadragesimalis flos) nominatur.

VIRE S A C T E M P E R A M E N T V M.

Folia herbæ paralyfis calidæ, & aliquantum reficcantis sunt temperatura. Flores decerpti internis corporis partibus accommodatiores.

I N T R I N S E C V S.

Flores herbæ Paralyfis Saccharo conditi, nec non & aqua distillata, uiribus exhaustis, longaq; ægritudine confectis, nec non apoplecticis, & his qui crebras patiuntur syncopes profunt, aiuntq; id experientia constare.

Eadem ratione & internis affectionibus utiliter adhiberi potest herba Paralyfis, est enim singulari cor confortandi facultate prædita.

E X T R I N S E C V S.


Flosculi & folia herbæ Paralyfis maxime salutare sunt, tumores enim ex morſu uenentorum animalium sub ortos detumescere faciunt, alijsq; medentur uulneribus, si distillata aqua colluantur, aut si folia illis imponantur.

Herbæ Paralyfis aqua distillata doloribus capitis à calida intemperie profectis medetur singulari experimento.

Mulierculæ formæ studentes, è floribus, prius uino aspersis aquam sibi distillant, qua faciem illinunt, sperantes hoc pacto genas suas à rugis maculisq; & alijs id genus uirijis uindicare se posse.

De Chamædry. Cap. LXVII.

Chamædry.
Gamander.




CHAMÆDRYS VERA proculdubio non multis officinis in Germania nota est, nec uisa etiam, quare usum illius ut ignorent necesse est, nec mirum certe si plerique mortales a medicamentis, quæ isti conficiunt, abhorreant. Ne uero in errore posthac uersentur hi, qui simplicium exactam cognitionem percipere desiderant, paucis uniuersam Chamædryos descriptionem ob oculos ponemus. Chamædry in tria diuiditur genera, estque alia nobilis, reliquæ duæ uulgares, nam in omnibus fere hortis graminosis reperiuntur.

Chamædry uera, cuius ¹² ueteres mentionem fecere Chamædry in montibus subter Iuniperos in musco, & lapidosis collibus, & terra præcipue limosa prouenit, dodranta li altitudine, radice per terram hinc inde serpente, caudæ candida, ex qua sub mensem Malum multi tenues furculi, exiguis foliolis, binis per interualla, sese mutuo respicientibus, effigie & diuisura quercus, (ita quidem.

Chamædrysaera.

Dasrecht Gamanderlin:



ῥιζοματὰ τριμήνη
τα.

quidem ut ouum ouo uix adeo simile sit, quam sunt folia quercus, et huius Chamædryos uestiti exeunt, Iunio mense purpurascens flosculi Betonicæ flores referentes, unde non inepte Betonica exigua appellari potest, prodeunt, odoratissimi, nam etherba iucundo commendatur odore, gustu subamara.

Cæterū cum apud Theophrastum libro. x. cap. x. de plantarū historia, et uires et forma huius Chamædryos descripta sint, annotabimus illa in gratiam studiosorum rei herbariæ.

Τὴς δὲ χαμᾶδρυος, τὰ αὐτῆς φύλλα πρὸς τὰ ῥιζοματὰ καὶ πρὸς τὰ ῥαθύμακτα οὐ ἰσάμην τριβόμενα. πρὸς τὰ τὰ νινόμενα ἴσῃ. ἢ καὶ κατὰ τὴν καθάραν χάριν. ἀγάρην δὲ καὶ ὀφθαλμοῖς, πρὸς δὲ τὰ ἀργυματὰ, προσάγειν τὸ φύλλον, τριβάντα οὐ ἰσάμην. ἔχει δὲ τὰ φύλλα, διὰ πρὸς δρυὸς. τὸ δὲ ἀνάσσειν ἢ ἔχει, ὅσον πτωμαῖον. ἔσθον ἢ, καὶ ἐδὲ.

Hoc est,

Triflaginis folia ad ruptiones, & uulnera in oleo trita, necnon ad depascētia ulcera. Fructus bilē purgat, oculis prodest, folium ad albugines seu Argemata, in oleo tritum cōducit. Habet autem (Chamædrys)

folia quercus, & statura uix palmum excedit, & odorata atq; suavis est. Hęc ille. Nunc ad uulgares Chamædryos species explicādas accedamus. Reliquæ duæ uulgo Gamandrææ appellatæ, forma inuicem consimiles, maxima

maxima tamen, quæ in asperis & saxosis montibus reperitur, elegantior est. Atq; ea radicem habet lignosam & tenuem, fibrisq; capillatam, e qua te-
 retes coliculi dodrantes, spicatis floribus, non aliter quam Betonicæ, *Chamædrys alta*
 cæruleo colore, tinctis sub initia Maij mensis comantes, consurgunt. Fo-
 lia eius instar ferræ diuisuris incisa sunt, cætera Balsaminæ acutæ haud mul-
 tum dissimilia. Mirum est autem quod flores huius stirpis non e uertice,
 pro more aliarum, sed e lateribus caulis prodire cōsueuerunt, ita ut prima-
 rius caulis præmorsus uideatur.

Tertia Chamædrys, quæ & uulgatissima est, ac officinis usitata, passim
 aduentante Maio inuenitur in hortis graminosis, cæruleis flosculis Ana-
 gallidi similibus, at paulo minoribus, rarioribusq;. Differentia uero qua
 propriissime duæ postremæ Trissagines discernuntur, in situ foliorum, &
 floribus est posita. Nam prioris folia humi procubunt, nihilq; præter florē
 spicatum in altum attollitur. At posterior eademq; (ut diximus) uulgatissi-
 ma, instar arbusculæ plane erigitur, nec per terram ut altera sparsa iacet.

Deinde in maiori illa Gamandræa, quæ spicatos flores profert, raro plu-
 res quam binæ emicant uiolæ, ijs decedentibus, binæ aliæ ex ordine succe-
 dunt, donec spica ad summum usque defloruerit.

NOMENCLATURAÆ.

Prima Chamædrys purpureis prædita floribus iure Betonica parua 1.
 (Germanis Klein Barthonien oder Barthengel) dicitur, causas supra recen-
 suimus. Estq; illa uera Trissago, Chamædrys, Quercula minor, uel Humi-
 lis quercus, de qua Dioscorides lib. iij. cap. ciiij. agit, Teucrion quoq; illam
 uocari & Linodryn asserens. Potest & *Χαμῆδρυς* (quamuis alia exemplaria
Χαμῆδρυς legant) M. Vergilio testante, uocari. Plinio ob incisuras quas ob-
 net, Serrata, Manlio Calamandrina, Apuleio, Drys & Drysites. Barba-
 ris & Arabibus (utentibus Genitiuo pro nominatiuo) Camedreos, Ca-
 medryos, Damederios, Laurentio Phrysis, Kamel & Trizaoga appella-
 tur. Nec uero tacendum opinor tres apud Dioscoridem extare Trixagi-
 nes, uidelicet lib. iij. cap. cxvi. ciiij. & ciiij.

Reliquas duas Gamandræas in gratiam seplasiariorum Trixagines &
 Querculas cum alijs appellabo, tametsi illi postremam duntaxat habeant
 in usu, quæ Germanis Blomenderlin / Gamander / Vergiß mein nit / & a-
 pud Mediomatrices mulierculas, Helfft / Frauenbiß / (id est Morsum foe-
 minæ, eo quod in medio corde suo spoliatum uidetur, unde ut docuimus
 flores in lateribus coliculorum, non in capite progignit) uocatur. Quod si
 & hæc Teucrion appelletur, certe ad lienis uitia adhibenda foret, usuq; ob-
 seruandum si illis salutaris esset, nec ne, uti & Teucer fecit. Sed de Teucro
 uero paulo post. Vnum hoc annorandum uidetur, nimirum quod Plinius
 lib.

2.

3.
Chamædrys
*uulgaris.**Χαμῆδρυς*
Τρίξιος.
Plinius lib. 24.
cap. 15.
Theophrastus
de planta. histo.
lib. 10. cap. 10.
Apul. cap. 24.
Serap. cap. 180.

2. 3.

lib. xxv. cap. v. & Hemonion Teucrij appellatione insigniat, quam recte autem, ipse uiderit, tamen enim uiribus nihil inter se differantæ plantæ, tamen quo omnis semel in re herbaria tolleretur obscuritas, consultius mihi uideretur, si quæq; stirps proprijs suis nominibus uocaretur.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTVM.

Chamædryos species omnes a nobis descriptæ, ex ordine sunt calefacientium & exiccantiũ, ideoq; uti Betonica utrinq; utiliter adhiberi possunt, præsertim ea quæ purpureos gignit flores, & a nobis ob formam & uires Betonica exigua est nominata.

INTRINSECVS.

Betonica exigua, & Gamandraea cæruleis conspicua flosculis, uino uel aqua decoctæ, percolatæ, demum melle uel saccharo temperatæ, in modum aliarum decoctionum, mirifice ad tussim faciunt, incipientibus hydropicis Indurato lienī, stranguriæ, atq; ijs qui difficulter urinā reddunt, auxiliantur.

Vino decoctæ eadem herbæ, ac ea qua diximus ratione temperatæ, ueneno resistunt, menses trahunt.

In primis uero frigidis mulieribus, qui albīs laborant mensibus, utilissimæ sunt.

Alia & plura Chamædryos iuuamenta, require in Betonica, cui temperamento & uiribus responder, ut iam aliquoties diximus.

EXTRINSECVS.

Chamædryos herbæ siccatae & decoctæ, deflectionibus & fetu, necnon in sacculis muliebribus locis impositæ, albos menses finiunt, & erosionibus uulvæ medentur.

Eadem cum aqua salsa, & aceto decoctæ, deinde uero cum fermento coctæ, ut fiat emplastrum, ac frigido stomacho impositæ, eructationem, fastidium, & uomitiones a frigida causa ortum habentes, compescunt.

In puluerem redactæ adiuncto semine Nigellæ æquali pondere, in sacculo calidæ, capiti impositæ, fluxiones & pituitam illius discutit.

Sunt & hæ plantæ uulnerariæ, si admixto aceto, uino, melle, uel oleo, prout consultum fuerit, usurpentur.


Gamamandrea cum farina fabæ lupinorū, aceto & aqua salsa decoctæ, decoctæ et percolatæ, surfures & porrigines capitis, & superciliorū tollunt, si huiusmodi decocto colluantur.

Et ut paucis omnia comprehendam, possunt omnes Gamandrae, necnon Teucrium, quod sequenti statim describemus capite, ad eadem omnia, ad quæ Betonicam facere docuimus, adhiberi, idq; in decoctionibus, positionibus

tionibus, Edegmatis, oleis, pulueribus, fotuac sudatorijs balneis, prout
cuique uidebitur.

De Teucrio, Germanis Erenbreiſ.

CAP. LXVIII.



T EUCRII HISTO-
riam propter adhærescen-
tes quas habet radículas,
post Hederas describere sta-
tueram, nisi affinitas, quã
cum Chamædry habet, à
proposito me reuocasset.
Cum namq; tenuibus ac
rotundis uirgis, radicibus,
flosculis, & semine Chamæ-
dryn prorsus referre uidea-
tur, operæ prætium fore ex-
istimaui, si quas natura &
formæ similitudo coniu-
xisset, eæ in scriptis nostris
à se mutuo nequaquam di-
uellerentur. Teucrium ita-
que per terram hinc inde
serpendo ueluti Numularia
sele propagat, folio longio-
ri ac asperiori, minutis di-
uisuris serrato, ut eono-
mine à folijs Pruni sylue-
stris parum dissideat. Flo-
res spicatos & exiguos pro-
ducit, ex lacteo colore cæru-
leos, purpura leuiter admix-
ta. Lis decussis, id quod fit,
Iunio mense, exiguum se-
men relinquitur, quale ha-
bet vulgaris Gamandra, a
foculamentis paruis con-
clusum, ueluti Bursæ pasto-
ris.

Forma.

Tempus

Virgæ

Virgæ eius, & flores frequentiores è lateribus quam primario caule prorumpunt. Cæterum tota sua substantia amarum est Teucrium.

2. *Agreste Sedum.* Est & aliud quoddam huius plantæ genus, quod tamen ad diuersa genera pertinere uidetur, partim enim Numulariam refert, partim uero Teucrion, posteriori tamen similis, at uiridius illo ipso, folio non serrato, molliori, Portulacæ pene simili, unde non inepte Sedum agreste dici posse puto. Quod ad flores, semen & loculamenta attinet, adeo cum Teucrio conuenit, ut inter utriusque semina differentiam inuenire difficile sit. Proinde tam hoc quam illud simul insyluis sub quercubus, locis arenosis, montibusque ac collibus & agrorum limitibus limosis, nascitur.

NOMENCLATURAÆ:

Teucrion haud immerito Chamædryos species censetur, non tantum ob similitudinem, uerum etiam quod sub quercubus (ut diximus) felicissime proueniat. Si quid uero de præstantia eius dicendum est, hoc unum ego affirmare possum, Teucrium mirabili & efficacissima ui aduersus aëris intemperiem pollere, adeo quidem ut ea in re multas alias plantas longo post se intervallo relinquat. Inprimis uero aquam è Teucrio per noctem & diem unam uino macerato distillatam, ad acutas & pestilenciales febres unice facere, in multis tam iuuenibus quam ætate prouectis expertus sum.

Teucrion.
Diosco. lib. 3.
cap. 102.

Quamobrè quicquid alij dicant, ego hanc plantam Teucrion esse, & pro Teucrio usurpandam censeo, neque moror siue Teucer Aiakis frater, siue alius quis, inuentor illius extiterit. Quisquis igitur usum Teucrii uerum nouerit, is certe ad lienis uitia utilissimum deprehendet, attestante id Hieronymo Braunschweig/qui Teucrion Veronicam cognominari tradit, à rege quodam Gallorum, qui succo eius herbæ ab elephantis morbo liberatus dicitur. At ego suspicor Veronicam potius dicendam, propter uires quas cum Betonica easdem obtinet. Nostri Doctores medici hac quoque utuntur planta, licet ignoret quid de illa ueteres rei herbariæ autores scripserint, interim pro more suo pleraque ex Empiricis mulierculis Circes pedissequis addiscentes. Ne tamen nomine careat, uocant illam Herbam Tunica, quod & floribus Gariophyllorum postea tribuunt, ut uel hinc appareat nihil in re herbaria certi apud hos magistros esse constitutum. Pastores nonnulli Germanica uoce Teucrion *Vihe murtz* / id est Aroma pecorum, singulari nimirum experimento, quo in puluerem redactum Teucrion, cum sale tussientibus pecoribus utiliter exhibetur, appellant. Mulierculæ quædam Serpentum à serpendo haud dubie, & Gruntheyl appellant. Vulgare uero apud Germanos huius plantæ nomen est *Erenbreiß*. Apud Dioscoridem, sequentia quoque obtinet nomina, Chamædrys, Trissago, Teucris. Est autem mihi

cem mihi hoc loco monendus paucis optimus lector, Teucrij & Teuthrij appellationes minime confundendas, de posteriori etenim Dioscorides, cum sic alia herba, seorsim agit lib. iij. cap. clv.

Alterum herbæ genus, folijs Portulacæ uestitum, Teucrio non abssimile, a veteribus Sedum agreste dictum existimo, quod cum Sedo non nihil affinitatis habeat, & in sylvis reperiatur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Teucrium tota sua substantia amarum est, easdemq; cum Betonica & Chamædry facultates obtinet.

INTRINSECVS.

Teucrium uino maceratum, ac distillatum, remedium est efficacissimum ad quasuis pestilentiales febres, binis uncjs cum modica Theriaca adiecta potum, quo facto stragulis probe se operire, & quiescere oportet, tum enim per sudores uenenum expelletur, & a corde arcebitur.

Ad eadem facit herba in uino decocta. Teucrium uicjs lienis opitulatur, & lien ipsum potenter absumit, per aliquot ex ordine dies potum.

Aqua Teucrij stillatitia per aliquot dies binis uncjs pota, uertigini auxiliatur, lentam incidit pituitam, sanguinem purgat, stomachum exalfacit, meatus iecoris aperit, pulmonis & lienis uitia emendat, uenas purgat, nec non matricem & uescicam, sudorem & uenenum expellit, regiumq; similiter morbum & calculum renum, & si quæ sunt aliæ corporis totius pestilentes affectiones.

Aqua Teucrij binis uncjs, & semiuncia, cui folia ipsius Teucrij in puluerem redacta, mediusq; cortex Amaræ dulcis, æquis portionibus, hoc est, una drachma adiecta fuerint, per aliquot dies pota, thoracis crassos & lentos humores discutit, ac excreabiles facit, suspiriosis prodest, potissimumq; exulcerationibus pulmonis medetur. Hoc ipsum prudentes pastores norunt, ij etenim pecoribus tussientibus Teucrij herbam in puluerem redactam, cum sale exhibent.

EXTRINSECVS.

Folia cum aceto, uel tusa, uel cocta, perq; aliquot dies imposita, induratum lien discutit & absumit.

Vncia uitrioli in puluerē redacta, ac in aqua Teucrij liquata, collutione putrida ulcera, lichenas, serpigines, papulasq; & alias quasuis scabies purgat, sanatq;. Idem succus herbæ præstat, uel per se, uel cum alumine.

Erit paucis omnia dicam Teucrium non solum hominibus, sed & iumentis, ad internas & externas affectiones, utilissimum est.

De Verbena. Cap. LXIX.

Eysen Frauc.

Verbena recta.

Verbena foemina.
na.

VERBENA, OMNIBUS notissima herba, passim ad sepes, muros, & in coemiterijs, alijsq; incultis locis, cubiti interdum altitudine, multis adnascentibus tenuissimis ferulis, arbusculam referens, luxuriat. Radix illius capillata est, haud admodum longa, caulis tenuis et quadratus, folia tribus diuisuris incisa instar cristæ gallinacæ, (unde a nonnullis Crista gallinacæ appellatur) aversa parte qua terram spectat, albicantia. Flosculos gerit ex albore & purpura uersicolores, in cacumine coliculorum, eosq; raro simul ternos aut quaternos, quibus pereuntibus proximi quicq; orbiculi florere ilico occipiunt. Semine prægnat oblongo, Plantaginis rubæ simili. Hæc planta uiridis adhuc, odore satis iucundo commendatur, gustu amara.

Alterâ uero Verbena quæ luteos profert flores, & Germanis hæcenus, Verbena foemina uocata, supra cap. xxxij. descripta

est. Forma enim & sapor illius euidentissime euincunt, ad Sinapi esse referendam.

Verbe.

Verbenam autem supinam Dioscoridis non satis mihi perfectam ac cognitam esse ingenue fateor. Verum enimvero novi stirpem quandam, quæ Verbenam supinam esse cōficio. Ea in locis humidis, palustribus, & fossis provenit, unico plerumque eoque purpureo & tereti cole, sesquicubitali nonnunquam altitudine, geniculis distincto, radice fibrata. Folia huius, Verbenæ rectæ prope similia, in tres scilicet partes dissecta. Augusto mense flore comaræ, rotundo, multipliciq; foliolorum ordine referto, sed non stellato, Conyzae simili. Proinde flores singuli è rotula seu stella viridi, instar oculi, purpureis ueluti supercilijis, per ambitum ornati, elucent. Semen in auras evanescit, instar Senctionis, odore ingrato, binis aculeis uestibus adherescens.

NOMENCLATURAE.

Verbenæ nomenclatura adeo uulgaris est, ut eam aniculæ etiam teneant, ex enim hac quoq; herba in Verbenis ac Sagminibus suis superstitiose uti solent, quæ certe superstitio ab ijs ortum ac progressum sortita est, qui inter Christianos illam maxime cohercere debebant.

Germanis *Eisenkraut* & *Eiserich* à ferro quod hac herba adurescere con
suevit, dicitur. Quare haud iniuria Agricola uir doctissimus in Dioscoride,
pro *feria* ferrariam legendum censuit. Vulgo herba sacra, Hierobotane, Sag
minalis. Verbenaca, Peristerion, appellatur. Dioscorides lib. iij. capite lviij
Bunion eam, Philtridotem, Iunonis lachrymam, Mustelę sanguinem, Mer
curij sanguinem, Cristam gallinaceam, Trixalim, Exuperam, Feriam, uel
ut iam indicauimus, Ferrariam, & Pemsempte cognominat. Plinio, Blatta
ria, Hermolao Barbaro, Columbaris, Lucinia, Lustrago, Militaria, Petono
mos, Panchromos, & Verminalica, Autori deniq; Pandectarum, Centrum
Galli nominatur.

ἡ ἀρχὴ βασιλείας, καὶ ἡ
ἐκδοχή

Quedam exempla
plaria Pheriam
legunt.
Blattaria.

Altera uero Verbenaca, quæ supina cognominatur, quibusdam Germanis *forzen ygel*, dicitur, posset & *Banenfamp* id est, Crista Gallinacea, à forma foliorum appellari. Hanc, siquidem sit Verbenaca supina, quidam Eri-
genion, alij Chamglycon, alij Sideritin, quidam Curitin, alij Persephonion, alij Iouis colum, alij Dichromon, alij Callefin, alij Hipparifon, nonnulli de-
metriada, Aegyptij Pemphthenphtham, Pythagoras, Eryscptron, Romani
Cincinalem uocant.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Verbena hodie etiamnum frequentius ad amuleta & expiationes, quam in medicina usurpatur, utiliter tamen utrinq; corpori humano adhiberi potest.

INTRINESCVS.

Recentiores herbarij Verbenæ omnes probe internas affectiones sanant.

diuim tribuunt, quippe quæ epar, lien, & renes obstructionibus liberare possit, uino decocta & pota.

Aqua Verbenæ distillata, iisdem facultatibus prædita dicitur, meatus scilicet epatis & pulmonis aperiendi, regium morbum discutiendi, uenum expellendi, & alia pleraq; quæ in historia Chamædryos annotata sunt, efficiendi.

EXTRINSECVS.

Verbena cum aceto tusa, ac illita, sacris ignibus opitulatur.

Eadem admixto melle imposita, uulnera glutinat. Folia cum suillo adipe ueteri tusa, ac imposita, uuluarum tumores deprimunt, doloresq; finiunt.

Verbenæ aqua frontitemporibus illitam, capitis dolores sedare, experientia compertum aiunt. Vtilissima est uero ea aqua ulceribus oris, locorumq; pudendorum, mariscis, alijsq; id genus, collutu.

De Verbena quæ Germanis foemina dicitur, suo loco differuimus.

Postrema autem nempe supina Verbenaca, serpentes, aliaq; uenenoſa animalia pellit, ueluti & Conyza. Potest etiam depascentibus, ac longe lateq; serpentibus ulceribus adhiberi.

De Stœchade. Cap. LXX.

STOECHADOS HISTORIAM POST ROSMARINVM,

& Lauendulam prosecutus fuissē, si eo tempore in horto meo satis excreuisset. Tamen si enim ut illa prouenire posset omnem operam impendissē, tamen ad florem ob hyemis iniuriam peruenire non potuit. Sed quocunq; loco tandem describatur, haud multum referre arbitror, quare paucis in præsentia illam delineabimus, præsertim cum in Germania nostra non usq; adeo uulgata sit. Ea itaq; recens adhuc odoratissima est planta, radice, foliolis, & caule, Lauendulæ similima, folijs acutis, & ea qua terram spectant parte, subcineracei coloris. Flores illius forma Betonicam referunt, nam tales illi Francoforti in nudinis uenundantur siccati, recentes etenim ex prædictis causis habere non licuit. Attamen in his ipsis aridis flosculis semen continetur exiguum, instar Melissæ, quod ubi terræ ineunte Maio mandatum fuerit, quemadmodum Basilicę, binis folijs prorumpit, atq; hac ratione plantata mihi fuit Stœchas. Porro & flos & herba huius gustum subamarum repræsentant.

VIRESCENTEMPERAMENTVM.

Flores & folia Stœchados calidam & siccam obtinēt temperaturam, aiuntq; eam puerperis a partu utilissimam esse, non tantum decoctionibus, sed

Stoechas.
Stoechas frut.



bus, sed & suffumigationibus. Nam is mos in multis regionibus, iam-
dudum inolevit, ut a partu mulieres optimis quibusque & odoratissimis
herbis suffumigentur. Quam consuetudinem equidem ut non impro-

barim, ita inprimis optarim, ut herbarum proprijs ac genuinis uiribus cō-
renti, non ad magicas coniurationes, quibus singulares quædam faculta-
tes plantis addisulta putat uulgi opinio, confugeremus. Deo gloria, suisq;
honor creaturis tribuatur, ita tamen nenostis illas coniurationibus melio-
res efficere stulci conemur.

● INRINSECVS, ET EXTRINSECVS.

Stichas non aliter atq; Hyssopus ad uitia thoracis, & pectoris facit, qua-
re indifferenter utraq; stirpe uti possumus.

Flores autem uertigini accommodati sunt, olfactu, impoſitu, aut certesi
illis in Tragemate utamur, prout cuique uidebitur.

De Bursa pastoria. Cap. LXXI.

LVRIMAE EQVIDEMPLANTAE REPERIUNTVR

- quæ a seminum receptaculis, Bursæ pastoriæ dici commodè
possent. Nos in præsentia aliquot earum recensēbimus. Prima er-
go sit ea quæ sub Thlaspidio descripta est. Binae deinde sequuntur aliæ, lu-
teo in uulgis prægnantes semine, gustu ac sapore Nasturtij, quarum men-
tionem fecimus cap. xxvij. cum de Nasturtijs ageremus. Rursus quar-
ta quædam in agro Vormatiensi (nam non ubique inuenitur) secus itinera,
& inter uineas luxuriat, compluribus longis teneris ac tenuissimis uirgulis,
ac furculis, quæ paucis & admodum exiguis foliolis, ac angustioribus,
quam sint folia Centumnodiæ, uestiuntur. Forma, odor, & gustus semi-
nis, Nasturtium referunt, nisi quod illo acrius est, & paulo etiam minutius.
Mulierculæ Besem fraut appellant, quasi scopariam herbam, scoparum e-
nim instar pauimentis uerrendis, idonea est.

Atqui duæ uulgares huius generis stirpes, de quibus in hoc capite ora-
tionem peculiariter instituiimus, quæ & passim proueniunt, forma pene eæ-
dem sunt. Ut autem recte dignosci possint utranq; depingemus.

- Maiores & uulgatissima, nempe quæ in hortis, secus uias, in parietinis, lo-
cis denique cultis pariter ac incultis nascitur, plerumq; unico assurgit caule,
terete, & dodrantali. Folia eius prima, antequam in altum se tollant, dis-
secta sunt, instar foliorum Verbenæ uel Cardui benedicti. Radicem habet
rectam, tenuem, candidamq;. Folijs paucis uestitur. Caulis qua in altum at-
tolitur, in multos sese diffundit ramulos, qui omnes in summitate sua can-
didos ferunt flosculos, Verbenaq; floribus minutiores, qui tandem in uul-
gas exiguas, seminibus paruulis refertas abeunt. Est uero hæc herba omni
prorsus destituta odore, ueluti omnia pene olera culinaria, perq; totum an-
num instar Senecionis perdurare potest.

Postre

Bursa pastoris.
Teschelkraut.



dis distaret. Nihil tamen hic affirmarim, quin potius sit maneatq; Bursa pastoris.

Postrema autem Pastoria bursa iam descriptæ similis est, flore & uulgis, quibus semen clauditur, ac folia huius cum primum oriri cœperint, ad similitudinem stellæ humi diuissimè sparsa iacent, Pitosellæ uulgaris haud multum dissimilia. Cauliculos habet nudos, dodrantales, interim & exiliores, tenues. Vasculum quodq; in quo semen continetur acinum Peponis (quam Germani Melonen uocant) refert. Floret in eunte Maio, gaudet arenosa terra, sapore ac odore omni carens.

NOMENCLATURAE ●

Germanis *Seckelkraut* *Teschelkraut* vñnd *Hirtenseckel*, Latinis *Bursa pastoris*, *Pera pastoris*, & quibusdam *Herba cancri*, *Crispula*, *Sanguinaria*, & *Sanguinalis* dicitur, nec iniuria, cū sanguinis eruptiones sistere possit. Videtur uero mihi hoc loco non *Sanguinalis*, sed *Sagminalis* esse legendum, quod si firmum esset, certe hæc planta non procul à *Verbena prima* *Dioscori*

Bursæ illæ magnæ pastoriæ, quæ latioribus uulgis conspicuæ sunt, sub Nasturtio describuntur. Acuulgatissima in his stirpibus, nempe quinta, frigida & sicca naturæ utitur, necesse est, nam sanguini sistendo utrinque corpori adhibetur.

INTRINSECVS.

Bursa Pastoria siccata uino rubro, uel aqua pluuiali, in qua Chalybs candens extinctus fuerit, decocta ac pota dysentericis ac lientericis fluxiones alui cohibet, urinae sanguinolentæ medetur, sanguinis excreationes, mensiumque abundantium profluvia sistit, omniumque internorum uiscerum qualuis erosiones sanat.

Eadem aqua distillata per aliquot dies continuos, mensura quatuor aut quinque coclearium pota efficit.

EXTRINSECVS.

Errhinon ex lineo panino factum, succoque herbæ madefactum, ac naribus inditum, sanguinem sistit. Idem succus, uel aqua etiam distillata, uulnibus recentibus colluendis utilissima sunt.

Multi in ea sunt sententia, ut credant, sanguinem ex naribus alijsue uulnibus manantem cohiberi, si herba saltem apud eum hominem incaluerit.

De Verbasc. Cap. LXXII.

VERBASCITRIA PASSIM ET VVLGATA INVENTUNTUR genera, quæ omnia incultis & arenosis agris, secus itinera, in collibus & sepibus, ubique fere affatim proueniunt.

Quodque in his maximum est & notissimum, longam habet, rectam, rotundam & lignosam radicem. Folia uero maxime ea quæ prima erumpunt, humiliter iacent, admodum lata, necnon oblonga, ex cinereo albican-
Verbascum maius.
tia, pilosa, Elenique folijs molliora. Secundo primum anno in caulem exit candida medulla intus refertum, ueluti Sambucus, cumque nonnunquam usque ad altitudinem attingentem, ac ab imo usque ad summum, folijs ex ordine uelut stitum, quæ tamen quo altiores in caule obtinent locum, eo etiam angustiora, & minora euadunt. Flores fert luteos, lanuginosos, & odoratissimos quibus foliolis distinctos, qui caulem circumquaque ad fastigium usque ambiunt, quibus decussis, teretes ac pilosi globuli, copioso semine, Papaueri haud absimili,

Verbascum.
Wulffraut.



abstissimi, ac minori pregnātes, subsequuntur. Proinde hæc planta cum floribus emicat candelam pulcherrimam, forma sua repræsentat, unde illi Candelæ regię nomen impositum est. *Candela regis.*

Alterum Verbascum, ad superius forma accedit, nisi quod per omnia illo magis exiguum est. Folia huius nigricant, grauiusq; & male olent. Flores uiolis similes gerit, ex pallido luteos, quinis purpureis notis pictos, totidemq; lanuginosis staminibus quasi diuisos, & non minus odoratos, quam primi generis. *Verbascum nigrum.*

Tertium in syluis, præsertim in Vuasgouia reperitur, radice & caule secundo generi haud dissimile. Folia eius candicant, modicæq; lanugine horrent, flores plane candidos habet, odore gratos, nam herba ipsa & cætera omnia grauius olent. Semen in folliculis seu globulis rotundis clauditur. Hic uero mihi uide naturæ miram & uariam uim, nam quemadmodum in Coriandro solum semen odore iucundo commendatur, ceteris partibus *Syluestre Verbascum.*


grauolentibus, ita in hac stirpe nihil est odoratum, præterquam flos ipse.

Postremo inuenitur in quibusdam altissimis syluis, qualis est ea, quæ Germanis der Ydar dicitur, herba quædam, incanis ac mollibus folijs, mi- *Naturæ miraculum.*

Verbasculum.

Verbascum nigrum.

Schwarz Wulfraut.



noribus tamen quam sint in reliquis Verbasci generibus, è quorum medio elegantissimus cærulei coloris flos prodit, Cyano (quo de infra cap. cxcij.) non absimilis, ac maior, pediculo fere dodrantali insidens. Hanc herbam Verbasculum esse suspicatus sum, cum foliorum mollietiem considerare, quod ad florem attinet Cyanum sylvestre, Germanice Wäldt-Tornblüm appello, quoad commodius emergat nomen. Sunt qui herbam Paralyfin, Verbascis accenseant, sed qua ratione non uideo, nos de illa suo quoque loco egimus.

NOMENCLATURAE.

Verbasci apud Germanos hæc sunt nomina, Wulfraut / Künigskerz / Biechfraut / Hinkelbrant / Vnhol den kerz. Dioscoridi lib. iij. cap. xcix. *φλέμω*, Lucernare, Lychnitis, Pheminalis. Latinis, Lanaria, Candelaria, Tapsus barbatus, Regis candela. Barbaris, Cauda lupina, Aspalatū, Pomphilogos, Abedonei,

1. Busuri, Flominos. Manlio, Auidon, Auion, & ut quibusdam placet, Aui-

φλέμω.
λευκοφύλλον.

cennæ lib. ij. cap. cij. Busuri appellatur. Ego maius Verbascum masculum Leucophyllon, & Verbascum arborescens esse existimo, tametsi uerba Dioscoridis

Verbascum.
Waldtorn blümen.



scoridis aliam præ se ferre
sententiam uideantur. Alce
rum *Verbascum nigrum*
appello. Tertium quod 3.
candido emicat flore, syl
uestre *Verbascum*, seu al
bum dixerim, estq; illud cū
præcedente eiusdem fere na
turæ, cum utrunq; grauissi
me oleat, quod testabun
tur quicunque has herbas
nouerunt, Pliniumq; libro
xxv. cap. ix. legerint, nam
non solum scripta ueterum
euoluenda sunt, sed & expe
rientia ipsa adhibenda est,
si ad exactam stirpium co
gnitionem peruenire ali
quando contendimus. Po. 4.
stremum *Verbascum* a
Dioscoride *Lychnitis*, Lu. *λυχνίς*, *λυχνία*.
cernare, & *Tryallis* nomi
natur.

Nomenclaturæ itaque
quas nunc recensuimus sa
tis apertæ ac planæ sunt,
quare a prolxiore illorū
explicatione supersedebi
mus, paucis nonnulla indi
caturi. Differūt itaq; *phlegma*,
& *Phlemos* quæ est uiperi
næ apud Apuleiū cap. v. ap
pellatio. Aliud est item *Ta*
xus, uenenosa illa arbor, cu
ius Vergilius in *Æglis*
meminit, aliud deinde *Ta*

xus barbatus (sic enim quidam scribunt, licet alij *Tapsum* dicant,) quod est
Verbasci cognomen.

Quod autem quidam *Verbascum Lanarium* herbam appellant, (quam
quam

quam & apud Dioscoridem libro ij. cap. liij. peculiaris sithherba, quæ hoc nomine insignita est) id sine causa non fit, cum folia eius pilosa sint, ac ueluti Salvia omnem attrahant puluerem, unde & Blattaria iure dici posset, quemadmodum de Verbena Plinius libro xxv. cap. ix. scriptum reliquit, Superuacanea hæc forsan uidebuntur, at nullam aliam ob causam in medium a nobis adducuntur, quam ut non solum proprias stirpium differentias, proprietates & facultates, sed & appellationes illarum ueras tandem discamus.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Omnia Verbasci genera, maxime folia & flores ipsorum, dolores, tam in interioribus quam externis partibus subortos, sedandi, facultatem obtinent.

INTRINSECVS.

Radix Verbasci magni uino rubro, uel aqua (siquidem febris adsit) decocta, & pota, quotidiana alui profluuiâ, quam Diarrhœam uocant, cohibet.

Idem aqua ex floribus distillata, & per aliquot dies mensura quatuor aut quinque coclearium pota, efficit. Eadem hac ratione usurpata, tormina uentris sedat.

Decoctio Verbasci, necnon aqua distillata, quarum nunc mentionem fecimus, ruptis, conuulsis, fractis & contusis, laborantibus uitio pulmonis, tussientibus, omnibus internis apostematibus, ac doloribus & inflammationibus auxiliantur.

EXTRINSECVS.

Verbasci folia, aut flores in aqua decocti, oculorum, ani, & genitalium inflammationibus, tumoribus, abscessibus, & podagræ etiam calidissime, infusionibus, & si calida in linteolis imponantur, apprime conducunt.

Easdem uires aqua distillata obtinet, in primis uero oleum quod solis calore ex floribus uitreo uase diligenter obturato, conficitur, qua ratione etiam oleum ex flosculis Rosmarini elici potest, quod sane quam utilissimum est.

Aqua distillata, oculis indita, fluxiones eorum cohibet. Ea, si facies per aliquot dies abluatur rubores illius protinus tollet. Erysipelatis, sacris ignibus, & ambustis, necnon impetigini ac malæ scabiei efficaciter adhibetur, si affectis partibus linteolum duplex in aqua illa madefactum imponatur.

Dioscorides scribit Ficus folijs maioris Verbasci substratis ex ordine, per annum a corruptione uindicari.

De Hyssopo campestri.

Cap. LXXIII.

Heyden Ysop.



FRUTEX ISTE IN aruis incultis, et montibus inter ceteras sylvestres plantas nascitur, radice lignosa, quæ unica sæpe plurimas uirgas easq; dodrantes, humiq; iacêtes progignit, exiguis & angustis foliis instar Genistæ aut Hyssopi uestitos. Iunio & Iulio mensibus, flore emicat luteo, non aliter quam Anserina, uel Ranunculus uulgaris, nisi quod aliquantulum hic palleret. Is ubi decussus fuerit, folliculis rotundis semen luteum contentum, apparet. Proinde destituta est omni odore hæc herba, succum autem glutinosum, ac lentum, instar Consolidæ maioris fundit.

NOMENCLATURAÆ.

Quod huic plantæ apud Germanos proprium sit nomen, scire nondum potui, quare quoad commodior aliqua inueniatur appellatio, interea uocabimus *Seldt Ysop* / seu *Heyden Ysop*, nam & folia & uirgæ Hyssopi habet, ut supra diximus.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Necq; etiam quicquam de uiribus illius compertum habeo, nisi quod eas sagminibus

sagminibus suis mulierculæ adiungere solent, creduntq̃ tumoribus, ac paralyſi membrorum, ſi in balneis quibz utatur, uel imponat, uſiſſimum.

De Asparago.

Cap. LXXIII.

Spargen.



QVA RATIONE ex ſemine & radice Asparagus, de quo nunc agendum nobis eſt, plantetur, multi tradiderunt, in primis uero Palladius mēſe Martio, titulo nono, quo ſtudioſum lectorem remittimus, ad deſcriptionē herbæ prope- rantes. Asparagus Maio mēſe grandi radice, ac thyrſo primum frequēti, recto, digitum craſſo, terete, pin- gui, & ſucculento, folijs ca- rente, proſilit, non aliter quam Lupuli prima germi- na. Cæterum hi turiones ſiue Asparagi appetente Iu- nio in longos caules, folijs tenuiſſimis, incifuris diuiſis ac capillamenti modo tenu- atis, Foeniculo ſimilibus, ueſtitos explicantur. Florē æſtate fundit paruulū, quo decuſſo bacculæ dependē, primū uirides, tandē uero rubei coralli inſtar rubefcē- tes, ſeminibus reſertæ. Na- ſcitur lapidoſis locis, limo- ſis collibus, apricis cam- pis, maxime in agro Vor- marienſi, nonnunquam & in humectis. Qui radices uenales circumferunt, ſi in Rinckga-

Rinckgauia, in pratis Vucinheimenſibus Aſparagi radices effodiunt, eaſq; Antuerpiam uſq; deportant.

Aſparago hodie Italīs & Hiſpanīs nihil frequentius in acetarijs, quam & apud Germanos in uſu non ita pridem eſſe cœperit, quid enim eſt, quod in gulæ uoluptatem non uertatur, quid denique tam rarum, in uictu & ueſtitu, modo ad uoluptatem & delicias faciat, quod non frugalitatis, ſobrietatisq; maiorum noſtrorum plane obliſi, imitari conemur?

NOMENCLATURA.

Aſparagus officinis extrita priori litera, Sparagus, Germanis *Spargel*, & quibuſdam *Teuffels trauben*/quaſi uua Diaboli, propter baccas inter folia dependentes, appellatur. Theophraſto, Corruda, uel Corrudago. Serapioni, Halion, & nonnullis, Nalion, Aſtuſung. Plinio, Libycum, Horminum. Auerrhoi Alhaſce (quod nomen altero Thymo quoq; tributum eſt) Apuleio, Aſpharagos, Acanthillis, Aſparagus ruſticus, Aſparagus noſter. Dioſcoridi denique *κράταγος* *μαρίνη*, hoc eſt, Murina ſpina, qua apellatione & Myrtus ſylueſtris uenit, Orminion, ſed & hoc nomine Aloe apud Dioſcoridem lib. iij. cap. xxiij. cognominatur, ut interim de Aſparagi uoce taceam, quæ non ſolum in genere olerum germinibus, quæ primum in lucem prodeunt, antequam in folia explicentur, recentiſſimiſq; turionibus qui edendo ſunt, paſſim apud authores purioris latinîtatis, tribuitur: ſed & a Dioſcoride lib. ij. cap. cxxxv. Smilaci horteniſi aſcribitur.

κράταγος.
Theop. lib. 6.
cap. 3.
Serap. cap. 4.
Plinius lib. 20.
cap. 10.
Apul. cap. 28.
Dioſco. lib. 2.
cap. 114.
Dioſco. lib. 4.
cap. 141.

VIRESCACITUDINIS ET TEMPERAMENTUM.

Recentes Aſparagi turiones, cibis idonei ſunt, ſemen & radix officinis, proinde Aſparagus abſtergendi mediocrem ſortitus eſt naturam, nec nimium frigidam, nec etiam abunde calidam. Vrinam pellit teſte Simone Lauenſi.

INTRINSECUS.

Aſparagi recentia germina, uino cum butyro & aceto decocta, qua ratione & Lupuli turiones parari ſolent, aluum emolliunt, uicia pectoris expurgant, urinam promouent, ſed & genituram minuunt, ſi quis continuo illis utatur.

Radix uino decocta & pota obſtructionibus iecur liberat, morbum arquantum expellit, renes purgat ac ueſicam, Iſchiadicis plurimum conducit.

Herba aut ſemen uino decocta, & aqua diſtillata, eaſdem obtinent facultates.

Aduer-

Aduersus morbum regium, decoquitur radix cum ficis & cicere, qua potione sumpta, morbum pelli asserunt.

Radix resiccata & uino decocta ac pota, dysentericis & stranguria laborantibus auxiliatur.

EXTRINSECVS.

Radix Asparagi in minutas partes dissecta, tusa, uinoq; decocta, ac calida imposita, dolorem in membris luxatis ortum, sedat. Herba pari ratione parata dolorem renum mitigat. Succus herbæ ore retentus, dentium dolorem sedat.

De Plantagine. Cap. LXXV.

NON CERTE MIRVM VIDERI DEBET, CVR CHRYSIPPUS Plantagini peculiarem ac proprium dicauerit librum, u. niuersam eius laudem copiose complexus, cum ad tam uaria efficacitas sit. Nam & Chirurgici ea utuntur, & in officinis, seplasijsq; nihil illa notius. Quid? quod in uulgo nemo fere est, qui ex quotidiano usu & obseruatione non didicerit, quibus uiribus Plantago prædita sit, præsertim si qui illam in cibis iam usurpare consueuerunt, aduersus alui fluxiones. Quare operæpretium non est, ut in commendatione huius plantæ diu immoremur, satiusq; fuerit ad historiam accedere.

1.
Plantago maior

Plantaginis tria sunt genera, ita ut alia sit maior scilicet, alia minor, alia uero media. Maior folia fundit Gentianæ, uel Betæ similia, humi iacentia, quorum singula septem fibris seu costis, in folij sine prope radicem concurrentibus auersa parte distincta sunt. Caulem emittit teretem, læuem, & dodrantalem in summitate spicatum, semine in tenerrimis folliculis concluso prægnantem. Radix huius plurimis fibris capillata.

2.
Plantago media.

Media, tota sua substantia magis est exigua, habetq; iidem folia semper per terram instar stellæ diuisim sparsa, semperq; uirentia, ac aliquantulum ad cineraceum colorem uergentia, hirsuta & aspera, septenis neruis diuisa, ea cum ad iustam suam magnitudinem peruenere linguam referunt. Caule exilit dodrantali, nudo, flore ex spicatis fastigijs prodeunte, ut in frugibus uidere est, semine oblongo, Basilicę semini similimo.

3.
Plantago lan-
ceolata.

Tertia uero Plantago omnium minima, ac angustissima producit folia, fibris suis distincta, colore fere nigricantia, coliculi eius non rotundi, sed angulosi, ac friati, non aliter ac si septem illi nerui qui per folia sparguntur, in hunc caulem quasi unum corpus coluissent. Florem fert spicatum, & nigrum, qui cum floret candidus est, ut & mediæ Plantaginis, refertq; forma

Plantago rubra.
Roter Wegerich.



Plantago lanceolata.
Spitzer Wegerich.



sua capillos punctis minutis, inferne appensis conspicuos. Semen huius multo est maius quam reliquorum, quantum etenim illis radicis, foliorum, & florum quantitate cedit, tantum rursus illas seminis magnitudine,

Plantago latifolia.
Breiter Wegerich.

Plantago aquatica.
Wasser Wegerich.



& usq; superat. Nascuntur autem omnia Plantaginis genera, in humectis hortis ac pratis, florentq; Maio & Iunio mensibus.

4.
Plantago aquatica.

Iam & alia, Plantagini non usq; adeo dissimilis herba, in fossis nonnullis, palustri-

palustribusq; locis inuenitur, folio pingui & uiridi, longo caule, eoq; in altitudinem ramoso, flosculis candidis et copiosis, instar Limoni. Hęc Germania Waffer Wegerich/ id est, Plantago aquatica, (tametsi inter Plantagines nō uideatur connumeranda) & frosch löffel/ quasi Ranæ coclear, si ita dicere liceat, eo quod folia eius coclearium formam representant, quando & Ranæ illis gaudent, appellatur.

NOMENCLATURAÆ.

Quia linguæ similes sunt Plantagines, ideo apud Græcos, quæ sequuntur nomina sortitæ sunt, *ἡ γλῶσσοις, ἡ γλῶσσοις, ἡ γλῶσσοις*, hoc est, Lingua agni, Herba agnina, Ouilla herba, quo nomine & Ocimastrum uocat Dioscorides lib. iij. cap. xxix. Propter fibras uero & cōstas quibus distinguuntur, *πνύξ, πνύξ, πνύξ*, Multineruiam, Septineruiam, uocant. Dicuntur etiā Cynoglossa (de qua uoce paulo post) quod Plantaginis & Cynoglossæ eadem fere sint folia, quod ad formam attinet, Coturnix, Gelapyros, Stelaphuron, Eurechnomonon, Asonth, Thesarica, Atircon. Vulgatissimum autem harum stirpium nomen est Plantago, quæ appellatio a doctis maiori generi, quod Germanis Roter Wegerich/ hoc est, Plantago rubea, dicitur, (eam ni mirum ob causam, quod semen eius aliquantulum rubescit, uel quod aduersus dysenteriam usurpari consueuerit) assignatur. Altera Lanceolata, & minor Plantago, & Lanceola, (sed & hoc nomen alteri cuidam plantæ lib. iij. cap. cliij. tribuit Diosco.) Germanis Spitzer Wegerich. Tertia uero Plantago media, Germanis Breiter Wegerich/ hoc est, Plantago latifolia, nominatur. Mirum autem est quod non solum Dioscorides, & Plinius, Dio. lib. 2. sed & Apuleius (apud quem ista leguntur Plantaginis cognomina, Thyr- cap. 115. sion, Vranichneumonos, Asthat, Tarbidolopion, Thesarica, Simpeax, Ar- Plinius lib. 25. tiercon, Plantago lata, Plantago maior) duorum duntaxat plantaginis ge- cap. 8. nerum meminerint, potestq; fieri ut uel tertium illius genus non nouerint, Apul. cap. 1. uel certe illud cum primo coniunxerint, proq; uno & eodem habuerint. Se- Serap. cap. 223. rapioni Plantago Lifen Alhamel dicitur. Auicennæ lingua arietis. Man- Auicenna lib. 2. lito, Bleta syluestris, eidem minor Quinqueneruia, propter quinque fibras, cap. 439. quanquam interdum septem quoque habeat, Phrysius maiorem Plantaginem, Ascher uocat, minorem uero Herlarum, Megeboram, Herbam Martis, & Germanica uoce Spißfraut. Ex his itaq; quæ de nomenclaturis Plantaginis nobis disputata sunt, rursus animaduertere licet, in summa obscuritate rem herbariam uersari, postquam nobilissimæ stirpes quamplurimis insigniuntur appellationibus, cui difficultati nulla alia re consuli poterit, nisi genuinis suis nominibus donentur plantæ, cæteris repudiatis. Quod ut fiat aliquando, rogamus omnes studiosos diuine simplicium cognitionis,

& adhortamur, ut diligenter, & cum iudicio optimorum authorum, qui hanc medicinæ partem scriptis suis exornarunt, sententias perpendant, & cum uiuis herbarum imaginibus conferant, ex qua collatione ueritas tandem elucebit.

VIRE S AC TEMPERAMENTVM.

Inter multas plantas Plantago usitatissima est. Quod ad temperamentum attinet, refrigerat illa & exiccat mediocriter, quare uulneribus tam hominum quam iumentorum utilissima est.

INTRINSECVS.

Plantaginis herba recens in cibo cocta & usurpata, uel semen eius, aut quoduis horum in puluerem redactum, ac introsumptum, internorum uiscerum erosiones per sanat, alui profluuiâ cohibet, phthisicis prodest.

Aqua distillata Phthisicis commodior usu, necnon sanguinem mingentibus, & excreantibus.

Plantaginis radices ternæ uino decoctæ, ac potæ, febris tertianæ, quaternæ uero quartanæ medentur teste Dioscoride, tametsi aquam distillatam mensuracoclearis unius sumptam, in accessione febris magis probem.

Eadem, seu succus Plantaginis expressus per aliquot dies continuos bibitus, menses sistit, internas erosiones sanat, id quod experientia testatum fecit.

EXTRINSECVS.

Experientia proin compertum est, capitis dolores tolli, linteolis in aqua, seu succo Plantaginis madefactis, & impositis.

Succus oculis inditus inflammationes illorum aufert, similiter aduersus aurium dolores efficax est idem succus, & auditum restituit.

Aqua gargarissata aliquoties per diem, exulcerationi oris, et colli, alijsq; id genus uitij opitulatur.

Radix Plantaginis cum radice Pyrethri in puluerem redacta, dentibusq; excauatis imposita, dolorem sedat.

Morsibus serpentum & canis rabiosi, succus Plantaginis auxilium adfert, si illo uulnera colluantur.

Omnibus elephanticis & serpentibus ulceribus, mentagris, fistulis, cancro carbunculis, herpetis, & depascentibus, medetur succus uel aqua herbæ Plantaginis, si illis colluantur continuo.

Aqua uel succus Plantaginis cum Sedo temperatus, sacris ignibus, inflammationibus & ambustis igni prodest.

Quidam.

Quidam strumas discuti pollicentur, radice de collo suspensa.

Omnis generis inflammationibus & tumoribus præcipue conducere Plantaginem aquaticam multorum prædicatione confirmatum est.

Breviter omnes Plantagines, herbæ sunt uulnerariæ, tam recentibus, quam inueteratis uulneribus utilissimæ.

Erasmus in colloquijs suis buffonem ab aranea ictum a Plantagine remediū petere affirmat. Atq; hæc de Plantagine dicta sufficiant, nunc ad Cynoglossam nos conferemus, quæ ut in folijs cum Plantagine, ita & nomine aut supra meminimus, cum eadem affinitatem quandam obtinet.

De Cynoglossa. Cap. LXXVI.

DIOSCORIDES LIB. III. CAP. CXXIII. SCRIBIT

D Cynoglossam caule uacare, cui & M. Vergilius interpres doctissimus astipulatur, eamq; sententiam alij quoq; uiri doctissimi approbant. Qui fit ut unum e duobus suspicari necesse sit, nimirum uel nostram Cynoglossam aliam esse ab ea, cuius Dioscorides & alij meminerunt, cum nostra caulem habeat altitudinem nonnunquam binorum cubitorum excedentem, aut certe, si quidem eadem sint duæ hæc stirpes, consentaneum est Dioscoridem, & qui eum sequuntur Cynoglossam non uidisse, nisi primo anno e terra erumpentem, tum enim humi folia eius sternuntur, ueluti Plantaginis latifoliæ, perq; hyemem illæsa durant, deinceps uero appetente Iunio mense caulem emittit foliatum, & hirsutum, ac lanuginosum, sicut & Buglossa. Proposui quid mihi uideatur, quod si alijs placuerit, hanc nostram Cynoglossam pro ea recipere, quæ a Dioscoride describitur, per me sane id licebit, neq; enim repugnabo. Ad historiam itaq; accedamus. Caulis illius, quem altero demum anno progigni, proceritatemq; duum, uel ternum pene cubitorum attingere diximus, folijs mollibus uestitur, purpureisq; flosculis Buglossæ illi, quam Germani quidam die *Obßen zung vom ham* uocant, similibus, ex ordine collocatis emicat. Ac his decidens umbilici lappacei, ricinis seu cimicibus haud multum dissimiles, inq; bini aut terni ad formam Trifolij coniuncti, subsequuntur, qui ubi Iunio mense maturuerint, non aliter quam Lappæ uulgares, aut echini Eupatorii uestibus inhaerent. Radix quandoq; digitum crassa euadit, forma sua Rapam exiguum representans, foris colore pullo. Nascitur Cynoglossa in paretinis & muris secus sepes, quo omnis generis sordes conijci plerunq; solent, sabulosisq; & incultis deniq; locis.

Cynoglosson.
Hundezung.

NOMENCLATVRAE.

Κυνόγλωσσος Græcis, Cynoglossa & lingua canina Latinis, Hundezung Germanis dicitur. Posset & eadem lingua Hundesfraut / id est, herba canina, Hundeswurtzel / id est radix canina appellari, cum tota sua substantia foetore canino grauiter oleat. Hanc alij (teste Dioscoride) Phytton, alij Caballation, alij Splineion, alij Scolymon. Romani Linguam canis, aut Caninam appellât. Apuleius cap. xvi. Phrygian, Hemi-onion, Splenion, Caballion, Scolymon, Pyrgin, Leucrion, Zenis, Sublabium & Linguam Macedoniam uocat. Manlius sup. pillu. Reumat. Mesue. Cynoglossam ait à quibusdā, Kaliber, Cenesfē, Alchzaaber, Cabcachar, Alcarcachar appellari. De Splenij & Scolymi uocibus, plura infra clxxxij. & clxxxviij. capitibus libri primi commentariorum nostrorum.

VIREs AC TEMPERAMENTUM.

Cynoglossa frigidam & siccam temperaturam obtinet, inueteratis, & malignis ulceribus & mariscis præsertim sanandis efficacissima.

INTRIN-



Cynoglossæ uox
& Plantagini et
Narcisso tribuitur,
uide cap. nostrum de Plantagine,
et Apuleiū cap. 54.

INTRINSECVS.

Radix Cynoglossæ uino decocta, uespericq; & mane bibita, aluū emollit. Eadem fermento obducta, ac paulatim in calido cinere tosta, & assata, postea abiecto fermento locis affectis balani instar indita, calorem & dolorem internarum mariscarum protinus aufert, utq; cito curentur efficit, experientia id attestante, neq; multis hoc genus curationis notum est.

EXTRINSECVS.

Aqua Cynoglossæ, succus & puluis eius mariscis utilissima sunt, collutione & inspersu.

Aqua distillata alia quoque sanat uulnera, præsertim genitalium, linteolis in ea madefactis ac impositis.

Herba tusa, & cum adipe suillo in sartagine tosta, moribus rabiosi canis medetur, & ambustis: caluis illitu capillos reducit.

Aduersus inueterata mala pustularum, fistularum, & aliorum abscessuum tumidorum, unguentum e Cynoglossæ succo confectum illitu efficax est. Confectio uero sic se habet, Succum Cynoglossæ cum melle Rosarum æquis portionibus paulatim, quoad succus absumatur decoque, post Terebintinam admisce, & fiet unguentum præstantissimum.

De omnibus Buglossæ generibus.

CAP. LXXVII.

VGLOSSÆ QVATVOR SVNT GENERA, DVO Nimirum domestica, duo alia syluestria, eaq; magna & exigua, quæ omnia ordine explicabimus.

Maior itaque domestica Buglossa in quibusdam regionibus, ut in Lothoringia in agris optimis prope Dufam, Nanceam, & quæ Germanis *Vielans* pfort dicitur, prouenit, alias in hortis plantari consuevit. Radix illius quandoq; cubitum longa euadit, recta, pulla foris. Folia Aprili menselonga, hirsuta, nigricantia, spinulis horrida, humiq; in circulum stellatim sparsa fundit, quorum nerui seu uenæ, qua radicem spectant, quandoque purpurei apparent, ut eo nomine prope ad formam foliorum Cynoglossæ accedant. Maio mense ternos aut quaternos quandoq; oblongos ac hirsutos caules emittit, in fastigijs surculosos, folijs ab imo usq; ad summum inæqualiter longis, ac subinde angustioribus uestitos, eaq; omnia folia formam linguæ acutæ representant. Flores fertradiatos, instar rotulæ, par-


^{1.}
Buglossa domestica maior.

Buglossa Italica.
Welsch Ochsenzung.



tim candidos, partim purpurantes ante solis ortum, qui si radijs suis uiolas
illas percusserit, pulchre cæruleo inficientur colore. Floribus decussis in
hirsutis ac stellatis uasculis tria uel quatuor semina coniunctim posita, ob-
longa.

Buglossa maior.
Ochsenzung die groß.



longa ac rugosa, ueluti semen *Consolidæ maioris*, at maiora, capitulis uiperarum similia, sapore *Amygdalino* prædita reperiuntur. Ex his plantari potest *Buglossa*, quæ tamen primo plantationis anno raro ad frugem & florem peruenit, sed altero demum, ueluti & *Cynoglossa*, ac *Consolida maior*.

Secunda domestica & nobilis *Buglossa* supra de ² *Buglossa domestica altera*, scriptæ quadantenus accedit, nisi quod illa breuior, angustior, acuminatior, ac quoad omnia magis exigua est, semine præsertim, quod & magis nigricat. Flores huius uiolis similes sunt, sicut & præcedentis, ñq̃ nonnulli cerulei, alij plane purpurei perpetuo.

Sylvestris *Buglossa* in ³ *Buglossa sylvestris*, agris, ac collibus maxime secus itinera passim inueniuntur, caulibus prælongis, copioso eoq̃ ex cæruleo quodammodo colore purpurascente flore emicantibus. Aliæ huius generis nonnullæ stirpes candidos gerunt flosculos. Forma herbæ, caulium & radicis, & color sylvestriū *Buglossarum*

cum domesticis conueniunt, quanquam folia in his sint magis horrida & acutiora. Floris duntaxat forma qua *Galiopsis* imitantur hæ *Buglossæ*, a domesticis dissident.

Buglossa sylvestris.
Waldt Ochsenzung.



NOMENCLATURAE.

Quamuis mihi dubium non sit, quin plerique nostrā hoc loco sint reprehensuri sententiam, eo quod illa a placidis doctissimorum uirorum, uidelicet Nicolai Leonici, Marcelli Vergiij, Leonhardi Fuchsi, aliorumque multorum, qui uno ore omnes Buglossam nostram *nigellam*, seu *nigellam*, Dioscoridis esse affirmant, dissentiat, tamen cum unicus nostrorum laborum scopus is sit, ut nostra industria & studio, res herbaria non tantum maiori luce, perspicuitate ac dignitate exornetur, uerum etiā proprijs ac genuinis appellati-
onibus quæque planta illustretur, quid mihi uideatur, paucis aperiam, cum bona doctissimorum quorum meminimus uirorum uenia, quos omnes magnopere rogatos uelim, ut æquo animo quod pronuntiabo, accipiant, præsertim cum sententia mea nihil honoris uel laudis cuiquam detractum cupiam. Buglossam igitur nostram censeo

ad *herbarium* Dioscoridis, quod ille lib. iij. cap. cxij. describit, referendam, quod non solum experientia testatur, sed & Nicander ipse in Theriacis, cuius descriptio, cum ea quæ in Dioscoride extat omnino consentit. Quod cum ita sit,

fit, adhortamur omnes rei herbariæ studiosos, ut cum descriptionibus iam citatis Buglossæ formam conferant, postea de nostra sententia iudicent.

Dioscoride, Nicandro, & Ægineta testantibus, alij Aridam, alij Alcibion, alij Doriada, Romani Alcibiæcum nominant, ut uel hinc constet Echion seu Buglossam Viperinam esse herbam, cum quia semen eius, ut docuimus uiperina capita imitatur, tum etiã quod ad serpentium morsus efficacissime facere manifestum sit, unde & appellationem Alcibiij obtinet, a quo dam nomine Alcibio. Is (quemadmodum ueterum scripta testantur) cum secus arcem dormiens, a uipera dente sub genu ictus fuisset, excitatus a somno, ex herba hac succum commanducando expressit, expressumq; bibit, mox quod reliquum erat expressæ herbæ corpus, uulneri imposuit contra dolorem, atq; ita sanatus fuit, De Echio Plinius lib. xxv. cap. ix. lib. xxvij. cap. v.

Iam uero non desunt qui Echion in duo genera partiantur, quorum primum quidem illud sit, quod iam attigimus, alterum uero Ocimastrum seu Ocimoides, cuius post Echion statim mentionem facit Dioscorides, sed iudicium penes lectorem esto. Cæterum quid de Ocimastro nos sentiamus, capit. lx. supra declarauimus. Et fieri certe potest ut ea ipsa herba quam capite citato Ocimastrum appellauimus, aduersus uenenum efficacissimæ sit, quin & flosculi eius seu folliculi a uiperinis capitulis haud multum abluunt, iudicium in hac quoque re lectori permittimus.

Germani hanc stirpem *Wschsen zung* / id est, linguam bubulam uocant, quam non solum forma, sed & spinulis imitantur folia.

Syluestrem Buglossam, quidam *Schaffzung* / id est, ouinam linguam appellant, atq; ea flore tantum a domestica differt, ut diximus.

Buglossam uero domesticam minorē Tubingæ in ducatu Vuirtenbergensi primum uidi, quæ in loco tanq; peregrina planta honorifice habetur, quemadmodum sane non est uulgaris. Cæterum appellant eam die *Wschsen zung vom Ham* / a loco quodam *Ham* dicto, unde primum uenisse dicitur. Estq; illa uerum nobile & exiguum Nicandri *xxv.* Apuleius quoq; Echij meminit, at quantum intelligo, non satis illi perspectum fuit, nam de illo non multa facit uerba, nam de uno tantū genere scribit, quod ad aquas nasci ait, hisq; sequentibus insignit nominibus, Viperina, Elenion, Echidnion, Theriorizon, Serpentaria, radix Macedonica, quæ omnia de Ocimastro meo cap. lx. supra descripto, intelligo.

Vnum pro conclusione addere libet, uidetur enim mihi aliquas Buglossas ad Anchusas referri posse, quas Dioscorides omnes Alcibiadæa uocat. Conferantur ergo cum syluestri Buglossa cap. Diosco. xxvij. lib. iij. & cum Ocimastro nostro alterum Alcibium, quod a uenatore inuentum fuit, *ueneris*

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Buglossarum omnium folia, necnon flores calidam & humidam habent naturam. Porro iam pridem usus obtinuit, ut credantur ad omnes medicinas cor confortantes adhibendæ. Nam è Buglossa aqua distillatur, & flosculi Saccharo condiuntur, quibus utuntur in confortando corde, quæ & ambo in uenenosis ac pestilentialibus febribus usurpari comode possunt.

INTRINSECVS.

Herba Buglossæ, radix, & semen, uel singula seorsim, uel omnia simul uino decocta & bibita, ueneno ne cor occupet resistunt.

Aquæ distillatæ necnon & conseruæ ex flosculis tribuunt uim roborandi cor, lipopsychiam remouendi, lætitiâ melancolicis excitandi, ac sanguinem purgandi. Breuiter in omnibus febrium caloribus, & animi deliquis, tam aqua distillata quam flores Saccharo conditi usurpari tuto possunt.

Semen tustum ac in uino potum, mulieribus lactis copiam restaurat.

EXTRINSECVS.

Quicumque serpentino alteriusue uenenati animalis morfu uel ictu læsus fuerit, aquam Buglossæ potet, eaq; uulnera morfus ac ictus abluat, & folia imponat, citoq; auxilium sentiet.

Linteolis in aqua è floribus distillata madefactis, oculisq; impositis, inflammationem ac dolorem illorum reprimes.

Herba cum radice & semine, uel singula ex his seorsim trita, uinoq; decocta, ac calida imposita, Ischiadicis mirifice profunt.

Syluestris Buglossa quam Lycopsim appellauimus recentibus uulneribus, morfu uel percussione ortis medetur.

Radix illius cum farina ordeacea trita, oleoq; decocta, & emplastri modo imposita, sacris ignibus auxiliatur.

De Boragine. Cap. LXXVIII.

ORAGO CAVLIVM, AC FOLIORVM ASPERITATE horret, rursus radice rotundæ & rapitiæ grato læuore glabrescit, sicut & flosculi eius radiati. Li colorem suum uino innatantes quamprimum mutant, maxime qui cærulei sunt, quorum color in purpureum

Borago.
Burris.



purpureum transic. Quemadmodum enim tenerrima quædam membra
 uini aceti & salis acrimoniam sustinere non possunt, sed ex illa tumorem
 quendam contrahunt, ita & flosculi Boraginis, Violarū, Echij, Cichoreæ,
 omnesque

omnesq̃ pene flores qui cæruleo sunt infecti colore, uino corrumpi consueuerunt. Borago uero (ut ad historiam eius reuertamur) tametsi asperrimos gerat caules, hirsutisq̃ uestiatur folijs, tamen hyemis frigora minime ferre potest, nisi ea quæ non ita pridem è terra enata fuerit, nullumq̃ adhuc fructum procreauerit, deinde ut summo studio cõtegatur necesse est. Quæ caules ermit sic plane alsiosa est, cum æstate enim in qua excaulescere coepit, perit, neq̃ alteram attingere potest. Folia habet hirsuta & aspera, ut indicauimus, lata, rugosa, ac plicata, modice rotunda, minora Verbasco. Caule exit concauo, nonnunquam unico, interdum bino, uel terno, eoq̃ in fastigijs ramoso. Iunio mense ramuli qui summo cauli adnascuntur, flore elegantissimo, alij cæruleo, alij candido, alij deniq̃ expalescente roseo, emicant. Quo decussato subnascuntur nigra granula, bina uel terna coniuncta, eo modo quo in Echio collocata supra docuimus, aut nigriora & minora illis. E semine deciduo quorannis repullulascit Borago, ita ut quem semel occuparit locum non facile in posterum deferat, neq̃ enim extirpari se unquam patitur. Potest autem semen humi per hyemem illæsum delitescere, nisi à muribus deuoretur, qui propter dulcedinem, quam cum radice & flosculis communem possidet, illo plurimum oblectantur.

^{2.}
Syluestre Boragini genus in censu Zizaniarum habetur, reperitur illud in hortis inter olera, Boragini domesticæ caulium & foliorum horridis spinulis simile, florem uero gerit minorem illa. Ego quidem hac Boragine pro satina, ubi id necessitas postulabat, sæpenumero usus sum.

NOMENCLATURAE.

Nemo in posterum dubitare debet, quin ea planta, quæ Germanis *Burres*/Latinis *Borago*, *Porrage*, seu ut Leonicensi placuit, *Corago* dicitur, uerum sit *Dioscoridis* *βύλαγον*, cui sequentia apud eundem autorem ascribuntur nomina, *Genitura felis*, *Zanuchi*, *Antueorin besor*, *Ansanaphi*, *Bouis lingua*, *Bubula lingua*, *Libanion*. Et apud *Plinium*, *Euphrosinon*, lib. xxv, cap. viij. Huic nostræ sententiæ non solum astipulatur plantæ illius cū *Dioscoridis* descriptione concordia, sed & multi eam doctissimi uiri suo calculo confirmant, uidelicet clarissimus uir *Manardus Ferrariensis*, *Marcellus Vergilius*, *Otho Brunfelsius*, *Leonhartus Fuchsius*, de erroribus medic. errore vi, quos omnes honoris gratia nominatos uolo, ueteribus interrim simul assentientibus, *Marco Catone* scilicet & *Auicenna* *Arabe*.

Diosco. lib. 4. cap. 123.

Manardus lib. 5. epist.

Catodere rusticorum lib. 2. cap. 40.

Auicenna lib. 2. cap. 438.

VIRESCERE AC TEMPERAMENTVM.

Boragini flores & herba hodie communem cum Echio habent usum, ita

ita ut una pro altera sumatur. Est autem Borago calidæ & humidæ qualitatis, attestante Serapione cap. lxxxij, quare tuto in cibo & potu usurpari potest.

INTRINSECVS.

Boraginis herba cum maluacea beta decocta, debilibus hominibus in cibo utilissima est, in potu etiam illis adhibendi sunt flosculi, ut reficiantur, possintq; melancolicam tristitiam pellere.

Atunt Boraginem quæ tres emitat thyrsos, tota substantia in uino decoctam & potam, ad tertianos horrores prodesse, quæ quatuor, ad quartanos. Mihi aqua distillata & flores Zaccharo conditi magis probantur, ac in omnibus etiam febribus utiliores deprehendi.

EXTRINSECVS.

Herba combusta, ita ut in cineres redigatur, postea uero aqua mellis temperata exulcerationibus, & ardoribus oris, gulæ & linguæ, & gingiuarum medetur, si cum illa colluantur continuo.

Aquæ Boraginis iuuamenta in Echio commemorata sunt.

De Consolida maiore. Cap. LXXIX.

CONSOLIDA MAIOR E' RADICE BICVBITALI NON-
 C nunquam, intus candida, glutinoso lentore molli, in superficie nigra, tolīs satis longisq; & asperis, Elenī foliorum formam penè imitantibus profilit. Alterum deīnum anno fructum ædit, caulemq; emittit cubitalem, hirsutum, asperum, intus concauum, multis germinum ac surculorum productionibus aliisq; distinctum, quæ inflexis foliolis instar Boraginis uestiuntur. Flos illius in rotundam quasi accauam campanulam exit, ueluti & herba Paralysis, cuius post Betonicam supra mentionem fecimus. Atq; his partim expallido & luteo colore candicat, partim uero expurpureo cæruleus est. Floribus decidentibus semen in herbaceis uasculis clausum relinquitur. Floret Iunio & Iulio mensibus. Gaudet palustribus & humectis, graminosis hortis, & littoribus ac ripis, neq; facile ubi semel radices egerit propulsari potest, nam uel minima radice portio humi infixa continuo in herbam emergit.

Syluestre Consolidæ genus iam descripto simile est, nisi quod tota sua substantia magis exigua, uiscosior, & glutinosior euadit, radice qua cauli coniungitur fusca, nec temere dodrantalem mensuram excedente, sapore dulci, plerunq; in syluis inuenitur.

Consolida maior.

Walwurz.



NOMENCLATVRAE.

Consolida maior, Germanis Großwalwurz / Beinwellen / Schanz-
wurz / Schmerwurz / hoc est Vinctuosa dicitur, eo quod ut diximus radix
illius

illius glutinoso lentore mollis sit. Herbarij & uulgius Consolidam maiorem uocant, propter mirificam quam habet uulnera glutinandi uim. Tamen si, ut obiter hoc annotemus, multas alias Medici numerent Consolidas, uidelicet minorem, quæ est Sanicula, Regalem, ea est quam Germani Ritterspoin dicimus. Dioscoridi *σινυγρον* alterum, Solidago (quod nomen Pri- Diosco. lib. 4.
mulæ veris nonnulli impertunt) et Pectos à Græco uerbo *πηγνυμαι*, quod den- cap. 11.
sari, cōcerni, & in glaciem gelari est, nam aqua in qua radix eius tusa per no- Apuleius ca. 59.
ctem macerata fuerit, congelatur, quod idem Theoph. de Althea radice scribit. Apuleio Inula rustica, Xilophyton, Alum, Anazetesis, Hæmostasis, dicitur, quanquam de primo Symphyto quod Petræum uocauit Dioscorides, loqui Apuleium existimem.

Symphyton autem exiguum quod in syluis nasci docuimus, Germani *Symphyton exi-*
gnum *Walmurtz*, i. Consolidam minorem, an uero illud sit Dioscoridis, *gum.*
Petræum Symphytum nondum mihi constat, quando hæc nostra minor Consolidam cum descriptione minime conuenit, nam illius radix digitū excedit, nec odorata est, quæ omnia de suo Petræo Symphyto prædicat Dioscorides. Quid uero Symphytum sit Petregū infra cap. clixij demonstrabimus.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Radix in medicina maiorem habet usum quam herba, estq; illa temperaturæ calidæ & humidæ, uulneribus, & rupturis internis ac externis commodissima.

INTRINSECVS.

Radix mundata, uino decocta, & pota, exulcerationibus pulmonis, ulcē thoracis expurgandis prodest, facit enim illa excreabilia, sanguinem excreantibus, omnibusq; internis rupturis cōducit. Quare aduersus omnis generis rupturas & uulnera præ cæteris radicibus eligi debet. Non desunt qui e radice aquam distillent, qua ad supra dictas affectiones utantur.

EXTRINSECVS.

Cum tam salutaris sit Consolidæ maioris radix, solent Chirurghi emplastris suis illam adiungere, quæ in glutinandis recentibus uulneribus usurpant. Aiunt si cum carnibus coquatur, frustra in unum corpus coalescere.

Radix eadem cum Senetionis folijs tusa, ac emplastri modo imposita, non tantum inflammationibus medetur, sed & contractis membris.

Omnes itaq; Chirurghi Consolidam maiorem in hortis suis plantare debeant, cum radix illius, ut diximus, omnis generis uulneribus, rupturis et contractionibus ossium, ac commodatissima sit, quotidiana id attestante experientia.

De Scabiosa. Cap. LXXX.

Pestemenkraut.



VLTA SVNT SCABIOSAE GENERA, QVAE OMNIA
 M folia gerunt hirsuta, instar Buglossae, & Boraginis, partim exuiridi
 nigricantia.

nigricantia, partim uero albicantia cineraceiue coloris. Sed ordine singula perstringamus genera, quæ in sex fastigia docendi gratia diuidemus. ^{1.} Prima itaq; & præcipua Scabiosa, quæ plerumq; inter fruges, candida humo nascens prouenit, radicem habet candidam, oblongam & rectam, qualis *Scabiosa primæ* genus.

est foeniculi radix. Priora quam primum è terra profiliunt folia, linguas acutas referunt, nec sunt dissecta, at quæ subsequuntur admodum laciniata ac multifida fiunt, instar Valerianæ, quam Mariæ Magdalænæ radicem nominant, alias puerum dictam, eorum summa acumina, formam cuspidis lancearum imitantur. In caulem exit Iunio mense, teretè, bicubitalem, culmo Siligineo similem, cuius uertici flos rotundus insidet, pileolum latum æmulans, alius ex cæruleo purpureus, alius uero Bersyllici colore tinctus aparet. ^{2.} *Scabiosa altera* genus.

Admiratione uero dignum censeo, quod singuli istius plantæ flores, multis flosculis compactis constant, structuræ apum similimi. Tertium ^{3.} *Scabiosa tertia.* genus radice & caule iam descriptas Scabiosas sequitur, folijs uero quæ laciniata, & multo minora habet, rursus ab ipsa discedit. Proinde tota sua substantia magis est hirsutum, crispum, ac nigricantius. Flos purpureus antequam prodierit rotundis capitulis seu uerticillis Lychnitis coronariæ, (qua de infra cap. exciij) at maioribus, inclusus latet. Cum defloruit semen maturum in auras euanescit. Aliud deinceps Scabiosæ genus reperitur, ^{4.} *Scabiosa uulgaris* quod in pratis cum reliquis graminibus nasci solet, capitularis emicans floribus, folijs uestitum cineraceis & angustioribus, modice laciniatis, & *ris pratensis.*

qua terram spectant tenui quasi araneæ tela obductis, id quod etiam in Vngula caballina uidere licet. Semen, quod cum Lychnitis coronariæ semine magnam habet affinitatem, similiter ubi maturuerit, in aëra auolare consuevit. Postremo, binæ aliæ Scabiosæ, florum duntaxat colore à cæteris differentes, in quibusdam aridis campis inueniuntur. Earum caules rotundi ^{5. 6.} *Scabiosa quinta & sexta.* sunt, læues & iuncea, primoq; generi non dissimiles. Folia lacinijs suis à coriandro parum distant, humi strata iacent, coloris nigricantis, et mollia. Flos alteri ex cæruleo purpurascens, alteri uero plane candidus, Iunio mense exiit. Habentq; hæc duo postrema Scabiosæ genera magnam per omnia cum primo affinitatem.

NOMENCLATURAE.

Deplorandum equidem est, quod inter tot doctissimos uiros nemo haecenus prodierit, qui plantarum genuina, & apud ueteres usitata nomina inquirendi laborem sibi sumeret. Nam non solum adulterinæ hodie multis stirpibus appellationes ascribuntur, sed & pleræq; quo pacto à ueteribus uocatae fuerint ignoratur, id qd Scabiosis nostris, & quæ statim sequuntur herbis, usu quoq; uenit. Quamobrem rursus mihi adhortandis sunt rei herbariæ studiosi, ut in id incumbant sedulo, quo proprias suas appellationes

plantæ recuperent. Quod ad me attinet, tametsi nullam mihi aut exiguam certe cognitionem uendicem, pro uiribus id quoque conabor, si uel hac saltem ratione meo exemplo doctiores ad suscipiendam hanc prouinciam, excitare queam. Sed uunc rem ipsam aggrediamur. Cum itaque quo ueteribus sint appellatæ nomine hæ stirpes non constet, uisitatibus uocibus contenti simus. Nam tria priora genera (quæ & præstantiora sunt, & maioris usus). Medici nostri hodie Scabiosas uocant, autoritate nimirum herbariorum ueterum. Extant de illis uersiculi quidam, quos S. Urbanum composuisse ferunt. Eos in gratiam studiorum subiiciam.

Urbanus pro se nescit pretium Scabiosæ,

Nam purgat pectus, quod comprimit ægra senectus.

Lenit pulmonem, purgat laterum regionem.

Apostema frangit, si locum bibita tangit.

Tribus uncta foris anthracem liberat horis.

Nonnulli putant eam esse, quam Ægineta Pforam appellat. Quod si Pfora sit, esto sane per me quoque Pfora. Scabiosæ etenim nomen à scabie, cui medetur sortita est, possetq; Germanice *Gründt Fraut*/dici, cum alias *Pe slemen Fraut* / & Scabiosen appelletur.

Postremas Scabiosas ad caput cxiij. lib. iij. Dioscori. conieci, ubi *νιγορ* describitur, idq; non sine ratione, non enim tantum descriptio illis competit, sed & nomina conueniunt, Buglossi nimirum grandis & Spinæ mollis:

VIRE S AC TEMPERAMENTVM.

Omnia Scabiosæ genera calidā & siccam temperaturam obtinēt. Apud ueteres externis tantum corporis partibus, aduersus tumores, & contractiones neruorum et uenarum radix tusa emplastri instar imponebatur. Nostri uero Medici miris eam extollunt laudibus, & recte quidem, quis enim uel minimæ herbulæ uires explicare satisq; laudare possit?

IN TRINSECVS.

Herba uino decocta & pota, pleuritico morbo medetur. Aduersus eundem morbum mulierculæ Maio mense aquam distillare solent ex ea herba, propinantes singulis uicibus potandam mensura ij aut iij coclearium, non tantū pleuriticis, sed et contra pectoris uitia & apostemata, tussim omnisq; generis thoracis affectus.

Apostematibus alijs rursus è Scabiosis tale conficiunt medicamentum: Accipiunt manipulum Scabiosæ herbæ desiccatae, dulcis radicis dissectæ in minutas partes, unciam unam, fici xij, seminis foeniculi unciam unam, seminis Anisi tantundem, Iridis unciam dimidiam, quæ omnia per noctē in mensura aquæ macerant, postero illa die supra tertias decoquentes, postea uero Saccharo uel rosaceo melle indulcorant, uespertim ac mane calidum haustum.

haustum inde præbent, quo Apostema maturari, emolliri ac per tussim excreabile fieri affirmant. Cæterum ad Apostemata quisq; priuatas suas habet decoctiones, quas per nos licebit ut sequatur, nos de simplicibus hoc libro medicamentis agimus, non de compositis, quorum uariam confectionem nunc explicare nostri non est propositi.

EXTRINSECVS.

Succus Scabiosæ omnis generis scabiei, psoris & lepræ usurpatus per se uel in balneis utilissimus est, quo etiam furfures capitis abiguntur, si cum eo caput abluatur.

Ex his quæ paucis recensuimus, alia si qua desiderantur iuuamenta, nemo non colligere poterit.

De Morsu Diaboli. Cap. LXXXI.

Q VAE VVLGO MORSVS DIABOLI HERBA DICTUR, ea primo Scabiosæ generi similima est, nisi quod folia huius ^{v.} *Succisa.* non sunt dissecta, ut illius, sed Plātaginis herbā referētia, oblongiora tamen, linguæ non dissimilia, modice hirsuta, colore nigricantia. Iulio mense in caulem nudū exit, rotundum, in cuius fastigio purpureus flos emicat forma pileoli. Nam multis flosculis coactis simul ille cōstat. Quem admodum enim apes fauos suos ex ordine construere consueuerunt, ita in hac stirpe flosculi coniunctim & in circulum stipati capitulum cui insident, ornant. Iis Augusto mense decidentibus, semen in auras euanescit, non aliter quam Scabiosæ.

In hoc genere inneniuntur quæ florem gerant prorsus candidum, sed raro occurrunt ejusmodi plantæ. Ego illas in sylua Ydar / prope arcem ^{2.} *Succisa altera.* Birckenfeldt inueni. Radix utriusq; fibrata sicut & Plantaginis, seu Valerianæ, inferne quasi præmorsa, id quod uel naturæ adscribendum uidetur, aut certe uermibus qui Valerianæ & aliarum quoq; plantarum radices præ mordere solent.

Morsus Diaboli exiguus, ad Lactucarias herbas pertinet, folijs uestitur hirsutis & serratis, quemadmodū Hieraciū, de quo statim dicitur. Iulio mē ^{3.} *Succisa tertia.* seluteum profert florem, multiplici foliorum ordine stipatum, caulem uero iunceum & læuem. Radix huius iridem succisa est, semen quod habet in canum, & lanuginosum in auras euanescit.

Morsus Diaboli primus & secundus, dumetis, aridis pratis & campis gaudet. Tertius muris antiquis, semitis & arenosa terra.

NOMENCLATURAE.

Germanis dicitur hæc herba Abbiß / & Teißfels Abbiß, uulgo Morsus

Morsus Diaboli.

Scüffels Abbß.



Diaboli, propter radicem succisam. Herony. Braunschweig Iaceam nigram uocat. Quod si ca nō sit Scabiosæ genus, certe quo referenda sit, ignorare me ingenuè fateor.

Quæ autem luteo emicat flore, lacteoq; succo prædita est, ab Ægyptiacis, qui passim oberrant, Germanis die Zygeuner uel Heide audiui Abbß. i. Morsum appellari, qui factum est qd illius hoc loco meminimus, cum Hieracci genus sit de quo suo dicetur loco.

VIRESCENTIA

Eadem cum Scabiosis vires obtinet uterq; Morsus Diaboli (nam de tertio alibi agitur) ideoq; illo pro Scabiosis, & uicissim Scabiosis, pro illo uti tuto possumus.

INTRINSECUS.

Morsus diaboli cum flore, herba, & radice in uino decoctus, facit ad omnia ad quæ Scabiosæ, maxime uero ad discutiendos sanguinis grumos, & aduersus pestem. Eadem potest aqua ex herba distillata.

EXTRINSECUS.

Aqua distillata, seu succus herbæ vitriolo mixtus exsiccat & sanat quas uis papæ

uis papulas, omnemque fluentem scabiem illicur. Alia iuuamenta ex his quæ perstrinximus colligi facile possunt.

De Luparia, et ea quæ Germanis Eisenhütelin
dicitur. CAP. LXXXII.


Luparia. Wollfewurtz.



LUPARIA, ET EA
quæ Germanis Eisenhütelin
dicitur, folia quinis diuisu
ris dissecta habent quemad
modum Sanicula, seu Ranun
culus multiplex. Radix
utriusque multis capillamen
tis fibrata, nigra, ueluti As
paragi, seu Ellebori nigri
quem Germani Ehistwur
zel dicunt, satis iucundo o
dore prædita. Atque hæc
nus binæ istæ plantæ consi
miles sunt, tamen si posteri
or multorum sit generum,
uti docebimus. Sed Lupa
riæ historiam prosequa
mur. Ea ex antiqua radice
quinos aut senos bicubitas
les cauliculos emittit, qui
in cacumine Maio mense
flores ex pallido luteos, for
ma acutos pileolos æmu
lantes ferunt, nec multum
à floribus Linariæ distan
tes. His decussis semen pul
lum, angulosum, Cæpe uel
Nigellæ semini non dissimi
le, in distinctis ac separatis
à se mutuo siliquis, quæ ad
figuram Aquilegiæ follicu
lorum accedunt, nisi quod
hæ magnitudine illis cedunt,

Eisen hütlin.

Eisen hütlin.



relinquitur. Semen hoc degustatum crebra sputa pro-
uocat, natura calidissimū,
ueluti Pyretrū. Nascitur ue-
ro Luparia in altissimis ual-
libus, in syluis autem in pri-
mis, quales sunt Hercynia
sylua, & quæ Germanis der
Speßart/der Ydar dicitur,
& in Vuasgoia.

Iam ut ad alteram uenia-
mus, non unius illa est ge-
neris. Nam quæ maxima
est, Argentinæ (quo Lugdu-
no Galliæ primum deuenit,
se dicitur) in hortis uolu-
ptatis gratia plantatur, atq;
ea Lupariæ forma & sapo-
re per omnia respondet, ni-
si quod procerior & gran-
dior euadit. Flores eius ex
ordine quoque aperti cauli-
bus adhærent, colore cæru-
leo tincti, galeæ figuram ele-
gantissime repræsentantes.
Minor autem ex hoc gene-
re cæruleo iidem emicans
flore, Norinbergæ usitata
est. Postremo alius eius
generis frutex florem rose-
um ferens, ibidem inueni-
tur.

NOMENCLATURÆ

Græci in impositionibus nominum foelicissimi omnium sunt. Quare quæ
uulgo Lupariam, & Germani Wolffswurtz (nam de alterius stirpis ap-
pellationibus alias differemus) nominant, eam Græci ἀνίτην, κισκυτόρον, λυ-
παστόρον, κύμαρον, λωκόν, uocant.

VIRE

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Luparia, & altera quæ Germanis *Eisen hütlin* dicitur, nimirum ea quæ cæruleum profert florem, adurentis sunt facultatis, quare intro sumi non debent. Quam etenim noxiæ sint plantæ internis corporis partibus, interitu conuiuorum Antuerpiensium, qui in acerarijs harū radice uescentes diem suum obierunt, abunde demonstratum fuit.

EXTRINSECVS.

Lupariæ herba, semen aut radix in puluerem redacta, & cum oleo temperata, ut unguentum inde fiat, illitu pediculos ac furfures quocunque tandē inueniantur loco, enecat ac expellit. Idem radix præstare potest, si in aqua uel lixiuio decoquatur, accum illa caput postea abluatur. Hoc remedio opus certe erat Syllæ, qui eiectis ciuibus Roma, pediculari tandem morbo consumptus est, ut produnt historiæ.

De Pedicularia campestri, & Consiligne.

CAP. LXXXIII.

VM DE ACONITO ET ALTERA ILLI CONIUN-

Cæta stirpes scribere instituissem, in mentem mihi quamprimum ueniebat pedicularia campestris, cum qua cum non nihil affinitatis habeat Consiligo Ruellij, uolui post Aconitum historiam illarum persequi. Pedicularia itaque duum est generum, quorum utraq; in humectis pratis reperitur.

Et prior quidem unico, recto, ac dodrantali coliculo, herba admodum minutis diuisuris incisa, multoq; magis exigua Geranio minori, enascitur. Maio mense rubicantem florem fert, ex uasculis quibusdam prodeuntem, quod idem in urtica Germanis *Bynsaug* appellata fieri uidemus. Semine post florem prægnat fusco, & rotundo, latissimis siliquis incluso. Radicem habet tenuem ac perbreuem, ita ut quam facillime euelli possit. Quare in noxia hac stirpe naturæ consilium ac prudentiam admirari certe debemus, qua pecorum salutis consuluir, eo quod pestilentissimam herbam radices alte agere nō permisit, admonēs interea pecuarios, ut e pratis ac pascuis, ejci illam curent sedulo. Cum enim a pecoribus inter cætera pabula deuorata fuerit, pediculorū in illis ingentē procreat copiam, quo morbo uix tandem citra magnum periculum liberantur. Hinc aquod Germanos *Leiß freut*/ hoc est pedicularia uocari coepta est.

Pedicularia campestris prior species.

Pedicularia campestris, Germanis
Kodel.




Pedicularia campestris secunda species. Altera luteo emicat flore, è latis uasculis prorepente similiter, folio interrim non adeo inciso, pecoribus minimè noxia.

Tertia

Consiligo Ruellij.

Leißkraut Consiligo.



Tertia in asperrimis col-
libus ac mōtibus nascitur,
plerunq; secus itinera, atq;
ea Helleboro nigro, quem
Germani Chustwurtz ap-
pellāt, adeo similis est, ut u-
triusq; herbę affinitate nō
nunq; decipiantur homi-
nes, grauit̃ olet, radicem
habet breuissimam. Et
mulierculis ueterinarijs, pe-
corum pediculis expellen-
dis adhibetur.

2.
*Consiligo
Ruellij.*

NOMENCLATVR AE.

Prima pedicularia qui-
busdam Germanis Rodel-
kraut / & apud Mediomar-
trices Leißkraut appella-
tur. Alteram nonnulli Ger-
mani Marten oder Wyfen
Teschē, hoc est, Pratenſes
uulgas a receptaculis nimi-
rum seminis uocant. Tertia
foetida Pedicularia, a non-
nullis propter formam Ve-
raturum syluestre, Germanis
Wild Chustwurtzel existi-
matur. At D. Cōradus Gef-
nerus cōtendit eā esse Con-
siliſinem Plinij. Atq; hanc
suam sententiā uerbis Ruel-
lij, qui elegantissime hanc
plantam descripsit, Pome-

Plinius lib. 25.
cap. 8.
Ruellius lib. 2.
cap. 134.

leam illam uocans, Pulmonariam, Leonis patam, Marsilicam herbam, &
Diapycon, satis comprobata sentit: An uero Consiligo Ruellij eadem
sit cum ea, cuius Plinius mentionē fecit, necne, affirmare non ausim, postq;
formam illius Plinius haudquaquē depingit. Sunt qui illam Germanica uoce
Sphlangen.

Col. lib. 6. cap. 5

Schlangen wurzel / idest *Serpentaria* iam radicē appellant, eo quod uti asserunt, omni ueneno aduersetur. Id quod non tantum *Columella* testatum reliquit, uerum etiam experientia ipsa, quæ fidem rebus conciliare solet. Sed age proferamus utrunq; testimonium. *Columella* itaq; aduersus pestilentiam ingruentem gregi præsens remedium cognouit radiculae, quam pastores consiliginem uocant. Ea in *Marsis* montibus plurima nascitur, omnique pecori maxime salutaris. Læua manu effoditur ante solis ortum, sic enim lecta maiorem uim creditur habere. Vfus eius traditur talis. *Aenea* subula pars auriculæ latissima circumscribitur, ita ut manante sanguine, tanquam *Olitrae*, ductus appareat orbiculus. Hoc & intrinsecus, & ex superiore parte auriculæ cum factum fuerit, media pars descripti orbiculi eadem subula transiit, & facto foramini, prædicta radícula inseritur, quam cum recens plaga comprehendit, ita continet ut elabi non possit. In eandem auriculam omnis uis morbi pestilensq; uirus dicitur, donec pars quæ subula circumscripta est, demortua excidat, & minimæ partis iactura caput conseruatur. Hactenus sententiam *Columellæ* ex capite xxxiij lib. ij *Ruellij* bona fide retulimus, nunc quod nos ex *Monacho* quodam iam pridem audiuius, non pigebit referre. Is aiebat, uenenum uel haustum uel deuoratum ei minime nocere posse, qui hanc radiculam ex collo pendente secum gestauerit. Rursus ilico mori & pecora & homines si intro eam sumpsisent. His addebat certa se hoc didicisse *Empyræa*. Nam cum canis radicem hanc ex collo suspendisset, uenenumq; ei propinasset, euasisse illum ueneni periculum. Vbi uero eandem radicem in puluerem redactam cani commedendam exhibuisset, mortuum ilico. Hinc iudicio conformato dicebat se escam ex hac radice confectam vulpibus & lupis proposuisse, multosq; ex illis necasse. Atq; hæc hactenus. Proinde binis his testimonijs facile adducor ut hanc herbam, Consiliginem esse credam.

ADMONITIO DAVIDIS KYBERI

ad Lectorem.

VETERINARI *Gengenbacenses* non hac consiligine *Ruellij*, sed *Elleboro nigro*, quem *Germani* *Christwurz* dicunt, in pecoribus medendis eadē peneratione quam *Columella* proponit, uti cōsueuerunt, nisi quod omnibus ferè corporis iumentis partibus radiculam eam insigere solent, quauis etiam de causa laborantis. Quamprimum enim iumentum aliquod parum læte uiuere ac morbum aliquem alere intellexerint, ad hoc medicamentum tanquam sacram ancoram confugiunt, & plerunq; successus uotis respondet. Hac de causa eam herbam *Kinderwurz* hoc est, pecorum aut bouum radicem uocitant, quod bubus ferè & tauris nec non alijs iumentis eo quod diximus modo opituletur. Hæc optime lector eo in medium à me adferuntur, ut

tur, ut studiosi rei herbariæ diligenter ueterum scripta excutiant, quo Ellebori nigri adulterini locum proprium aliquando inueniamus. Nam eam herbam quam Germani *Christwurtzel* / alij uero Elleborum nigrum adulterinum uocant, ad Elleboros nequaquam pertinere luce meridiana clarius est, quemadmodum infra cap. cxxxv. fusius docebitur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Priora duo genera in uliginosa ac putrida terra proueniunt, pecori nocentissima ut diximus, ideoq; intra corpus hominibus minime usurpanda. Possunt tamen extrinsecus siccis ac calidis affectionibus adhiberi. Sunt enim calidæ & humidæ temperaturæ.

Consilio similiter internis corporis partibus adhiberi non debet, sed ab illa cauendum tanquam a pestilentissima planta, ut quæ lupis ac uulpibus interficiendis magis conueniat, quam hominibus.


De Cruciata. Cap. LXXXIII.

CRUCIATA INCULTIS AGRIS, COLLIBVS ET SEACUS itinera prouenit, radicem habet in medio instar crucis dissectam, longam, rotundam, candidam, membrum muliebri referentem, ternis uel binis nonnunquam inferne fibris diuisam. E qua lunio mens eterni aut quaterni prodeunt coliculi, dodrantalem altitudinem haud temere excedentes, atq; ñ contractis, ac crassiusculis folijs, Satyrio paruo non multum dissimilibus, ac crassioribus & minoribus, uersusq; terram sese inflectentibus uestiuntur. In cacumine illorum septeni, aut seni nascuntur flores cærulei, qui tanquam oblongæ ac concauæ campanulæ, ex uiridibus siliquis proropere uidentur, ueluti herbæ Paralysis flores. His decidentibus, fuluum semen prælongis illis sacculis inclusum reperitur per omnia semina Seriphij Germanici, de quo statim cap. cxi, simile.

NOMENCLATURA.

Hæc planta Germanis uulgaris uocabulo *Modelgeer* / & *Creißwurtzel* / hoc est, Cruciata a forma radicis appellatur. Alij Saponariam & Italin agriam, Germanice *Seiffenfraut* / & *Wildweidfraut* / sed perperam uocant. Qui Rhenum habitant Germani *S. Peters fraut* / hoc est, herbam Sancti Petri, nonnulli radicem propter uulnera, quæ ut diximus habet, *Sperensich*

Cruciata.
Modelgeer.



Sperenstich nomināt. Hierony. *Braunschweig* putat eam esse herbam quæ dicitur, herba Borith, quæ appellatio cum sit Hebræa, (Nam Hebræi בורית, Chaldæi adiecta in fine litera בורית Boritha efferunt) annotabimus quid de illa Hebræi sentiant, in primis uero Kimhi, qui in radicibus suis, & commentario in Hieremiam capite secundo ita scriptū reliquit,

פירש ר יונה כי הוא
 עשב שמכבסין בו ויש
 מפרשין אותו כי הוא
 הנקרא בלעז סבר

Hoc est, Interpretatus est R. Ionah, quod Borith sit herba, cum qua lauent (uestes scilicet,) & sunt qui interpretentur ac dicant eā esse quæ uulgari lingua Sapodicitur. Hæc illi. D. Conradus Gess. hanc herbam Gentianæ speciem esse contendit, neq; aliter rem se habere posse totus opinatur. Quod ad me pertinet, sui ego olim in ea sententia, ut existimare Cruciatam esse Radiculam, seu Larnariam herbam Græcis *ῥαδι* *ῥαδι* appellatā. Quanquam commodius ac magis pro-

prie ad caput cxxv. lib. iiii. Diosco. ubi *ῥαδι* describitur, referri possit. quæ omnia a me adducuntur, non ut quenquam sententiæ meæ subscribere cogam, sed ut, quod semper moneo & inculco, cum descriptionibus ueterum

rum uiuæ herbarum imagines conferantur, quo uel hinc elucescat ueritas.

VIRE S AC TEMPERAMENTVM.

Quod si hæc nostra Cruciata Dioscoridis sit *pirruia*, quem admodum mihi persuadeo, non multis aut peculiaribus illa prædita uirtutibus ab autoribus describitur, & recte quidem cum ad ueneficia amorum nonnulli hæc herba utantur, tamen si aduersus quasdam affectiones suum quoque utrinque habeat usum, maxime aqua eius distillata.

I N T R I N S E C V S.

Aqua ex herba uel radice distillata, ac pota, uitia pectoris expurgat, uenenumque omne discutit, quare non iniuria aduersus pestem illa utuntur nonnulli.

Planta tota siccata, & in puluerem redacta, easdem facultates obtinere dicuntur.

Pastores pecorum apud Mediomatrices miris superstitionibus hanc plantam fœdant, nam ubi pestis porcorum ingruerit, illius herbam ac radicem minutim concisas cum alijs quibusdam pulueribus, in cibo ac potu exhibent, adiunctis quibusdam preculis, plane sibi persuadentes quotquot huiusmodi escas degustauerint porci, eos a pestilentia tutos fore. Sed pro dolor fœdis superstitionibus, ac magicis artibus omnia loca referta sunt, nec est qui serio operam impendat, quo istiusmodi idolatriæ tollantur.

E X T R I N S E C V S.

Cum radix istius herbæ instar muliebrum genitalium dissecta sit, solent illam aniculæ ueneficæ, & quæ longa obseruatione Circes artes perdidicerunt, summis laudibus extollere, affirmantes mira illam facultate uulnera conglutinandi, pollere. Quare insignem apud illas sortita est appellatio, qua dicitur *Herl allen schaden* quasi *Chiliodynamys*. Proinde habetur ab illis uulneraria herba præstantissima, maxime aduersus rupturas, & affectiones equorum, si cum herba & radice decoctis uino uulnera abluantur, & puluere radicis tuscæ aspergantur.

De Isati. Cap. LXXXV.

I SATIS HODIE OPTIMOS AGROS INTER AQVIS-
granum & Duram, celeberrimas inferioris Germaniæ ciuitates,
sitis

Isatis.
Waidr.



^{2.}
Isatis sativa.

^{3.}
Isatis sylvestris.

sitis occupat, incolisq; eius loci magnum quæstum adfert. Ex qua ut colorem cæruleum extorqueant, inueniunt illi sibi molas quassam, quibus cum liquore herbæ expresseſſerint, inq; globos redegerint, quos in tabulatis æstate feruente exiccant, uoti sui compotes euadunt. Isatidem Serapio cap. xlvij. & Dioscorides lib. ij. cap. clxxvij. graphice depingunt, inq; duo genera distribuunt, in satium scilicet et sylvestre. Satiua Isatis Plantaginis instar folia habet humi sparsa, pinguiora tantum & nigriora. Caulem, qui altero demum anno profilit, duobus cubitis quoadq; altiore. Radicem candidam, rectam, paucis fibris capillatam. Odor ei agrestis & uirosus ut & aliarum sylvestrium plantarum.

Sylvestris Isatis, a domestica plane nihil differt, nisi quod non ubiq; locorum plantatur, qui sit ut eo sit ignotior. Quamquam quibusdam in locis sponte sua crescit, præsertim circa Crudenacum, & Meysenheim oppida, ubi ego se-

men collegi. Folia & caules sativæ respondent. Aprili mense aduentante longos è radice, recta, candidaq; emittit caules, in summitate ramosos, multisq; acutis foliolis ornatos. In uertice caulium flores emicant lutei, copiosi, accon-

ac coniunctim stipati, uti in Ebulo uidere est, qui deinceps in nigros, longos, latosq; ac pendulos folliculos linguarum figuram referentes, desinunt. Acque hoc semen illius est, ex quo ubi deciderit, repullulascit hæc Isatis, nam postquam semel semine prægnans fuerit continuo perit.

NOMENCLATURAÆ.

Prior Germanis Waidt/ Dioscoridi *ισατις θυμω*, Egne, Augion, Arustion, Gluta, & Glastum. Altera Germanis Wild waidt/ *ισατις άγρια*, Iene parua &c. appellatur.

VIRE S AC TEMPERAMENTVM.

Vtraq; Isatis ex ordine est calefacientium & exiccantium, potestq; utrinque commode usurpari.

INTRINSECVS.

Isatidis prædictæ uino decoctæ & potæ iocinorosis utiles sunt, ita tamẽ ut simul extrinsecus decocto illo foueatur hepar.

EXTRINSECVS.

Succus herbæ expressus, & aqua distillata, sanant, glutinantq; uulnera, & cruorem illorum sistunt, sacris ignibus medentur.

Herbæ siccatae inq; tenuissimum puluerem redactæ, exiccant & sanant omnis generis putrescentia & serpentia ulcera & Phagedænas.

De Lactucis. Cap. LXXXVI.

QVOD HOC LOCO LACTVCARVM HISTORIAM IN-
serimus, in causa fuit Plinius uir undequaq; clarissimus. Namq; *Plinius lib. 10. cap. 7.*
is cum de Isatide, cuius iamprimum meminimus scriberet, eodem capite tam syluestris quam satiuæ Lactucæ descriptiones complexus est. Quare hinc admoniti ad Lactucas transire operæpretium uidebamus nobis facturi. Erut ordine singula persequamur, de satiuâ primum loquemur, deq; illa, & omnibus alijs in genere quædã præmittemus. Satiua igitur Lactuca in tria apud nos diducitur genera, quæ omnia lacteum incisa stilant succum. Herbam habent molliusculam, caulem uero aculeis quibusdam horrentem, id quod & folijs qua terram spectant usu uenit, maxime

Lactuca crispa, & lata.
 Brauß vnd breiter Lattich.

Theop. lib. 2.
 cap. 16.

Theophr. lib. 7.
 cap. 2.



1.
Lactuca sativa
 maior.

2.
Lactuca crispa. Ioris.

ubi aliquantulum consensu erint, quæ omnia à Theophrasto animaduersa ac scriptis mandata sunt. Proinde omnia Lactucæ genera subamara sunt, quamuis satiuæ, dum adhuc tenera est, pieruncq; dulcis fit, unde Theophrastus Lactucam sectam dulcedinem suam genuinam necessario retinere tradit, quod procul dubio de tenera adhuc Lactuca, quantum sentio, intelligi oportet. Nam ut uel omnibus coquis notum est, quo uetustior fuerit Lactuca, eo amarior euadit, qui fit, ut cum excaulescere coeperit, epulis non amplius sit idonea, quare tum culinis abdicatur, quod similiter Endiuæ, alijsq; oleribus contingere uidemus. Sed enumeremus nunc satiuæ Lactucæ genera.

Eorum primum quod & maximum est, latissimis uestitur folijs ex uiridi nigricantibus, quemadmodum Beta maior, ac uersus medium coeuntibus, non aliter quam Brassicæ capitatae. Radicem habet teretem & candidam. Sunt & in hoc genere nonnullius

candida folia, quæ & ipsa in caput quoddam coeunt.

Alterum folia acquirit satis longa, quercini similia, incisa, herbacei co-

Tertia

Lactuca sylvestris.
Wild Lattich.



Tertia Lactuca, quæ & pulcherrima est, crispa dicitur, uiroris itidem diluti, folio plicato, rugoso, ac coarctato, simulq; laciniato. His omnibus iam enumeratis Lactucis, caulis exilit rotundus & procerus, multis in summo ramis brachiatus, flosculis exiguis, luteis, instar stellæ, at multiplici foliorum ordine distinctis, in uertice ramulorum omnium emicans. Li à maturitate posteaquam semen fecerint, in pappos euanescent, non aliter quàm Senecionis. Atqui maxima Lactuca semen subalbidum progignit, cum reliquorum duorum nigricet, maiusq; sit Endiuivæ semine. Porro quotannis omnes sativæ Lactucæ species, è semine suo repullulascunt in hortis satæ, & nonnullæ fuscas sortiuntur radices. Tempus uero quo sericæ conuenit, est verum, Martio scilicet, Aprili, & Maio mensibus, uti tradiderunt Columella & Palladius.

Extra hortos Lactucæ aliud quoddam genus prouenit, secus muros & macerias ac sepes, quod è semi-

3.
Crispa Lactuca.

4.
Lactuca sylvestris prima.

ne sativæ secundæ sponte sua profilit, aculeis ac spinis asperioribus multo quam cætera sativa genera, gustu admodum amarum, & quod nõ nisi dum ætenuum fuerit, in usu habetur.

1.
Lactuca sylue-
stris altera.

Postremo in obscuris ac uliginosis syluis inuenitur Lactuca alia, caule, aculeis, folijsq; uulgari Endiuia: similima, florem gerit rubicantem ex fusco, semine exiguo, Endiuia: quam propinquo, & quod similiter pappis suis in auras euolet.

NOMENCLATVRÆ.

Columella de-
hor. cult. lib. 13.
cap. 2.

Lactuca latine, *οἶδα* Græce, *חֲסֵרֵת* Chasæret Hebraice, teste Aruch Monstero, *Lattich* Germanis. Auicennæ Alchace. Galeno Thridacine appellatur, atque hæc generalia sunt huius plantæ nomina. Theophrastus autem tria commemorat satiuæ genera, quæ suis appellationibus in hunc distinguunt modum, ut prima sit Lactuca rotundi caulis, altera laticaulis, tertia Laconica. Columella item tria statuit Lactucæ fastigia, unam, quæ apud nos maxima appellata est, Cypriam: alteram, quæ folia habet albida, pallentia, & uulgarissima est, Cappadocam: tertiam dulcissimam scilicet & quæ speciem mali cuiusdam obtinet, nam in capitis fere formam protuberant folia illius quamprimum a terra uel parum attollitur, Cecilianam nominans, postquam quæ crispa appellatur, quod ad usum attinet, secundum locum occupat. Porro satiuæ Lactuca Dioscoridi *οἶδα* *ἡνίο*, syluestris uero *ἡνίο* *οἶδα*, Galeno Chondrila, Germanis *Wilder Lattich* appellatur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Lactuca tam satiuæ quam syluestris, frigidum, humidumq; obtinet temperamentum, quare in medicina, & cibis usurpari utiliter possunt. Nam præ cæteris oleribus bene nutriunt, purumq; generant sanguinem. Quamquam hodie a medicis, qui peregrinis fere & inexploratis, quod pluris uideant magis gaudent, non admodum expetantur. Verum enim uero aliter senserunt ueteres. Serapio namq; testatur utilem sibi fuisse Lactucam, quippe qua Cholera æstuantis uitia expurgarit. Plinius etiam doctissimū medicum, Musam, Augusto Lactuca uim morbi repressisse tradit. Quid quod Galenus lib. ij. Alimentorū Lactucam summis laudibus effert: Sed ascribamus uerba illius, quæ ita se habent.

Pleriq; etiam antequam excaulescat, in aqua elixa utuntur, uti ego iam facio, ex quo dentes mihi deteriores esse coeperunt. Nam amicus quidam meus, quum olere hoc a longotempore me ut familiari cibo, usum fuisse sciret, uidereq; post mandî a me citra magnam molestiam non posse, cocturæ rationem indicauit. In iuuentute enim, quoniam assiduo os uentriculi bile efferuescebat, æstus moderandi gratia Lactucis utebar. Quum autem ad prouectam ætatem peruenissem, olus hoc contra quam in iuuentute somnum.

somnum iam studio & industria accersenti mihi auxilio fuit: quippe qui etiamnum iuuenis uigilijs dedica opera me assuefeceram, declinante iam ætate, ipsa ex se infomni, grauius hoc incommodo infestabar. Aduersus quod unicum mihi præsentissimum remedium Lactuca uespere commanducata semper fuit. Hæc ille.

Quæ omnia ideo a me adducta sunt, ut pristinae suæ dignitati cum aliæ optimæ plantæ, tum uero Lactuca nostra nobilissima restituerentur, Ratio parandi Lactucas apud Platinam lib. iij. extat.

INTRINSECVS.

Lactuca satiuæ, maxime crispa, in cibo commanducata, æstuantî stomacho prodest, uti de seipso Serapio prodidit.

Coctura Lactucæ, si in pulstem illa concoquatur, nutrimentum bonum affert corpori deficienti, somnum conciliat, aluum emollit, lactis copiam generat, doloresq; sedat. Verum continuus Lactucæ usus claritati oculorum officit, insomnia venerea, & concubitus arcet, quo nomine ijs qui castitatem uouerunt, utilissima est Lactuca, necnon Ruta, ut suo diximus loco.

Quod de herba commemorauimus, hoc idem de semine & aqua distillata intelligi uolumus.

Lactuca senibus in primis accommodata est, naturalem enim humiditatem in illis conseruat, qua de causa Galenus haud dubie Lactuca cum aromatis usus est, teste Antonio Gaizo de somno cap. ij. Qui aromatis destituta, iij. Mentham & Petroselinum (ut uulgo uocant) cum Lactuca deuora re debeant, admonente Constantino lib. v. cap. xvi.

Lactuca syluestris eadem pene habet facultates, sed frigidior temperata, & ad Papauer fere accedente prædita, ijs qui infomnijs laborant, in cibo & foris imposita, utilissima. Idem & semen & aqua distillata possunt.

EXTRINSECVS.

Omnes capitis, iecoris & stomachi calidæ affectiones, Lactucæ herba, uel semine aut aqua distillata curari possunt, si herba uiridis, uel lintheola in succo, uel aqua distillata madefacta extrinsecus imponentur, quod genus remediorum, Repercussuum uulgo medici appellant.

De Hieracio, Germanis Psaffenblat.
CAP. LXXXVII.



*Hieracium
maius.*

MVLTA SANE Lactarię plantę extant, utpote Lactuca, Papauer, Chelidonia, Lathyris, Esula, Endiuia, Scariola, Auricula muris, & Hieracion, de quo deinceps agere decreuimus. Sunt autem Hieracię duo genera, maius scilicet & minus, cuius postremo mentionem faciemus, de maiori primum, & iure quidem, aliquid dicturi.

Maius Hieracium, folia habet in circuli figuram humi sparsa, eaque utrinque serrata, non aliter quam Cichorea, tenera adhuc, sed paulo pinguiora & molliora, ut ea de causa maiorem cum Lactuca affinitatē contraxisse merito uideri debeat. Incisurę foliorum, dentibus magnę alicuius serrę similes apparent, & uenę quę hijs in læua parte insunt, qua radicem, quę illi candida & recta, paucisq; capillamentis fibrata est, spectant, colore roseo ac leuiter rubicante, tinctę sunt. Aprili mense, maxime initio eius, e medio plantę, longi, ac concaui scapi, cul-

nos imitantes, omnisc; nodorum ac geniculorum intercapedine carentes, emergunt,

emergunt, in quorum summitatibus uiridia ac radiata capitula, Olius quam similima profiliunt, quæ ubi sese aperuerint, in flores tandem luteos, ac multiplici foliorum ordine distinctos, solis figuram representantes, designant. Cum autem præmaturi illi fuerint, in rotunda, capillata, ac lanuginosa capitula, in quibus semen continetur, euadunt, quæ facillime uento ut auolent in auras impelluntur, quo facto scapi nudos, candidos & rotundos uertices, rasis Monachorum capitibus similes, sustinent, qui & ipsi Maio mense marcescunt, herba ipsa superstite per totum annum. Gaudet locis graminosis, cœmiterijs & sepibus, neq; in Cichoream transit, ut multi somniant. Proinde incisa lacteum fundit eumq; amarum succum.

Heracium minus, maiori per omnia respondet, nisi quod illo magis est exiguum, & nigricantius. Radix eius præmorsa apparet, quod in Morsu Diaboli indicauimus, quo loco hanc plantam descriptam reperiēs, ^{Hieracium minus} Suc- cum emittit lacteum, sed admodum amarum.

NOMENCLATURÆ.

Generosus Comes de Neuenare putauit has plantas ad Lagopoda referri posse, quemadmodum & doctissimus Hermolaus Barbarus Benedictam herbam Lagopoda dici posse putauit. Ego tamen bona cum uenia utriusq; affirmo neq; hanc, neq; illam (quam nos Nardum Garyophyllatā supra nominauimus) Lagopoda (quid uero proprie *λαγώπους* sit paulo post dicetur) appellandam. Quin constanter & uerissime pronunciamus has stirpes eas esse quæ Hieracia, & Lactucæ erraticæ Dioscoridi uocantur. Maius ergo *ἡράκιστον ὀνίχον*, Sonchiten, Lactucam erraticam, & Sithelias Dioscorides lib. iij. ca. lxxv. appellat. Apuleio, Thridax agria, Aspidelon, uel Aspideion, ^{Apul. cap. 20.} Picris, lobonfos, Lactuca syluatica. Officinis & uulgo Dens leonis, Rostrū porcinum, & Apostematica (uti Comiti iam commemorato placet) dicitur. Et recte quidem postremum ei nomen attribuitur, cum Apostematicis calidis, & in febre ardente, aqua eius distillata in primis utilis sit. Minus Dioscoridi lib. iij. cap. lxxvi. *ἡράκιστον ὀνίχον ῥόνον*, Sonchite, Intybum agreste, Styhessade, & Lactuca minor, dicitur. Erraticis illis qui Ægyptiacos se gloriantur Morsus Diaboli minor, ea quod radicem habeat præmorsam. In Hassia audiui eam Summer doin/hoc est, æstiuam spinam, ab aculeis nimirum exiguis quos habet, appellari. Germani tam hoc quam illud, propter solem Sonnenwürdel/temporis ratione Mergen blümen, ob colorem Dotter blümen, seu Eier blümen, & quia rasis capitibus similia sunt scaporum cacumina Pfaffen blatz/ Münch Köpff/id est, caput Monachi, & a foliorum forma, Lewen zanz/id est, Dens Leonis, & Wissen Lattich/seu Weg Lattich/quod forma & lacteo succo ad syluaticas Lactucas pertinere ui-

dentur, uocare solent, Posset & comode Augen wurzel dici ab oculis, quorum maculas extergit, si uel radix, quo tempore Sol Virginis signum intrat, hoc est, circa festum Bartholomæi, effossa, de collo uel hominis, uel iumenti suspendatur, quod idem aqua distillata efficit, quemadmodum multi qui id experientia didicerant, mihi confirmarunt. Vnde facile adducor ut credam accipitrem, a quo nomen sortitæ sunt, primum mortalibus usum harum herbarum indicasse. Sed de his satis.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Vtrumq; Hieracium frigidam temperatûram obtinet, quare omnibus ardentibus febribus, inflammationibus, & Apostematibus conducit apprime.

INTRINSECVS.

In Apostematibus, ac ardentibus febribus, nihil sane utilius, ac efficacius usurpari, meo quidem iudicio potest, aqua Hieraciorum distillata, si ea singulis uicibus mensura trium aut quatuor coclearium bibatur. Hoc enim remedio punctori lateris dolores mitigantur, somnus accersitur, tussis auferitur una cum inflammatione.

Succus maioris Hieraci potus, æstuanti stomacho prodest. Atqui aqua distillata gratior est quippe a qua nemo facile abhorreat.

EXTRINSECVS.

Optima collyria aduersus maculas oculorum, ex aqua Hieraci, & radicis illius distillata fiunt, quanquam succus idem possit, sed & uehementius ac efficacius oculorum caliginem discutit.

Herba uiridis extrinsecus imposita, (quod & de linteolis in aqua distillata madefactis intelligendum est) omnem inflammationem nigrarum, & adurentium pustularum sedat, siue illæ pedibus, mammis aut genitalibus oriantur, quin & inflammationi membrorum medetur aqua distillata, linteolis in ea madefactis, ac impositis.

Postremo solent & mulierculæ facies suas hac aqua abluere, ut maculas exterant, purumq; & immaculatum uultum consequantur.

De Lagopo, & Lactuca leporina.
CAP. LXXXVIII.

Lagopus.
Basenstrauch.



LAGOPI, ET LACTUCÆ leporinæ post Hieracii historiam annotare oportet, ut repretium uidebatur, cum quod ambæ hæ stirpes in censu earum quæ lactariæ dictæ sunt, habeantur, tum etiam quia priorem nonnulli Rostrum porcinum esse contendunt. Atqui iam quodnam illud sit præcedenti capite docuimus, quare Lagopum alibi quærere oportet, & si ueritati subscribere uolumus, certe is lib. iij. cap. xix. apud Dioscoridem descriptus est, nam de Lactuca leporina paulo post. Tamen si autem Dioscorides, & post hunc Galenus, necnon Ægineta & Plinius, huius herbæ meminissent idque paucis, intacta illius historia, nihil enim de forma eius dicunt, solum id asseuerantes quod alium reprimit: tamen non solum Apuleius herbam hanc Leporinum pedem referre ait, sed et Etymologia hoc idem indicat. Iam si rerum ipsarum imagines consulamus, nullam certe quæ Leporinum pedem representet herbam inuenimus,

præter nonnullos flores, præsertim uero eum qui in genere Lotorum habetur, & Germanis *Hasenflee* dicitur. Ea planta in aridis & sticulis cam-
 1. *Lagopus*
Hasenflee.
 pis, cultis, pariterq; incultis agris prouenit, radice prælonga & lignosa, her-
 ba uere Lotum trifoliam referens, nisi quod illa magis exigua est. Iunio
 mense appetente luteo flore eoq; copioso emicat, nam non raro duodecim
 unicus caulis sustinet, ita tamen ut sæpenumero seni aut quini coniuncti ap-
 pareant, ac singuli coliculi cum suis floribus pedem leporinum æmulentur.
 Floribus decussis filiquæ senæ aut quinæ itidē coniunctim positæ succedūt,
 pedi gallinæo, uel columbino similes, in quibus semen minutum instar
 Eruorum inclusum reperitur. Sed de hoc Lagopi genere suo loco plura.

2. Inueniuntur deinde ipsæ in locis flosculi diuersicolores, utpote candi-
Lagopus
Hasenpföt-
lin.
 di, rubri, purpurei & uariiegati, Aprili mense florētes, formaq; sua Tineariā
 repræsentantes. Herbam habent cineream, non aliter quam Pilosella mi-
 nor. Sed & de hac stirpe alias dicemus, nunc ad Lactucam leporinam nos
 conuertemus.

3. Illa ualde exigua est planta, folijs in modum rotæ humi sparsis, quæ & sin-
Lactuca lepori-
na.
 gula incisuris dissecta sunt, ueluti Hieracium minus, sed minutior illo per
 omnia, tenui & læuis capo, flosculo luteo. Nascitur plerumq; in segetibus,
 nonnunquam & incultis agris, ac aridis collibus. Est autem hæc Lactuca,
 inter omnes Lactarias herbas fere minima.

NOMENCLATURAE.

1. Primum genus, Germani *Hasenpfötlin* uocant, atq; hanc ego autumo,
Diosco. lib. 4.
cap. 19.
 eam esse quæ Dioscoridi *λεγιών*, Leporinum Cyminum, & Leporinus pes
 dicitur.

2. Alterum similiter *Hasenpfötlin* Mediomatrices appellant, quod Lepo-
 rino pedi sit simile. Qui ad Rhenum habitant *Meißölin* cognominant,
 hoc est, Pilosellam.

3. Lactucæ leporinæ nullum aliud præter hoc ipsum nomen apud autoreo
 inueni. Solus Apuleius illius meminit, cuius hæc sunt uerba:

Lepus cum æstate nimio deficit æstu, hac herba remediatur, ideo Lactu-
 ca leporina dicitur. Hæc ille.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Contraria ac mira facultate hæc Lactuca prædita est, nam uentrem &
 soluit & cohibet. Proinde utrinque adhiberi potest.

INTRIN-

INTRINSECVS.

Lactuca leporina uino decocta & bibita, alui fluxum cohibet.

Herba resiccata & in puluerem tusa, inq̃ uino pota, aluum emollit, quod si febris quoq; adsit, puluis ille in aqua sumi, uel herba aqua decoqui debet.

EXTRINSECVS.

Lactuca leporina tusa, tumoribus coxendicis imposita, tumore deprimi.

Eam, si febricitantibus nescientibus sub puluino supponatur, remedium morbo asferre aiunt.

Succo illius supercilijs illito, pili decidunt.

De Endiuia. Cap. LXXXIX.

VO DOMESTICAE ENDIVIAE GENERA IN HORTIS nostris reperiuntur, quorum alterum seritur, alterum sponte nascitur.

Maxima in his Endiuia, folia Lactucæ quadantenus similia habet, linguam referentia, ac minime incisa. Semen eius, omni Lactucæ semine magis nigricat, frigidaq; & umbrosa terra gaudet. Porro licet Lactucæ semini admodum affine sit, tamen incultis agris, propter muros & petrosa loca foelicius fructum fert quam cultissimis locis. Altero demum anno in caulem exit, (nam antequam excaulescat hyemis iniuriam satis sustinet, quod & Columella lib. xij. cap. iij. & experientia testatur) eumq; rotundum, crassum, et procerum lacteo sed amaro (sicut in altera Endiuia) succo præditum, in uertice multis ramis brachiatum, foliolisq; plurimis, linguæ ut diximus formam representantibus, ornatum, ut arbusculam haud obscure imitetur. Florem gerit luteum, qui a maturitate una cum semine in auras euanescit, uti Senecionis. Neque uero prætereundum est, hoc Endiuia genus peregrinum esse. Nam e' Burgundia olim ad nos allatum fuit, consilio & opera generosissimæ Principis de Troia, cuius beneficio in toto nunc Ducatu Belpontino passim extat.

Vulgaris autem Endiuia priori, caule, floribus & semini similis est, folijs tantum ab eadem dissidens, quæ maioribus diuisuris incisa habet, non aliter quam Hieracia. Caulis illi admodum magnus, purpurascens pene, spinulis multis horrent uenæ foliorum. In hortis ad muros prouenit. In Alsatia sponte extra uineas, in collibus & secus macerias, gignitur. Semen uento in aëra dispellitur.

NOMEN

Endiuia maior.

Endiuia vulgaris.

Endiuiā.

Endiuien.



NOMENCLATURAE.

Quas modo descripsimus Endiuias, eas satiuas Dioscoridis esse iudicamus, quas ille capite lxi. lib. ij. depinxit communi nomine Serin & Inty-
 bum (unde

bum (unde appellatio Endiuiae nata uidetur) utraq; appellans: Verba illius hæc sunt.

Seris duum est generum, una folio latiore, Lactucarum simillima, altera angustiore est folio, & gustu amara.

Quæ sane uerba nostris Endiujs quadrare nemo non uidet. Vsurpantur & illæ dum adhuc teneræ fuerint in cibis, quod Dioscorides similiter de illis affirmauit.

Proin possunt Germanice *Jame Endiuien* / & *Genszungen* appellari. *Serap. cap. 143.* Serapio Scariolas seu Serriolas illas nominauit. Neq; impedit me hoc loco Neoteriicorum sententiæ, qui in multas Endiuia species digerunt, quas tamen discernere ipsi nequeunt. Plinius diligenter de hac re scripsit, quem uide lib. xx. cap. viij. Sed ut de ea quam Germani *Oudissel* appellant, (quæ nihil aliud est quam Intybum syluestre, cuius descriptionem statim subiungemus sequenti capite) aliquid dicamus, notandum est, Plinio loco citato, & Plating lib. iij. Chreston, & Pancration, eam cognominari. Constantinus lib. v. cap. xvi. Endiuiae & Scariolæ appellationes uni & eadem herbæ attribuit.

VIRESC TEMPERAMENTVM,

Omnia Endiuiae seu Intybi genera, siue ea satiuia, siue erratica sint, unam & eandem temperaturam obtinent. Refrigerant namq; & obstructionibus leni & epar liberant, quare utrinq; his uti possumus.

INTRINSECVS.

In cibo commanducatæ aluum sistunt, æstuantis stomachi dolores leniunt. Hæc uero in primis efficit syluestris Endiuia in aceto assumpta.

Aqua herbæ Endiuiae distillata & pota, sitim illam uehementem quæ in peste præter naturam oritur, restinguit. Prodest & æstuantî stomacho, & Epati.

In quauis ardente febre citra periculum aqua Endiuiae distillata uti possumus, necnon aduersus inflammationes pulmonis, & sudores immodicos.

EXTRINSECVS.

Herba Endiuiae cum farina ordeacea, & cerusa cataplasmatîs instar calidis tumoribus, & sacris ignibus efficaciter imponitur.

Radix tusa & succus scorpionum & araneorum ictibus medentur.

Aqua Endiuiae linteolis excepta, & imposita, oculorum inflammationibus, doloribusq; subuenit.

Eadem

Eadem linteolis uel stupa cannabina incenso iocinori impōita, æstūm potenter restinguit: linteolis exiccatis sæpius ea aquæ immergere oportet, ut madefiant.

De Intybis syluestribus, seu erraticis, quas Germani Genßdistel / Sawdistel / & Dudistel uocant. CAP XC.

1. 2.
Duo Intybi syl-
uestris genera.

Q VEMADMODVM ENDIUIA, ITA ET INTYBUS syluestris in duo genera digeritur, quæ ambo Endiuixæ adeo con similia apparent, ut non a quouis facile discerni possint. Sunt autem Intybi erraticæ in censu Zizaniarum, & nascuntur in pingui solo hororum & uinearum. Iam ut ab Endiuix dignosci possint hæ stirpes: describamus eas. Quod id folia attinet, quæ in utraq; linguæ formam habet, & in altera serrata, seu dissecta, in altera uero integra per ambitum uisuntur, cum Endiuix conueniunt pulchre. Rursus ab eisdem magnitudine & latitudine (quam haudquaquam tantam obtinent quantum illæ) ram foliorū, quam caulium discedunt. Semen etiam his magis exiguum. Caulis concavus & mollis. Folia alterius nequaquam dissecta in extremitatibus, qualia Lactucæ habent, alterius uero, angusta, acuta, & incisa. Flores eosdem, semina eadem ambo gignunt. Sed ea quæ acutis uestitur folijs, intra humum serpendo radicitur, quemadmodum Lolium.

Præter iam commemoratas Intybi syluestris species, alia quædam ad muros nonnullis, & iuxta fluuios reperitur, folio prælongo, sed angusto, dissecto instar quercini folij, flore luteo, & multiplici & maiori supra descriptis duobus generibus.

NOMENCLATURA.

Intybis binis syluestribus proprium in nostris commentarijs caput dictatum uolui, nulla alia ratione, quam ut uel tandem a domesticis separentur. Germani illas Genßdistel / Sawdistel / & Dudistel uocant: & Latini quidam Scariolas, seu Serriolas, atq; hinc error in his stirpibus ortus esse uidetur, quod scilicet tam Endiuixæ quam hæ plantæ Scariolæ nomenantur. Ceterum meo quidem iudicio non inepte hæc duo Intybi erraticæ genera ad Taraxacon Serapionis, & Cicerbitam asperam, quæ apud Dioscoridem *ὄζυζος* dicitur, referentur.

Serap. cap. 142.
Diosco. lib. 2.
cap. 120.

VIRES

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Cum Endiuiā uera destituimur, Intybo erratica contenti ut simus necesse est, præsertim cum easdem cum illa facultates sortita sit, quas hoc loco repetere superuacaneum esse putamus. Hoc unum obseruandum censemus, Intyba syluestria propter uim refrigerandi magnam, qua præditæ sunt, externis corporis partibus potius adhibendas, quam internis.

E X T R I N S E C V S.

Herba tusa, & aqua distillata, æstuantī stomacho, & podagræ, alijsq; quæ refrigerationem desiderant, utiliter imponuntur.

De Cichoreæ uarijs generibus.

CAP. XCI.

NTEQUAM CICHOREAS IN SVAS SPECIES PARTIAMUR, in genere prius nonnihil de illis annotabimus. Cichoreæ itaq; omnes circa Solstitium æstiuū florent, secundum itinera, & uias, maxime eas quæ per agros frugiferos ducunt. Radices habent longas instar fœniculi, quæ antequam caules producant, amarum lac manant. Folia prima humi sparsa procumbunt, non aliter quam Hieraciorum, coloris tamen magis incani, asperiora & minora, scissa, unde quidam putauere Hieracia in erraticum Cichoreum, quod cæruleo emicat flore, tandem conueriti. Caules proferunt frequentibus furculis brachiatos, sed non perinde foliatos, quin foliorum loco ab imis usq; in summas partes omnium ramulorum, plurimi protuberant toruli, qui cum adaperiuntur cærulei exillis erumpunt flosculi, (atq; hæc esto prima Cichoreæ species) cum sole se circumagentes. Nam siue sudum, siue nubilum fuerit cœlum, tamen ex his flosculis hora diei animaduerti semper potest, quippe cum interdū dehiscant, sole occidente comprimuntur. Sed quod fere præterieram, naturæ miracula in hoc quoque flore obseruare licet. Siquidem non tantum ad solis ortum & occasum sese pandit, & recludit, uerum etiam cumulo formicarum abditus cæruleum colorem in rubeum mutat, ac si terrore illarum erubescerēt.

Inueniuntur deinde (tamen si rarissime,) in hoc genere plantæ, quæ partim candidum, partim roseum gerant florem. Has stirpes secus uias domesticissimo uiropiæ memoriæ D. Othoni Brunfelsio demonstraui olim. Semina iam descriptarum Cichorearum, non euanescent ut aliarum Intyborū, sed in

21
Cichorea cærulea.

Miraculum nature.

22
Cichorea candida, & rosea.

Cichorea.
Wegwart.

3. 4.
Lutea Cichorea



5.
Cichorea procer
ra.

sed in folliculis, qui singuli uerrucas imitantur, coniunctim positis, latent.

Tertia porro & quarta *Cichorea* flore luteo, qui ab *Hieracei* maioris floribus nihil distat, consimiles plane sunt, quantitate uero differunt, nam altera tota substantia maior est. Folij utraq; uestitur dissectis per ambitum ueluti primæ, sed asperioribus spinulis multatis, quemadmodum *Endiuæ* horrentibus. Radices earum longæ sunt & rectæ, luteum succum manant incisæ, qui in gummi quasi glutinosum coagulatur. In *Assatiæ* asperis collibus, secus agros & uineas, apud *Mediomatrices* uero in montanis pratis, ubertim gignuntur, semine subluteo.

Quinta *Cichorea* quæ & maxima euadit, nam altitudinem mediocris arbusculæ attingit, multis surculis brachiata undiq; foliolisq; frequentibus & acutis instar linguæ, ac ueluti pennatis uestitur. Flos illi quæ admodum *Lactucæ* luteus, qui in pappos à maturitate abit, quod idem in proxi-

mis duabus contingit. Frutex iste in humidis agris nascitur, proceritate alias omens fruges superans, germinibus adeo longis, ut ad uinctum satis lenti et apti sint. Lacteam similiter fundit succum, qui cum coagulatur, gummi repræsentat.

Verumenim

Cichorea sativa.

Wegwart zam.



Verumenimvero su-
perest, ut de sativa dicamus *Cichorea sativa*
Cichorea, quæ omnium e-
legantissima est. Ea cau-
le, flore, semine, & radice
uulgari omnino respon-
det. Atqui folia radici pro-
xima nequaquam incisa
sunt uti uulgaris *Cichoreæ*,
sed integra, Endiuæ pri-
mæ pene similia, sed paulo
minora, & angustiora. Co-
lorem obtinent pulchre uir-
ridem, gustu subamara. Hy-
emari potest hæc herba.
Quædam enim ex hoc ge-
nere capitula albida prog-
nunt, quæ acetarjjs adhi-
bentur, non aliter quam La-
ctuca.

NOMENCLATURAS

Cum cognitio stirpi-
um, donum Dei Optim.
Max. sit, non pudet me
facere quod Hippocratem
excellentissimum Medicum
quondam fecitasse legi-
mus. Is etenim Crateuæ
herbario sæpenumero scri-
bebat, rogans illum, ut ad
se herbas & radices uari-
as mitteret, quo quænam il-
læ essent, addisceret. Pari ra-
tione postquam nos quoque

sativam Cichoream cognoscendi desiderium tenuit, non dubitauimus su-
per ea re honestissimum uirum D. Georgium Ollingerum, ciuem Norim-
bergensem, literis nostris interpellare, a quo illa ad nos allata fuit. Atque

Diosco. lib. 2.
cap. 122.
Varro lib. 2.

hæc ea est *ſatīua* angustifolia, quo nomine & Intybus uocari meruit. Cichoreum erraticum cærulei floris, herba est Solaris, & apud Varronem Solsequium, Heliotropium, & Ægyptijs Agon dicitur. Reliquæ Cichoreæ species ad caput cxxij. lib. ij. Diosc. pertinent, suntq; hæc illorum nomina (nam uulgo hodie omnia huius stirpis genera, Cichoreæ, Cichoria, & Germanis *Wegwart* & *Wegweiß* a uia quod nascantur secus itinera, Hebrejs uero, ut placet Phrisso *חַבְבִּית* Intuba, uocentur nimirum a Latinis mutata, dicuntur, Græcis *πικρα*, *σίρις*, *μαχάριον* & Ambubeia.

Hactenus igitur per aliquot capita Cichoreas & Intyba omnia descripsi mus, nunc quo facilius discerni queant, paucis & obiter ea repetentes com-
plectemur simul.

1. Cichorea satīua
& erratica
2. Endiuia binæ su-
pra cap. lxxix de-
scriptæ.

3. Genß distel / hoc
est Endiuia sylue-
stres

4. Caput Monachi,
Paffen rōsin.

5. Tria postrema
Cichoreæ gene-
ra, quæ luteos pro-
ferunt flores

6. Lactuca lepori-
na

pertinent ad

caput cxxi. lib. ij. Dioscor. potestq;
fieri ut apud Theophrastum lib. viij.
cap. vij. & xi. Intyba & porcellia uo-
centur.

cap. cxx. lib. ij. Dioscoridis *σίρις*
πικρα, atque picris seu Taraxacon uul-
go uocatur, Andryala nobis Theo-
phrasti esse uidetur. lib. vij. cap. vij. &
xi.

cap. lxxv. lib. iij. Dioscoridis *πικρα*
nobis sub Amaragine Theophrasti cō-
prehendi uidetur.

cap. cxxvij. lib. ij. Diosco. *πικρα*

Apuleij caput. cxiij. & potest pro
Endiuia, seu Lactuca syluestri usurpa-
ri.

Quod si hac ratione plantæ a se mutuo discernantur, sortientur illæ tandē
genuina sua nomina, & minus difficultatis, ac obscuritatis in rem herbari-
am subrepet. Sed satis superq; de his.

VIREs AC TEMPERAMENTVM.

Sadua Intybus iam in usu esse coepit apud omnes, unde iam passim Cichorea appellatur doctis, quare de illa nunc loquemur. Est enim tota sua substantia frigida & sicca, utrisq; corporis partibus commodissima.

INTRINSECVS.

Decoquitur in aqua fasciculus eius, potumq; id decoctum, per inferna blem & pituitam trahit.

Semen tusum, ac in uino potum, ante accessiones febrium, illas finire dicitur. Diosco. lib. 4.
cap. 185. de Hæ-
liotropio.

Decoquitur herba & radix, uino aut aqua, & calidum bibitur id decoctum, aduersus obstructions lienis & iocinoris, sed in principio Hydropis, & malo corporis habitu, Græcis *ναξία* dicitur, hoc remedio uti conuenit.

Ad eadem ualet aqua distillata, in primis uero æstuantis stomacho, & ardentibus febribus, imbecillitatiq; cordis utilis est.

Cichoreæ luteæ, quas Condrillas appellari diximus uino decoctæ & potæ ueneno serpentino resistunt.

Succus expressus uino decoctus, uel per se sumptus, fluxiones alui sistit.

Proinde tam cærulea, quam lutea Cichorea in tenera adhuc ætate, cibis utiliter adhibetur, concoctionem namq; adiuuat, omnesq; obstructions iocinoris & lienis soluit.

EXTRINSECVS.

Folia cœruleæ Cichoreæ, abcessibus, tumoribus, & inflammationibus necnon pudendorum pustulis imposita, dolorem mitigant, ardorem extinguunt, calidæ podagræ commodissima, inflammationibus, & Erysipelæ caput puerorum subueniunt.

Verum aduersus iam commemoratas affectiones, aqua distillata maioris est momenti, si ea in linteolis lineis excepta affectis partibus imponatur. Maxime uero hoc pacto usurpata Anthraci auxiliatur.

Aqua è floribus cœruleis distillata, inflammationibus & caligini oculorum imposita, potenter remedium adfert.

Cichoreæ luteæ herba & radices tusæ subditæ per se, aut in pessq, menses trahunt.

Succus earundem cum sale nitri & melle temperatus, unguentum nobilissimum præstat, ad emendandam asperitatem, & deformitatem cutis.

Succus eius supercilijs nudis illitu, ad recuperandos pilos conducit admodum:


De Alsine, seu Auricula muris maiore.

CAP.

XCII.

Auricula muris maior.

Groß Meißor.



QUANQVAM MVLTIS plantis nomen hoc (Auricula muris) commune sit, tamen maxima in his, de qua ueteres scripsere, & quae passim obuia est: apud doctos ætatis nostræ plane ignota est, & usu repudiata. Quamobrem ne in posterum lateat, saluberrima herba, age describamus eā. Nascitur autem illa in umbrosis nemoribus, nonnunquam etiā ex antiquis muris in perpetua umbra sitis prorumpit. Iunio mense appetente, teretem, tenuem, & pilosum, cubitalis altitudinis caulem, eumq; nudū, folijs & geniculis destitutū prorsus emittit. Folia humi sparsa iacent, eaq; singula auriculam muris alpini, seu leporis expriment, sunt enim pilosa, & parum in extremitatibus incisa. Radicem habet breuem, sed multis fibris capillatam, non aliter quam Plantago. Flos in summitate rotundi caulis luteus ac multiplici foliolorum ordine supatus exilit, ueluti in Hieracio, qui post maturitatē in pappos euanesceat;

transcitat: Tota hæc planta ubicunq; incidatur, lacteum manat succum. Neque uero silentio prætereundum censeo, quod ego sæpe huic plantæ accidere uidi, maxime in sylua Brocomagi. Nam ad caulem prope terrā humilitas quædam colligitur nucis iuglandis magnitudine, quæ in rotundū agit, pilisq; incanis obducitur, ut musculo plane similis euadat. Qui sit ut uel hinc a mure nomen fortiri potuerit nostra hæc Myosotis.

NOMENCLATURA.

Germani Groß metißor, & quidam Chirurghi Heidniß wundkraut, hoc est, Solidaginem Sarracenicam (quamuis ab ea quæ Salicis folia habet, eodemq; hoc nomine appellatur, quo de infra cap. clxiiij. dicemus, diuersa sit) nominatur. Deplorandum est autem in eum locum redactam esse rem herbariam, ut quisque nominæ herbis imponere, & ex ipsa rerum experientia uires earum addiscere cogatur, doctissimis interea uiris (quorum id maxime intereat) nescio quem somnum stertentibus. Et quoniam ut dixi omnino ad indoctiores ea prouincia deuoluitur, conabor & ego pro uirili in sum, locum plantas asserere, proprijsq; suis quantum fieri potest appellationibus insignire. Itaque siquid iudico hæc ea est Auricula muris maior, quæ apud Dioscoridem *αυρη οὐρα* dicitur: quam ille Myoton, Anthyllion, Myorochon, Alfinen (quod Lucos quæ Græci *ἀλιν* uocant, umbrosaq; & nemorosa amet loca) & Myotosplenon, nam folia spleni similia apparent, uocat. Diosco. lib. 2. cap. 175. Dioscor. lib. 4. cap. 15. Periclymenon, Alfinem quoque maiore uocat.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Galenus lib. vi. hanc stirpem describit, aitq; illam frigida & humida naturæ esse, ideoq; commode sacris ignibus adhiberi posse. De minori muris auricula seorsim lib. viij. agit, sed de illa paulo post.

INTRINESCVS.

— Aqua huius herbæ distillata ad quasuis internas & feruentes inflammationes cordis, stomachi, & epatis, pota & foris imposita facit, quare ueluti Cichoreæ aqua usurpari potest intrinsecus.

EXTRINSECVS.

Chirurgi potiones uulnerarias ex hac Myosotide conficiunt, uulneribus recentibus mundificandis et sanandis, uino enim decoquunt & herbam bibendam exhibent uulneratis, & foris etiam imponunt.

Succus expressus, auribus in dolore utiliter instillatur, nam punctiones earum et tumoris tollit.

Breuius aquæ distillatæ eadem insunt facultates, quæ & Cichoreæ.

De *Auricula muris minore, & eius speciebus.*

CAP. XCIII.

Auricula muris minor.

Klein Meißer,



VULGARIS ET MINOR Myosotis quemadmodum maior amarum lacina cisa fundit. Nascitur illa sabulosa tellure, per quam non aliter quam *Fragaria* serpendo se propagat, radice admodum capillata. Per totum annum folijs humi sparsis apparet, quemadmodum *Primula veris*. Folia incana & subalbida habet, hirsuta, & singula formam auriculæ *Soricis* magni repræsentant. Maio mense luteos flores sustinet tenuissimi coliculi, qui in pappos postea desinunt, & in auras auolant.

Altera huius generis planta iam commemoratæ tota sua substantia similis est, sed uiridioris coloris, mollioribus folijs & non perinde pilosis. Natura utrique eadem.

Porro in hortis oleribus & cæpis confidis alia quoque *Auricula muris* reperitur, herba cauliculis & surculis procerioribus, pinguioribus & mollioribus. Atque ea in tenera sua ætate inter cætera olera decoquitur.

quitur. Flosculi huius cærulei fiunt coloris, similesq; floribus Anagallidis.

Postremo obseruandum quod et Tinearía lutea, & ea quæ Basenpför. in dicitur Germanis, de quibus infra cap. cix. agemus, inter Aurículas muris computantur, propter foliorum similitudinem, quam cum Aurícula muris hortensi occupant.

NOMENCLATVRÆ.

Duæ priores simul & uulgatissimæ Mysioides apud Dioscoridem cap. clxxvi. libro ij. uno nomine *αὐρίων* appellantur, quod & Plinius testatur lib. xxvij. cap. iij. Nostri utraq; Pilosellas appellant & pilis, tametsi pauca ueras earum differentias perspectas habeant. Nec desunt qui eas Anagallides uocari uelint, quam sententiam e uerbis Auicennæ stabilire conantur, qui lib. ij. cap. xviij. scribit, secundam Auriculam. muris in Dioscoride, cæruleos ferre flores, & semen Coriandro simile. Sed quod ad postrema attingit de semine uerba, iniuria fit Dioscoridi, nisi forte bonus ille Auicenna Anagallida cæruleam intellexerit. Atqui uereor illum, neq; Myosota, neque Anagallida perspecta habuisse. Hac de re Nicolaus quoque Leoniceus copiose tractat. Hortensis & syluestris Myosotis, licet à mulierculis à foliorum forma ita appelletur, nonnulli tamen eam Oculariæ herbæ (qua de nos infra capite cvij.) potius quam Mysioidis genus esse cōtendunt.

De quarto genere suo dicitur loco. Syluius medicus Parisiensis excellentissimus aliam quandam muris auriculam demonstrare uidetur. Sed probet ipse quod affirmat. Quod ad me attinet, uidere illam cuperem.

VIREs AC TEMPERAMENTVM.

Vulgares Myosotides lacteum succum manantes, calidum obtinent temperamentum, quo nomine intro sumi possunt, ad incidendum & extrahendum morbum regium adustum & inueteratum.

INTRINSECVS.

Hæ ipsæ Pilosellæ cum Cichorea & Centaureo, aliquando etiam per se uino uel aqua decoquuntur, & Saccharo temperantur, danturq; ijs quibus obstructi sunt iocinoris meatus, & qui ad morbum Hydropis procliuēs sunt.

Eadem ratione usurpatæ Aurigine laborantibus, ac commodatissimæ sunt, si eiusmodi decoctum bibant uesperi & mane, ita tamen ut à potu ij. aut ij. horis ieiunent.

De *Barbula hirci.* Cap. *XCIIL.*

Bocha bart.



Diosco. lib. 2.

cap. 123.

Plinius lib. 27.

cap. 13. & lib.

21. cap. 15.

POSTVLABAT
 auncipse ordo, ut Anagal-
 lidis & Tinearizæ mentio-
 nem faceremus, nisi in men-
 tem uenisset Hirci barbula,
 cuius historiam propter la-
 cteum quem fundit succū,
 hoc loco subiungere libuit.
 Isthæc itaque stirps Iunio
 mense in nonnullis pratis
 reperitur, radice candida,
 rotunda, digitum crassa, fo-
 lijs ab imo usq; ad summū
 caulis ex ordine positīs al-
 lij folia referentibus, & ali-
 quanto etiam lōgioribus.
 Quo loco obseruandū est
 paulo aliter tam Dioscori-
 dem quam Plinium, quod
 ad folia attinet, (nam in cete-
 ris breuiter sed scite illam
 depingunt) hanc herbam
 descripsisse, sic enim scribit
 Plinius,

Est & Tragopogon, quē
 alijs Comen uocant, caule
 paruo, folijs croci (quod
 nos, alijs, propter rei uerita-
 tem interpretati sumus) ra-
 dice longa, dulci, super cau-
 lem calyce lato, nigro. Hæc
 ille.

Sed finitionem bar-
 bulæ nostrę prosequamur.
 In cacumine scapi magni & proceri, quem habet Tragopogon, flores pro-
 deunt.

In cacumine scapi magni & proceri, quem habet Tragopogon, flores pro-
 deunt.

deunt lutei, magni & multiplices, & radiati, ut ea ratione haud multum à floribus Elenij distare uideantur. Iis pereuntibus pappi maiores Hieraciorū crinitis capitibus subsequuntur. Semen eius quod maius est semine Cymini Romani, sub lanuginosis capillis latet, & una cum pappis suis in auras tandem euanescit, quemadmodū semina reliquarū Lactariarū stirpium. Est & caulis multis distinctus geniculis, quæ fere omnia alba spuma instar saluæ circumdantur, quam aiunt Coccycem auem aspergere. De hac stirpe quisquis exacte coquoscere cupiat, is legat Theophrastum capite vii. lib. vii. Ruellius lib. ii. cap. cxxxviii. differentiam inter Tragopogona, & Gerontopogona constituit. Hinc quidam plantam hanc non Tragopogona, sed Gerontopogon esse affirmant, eo quod non habeat folia croci.

NOMENCLATURAE.

Barbula hirci Latinis, *κρυφύριον* Græcis, alias *νήυν*. Coma dicitur. Germani Bocksbarr, & pueri qui radice tenera adhuc uesti solent, sicut & alias herbas, præsertim Oxalida deuorare cōsueuerunt, *Γαυφύριον* / quasi Coccycis panem ob dulcedinem radice uocant, quæ si Apitijs perspecta foret, nunquam non acetarijs suis illam præ cæteris herbis & radicibus infererent.

VIRESC. AC TEMPERAMENTVM.

Barbula hirti tenera in ætate culinaria est herba; & esui apta, maxime in acetarijs, quemadmodum aliarum herbarum asparagi. Temperamento suo calida, internis corporis partibus utilissima.

INTRINSECVS.

Aqua ex herba & radice distillata Maio mense, remedium est præsentissimum aduersus Apostemata & dolores laterum.

Reliqua quotidiana obseruatio & experientia docebit.

De Pycnocomo, Germanis Geißbarr.

CAP. XCV.

OST BARBVLAM HIRCI PROXIMVM EST VT

P de Barba caprina dicamus, quæ tamen non manat lacteo succo, ueluti Barbula Hircina, nominis tamen allusione factum est, ut

hunc locum fortiretur. Est autem illa duorum generum. Altera & uulga Barbula caprina

S v na prior.

Barbula capræ.
 Waldt geißbart.



tissima non raro in uliginosis pratis, sæpe etiam inter spinas, & in collibus
 quibusdam prouenit, duris & rugosis folijs, ac complicatis instar foliorum
 Betulæ, per ambitum incisís, ueluti Eupatorium seu (ut uulgo uocant) Agre-
 monia

monia, nisi quod folia præcipua, quæ ex multis constant adiunctis æquali distantia alijs folijs, ijs quæ per fuscas uenas & surculis articuli interuallo prodeuntibus grandiora apparent. Quotannis nouos caules emittit, concavos, quadrangulos, fuscos, qui nonnunquam uiri proceritatem attingunt. Florem gignit copiosum, racematim compactum, magisque stipatum ac coactum quam Ebuli, coloris candidi, odorem gratum spirantem. Postquam is deciderit, semen subsequitur, Verrucæ exiguæ & acutæ simile, in tria acumina desinens. Radix illi longa, fibris quæ multis capillata, foris nigra, intus subfusca, grauissimi odoris, amari simul & astringentis saporis, non aliter quam Glandes. Hæc planta in tenera sua ætate inter cætera olera legitur, quod idem alijs nonnullis erraticis contingit.

Alterâ uero in umbrosis locis reperitur, & uallibus quibusdam, radice lignosa, nigra, tenui, intus subfusca, gustu itidem amara. Folijs uesitur maioribus & elegantioribus, instar foliorum Nucis, per ambitum ferratis quem admodum Castanearum. Alto proflit caule, flores candidos, racematim instar barbæ dependentes, qui in iulos tandem desinunt. Atque hoc illius semen est. Porro quotannis nouos emittit caules, floret Iunio mense.

²
Barba caprina
sylvestris.

NOMENCLATURA.

Cum exactius formam harum stirpium, & descriptiones tam Plinij quàm Dioscoridis considero, sane non uidentur mihi alium posse occupare locum, quam clxix. caput lib. iij. Dioscoridis, eritque nomen illius *πυκνόμορον*. Nec enim negari potest, non tantum barbas densas floris in hac stirpe dependere, sed & folia complicata & densa satis apparere, ut uel hac ratione Germanis *Dickblatt*, uel *Dickblumen*, propter foliorum & florum frequentiam, hoc est, *πυκνόμορον*, dici merito debeat. Vulgo Barbam caprinam Latine, Germanice uero *Geißbart* appellant. Non est autem prætereundum, quod iuuamenta quæ Pycnocomo a Dioscoride attribuuntur, non conueniant cum ijs quas Serapio & Auicenna Barbæ suæ hircinæ assignant. Nam Dioscorides quidem radicem Pycnocomi aluum soluere, bilemque extrahere tradit. Arabes contra Barbam hircinam aluum sistere & alios quoque fluxus cohibere scribunt. Hinc facile uidere est Barbam hircinam Arabum nihil aliud esse quam Ledon seu Ladanum, quod a Galeno *πυκνόμορον* quoque cognominatum est. Vide Geside succid. fol. xvij.

Diosco. lib. 4.
cap. 169.
Plinius lib. 26.
cap. 8.

VIRESCIT TEMPERAMENTUM.

Utrumque Pycnocomum quantum iudico, calidum & siccum est, inprimis uero uulgare, quod fuscâ habet radicem:

INTRIN-

INTRINSECVS.

Radix uino & melle decocta ac pota, aluum soluit, bilem extrahit. Porro si in uino rubro & quasi nigro decoquatur & bibatur dysenteriae utilis est.

Mulierculæ verno tempore tenera huius stirpis folia legunt, oleribusque suis adiungunt.

Semen in cibo commanducatum capiti noxiam adfert.

EXTRINSECVS.

Herba cum farina tusa & imposita, tumores discutit, furculos præterea extrahit, cuspides & tela, tusa & imposita.

ranuncul. Folia vulgaris Pycnocomi, adultiora, pustulas imposita excitant, quemadmodum Ranunculus.

De Senecione. Cap. XCVI

SENECIO TAMETSI NON FVNDAT LACTEVM

1. *Senecio vulgaris* Succum, tamen inter Lactarias stirpes eum recensere placuit, propterea quod semen illius ut earundem in auras euascat. Cumque situulgatissima herba, nihilominus diligentius eius historiam profecutus est Dioscorides, quam uel Balsami, Cinnamomi, uel Garyophyllorum. Descriptio igitur Senecionis sic habet. Senecio planta est cauliculo dodrantali, passim obuia in hortis olerum & cæparum, quibus in locis per totum fere annum uiret, quod & ueteres testati sunt. Folijs uestitur rugosis, in modum crucis dissectis, ueluti Erucae aut Verbenae, at angustioribus & breuioribus. Coliculus illi rotundus, concavus & succulentus, subruber, in summitate furculosus ac mitutissimis & incisis foliolis ornatus. In cacumine furculorum, nodosi ac lutei flosculi exiliunt, Tinearig flosculis haud multum absimiles, qui quamprimum in semen lanuginosum, ac pappos in auras euanescentes abeunt, e quo quotannis repullulascit, ineunte vere. Tota æstate apparent lutei flores, & usque in duram hyemen perdurant, quod idem de Scolymo Plinius lib. xxi. cap. xvi. prodidit, his quæ subijciemus uerbis.

Mirum (inquit) quod sine interuallo tota æstate aliud floret in eo genere, aliud concipit, aliud parturit. Hæc ille.

2. *Senecio maior.* Aliud deinde Senecionis genus non quidem ubique, sed in antiquis muris, & sabulosis semitis tempore messis floret. Illud fibrata ac breui radice, incisis folijs, molli coliculo, luteis capitulis, necnon lanuginoso semine, uulgari per omnia respondet, nisi quod illo tota sua substantia longius, maius

Senecio.
Creutzwurz.

maius & procerius est, foliisq; latioribus & cineraceis uestitur.

NOMENCLATURAE.

Germanis hæc herba Creutzwurz/Latinis Senecio, & Herbulum, Græcis (teste Dioscoride) *ἰριγόνη*, (quod initio veris defloreat perinde atque in media messe, nam & partus & conceptus, iuuentus & senium in ea sese mutuo contingunt) et *ἰριγόνη* dicitur. Dioscorides ut diximus eleganter eam describit lib. iij. ca. xcij. Theophrastus illius meminit lib. vij. cap. viij. & xi. cumq; de Intybis scribit, inter alia dicit, Aphacam non posse commode gustari, propter amaritudinem quæ illi insit, defloreat quamprimum, canescere etiam ilico flores illius, ac in aëra auolare, ex semine continuo renasci, rursusq; perire &c., quæ omnia de Senecione ego intelligo, nã Erigeron Dioscoridis, & Aphaca Theophrasti ad unum mihi genus refertur. Manardus Ferrariensis ait Senecionem Petrellam vocari, quæ appellatio secundum

Manardus lib. 3.
epist. medic. 1.

do generi Senecionis, quod cineraceis folijs uestitur, & amarius est, unde proculdubio erit Theophrasti Aphaca, tribuenda mihi uidetur. Quod uero Simon Ianuensis Carduum benedictum Erigeron appellat, error est manifestus.



manifestus, sicut & illorum qui Nasturtium hoc nomine vocant.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Senecio frigidam & humidam naturam obtinet, quare raro intra corpus lumitur.

INTRINSECVS.

Totus caulis, si coctus in passo potui detur, stomachi dolores calidos a bili contractos persanat, autor est Dioscorides.

EXTRINSECVS.

Herba Senecionis recens cataplasmatris instar illita, inflammationes faciat, tumoresque mammillarum, articularum, genitalium, & sedis discutit.

Vulneribus nervorum cum manna thuris medetur.

Nec desunt qui hanc herbam cum aceto tundant, ad eas quas diximus inflammationes. Parcs vires aqua Senecionis distillata habet.

De flore S. Iacobi. Cap. XCVII.

HÆC PLANTA FOLIIS VESTITVR NIGRICANTIBUS, dissectis & incis, maioribus Senecionis. Ea primo anno humi procumbunt, ueluti Plantaginis, nam secundo demum anno longi & fusci exiliunt caules, similes Artemisiæ, surculosi, multisque ramis brachiati, copioso emicantes lutco, radiato flore, Chamomillæ non dissimili, qui et ipse non aliter atque Senecionis a maturitate in lanugine sum semen desinit, & in aëre auolat. Floret circa festum Ioannis. Radicem habet breuem & fibratam, quemadmodum Plantaginis. Gaudet inculta & arenosa terra, muris & aridis collibus.

NOMEN.

Flos S. Iacobi.

S. Jacobs blüm.



NOMENCLATVRAE.

Germani hunc florem
S. Jacobs blümen / & S.
Johans blümen / quod eo
tempore floreant ut dixi-
mus, uocant. Latinis Flos
S. Iacobi dicitur,

VIRES AC TEM-
peramentum.


Flos, S. Iacobi non solum
eandem formam, sed & eas-
dem cum Senecione uires
& facultates obtinet, quo
nomine Senecio maior iu-
re appellari, & pro illius
uarietate tuto potest. Inprimis
autem uulneribus, inflama-
tionibus & fistulis me-
detur.

Reliqua si qua desidera-
tur iuuamenta quotidiano-
usu addisci possunt,

D.

De Ricino. Cap. XCVIII.

Wunderbaum.

Plinius lib. 29.
cap. 1.

QV AECVNQVE
apud ueteres olim magni
fiebant, ea cum tempore ua-
riantur, usuq; repudiatur,
quod cum in omnibus fere
rebus, tum uero in medici-
na praecipue contingere ui-
demus. Tameſi autem
unaquaeque terra ex libera-
lissima omnipotentis Dei,
manu ſua medicamenta ac-
cipiat, tamen raro illis do-
ctiſſimi quique utuntur in
curandis morbis mortali-
um, quin potius peregrini
ac longe petitis delectan-
tur remedijs, qui ſicut quis
quis inter iſtos loquendo
polleat, meliusq; nouas ac
mirandas medicamento-
rum compositiones moliri
& aſſerere poſſit, ilico apud
omnes doctiſſimus & ex-
cellentiſſimus habeatur Me-
dicus. Proinde poſtquam
diſertis eſſe lubet, ſapiam
& ego nunc aliquantulum,
percontaborq; hos, ad quid
Ricinus faciat. Nec dubito
quin aliqui ſint, licet non
ore, animo tamen reſpon-
ſuri, quod res eſt, nempe ne-
que uires Ricini, neque ubi
is inſcriptis ueterum ſit de-
ſcriptus, ſibi conſtare. Au-
diant itaque illi, ſi placet, obiter iuuamenta eius recenſentem (nam hi-
ſtoriam

floriam statim subiiciemus) ut uel hinc discant usitatis & cōsuetis remedijs contenti esse. Itaque Ricini oleum non solum lucernis utile existit, qua ratione apud Aegyptios olim, cum omni alio carerent oleo usurpatum legimus, uerum etiam herba ipsa sacris ignibus, tumoribus & inflammationibus mammarum, oculorumq; apprime conducit. Arqui hodie in hortis nostris spectaculum tantum exhibet Ricinus, ususq; eius uel nullus, uel exiguus est, quoniam satis apparet ab exteris nationibus ad nos haud ita dudum allatum. Sed ut relictis his finitionem eius instituamus, notandum est Ricinum hyemis omnisq; frigoris impatientissimum esse, ideoque quotannis e semine subincano, ricinisq; qui canibus adhærent simili, repululascere necesse habere. Cæterum semen ubi e solo emergere coeperit, bina rubra & rotunda foliola, assem quem Batzionem uulgo dicimus lata primum ostendere. Post quæ alia & latiora subinde exeunt, inter quæ teres, concavus, arundinosus, procerus idemq; teneerrimus caulis assurgit, quem in summitate omnium maxima & latissima circumdant folia, quod mirum uideri iure debet.

Cum etenim inter omnes fere stirpes maxima folia, radici propinqua fundant, solus hic noster Ricinus contra facit, quare a quod Germanos recte Wunderbaum/id est, mirabilis arbor dicitur. Porro folia singula dissecta in septem, & aliquando nouem diuisuras uenis suis distinctas, ut & pedis anserini, & solis effigiem repræsentent, sunt & illa per ambitum serrata, & pluuia imminente in altum cōplicata sese tollunt, imbrisq; aquas recipiunt, perq; triduum nonnunquam retinent. Caulis Ricini fuscus ac subalbidus, & farinæ aliquid aspersum habere uidetur, altitudinem sepe numero duuum uirorum superat, multisq; in summitate ramis e geniculis prodeuntibus brachiatur. Atq; si surculi in uertice asperos racemos ex se procreant, qui duplici flore emicunt. Inferior idemq; prior flos luteus est, quem admodum & Fagi, is antequam emergat, in nodis, seu torulis rotundis continetur, postquam uero defloruit, decidit ilico sine fructu. Alter & superior ruber est, croci floribus similis desinitq; tandem in aspera uascula, eaq; omnia triangularia, qualia sunt Cataputiae seminum receptacula, quæ cum maturuerint, dehiscunt, tumq; semina excidunt ricino animali similia, quod quamprimum fit, tota sua substantia quantumuis ingens Ricini moles protinus perit.

NOMENCLATURAÆ.

Germani hanc stirpem Wunderbaum/Wundelbaum/Cretzbaum/& Zectentöner uocant. Dioscoridi, *ῥικινος, ῥιζοειδὲς ἄνθος, ῥιζοειδὲς ἄνθος*, Sanguis febris, Syssamma, Trixis appellatur. Vulgo Palma Christi propter foliorum formam dicitur, & nonnullis Cataputia maior, quod semen Ca-

Diosco. lib. 4.
cap. 158.

Dioscorides Semen
samoides paruum,
nechon & Solanum
rem herbam maiorem
uocat, uide
lib. 4. cap. 148.
T
& 185.

Serap. cap. 312.

caputis (de qua sequenti capite) simile habeat. M. Vergilius Ricinum in Herutria & Thufcia Phaselum Romanum uocari tradit. Serapioni Kerua et Cherua et Pendaetylus dicitur, nimirum a folijs, necnon Cataputia maior, ex qua oleum de Cherua conficiatur:

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Ricinus calidum temperamentum obtinet, magisque externis quam internis corporis partibus accommodatus est.

INTRINSECVS.

Grana triginta numero purgata, trita potu, pituitas, bilem, aquamque per aluum extrahunt, uomitiones mouent, sed in iucunda admodum est & molestia purgatio: siquidem stomachum uehementer subuertit. Ego sane eiusmodi purgatione non delector.

EXTRINSECVS.

Oleum quod ex semine Ricini conficitur teste Serapione, tum calidius, tum tenuiorum partium est oleo oliuæ, quare uitis cutis, papulis, & serpiginis illitu subuenit, quod idem semina tusa, ac emplastri instar imposita præstant.

Folia recentia tusa, tumoribus, ac inflammationibus mammarum & oculorum imposita, dolorem sedant, inflammationes tollunt, tumoresque detumescere faciunt, maxime uero si ex aceto & hordeo imponantur.

Reliqua supra in descriptione annotauimus. Nunc ad Cataputiam (ut uulgo uocant) minorem transeamus.

De Cataputia minore.

Cap. XCIX.

L

Lathyris.

ATHYRIN IN DVO FASTIGIA PARTIUNTUR, ITA tamen, ut binæ ex plantæ magnam inter se, quod ad totam substantiam, formamque attinet affinitatem habeant. Verum enim uero altera ex his caulem emittit maiorem, & semine etiam prægnat grandiori, eruis proximo. Istuc seminis genus non frequenter reperitur. Solens tamen circumforanei radicem & herbarum uenditores inter cetera medicamenta illud circumferre.

2.

Lathyris uulgaris.

Alterum uulgare Cataputiæ minoris genus, semen gignit Cannabino simile, quo in purgationibus uti consuevere ancilæ, nam nouem aut undecim,

Lathyris, seu Cataputia minor.
Springkraut.



Decim exhibere solent grana, his quos purgare instituunt. Radicem hæc planta habet rectâ & lignosam, unicumq; subpurpureû caulem, ab imo usq; ad summum oblongis & pinguibus folijs uestitum, Amygdali aut Salicis

folia forma sua repræsentantibus, n̄sq; altera parte albican̄tib; . In cacumine altero anno coles multis furculis ac ramis brachiantur, qui & ipsi folijs at brevioribus & rotundis, undiq; circumdantur, inter quæ pilulæ uirides triplici cellula conceptaculouē distinctæ, Ricini seminum uasculis confimiles enascuntur. Ex arefactæ nimio solis æstu rumpuntur, magnumq; Tonitum ædunt, quod & in alijs plantis contingit, atq; ita ex semine deciduo tandem reuiuiscit Lathyrus. Nam non ultra biennium durat hæc planta. Proinde totus lacteo liquore plenus est frutex. Semen gustu primo dulce habet, atqui deinceps calidius Pipere uel Aro.

NOMENCLATURAE.

De herbis Lacta

rijs nide Theophrast. lib. 9. ca.

11.

Diosco. lib. 4.

cap. 159 & 160.

& 161.

Nicand. in Theriack.

Germani Lathyrin / Springforn, uel Springfamen, quod semen impetu quodam ē folliculis suis exiliat, & Szeysbörner a ui sua quā aluum turbare solet, Latini Cataputiam minorem, Herbam Lactariam, Tithymalum quod nomen multis plantis commune est, uocant.

Tametsi autem de Tithymalis statim sequenti capite tractaturi simus, tamen quantum ad hanc nostram Cataputiam cognoscendam satis fuerit, paucis attingemus Tithymalorum, ad quos Lathyrin nostram quidam referunt differentiam.

1. Prima itaque Tithymalorum species, Chararias dicitur Vallaris, Cometes, & foliorum nimirum forma, Amygdaloides, Gobios, quæ omnia ad nucem vomicam nonnulli referunt.

2. Altera in Dioscoride Foemella et *stirus* est, quam ille Myrsiniten, Myrsiten, & Caryiten nominat. Verum enim uero uidetur mihi uera Thilys peregrina & incognita esse Germanis, nullam enim Lactariam herbam noui, quæ nucibus similem fructum ferat, quod de foemella sua annotauit Dioscorides. Quamobrem Cataputiam nostram ad caput clxi. lib. iij. Dioscoridis pertinere, & sequentibus nominibus appellari arbitror, *nathysis*, Tithymalus, & herba lactaria. Quod si quis Lathyrin & Thilyn sub uno genere comprehendere uoluerit, cum eo non multum digladiabor, cum Theophrastus de tribus duntaxat Lactariæ generibus scribat.

C. Celsus lib. 5.

ca. 7. Lac caprifi.

ci esse Lactucam

marinam dicit,

quod Graeci Tithymalū dicūt,

atq; hæc ipsissima

est Cataputia mi

nor, cuius histo-

riam iam perse-

cuti sumus.

Cataputiæ minoris semen, Granum solis dicitur. Pandectarum autor Cataputiam illam Latiuam & Leturam uocat, fuit enim is linguæ Græcæ imperitus.

VIRE S. AC TEMPERAMENTVM.

Omnes Cataputiæ humidæ & calidæ sunt temperaturæ, ac internis corporis partibus non conueniunt, quanquam ubi necessitas id postulauerit, semina & folia eligi poterunt.

INTRIN-

INTRINSECVS.

• Cataputiæ vulgaris xij aut xiiij grana tusa uinoq̃ pota, totum corpus commouent, aluum purgant, uomitiones potenter prouocant, phlegmata, choleram & melancholicam educunt.

Succus lacteus intro sumptus, maiorem noxam quam grana adfert, quamobrem caueat sibi quisq̃ ab illo.

Folia iure carninum decoqui possunt, & in potu usurpari, ad purgandam aluum, & uomitiones mouendas.

EXTRINSECVS.

Lacteus Lathyris, & omnium Lactariarum herbarum liquor, calidior, & acrior est herba & semine, quo ab Empsricis, seu ut rectius dicam uagatoribus & circumforaneis nequissimis, multi crudeliter necati sunt, caueant ergo sibi, qui decipi & perire nolint.

Verum si quis pilos superciliorum & frontis deijcere cupiat, is oleo lac Cataputiæ miscat, fronti q̃ uel supercilij illinat sub sole, ita tamen ne oculos aut faciem contingat lacteus ille succus, nam ex partes ubi hoc lacte infectæ fuerint, continuo inflantur, ac rubescunt ita quidem, ut lepræ speciem præ se ferant.

Idem succus concavis dentibus inditus, dolorem illorum tollit, sed danda est opera, ut gingiua cera rubea muniatur, ne illo lædatur.

Nam omnium Cataputiarum & Tithymalorum succus adurit, erodit, exest, quare in superfluis carnibus, uerrucis & serpigne exterendis maximus illius usus esse debet.

Qui succum hunc colligunt, ij Pisorum & fabarum farinam illi adiungunt, & ex his pastillos exiguos conficiunt, deinde soli exiccandos exponunt, exiccatosq̃ usui reponunt.


De Tithymalis. Cap. C.

Q VANQVAM DVO TITHYMALI APVD DIOSCORIDEM, priora genera, nec non tertium & septimum apud nos Germanos non proueniant, ut multi arbitrantur, tamen quam plurimæ ex Tithymali speciebus in nostris regionibus reperiuntur, quas omnes ex ordine suis descriptionibus per censuimus.

Primum illius genus esto Cataputia minor, quam Lathyrin & Myrsinten appellari superiori capite docuimus.

Esula vulgaris.
Gemein Wolffsmilch.

2.
Esula maior.



3.
Esula vulgaris.



Alterum deinde sequitur Germanis Groß Teüfels milch dictum, cuius folia Cataputiae folijs similia sunt. Semen non maius Sinapi albo. Caulis illi rotundus, subruher, unicus, in uertice ramosus, multique luteis capitibus, seu umbellis emicans. Porro ex alis surculorum appetente Augusto mense seminū inuolucra ternis loculamētis distincta prorumpunt.


Tertio loco ponatur *Esula vulgaris*, quæ passim in hortis & uinetis luxuriat, ea unico & concauo caule contenta est, qui non minus atq; superioris in fastigio umbellis, sæpe ternis, nonnunquam quaternis coniunctis emicat. Folia, quæ terna singulos geniculos circumdant, *Portulacæ* herbam representant. Flos eius cum florere incipit diluti uiroris est, qui in nuces quasdam, in quibus semen tribus intercurfantibus discriminibus diuisas desinit. Semen subfuscum procreat, Rapitio non absimile. Quotannis radice, caule, & floribus flaccescit, & prorsus interit hæc planta.

4. Aliud deinceps *Tithymali* genus, in quibusdam agris, & nonnullis colibus nascitur, proximo plane consimile, nisi quod quatuor aut quinque interdum una è radice caules fundit. Flos illius luteus, admixta purpura.

Iam

Esula sylvestris, non quæ hoc capite describitur, sed ea cuius supra cap. lxiij. postremo loco mentio facta est.

Wolffmilch in wälden.



Iam & in sylvis *Esula* quædam gignitur, sub qua *Esula sylvestris*. & uulgare illius genus cōprehenditur, quod sabulosis collibus, & uliginosis pratis inuenitur. Bina hæc *Esulæ* genera quatuor aut quinque caules ex se mittunt ab imis partibus usque ad summas angustis simulque oblongis foliolis uestitos, ueluti uulgarissima *Linaria*. Quod in his maius est sabulosis sylvis prouenit, luteis & purpureis floribus. Radix utriusque per hyemem salua & incolumis manet, e qua quotannis noui coliculi exurgunt. Estque hæc inter omnes plantas prima, quæ postquam flos & semen maturuerint, novos aduentante autumno asparagos ex se gignunt. Proinde qui *Esulæ* liquorẽ legere utiliter cupiet, is, (meo quidem iudicio) sub Aprilem mensẽ, quædiximus germina una cum radicibus colliget, & postquam illas rectificauerit, ad usum postea reponet. Duæ itaque hæc *Esulæ* magnam inter se obtinent affinitatem, nisi quod *sylvestris* procero caule (qui cu

Esula exigua.
Die kleinste Wolfsmilch.



6.
Esula exigua.

7.
Esula dulcis.

biri altitudinem fere attingit) exilit, et elegantioribus ac magis rubeis umbellis conspicitur, quam uulgaris quæ passim incultis agris & collibus nascitur.

Præteriam commemoratas *Esulæ* species, in agris quibusdam à mense Autumnali tempore reperitur frutex dodrantalis furculosus, minutissimis folijs Thymo similis uestitus. Semen in tripartitis loculis continetur. Nec puto multos esse quibus notata fuerit hæc herbula.

Postrema quæ dulcis est *Esula*, in umbrosis ac uliginosis moribus & uallibus alpium Helueticarum provenit, caule, flore, folijs, radice, & lacteo succo, Tithymalis & Lathyri adeo propinqua, ut ab illis uix discerni possit. At gustus ipsius lactei succi & radicis dulcis est. Semen illius luteum, rotundum, & ad Milium accedens, e' uasculis suis ubi maturuerit, exilire consuevit.

NOMENCLATURAE.

Omnium Lactariorum
Dioscor. lib. 4. herbarum uulgaria & communia nomina hæc sunt apud Dioscoridem, *ῥίβια*, seu *ῥίβια*, Lactaria herba, Lactuca marina, Lactuca caprina, uel *Asinina*, Tithymalus deinde apud eundem in varias secatur species, ita quædem

Τιδύμαλς κυπαρισίας:
Cypresse Wolfsmilch.



dem ut primus ἀρχή, mas, χαρμίας, Cometes, κύμυδανδης, καλὸν-secundus, Ἄνθ.
Myrsinites, μύρτις, & Caryites: tertius παράλις, Maritimus, Tichymalis, La-
ctariola herba, seu Papauer, (Theophrasto Coccus:) quartus, ἰαννίτις, id

Efula dulcis.

Süß Wolffsmilch.



est, Solisequus, Germanice
 Sonnen milchkraut / aut
 Sonnenwendende wolffs
 milch: quintus, *αυραγιασι*
 sextus, *δενδρῶδες*, seu arbore-
 scens Efula: septimus, *πλατύ*
φυλλο, Latifolius, Germa-
 nis Breit milchkraut / Lep-
 tophyllos, Tenuifolium,
 Germanice Dünnblatt / di-
 catur. Et hæc quidem capi-
 te clxx. lib. iij. Diosco. quæ
 sequenti statim aliam post
 describit Lactariam, eamq;
 genus Cyparissiae esse asse-
 uerat, cui hæc ascribit no-
 mina, *πένυον*, *κλήμα*, id est,
 Sarmentum, uel Viticula,
 Crambíos, *παράλιον*, Cono-
 picon, Turpet. Dein de du-
 obus sequentibus statim
 capitibus binas alias descri-
 bit Tithymalides, quarum
 altera est Lathyris, de qua
 supra diximus, altera quæ
 dicitur *πίπλον*, quam aliqui
συκῆρ, & *μύκων ἀφρώδιον*, hoc est,
 Sycen, & Spumeum papa-
 uer uocant. Ex his quæ nūc
 attulimus in medium satis
 liquere arbitramur, plures
 esse Tithymalides, quæ om-
 nes a lacteo & acri succo a-
 pud Germanos Wolffs
 milch / Teüffels milch, a se-
 mine uero, quod fragore

quodam e folliculis exilire, & grauiter, ac non sine noxa purgare aluum cō-
 sueuit, Springföner / Dreybföner / & Scheißföner appellari possent.

Iam si Dioscoridis sententiam cum scriptis Plinij, Galeni, & Æginetæ
 conse-

conferamus diligentius, possumus ex his omnibus tria quæ apud nos Germanos extant Lactariæ summa genera elicere. Primum quidem esto Caputia minor a nobis ante explicata. Alterum Esula magna, folijs Portulacæ uestita. Postremum uero uulgaris Esula, Linariæ folijs. Sin uero hæc prima & summa Lactariæ genera in species suas dirimere uelimus, quemadmodum Lactucam Plinius partitus est, lib. xix. cap. viij. non pauciores quam octoprehendemus.

Et primum quidem locum occupabit, iam sæpe repetita Lathyris, quam & Myrsiniten nos appellauimus.

Lathyris.

Secundum obtinebit magna Esula, Amygdalina gerens folia, at uiridiora & magis tenera, semine item prægnans minutissimo, eaq; Dendrodes, seu arborefcens nobis uidetur esse Esula.

Tertio & quarto loco numerentur Esulæ binæ Portulacæis folijs comantes, quarum uulgatissima, unci caulis & rotundi, radicisq; breuiusculæ est, altera caules plures profert, & incultis agris prouenit, hyemisque contemprix existit. Hæc inquam bina genera ad eum Tithymalum referimus, qui inuocatus appellatur, nobis Helioscopios & Solissequa dicitur.

Vulgarem porro Esulam sub qua duæ comprehenduntur plantæ, exiguæ scilicet quæ secus itinera in collibus nascitur, & maior quæ alto exilit caule, & purpurascens flosculis, Cyparissiam nos uocamus, uulgus medicorum Esulam minorem Arabes, Scebram, & Alscebram appellant, neque hic recipimus, quod Simon Ianuensis asseruit, Esulam non esse Tithymalum.

Minutissimum autem fruticē, qui folijs uestitur Thymi, Peplum Dioscoridis esse iudicamus.

Postremo eam plantam quam supra cap. lxiij. latis folijs descripsimus, Leptophyllum nos appellamus, quod Apuleius Persiten Asclepiu, Diadema, & Tritum cognominauit.

Reliqua genera Lactariæ mihi nunquam uisa sunt, maxime quod Dioscorides Paralium & Maritimum dicit, quod ad mare proueniat. Neq; Pityusam uiridem sed siccata uidi, nam illam & Turbit quo hodie uirumur unam & eandem esse plantam existimo, qua in re Actuarius Græcus mihi suffragatur. Illud Auicenna lib. ij. cap. cccxcj. Mezeheresi uocauit, tametsi alio in loco nimirum cap. 71. sub Turbit eandem rursus describat plantam. Proinde hoc ipsum est Turbit, cuius alij quoque Arabes, Mesue & reliqui meminere. Solus Serapio peculiare sibi fingit Turbit, quod nihil aliud est quam Tripolium Dioscoridis, quod ille Psychen, Merida, Potamogetona, Stachiten, & Calium arem appellat. Hinc multi astruere conantur, Tripolium esse Turbit Arabum, quod quam ueritati aduersetur, inde satis liquet, qd radix Tripolij odorata est, Turbit uero minime.

Quare

Serapio cd. 320.
Diosco. lib. 4.
cap. 120.

Quare cum duę apud Arabes extēt plantę, nomine Turbit insignitę, aduertendum est diligenter quis sit autor, ubicunq; illius mentionem factam legimus. Apud Serapionem namque sub appellatione Turbit Tripolium Dioscoridis, apud Mesuen uero, Rasen & Auicennam, uulgare Turbit, quod nos Pityusam cum Actuario nominamus, intelligi debet.

Quod ad dulcem Esulam attinet, multi sunt qui illam ad Miliariam Plinij referant. Verum enimvero si quis effigiem plantę cum descriptione diligenter contulerit, is facile uidebit speciem eam esse Tithymali.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Omnia Tithymalorum genera, adurendi uim obtinent, in primis uero lacteus eorum succus, quare raro citra noxam intro sumi possunt. Utillissima inter omnes Esulas ea est, quę longis & astrictis ueluti Linaria folijs uestitur, ita tamen ut radix solummodo intra corpus usurpetur, repudiato lacteo liquore.

Esulę dulcis radix uulnera mirifice glutinat, sed intra assumpta uehementer uomitiones mouet.

INTRINSECVS.

Esulę dulcis radicis exterior cortex lacte uel aceto per diem & noctem macerata, deinceps autem resiccatus, tusus & in puluerem redactus, postea dimidię drachmę pondere, in uino uel Melicato potus, quosuis aquosos humores, & choleram expellit, & hydropicis apprime conducit.

Semina omnium Tithymalorum pares habent facultates, at calidiora, & acriora sunt, aluumq; turbant, & uomitiones potenter excitant.

Pro hydropicis sequentes conficiantur pilulę, quarum dimidiām drachmam infirmioribus citra damnum, fortioribus uero drachmam integram exhibere poteris. Confectio ita se habet.

Accipiatnr radicis de Esula, quę Linarię habet folia præparatę dimidiā uncia, Aloes uncia, Mastiches drachma, & singulę species in puluerem comminuantur, et aqua Fœniculi, uel Balsamini in massam subigantur, posteaq; probe inter se commixta rursus tundatur, ex qua post noctis unius spacium paruę uel magnę confici poterunt pilulę, & sine dolore ac noxa assumi. Profunt uero hydropicis, & suspiriosis.

EXTRINSECVS.

Vsum & utilitatem Tithymalorum superiori fere capite exposuimus, possunt enim illitu crines euellere, scabiem & uerrucas exterere.

E radicibus, herbis, & lacteo Esularum succo unguentum efficacissimum aduer-

aduersus scabiem capitis contagiosam, quam uocant Germani den Erbgründt confici potest, estq; hoc singulare quoddam experimentum.

De Solaniuarijs generibus. Cap. CL.

Solanum hortense.

Sem. frant.



THEOPHRASTVS *Theophr. lib. 9. cap. 2. & lib. 7. cap. 14.*
 duo duntaxat Solani genera describit, unum quidem somnificum, alterum uero furiosum. Dioscorides uero quatuor Solani species recenset, hortense scilicet & id quod in folliculis uesicæ similibus rubros acinos habet, quæ ambo citra periculum deuorari possunt, nam reliqua duo somnificum nempe et Manicū, cibis nō sunt idonea, propterea qđ commesta insaniam pariunt & immodicum somnum, & suis quoque in cibo præsentem afferens mortem: & in his quidem cum Dioscoride consentit Theophrastus. Nos uero ex ordine antedicta genera explicabimus, suisq; descriptionibus notabimus.

Primum itaque et domesticum Solanum in hortis nequaquā prouenit, nisi plantetur, quin potius in altissimis syluis inuenitur, qualis est ea quæ in comitatu Veldentz ad flumen Nahie appellatum, uisitur, & ea quæ der Scheid dicitur prope

Solanum hortense

Halicacabon.

Schluten.

2.
Halicacabon.

liter domesticum est, ubi primum enim in vineis radices egerit hinc inde quoque serpens, non facile expelli se patitur. Aprilis mense noua germina e terra prorupunt, quæ in caules cubitales abeunt, folia primo generifere simi

pe Hornbachium, in his namque locis id Solani genus inueni. Frutex uerius est quam herba, nam trium cubitorum altitudinem attingit, multis ramis & surculis instar arbusculæ brachiatus, caule partim spadiceo, folijs Solatri uulgaris, at latioribus, & nigrioribus. Maio & Iunio mensibus flore emicat instar Campanulæ oblongo & concauo, ex pallido purpurante ueluti immatura ficus. Eo decidente rotundi & uirides subsequuntur acini, qui singuli singulis dependent pediculis, atque non appetente Augusto mense maturescunt, & nigri prorsus euadunt, quo nomine ad Myrtyllos fere accedunt, intus uero plane purpurei, multisque minutissimis granulis repleti apparēt, sapore subdulces aut fere insipidi. Radix huius candida, digitum crassa, torosa, longa, & que serpendo hinc inde intra terram radicatur. Per totam hyemem illaesa manet, & quotannis Aprilis mense nouos ex se procreat asparagos.

Alterum Solanum simi

lia

Solatrium uulgare.

Nachtschadt.



lia obtinet, at paulo minor
ra & lanuginosiora. Flo-
rem profert candidum in-
star campanulę formatum,
sed minorem primi gene-
ris flore, ex illo sacculi undi-
que conclusi, ad uescas an-
malium quamproxime ac-
cedentes nascuntur, qui ap-
petente Autumno rubri fi-
unt. Porro his uescis aci-
ni quidam rubei continen-
tur, Cerasis similes, gustu
amari, calculosis familia-
res, solēt enim hoc morbo,
affecti illos deuorare, uel
ex ipsis aquā distillare. &c.

Tertium & uulgare So-
latrum, herba est albiola,
nam quotannis ex humo
sponte repullulascit, & id
quidem non ē radice uti re-
liqua duo genera. In ster-
quilinijs secus macerias &
muros, & locis umbrosis
prouenit, sub initia Iunii
mensis surculosus exilit fru-
tex, cubitum sæpe altus, fo-
lijs nigricantibus, mollibus
& succulentis, Atriplicis si-
milibus, flore copioso, can-
dido & pallente, forma flo-
res Dulcis amarę represen-
tante, nam singuli flosculi
luteum intra se habent pa-
xillulum, non aliter quam

Solatrium uulgare
re-

sam dictę herbę flores. Iubi decussi fuerint, acini uirides subnascuntur,
qui cum maturuerint, nigro tinguntur colore, ac per omnia Hederarum
corymbis similes euadunt. Radix illi candida, recta, & breuiuscula, sicut
Anetho.

Anetho. Proinde frigore ita lædiur, ut ilico tota sua substantia perire necesse habeat.

4. Quartum Solanum tertio loco à Dioscoride descriptum in Germania nostrā haud dū uidit. Verum nascitur in hortis & uinetis nocētissima quædam herba, caule cubitali, folijs fere Solatri vulgaris, aut quod magis arri-
det Atriplicis, per ambitum acutis incisuris serratis, ita ut singula folia pedem anserinum satis commode referant. Semen copiosum producit, confunctim stipatum, ueluti in Atriplice minore uidere est. Pestifera & nocētissima ut diximus est herba, nam præsentanea morte sues interficit, quotquot illam in cibo deuorauerint.

NOMENCLATURAE.

1. *Solanum nigrū, seu hortenſe.* Primum domesticum seu sylvestre Solanum, in montanis sylvarū Ydar/ prope Nohesfelden/ & Birckenfeld/ Germanica uoce *Sem Fraut*/ quasi Porcina herba dicitur, nam in cibo illud tanquam præseruatium aduersus uenenosos & subitaneos morbos, suis exhibere solent incolæ illorum locorum. Nec desunt qui eiusmodi plantam in hortis suis, ad usus illos plantare solent, experientia enim compertum est, nihil illa efficacius suis dari posse aduersus morbos à calore et estu profectos, quod malum lunio mensplerunq; illis accidere assuevit. Hoc uero Solanum apud Dioscoridem *ερίχρον*, id est Solanum hortenſe, Solanum satium, uel nigrum uocatur, alij Scubulum, alij Allelo, Astrismurum, Cacubalum appellāt. Quod autem istā plantā Solanum hortenſe appellatam uolui, ea est ratio, quod illa nō perinde noxia est, atq; uulgare nostrum Solatrum, nam intro sumi quandoque potest, id quod de uulgari nostro minime affirmandum erit. Sunt qui radicem huius Solani pro Mandragora uendant, est enim Narcotica radix.

2. *Halicacabum.* Alterū Germani uocant *Schlutten/ Bobozellen/ Judenfirsen/ Tetiffelsfirsen/ Großsteinbiech*. Estq; hoc secundum *ερίχρον*, Dioscoridis quod ille *ἀνάνηλες* quoque nominat. Plinio Vesicaria, seu Vesicula, Trichon, & Calion dicitur.

3. *Solatrum uulgare.* Tertium idemq; uulgatissimum Solatrum, meo iudicio quartum est Dioscoridis Solanum, quod ille *μαννίν* appellat, id est, furiosum, Germanis *Sollwurcz*, Alj Persion, alj Thryon, alj Amydron, alj Pentadryon, alj Enoron, alj Orthogyion dicunt. Cæterum uidetur mihi hoc ipsum Solani genus alteram esse Apulej Apollinarem, quam Dercean, Strychnon, Manicon, Dorcinion, Cacabon, Baccinam, Colida. Apollo hanc herbam fertur inuenisse, & Asclepio dedisse, & Appollinaris nomen imposuisse. Hanc ipsam herbam Celiū Aurelius lib. ij. cap. xij. Vuam lupinam uocat, quam

quam hodie nostri docti sariuum & hortense Solanum esse contendunt.

Quartum Solanum, uenenosum & furiosum Solanum, per me quidem esto, (nam aniculæ quædam quæ non sine magno damno porcorum, quos hac herba interficere uiderunt, uires illius expertæ sunt) sequentibus nominibus nuncupant, *Schweins rodt / Scwplag / Genßfüßel*) quoad alterum *despienop* Plinij quo cuspides in prælijs tingebantur, exactius cognouero. Quamquam autem multi Dorycnion Dioscoridis ab eo, cuius nunc mentionem fecimus diuersum esse statuunt, tamen lib. vi. cap. vi. idem autor, Dorycnion, Solanum furiosum nuncupat. Plinio Naurira, & Manicon Erychthon dicitur. Porro tertium Solanum Dioscoridis, quod acinos rubeos in folliculis profert, sequentibus insignitum nominibus, (*τρίχνην παυτοκίνη, & μαννίνη*, Halicacabon, Dircion, Dorycnion, Callias, Vlticana, Opsago, Apollinaris. Plinio, Morion & Moly) nondum uidere mihi contigit, quare Xenocratem, qui Solana Theophrasti, Dioscoridis & Plinij, discernere me doceret, desidero, nam inter commemoratos autores quisque proprium pro se Solanum habet. Atqui cum de his præcipue plantis, in his commentarijs agamus, non quæ in maritimis regionibus proueniunt, sed quas Germania nostra profert, non magnopere in rebus obscuris & perplexis laborandum nobis censemus, quare relictis his, ad uires eorum Solani generum, quæ hoc capite descripsimus, potius conuertamur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Solanum sylvestre: (a quibusdam Germanica uoce *Scwfraut* appellatum) aduersus omnis generis inflammationes, utrinque subortas, tam iumentis quam hominibus utilissimum est, ita tamen ne una uice immodice illotaris.

INTRINESCVS:

Herba huius Solani una cum flore, & fructu suo maturo, in fine Maij distillata, omnis generis internis ardoribus & inflammationibus præsentissimo est remedio, si singulis uicibus mensuraj aut iij. coclearium ea aqua bibatur, & foris etiam linteolis lineis excepta imponatur. Ita enim usurpata æstuanti stomacho (quod uicium Cholericis familiare est,) opitulatur, necnon inflammationi epatis: quo nomine aduersus ardentes suum affectus usurpari, & *Scwfraut* / hoc est, porcina herba, appellari coepta est. Verum cauendum, ne immodice, ut diximus, illa herba utaris, quod nisi feceris, idem tibi accidet, quod uiro cuidam ex *Erbach* / prope *Hohenburg* / euenit Anno domini 1541. Is cum in sylua forte fortuna plantam hanc &

acinos eius elegantissimos uidisset, decerpit illos & quamplurimos deuorauit: Altero uero die in tantam insaniam & furorem incidit, ut plerisque, prout fert superstitio sæculi nostri, suadentibus *Widerstoss* ut uocant, (ubi insani & qui a *Cacodemone* obsessi creduntur, exorcisari quemadmodum superstitionis Ministri loquuntur, consueuere) abducendus iam iam esset. Ego autem ubi rem intellexissem, iussi illi uiro fortissimum uinum propinari, quo facto, consopitus paulo post conualuit, uiuitq; adhuc hodie.

EXTRINSECVS.

Folia recentia, capiti imposita, dolores eius ex magno æstu ortos finiunt, & æstum sedant.

Aqua distillata eodem modo usurpata easdem habet uires, nimirum *egyplosia* & parotidas sanandi.

Folia minutim concisa & imposita idem præstant. Pari ratione usurpata æstuanti stomacho, & inflammatione laboranti epati subueniunt, facris item ignibus, & omnis generis inflammationibus succurrunt.

Succus in pectore mulieribus subditus, menses cohibet.

Succus albumine oui temperatus, oculisq; impositus, inflammationes, & destillationes eorum tollit.

Potest & ex succo illo, admixtis cerussa, & *Lithargyrio* unguentum nobile confici, ad persananda fluentia & serpentina ulcera.

VIRES AC TEMPERAMENTVM SOLANI

alterius, quod *Halicacabon* uocant.

Secundum Solanum, a quibusdam *Zudenfirsen* appellatum, uim expellendi habet, quare utrisque corporis partibus utile censetur.

INTRINSECVS.

Acini huius Solani commanducati, seu aqua eius distillata, singulis uiscibus mensura iij. uel iijj. ligularum pota, urinam & calculum certo expellunt, renesq; & uesicam purgant, omniaq; interna ulcera mundificant, indideter, supra dicta ratione sumpta.

EXTRINSECVS.

Herba, succus & aqua foris non aliter adhibentur, quam primum a nobis positum Solanum.

VIRES AC TEMPERAMENTVM

uulgaris Solatri.

Vulgare Solatrum, necnon postremum eius genus, quod *Gengßüßel* a quibus

a quibusdam appellari supra docuimus, qualitates sunt frigidae, ideoq; raro intracorporis sumenda.

INTRINSECVS.

Solatrum uulgarè intro non sumitur, ut diximus, propter immensam quo præditum est frigiditatem, quod quam sit uerum, in suis facile uidere est, quibus in cibo commanducata hæc herba præsentissimam necem adfert.

At aqua distillata cum biennium aut triennium excefferit, si moderate usurpetur, ardoribus febrium conducit, quod idem de aqua Nymphææ polliceor, quæ huic succedere potest.

EXTRINSECVS.

Inter omnia medicamenta, quæ Repercussiva, hoc est, dolorem & calorem sedantia ac repellentia nuncupant, uix aliud efficacius reperias Solatro uulgari, quare quibuscunque inflammationibus, erysipelis, & æstuationibus, capitis, oculorum, aurium, stomachi, mammarum, epatis, renum, uesicæ, muliebrium locorum & testium, iure adhibetur succus expressus, & aqua distillata imposita. Potest etiam ex hoc Solatro, unguentum quod uulgo uocant Populeon, aut aliud eius generis confici, prout Chirurgi cuique uidebitur.

De Vua lupina, seu Astere. Cap. CII.

VANDOQVIDEM HAEC PLANTA A NONNVLIS
 Q Vua lupina, seu Vulpina esse putatur, uolui post Solatrum illius quoque mentionem facere. Ea (ut natales locos principio explicemus) apricis quibusdam locis, montosis, & fenticosis provenire solet, e' radice læui & rotunda, prælonga, hinc inde instar vermiculi longi sparsa & extensa, coloris pulli, caule fusco & minime nodoso, ueluti Hieraciorum, dodrantali, quin cacumine quatuor pulchre uiridibus folijs instar stellæ dispositis, Solani folijs similibus emicat, e' quorum medio pulcherrimus stellatus seu radiatus flosculus, triplici colorum discrimine conspicuus enascitur. Primum etenim in illo quaternaria folia nigricantis uiriditatis apparet, deinde uero octo iidem glutei quasi capilli uidentur, demum intra illos purpascens, & quadrangulus nodus forma ocellum referens apparet, qui in unicum & fuscum acinum desinit, figuram Myrtilli magni representans, saporis agrestis simulq; dulcis, qualis Solani sylvestris acini sunt. Sub


Asæ, sed non Atticus.

Wolfsbeer/oder Stern Fraut.

finem Aprilis mensis flo-
ret, ita tamen ut quisque
cauliculus unico duntaxat
flosculo, & unico acino cõ-
tentus sit.

NOMENCLATVRÆ.

Quod si isthæc stirps uera
sit Vua uulpina, seu canina,
ut quidam existimant, su-
peruacaneum fuerit nomi-
na illius, quæ in Solanis
enumerata sunt; hoc loco
repetere. Germanis Wolfs-
beer/ & Stern fraut appel-
latur. Nonnullæ muliercu-
læ à forma Augenfraut &
Sternfraut nominant, nec
id quidem iniuria, nam
meo certe iudicio *ἀστὴρ*, sed
non Atticus (cui sequentia
nomina Dioscorides assig-
nat, *ἀστρίωνος*, *ἀστρίου*, *βελόου*,
διπλάμου, hoc est, (suis ocu-
lus, herba inguinalis, Rathi-
bis, & Alibium) appellari
posse uidetur. Vt autem
hunc nostrum Asterem *παρα-
στειναιχίαν ἀνδρῶν* esse credam
adduci nullus possum, pro-
pterea quod is refrigerato-
riam obtinet uim, quam in
Aconito nequaquam repe-
rias.



Dioscor. lib. 4.
cap. 15.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vua lupina, seu Aster, una cum unicis suis acinis, earundem est: cum So-
lanis

lanis facultatum, & extrinsecus inflammatis locis imponitur, experientia attestante.

EXTRINSECVS.

Herba ipsa recens tusa, & cataplasmatibus instar, tumoribus genitalium imposita, præstantissimum est remedium, nam & inflammationes illorum tollit, & tumores detumescere facit.

Inflammationibus oculorum, folia, seu aqua distillata pari ratione adhiberi commodè poterunt.

Eadem medicamenta alijs quoque calidis affectionibus imponi possunt, Paronychiæ nimirum qui est abscessus circa radices unguium.

Multi in ea sunt opinione, ut credant herbam hanc sinistra manu effossam inguini tumenti impositam, dolorem finiri.

Nec desunt qui asserant, acinos Vux lupinæ deuoratos soporem inducere. Ego sane illos nequaquam degustare uolo, ne forte prorsus obdormiam.

De Prunella. Cap. CIII.

PRUNELLAE SEPTEM GENERA NUMERANTVR, quorum duo cœruleos, duo alia purpureos, tria denique candidos producunt flores, folijs, caulibus, & radicibus prope consimilia. Sed ordine singula perstringamus.

Prima igitur cœrulea Prunella, verna est herba, nam in pratis & graminosis hortis, nec non apricis collibus Aprili mense reperitur, folio uetusta molli & nigricante, Mentastri folium æmulante. Radix huius multis capillamentis fibrata, ueluti Plantaginum. Mense Aprili caulem emittit quadrangulum & concauum, cumque dodrantalem, atque hic illius flos est, nam cauliculum quem diximus undique flores circumdant cœrulei, non aliter atque in Hedera terrestri. Proinde inter flosculos, nonnulla ex purpureo uiridia folia usque ad cacumen coliculi, posita sunt. Flos ipse satis iucundo commendatur odore. Iunio mense & flos & caulis protinus dispereunt, ueluti Hieraciorum, at herba per terram sparsa hinc inde serpit, instar Numulariæ herbæ, multis rotundis & minutoribus foliolis, quam dum floret, prædita, quo nomine Serpentina dici rectè posset.

Huius primi generis interdum in nemoribus quibusdam graminosis alia inuenitur Prunella, supra dictæ per omnia similis, nisi quod flore emicat plane candido.

Alterà porro Prunella cœrulea, quæ florem gerit inter foliola illa exigua, & caulem in altissimis locis sitis, collibus & agris, prouenit priori cœruleæ

1.
Prunella cœrulea
prior.

2.
Prunella candida
prior.

3.
Prunella cœrulea altera.

Prunella vulgaris.

Blaunellen.

4. 5.
Prunella purpu
rea & candida.




Prunellæ per omnia respon-
 dens, hoc solo ab eadem di-
 scedens, quod non perinde
 læui et molliusculo folio ut
 illa, sed potius hirsuto, &
 cineraceo prorsus (sicut &
 caulis eius) uestiatur. Flos
 etiam suauiore altera spi-
 rat odorem.

Aliæ deinde huic conge-
 neres Prunellæ, folijs, radi-
 ce & odore cum cœruleis
 quas diximus forma con-
 ueniunt, hac solum in-
 uicem ratione distantes,
 quod altera purpureum,
 altera candidum profert
 florem. Porro autem raro
 binæ hæ stirpes inueniun-
 tur, tametsi ego quidem in
 syluis illas legerim, ac in
 hortos meos principio
 Maij mensis transfulerim.

Sexta uero eademque ue-
 ra Prunella, Iunio & Iulio
 mensibus, similiter grami-
 nosis collibus secus agros,
 & apud Mediomatrices in
 montibus Iuniperorum,
 pulcherrimo, magno &
 purpureo flore ornata con-
 spicitur, qualem Stœchas
 profert. Folia forma Men-
 tastrum fere imitantur, sed
 magis sunt aspera & hirsu-
 ta. Caulem habet quadra-

tum, dodrantalem, radicem fibratam ut et prima. Reperitur hæc Prunella &
 in pratis, ætherba, flore & caule magis exigua, quam ea quæ in montibus
 nascitur.

Prunella, Germanis
Gulden gunsel.



Postremo in sylva Bro-
 tomagi inueni egoprofus
 candidam hanc Prunellā,
 circa festum diui Ioannis,
 tota sua substantia sextæ
 Prunellæ similem. Eam sa-
 ne Prunellam foeminam es-
 se existimo.

⁷
Prunella candida
da altera.

NOMENCLATURAE.

Priores quinque Prunel-
 læ, ex ipsæ sunt quæ com-
 muni nomine Germanico
 Gunsel dicuntur, de quib-
 us (maxime uero quod
 ad cœruleas attinet) apud
 Hierony. Braunschueig
 Herbarium excellentissi-
 mum sequentes uersicul-
 Germanice scripti extant.

Gulden gunsel ist der na-
 men mein/
 Mein blüm gibe bloen
 schein.

Hoc est,
 Gulden gunsel meum est
 nomen,
 Flos meus cœruleo emicat
 colore.

Dux autem posteriores
 purpureæ Prunellæ apud
 eundem autorem, & suis
 uersiculis insignitæ sunt.

Braunell sobin ich genant/
 Ein braune blüm ist mir bekant.
 Prunella ego uocata sum,
 Purpureo etenim floresum prædita,

hoc est,

Atque hæc quidem de Prunellis Hieronymus Braunschueig, uerum si quis diligentius illas discernere uoluerit, is primum omnium cogitabit unamquamque fere regionem suam peculiarem habere Prunellam. Proin quemadmodum Arabes duplex agnoscunt Turbith, ita nos Germani duo quoque Prunellæ genera habemus. Nam apud Mediomatices eæ quæ cœrulei coloris sunt, & ab alijs Günsel dicuntur, Braunellen nuncupantur, eæ uero quæ circa diui Ioannis festum in pratis & Iuniperorum collibus reperiuntur, apud eosdem Braunwisen blumen, hoc est, purpurei pratenses flores nominantur. In Alsatia uero hi ipsi, die rechten Braunellen, hoc est ueræ Prunellæ appellantur. Sed quæ nostra super his sit sententia declaremus. Videtur ergo nobis primum genus, quod cœruleos, purpureos, & candidos fert flores, ueram esse Prunellam, nec inepte Primulam ueris dici posse, eo quod si res ipsas spectes, uerna omnino sit planta, non minus quam ea quæ uulgo hoc nomine notatur. Quamquam qui omnes Prunellas generalibus uocibus Solidagines, & consolidas appellauerit, cū eo haud magnopere contenderim, modo meminerit plures esse alias. herbas his appellationibus uocatas, Symphyton inquam, Tormentillam, Anagallida, Saniculam, Vaccinium (quo de infra cap. cxcv.) uulgares denique Primulas ueris. Quæ omnes plantæ cum commune Solidaginis & Consolidæ nomen obtineant, notis suis distinguendæ erunt, hoc pacto.

Solidagines.

Vt	Symphyton, alias unctuosa.	sit Consolidauel Solidago	maior.	Sed de his supra quoque cap. lxxix.
	Sanicula.		minor.	
	Prunella.		Media.	
	Primulæ ueris. genus unum.		Omnium minima.	
	Vaccinium.		Regalis.	

Prunella Argentinensis.

Quod ad Prunellam Argentinensem attinet, sciendum est, illam nequam Primulam ueris dici posse, cum circa festum diui Ioannis appareat. Dicitur autem Prunella, Germanice Braunnell, quod experientia obseruatum sit, eā Aphris, et oris exulcerationi, ac gulæ ardori (quæ uitia Germani die Bieune appellant) mirifice conferat. Hactenus uulgata Prunellarum nomina recensuimus, quæ uero illarum apud Dioscoridem & Theophrastum sint appellationes ignorare nos ingenuè facemur, cupimusque aliorum hac.

hac dere audire sententiam. Quanquam pretereundum non est, priorem ex *Diosco. lib. 4.*
cœruleis Prunellam a D. Conrado Gesnero, Verbenacæ supinæ accenseri. *cap. 39.*

VIRESC TEMPERAMENTVM.

Omnia Prunellarum genera, uulneribus recentibus accommodatissima sunt, propterea quod leniter illa sanare possint, præcipue uero aqua distillata ex floribus istarum stirpium, tam internis quam externis corporis partibus utilissima est.

INTRINSECVS.

Aqua Prunellæ internis corporis affectionibus & exulcerationibus medetur, interdum pota, concretos sanguinis grumos discutit, doloresq; ex calida intemperie profectos sedat.

EXTRINSECVS.

Omnia tam inueterata quam recentia uulnera aqua Prunellæ mundari & sanari commode possunt, maxime tum quando ardor siue inflammatio aliqua illis accesserit.

Eadem hodie ardori gulæ & exulcerationi oris, faucium & uicinis quam Germani die Breune appellant, duntaxat adhibetur, remedio sane præstantissimo, si gargarizetur, adiecto pauxillo mellis rosarum.

Flores uel folia uino uel melle decocta (pro ratione ægritudinis,) oris & faucium commemoratis uitijs subueniunt.

De Rhabarbaro Monachorum, Lapatio acuto,

Oxalide, & Bono Henricho,

CAP. CIIII.

VM CONGENERES OMNIVM CONSENSV HÆ SINT
C plantæ, uoluimus & nos coniunctim historiam illarum profequi, initium facientes a Rhabarbaro (ut uocant) Monachorum, de quo breuiter citra præiudicium aliorum, quæ nostra sit sententia aperiemus. Eam igitur Rhabarbaram, quæ primum quidem in monte S. Sy. Rhabarbarum monis in ditione Dominorum de Stauffen reperta, postea uero in hortis Monachorum, Franciscanorum, & Cartusianorum plantata, ac aliquandiu suppressa, unde tandem mihi quoque & multis alijs communicata fuit, Rumicem Hip-

Rhabarbarum Monachorum.

Münch Rhabarbarum.

polapathum Dioscoridis esse existimo, qui primo Rumicum generi, (quod ille acutum, nos uero Germani Menwelswurtz uocamus) radice, herba, caule, flore, semine, colore, forma & sapore adeo consimilis est, ut eodem loco simul nascentes binæ hæ stirpes, in tenera sua ætate discerni uix possint. Proinde in eo summa, ac certissima differentia uersatur, quod Rhabarbarum Monachorum folio & caule magis rubet, ac procerior, & grandior euadit cæteris Rumicis generibus.

Vera autem hortensis Rumex Lausannæ Sabaudia oppido provenit, iam dicto Rumici quadantenus similis est, at folia teneriora sunt, pinguiora & molliora, ac etiam magis exigua, quare inter olera reliqua ob dulcedinem suam in culinæ recepta est.

Iam ut ad Rhabarbarum nostrum & huic congenere vulgarem Rumicem (qui Germanis Grindwurtzel dicitur) reuertamur, habet hæ plantæ, cum quadriennium, aut quin-



2.

Hortensis
Rumex.

3.

Lapathum acutum.

quennium superuixerint, radicem amplissimam, ut quæ cubiti altitudine in terram descendat ueluti Gentianæ, intus crocei coloris, tamen si, quæ è monte S. Symonis ad nos peruenit, illam magis rubicundam quam uulgaris obtineat,

Oxalis.
Sawrampffer.



obtineat, utriusque samentum
gustu aspera & subamara.
Folia utriusque oblonga et
lata, Martio mense emer-
gunt, acutiusque apparent, ue-
luti cuspides lancearum.
Maioris inter hos duo Ru-
micis folia primum subrufa
sunt, ubi uero sese expli-
cauerint, pulchre uiridia ac
latissima fiunt, quemadmo-
dum & Raphani maioris,
Verbasci, aut Elenij. Porro
e radice utriusque teretes, stri-
ati, nodosi ac concaui exe-
unt caules, coloris fusci, al-
titudine ternorum quandoque
cubitorum, digitum crassi.
Appetente Iunio mense pre-
dicti caules in cacumine flo-
sculos multos luteos, & ra-
cematim dependentes ueluti
Barbula hirci proferunt,
his in purpureum colorem
mutatis semen succedit ele-
gantissimum, figuræ trian-
gularis, tenuissimo inuolu-
cro inclusum, ex quo plan-
tari illæ stirpes rursus pote-
runt. Breuiter binæ hæc plan-
tæ consimiles sunt, maior,
tenerior & rubicundior, in
hortis conseri necesse ha-
bet, hyemis contemptrix.

At uulgaris *Wienwurz* dicta, sponte sua gig-

nitur in humectis hortis, palustribus locis, pratis, & circa fossas;

Oxalis autem optimus est *Rumex*, illiusque quartum apud *Dioscoridem*
genus, radice itidem lutea, folijs minoribus, & acutioribus, auritis utrinque,

ut hoc

4.
Acetosella

Oxalis minima.

Der kleinſt Sawampffer.

Theophr. lib. 7.
cap. 6.s.
Acetosa minor.

ut hoc nomine cuspides læ-
cearum paruas referant. Sa-
por illi subacidus atque gra-
tissimus, nam et pueri tem-
pore famis illam diligenter
quærent, ut uitam suam su-
stentent. Principio Maij
mensis, caulis cubitalis ex-
lit, cui folia acuta, minora
Plantaginis folijs. Flores
fert in uertice caulium exi-
guos, partim subrubros,
partim uero ex croceo ui-
rides, in quibus hij ipsi iam
dicti colores adeo miscen-
tur uarij, ut exuiridi ruber
resplendere & elucere uidea-
tur. Ex his fuscum ac trian-
gulare semen oritur, quale
& in superiori stirpe nasci
diximus, sed colore elegan-
tius, et forma Adamantem
gemma triangulari re-
presentans. Ista Oxalis fer-
culis accommodatissima
est, & merito hortensis Ru-
mex diceretur. Quanquam
Theophrastus Rumicem
syluestrem in cibo magis
ulurpari, quam domesticum
testetur, quæ uerba ego de
hac nostra Oxalide intelli-
go.

Oxalis præterea quædam
exigua, sabulosis et incultis
agris prouenit, caule do-
drantali, nec temere altiore, radice tenui & lutea, digitum longa, folio non
maiore Saluia aurita (ut ita dicam.) Nam hæc Oxalis quæ e pediculo fo-
lia emittit, aurículas suas gerit, non aliter quam Saluia nūc commemorata,
nisi

Bonus Henrichus.

Schmerbel.



nisi quod hæc folia habet uiridiora iuxtaq; teneriora. Flosculi racematim quoq; cauliculis adherentes resplendentem cumq; rubrū colorem obtinent. Maio mense in flore optimo habetur. Semen eius triangularis quoque formæ, sed omnium reliquorum Rumis cum seminiotum minimū. Radix & semen asperi & acerrimi sunt saporis. Caulis & folia acida, ut uulgaris Oxalidis.

Sed Rumex unctuosus 6. qui Germanis Schmerbel/ *Bonus Henrichus* *Bonus Henrichus* *Gut Henrich* id est, Bonus Henrichus, & Gemein wundkraut/hoc est, Vulgaris uulneraria herba dicitur, in pagis, sepibus, antiquis arcibus & secus itinera gignitur. Radicem habet luteam & prælongam ueluti Lapatium acutum. Folijs uestitur Vngulæ asinæ, uel ipsius Ari (qua de causa Serpentina uel Colubrina radix a nonnullis dicta fuit) folijs similibus, sed pallidioribus, & tactu unctuosus, ac quasi farina aspersus. Caulem suū Maio mense procreat, copioso floreracemi instar incipi-

entis florere, ornatum. Porro tota hæc planta farina quasi aspersa apparet, quod et in Blicis uidere est.

Rumex denique aquaticus, in palustribus locis circa fossas ac lacunas nascitur, *Rumex palustris*.

scitur, maiori Lapatho, quod aliqui Rhabarbarum nominant, per omnia similis. Folia huius nonnunquam cubitum longa & latissima euadunt.

NOMENCLATURAE.

Ἐπὶ ἡγὲ τὸ λαπα-
θον ἄγριον, καὶ πρὸς
δυσμενέτερον ἢ κη-
ρὸν, ὅτι χυδὸν ὄψι-
τον ἔχει, καὶ τὸ πρὸς
μάστιγα διαφέρει.
Hec Theophras-
tus.

Duorum Lapathorum meminit Theophrastus lib. vii. cap. vi. aitq; Rumicem sylvestrem gustatu gratiorem satiuo, quæ quidem uerba ita ego intelligo, ut Rumex domesticus qui Lausannæ in hortis plantari consuevit, sit supra commemorata domestica Germanorum Menwelwurz/sylvestris uero Theophrasti Rumex, Acetosa, seu Oxalis habeatur. At Dioscorides lib. ii. cap. cvi. quatuor Rumicis genera recenset, ἰσχυράτων scilicet, κηρωτῶν, ἄγριον, et ἱσπανίδα. Tamen si prætereundū non est, ordinem apud Dioscoridem non satis bene se habere. Nam Oxylapathon, hortensi ille præponit, (quod alias facere non solet) qui sit ut quemadmodum indicauimus, ordinis, male collocati suspitio nobis subrepat. Sed distinguamus & nos singula Rumicis genera, suisq; insigniamus appellationibus.

1.
Rhabarbarum
Monachorum.

Primus ergo Rumex grandis, Græcis ἰσχυράτων dicitur, atq; illud Monachi Franciscani Rhabarbarum uocant, propter rubras quæ folijs illius insunt, uenas, & quia radicem intus habeat croceam. Faxit autem Deus ut saltem Rhabarbari sit species, quod cum ita se habuerit, certe Rhabarbarum in posterum ne quaquam tantis sumptibus, quantis antehac a nobis acquiratur. Sed ut ut se hæc habeant, certum est magnarum uirium hanc esse radicem, nam per se sumpta cum pauxillo gingiberis phlegma & choleram per inferiora educit, quod ipse (quippe qui hoc remedio usus fuerim) experientia didici. Hoc uero pacto confici debet, Accipiatur radicis aridæ drachma, gingiberis tertia pars drachmæ, redigatur in pulueres, & sumantur in iure calido, idq; ieiuno stomacho.

2.
Lapatium acutum.

Secundus idemq; sylvestris Rumex, qui Germanis Grindwurz / Züsterwurz / Menwelwurz / Wilder Ampffer / Wilder Mangolt / Stryp-per / Strupfflatich / Buppen fraut / dicitur, primo loco apud Dioscoridem collocatus est, & ἰσχυράτων uocatus, quod quidam Rumicem acutum & Germani nonnulli Spizige letschen / interpretantur, unde non inepte ἀνίσχυρι, a foliorum forma dici quoque posset, quod acutis calceis, qui olim in usu fuere, similima sint eius folia. Hac uero ratione Rumicis acuti appellatio ad aliam quemadmodum sequenti statim docebimus capite, pertinet stirpem. Plinio secundo Lapatium agreste: & Plinio alteri Hydrolapatium, & Cantherinum: Auicennæ uero Sicla sylvestris nominatur.

Plinius secundus
lib. i. cap. 38.
Apuleius ca. 13.
Plinius lib. 20.
cap. 21.
Auicenna lib. 2.
cap. 54.

Rumicem domesticum, Sabaudienfes, Lampe & Lampade uocant. Acetosam, Germanis Sauwampffer Dioscorides in quarto ordine Lapathum

Lapathorum ponit, & Oxalida uocat, a' saporis aciditate. Posset & Oxylapathum ut multi putant, dici. Medici nostræ ætatis Acetosam, alij uero Acedulam, & Acetofellam, Laparium acutum, Macrobius denique Partellam, & Serapio cap. cxi Humaalh, nuncupant,

Minima autem, & acuta illa Acetosa, quæ auriculis suis acutissimis cuspidibus imitatur exiguas, sub prædicta Acetosa nunc comprehendam. Verum si exactius singula pensitemus, quod ad formam & gustum attinet, iustius Oxylapathon (de quo nomine sequenti capite plura) appellari poterat, cū acutioribus uestiatur folijs quam ullum Rumicis genus. Sed proculdubio pauci sunt quibus ista planta sit cognita, utut multa de Rumice, eiusque generibus scribant. Nec inepte Lapatiolum, & Acetofellam, hoc genus Acetosæ quis uocaret.

Bonum autem Henrichum, quem quidam Germani propter unctuosam folia Schmerbel nominant, Rumicem tertium Dioscoridis, quem ille Plantagini similem, mollem, & in terra iacentem dicit, esse iudicamus. Tamen si quæ citauimus Dioscoridis uerba, de hortenfi primum, deinde uero de omnibus generibus Rumicis facile intelligentur, nam omnium prima folia antequam in caulem assurgant, in terra iacent. De alijs generibus sequenti statim capite.

Magnus postremo & palustris Rumex, Hydrolapathum esto.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Rhabarbari peregrini radix, omnibus pene calidis affectionibus, & cholera et phlegmate ortis adhibetur, nam humoribus prædictis leuiter purgandis, drachma radice illius in puluerem redactæ, in uino aut alio quopiam liquore ieiunis exhibetur. Est autem hæc radix hodie in magno pretio, sicut omnia alia ignota & peregrina. Sed relicta illa, de radice nostra, quam Monachi Rhabarbarum quoque uocant, loquamur. Ea enim saluberrima, ac utrisque corporis partibus utilissima est, quod sequentia quæ subiiciemus, affatim docebunt.

INTRINSECVS.

Radix Rhabarbari Monachorum siccata, in puluerem redacta, ac drachmæ pondere, cum gingiberis drachma in iure mane sumpta, choleram & phlegmata purgat citra periculum, hinc est, quod omnium Rumicum decocto olere aluum molliri tradat Dioscorides. Contrariarum uero semen eorum est facultatum, nam aluum sistunt, quare aduersus quasuis alui fluxiones, dysenterias nimirum, & coeliacorum affectus utiliter usurpantur, quæ quidem ita se habere usus & obseruatio medocuerunt.

Radix

Radix omnium Ruricum, & Rhabarbari Monachorum in puluerem redacta ac sumpta, aut folia in uino decocta & pota, epas & bilem expurgant, Ictericis & cholericis utilissima.

Aqua distillata harum herbarum maxime autem Acetosæ, in pestilentia libus febribus utilissima, incenso etiam epati, & estuanti stomacho prodest, continuo pota, & foris lineis panniculis imposita.

EXTRINSECVS.

Lapathi acuti tam hortensis quam sylvestris, & Acetosæ herbarum succus, & aqua distillata, omnis generis impetigines, & scabies sanant, inprimis uero abscessus, seu ulcera purulenta, ab inflammatione aliqua ortum ducentia.

Quidam ex his unguenta faciunt aduersus scabiem, idque hoc modo.

Accipiunt radicem Lapathi acuti (Germanis *Menwurtzel*) eamque in puluerem tusam cum aceto temperant. Alii succo expresso utuntur, aut tam herbam quam radicem in aceto decoquunt remedio efficacissimo aduersus omnes papulas & serpentes scabies.

Acetosa, seu Lapatium acutum uino decoctum ac calidum in ore retentum, dolores dentium sedat, & auribus instillatum, dolores eorum tollit.

De Bistorta, seu Colubrina.

CAP. CV.

E VERO ET MAGNO DRA'CVNCVLO, QUI RADICEM


D cem bulbosam habet, hoc capite nihil dicemus, historiam eius lib. ij. cap. lxxxj. prosecuturi. Nunc autem de ijs Serpentarijs (ut

uulgo non sine errore uocant) sermonem instituemus, quæ rubicantes intus radices, & contortas obtinent, dicimusque duo earum esse genera, quorum amborum radices extrinsecus nigre sunt & capillatæ, intus uero rubicantes astringentis saporis, quemadmodum Barbulæ caprinæ radix, aut glandes. E radice alterius, nimirum maioris, vere appetente foliola acuta instar linguæ, non aliter atque in Lapatio acuto, & rubicantia, prorumpunt, quæ tandem ubi sese explicauerint, oblonga & latissima euadunt, Lapatio acuto similima, at magis crispa & inflexa, superne uiridia & herbacea, ex altera uero parte coepta, non aliter atque uiridis æs. Caulem habet rotundum, cubitalem, exiguis & acutis foliis linguam referentibus uestitum, spicatorum florum quibus dilutioris purpuræ color inest, uertice emicantem. Flos illi copiosus, Plantaginis flosculis similimus.

Bistorta maior.

Alterius

Colubrina.
Natterwurz.



Alterius uero Colubrinæ radix, forma serpentem aut uermem imitatur, sed substantia priori minor, Caulē & folia (quæ & ipsa ex altera parte cœsi sunt coloris) non maiora habet, quam Acetosa. Nascuntur binæ hæ plantæ umbrosis, & humidis locis, pratis potissimum Martianæ, seu Herciniæ syluæ, aliarumq; sylvarum, ut sunt Germanis appellatæ, der Odenwaldt / der Speßhart / der Ydar / quæ in Eifalia ad Moseltam prope Valentiam sita est. Solent autem hæ plantæ dum adhuc teneræ sunt inter cætera olea legi.

2.
Colubrina
minor.

NOMENCLATURAE.

Si duæ hæ Colubrinæ in censu Carduorū essent, Anchusæ uideri poterant, quia uero Cardui nō sunt, non possum certe illas alio commodiori nomine appellare, quam Rumicis acuti uoce, quem Dioscorides Oxylapathum non *ἀνὸ τῷ ὀξύ*, id est, ab aceto, sed ab acutis folijs, nam *ὀξύ* mucronem significat, & ad

Rumex acutus.

uerbiallyter, pro eo quod est, acute, accipitur. Inter omnia enim Lapathorum genera, nullum acutiora fert folia, præsentī nostræ Colubrina. Acetosa quoque Oxilapathum, & per Oxylapathum dici posset, tum quod acido

fit gustu prædita, cum etiam quia acutis folijs uestiatur. Ne tamen confundantur appellationes, Rumicem acutum in palustribus nascentem (quod de præsentī Colubrina uere dicitur, ut indicauimus) a foliorum forma Oxylapathon, Acetosam uero *isaria* nuncupauit Dioscorides. Neque cuiquam dubium esse debet, quin huic nostræ Colubrinæ, uti hodie in usu est, uires La-

Colubrina, Serpentaria, Bistorta, Bardana maior.

Tormetilla quæ nonnullis Bistorta dicitur.

Diosco. lib. 4. cap. 18.

patho acuto attributæ apud eundem autorem conueniant, præsertim cum Pandectarum autor, præter Bis tortæ, & Bardanæ maioris appellationes, quas Colubrinæ assignat, illam quoque Lappam minorem, quod folia habeat Lapatho acuto similia, appellat. Sed ut ut hæc se habeant, nos, præfentes binas has plantas, quas Germani Schluppen wurzel / Schlagen wurzel / Klatern wurzel / uocant, Rumices acutos nominabimus, idque & propter formam, & propter facultates, non obstante, quod sint qui putent Bistortam eam esse herbam quæ Britannica uocatur. Qui uero illam pro Limonio Dioscoridis (de qua uoce nos lib. ij. commentariorum nostrorum cap. liij. & liij. egimus, habere uoluerit, cum eo nequaquam contenderim.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Folia Bistortæ & radix eius, eadem pene cum Acetosa facultates obtinent, ueneno enim resistunt, & sanguinem sistere utrinque possunt.

INTRINSECVS.

Radix in puluerem redacta, ac drachmæ pondere in potu sumpta, ueneno pestilentie resistit, ac illud per sudores expellit.

Eisdem uiribus pollenta aqua distillata, & radice in uino decoctio ad eadem ualeat.

Radix Colubrinæ, necnon aqua distillata, & radice decoctum sanguinis eruptiones, dysenterias, aliasque id genus fluxiones cohibet.

Radix Colubrinæ in puluerem redacta, ac cum aqua distillata temperata, grumos sanguinis ex casu, contusione, aut alia quauis causa, concreti, discutit, necnon morbum quoque regium.

EXTRINSECVS.

Radix Colubrinæ, Pyrethrum, & Alumen adustum, æquali pondere in puluerem redacta, melle temperata, ac magnitudine Pisi, cauis dentibus indita, fluxiones ac destillationes a capite defluentes sedant, & caput purgant.

Aqua ex radice & herba distillata, araneorum & scorpionum ictibus medetur, si cum illa colluantur.

Ad cancrum dorsi, Polypos, & maligna ulcera, quæ acœthe uocant, aqua prædicta, & puluis conducunt apprimere, si cum aqua abluantur, & puluere aspergantur.


Puluis

Pulvis pari ratione usurpatus, sanguinem e' uulneribus abundanter manantem cohibet.

De Ophiogloss.

Cap. CVI.

Watterzünglin.



PINGVIS HAEC
Herbula, digiti altitudinē
attingit, quemadmodum
folia Malogranati arboris.
Folium unicum obtinet,
a' cuius sinu inferiore pediculus
exit, cui a' lingula acuta herbacei
coloris infidet, quæ serpentinae
linguae Lapilli uocati similitudinē
refert. Folium huius plantae
crassum & pingue, cui lingula
adhæret, ut diximus, Plantagini
aquaticae forma sua aliquantum
simile est, & Fabae folium
crassitie ac pinguedine sua
æmulatur. Aprili ac Maiomē-
sibus in quibusdam humidis
pratibus inuenitur.

NOMENCLATURAE.

Lingua serpentina Latini-
nis, Grecis *ὀφιογλῶσσο*, & Ger-
manis Watterzünglin dici-
tur, a' forma sua. Posset &
Lingula uulneraria appella-
ri, a' facultatibus. Nam illa
nonnulli ad uulnera maligna
ac curatu difficilia, necnon
aduersus tumores, & inflam-
mationes utitur.

Nec defunt qui putant eam esse Linguam, seu Lingulacam Plinij lib. xxiij. cap. xix. & lib. xxv. cap. ix.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Elegantissima hæc ac exigua herbula, calidis tumoribus, ac recentibus plerumq; uulneribus adhibetur, propter singularem in curando, ac sanando quam obtinet celeritatem.

EXTRINSECVS.

Tundunt eam nonnulli cum adipe suillo, ac emplastri modo quibusuis tumoribus cum inflammatione confunctis, ad præcauendos, ac repellendos ignes sacros imponunt.

Vulnera glutinat Ophioglosson intra paucos dies, celeriterq; sanat, ueluti Symphyton quam Consolidam magnam uocant.

Erit paucis omnia cōprehendam, *ἰπὶ θύλακας* uulneraria est herba, inflammationibus ac tumoribus discutiendis accommodatissima.

De Olere Hispanico, Germanis Bynetsch.

CAP. CVIL

VMICVM MENTIO AD PRÆSENS NOS PERDV-

Rumiculus: multi enim hodie in ea sunt sentētia, ut credant illud Rumicū esse acutum, propterea quod folia eius, maxime quod ad auriculas attinet, quas infine obtinent, cum Acetosa quadantenus conueniant. Veruntamen si spinosum huius oleris & corniculatum semen, necnon radicem candidam eius & breuiusculam accuratius contemplemur, facile deprehendemus, illud nequaquam Rumicis apud Dioscoridem genus esse. Omnium namq; Rumicum radices prælongæ sunt, coloris lutei, sapore acri, semine triangulari, sed non spinoso, quæ uiuersa signa in hoc olere neutrquam reperiuntur, sed diuersa omnia illi insunt, nempe radix breuis & candida, sapor idem qui & aliorum quæ cibis adhibentur olerum, semen denique aculeatum. Porro tria illius sunt genera.

1. Primum idemq; nobilissimum, herba est mollis ac elegantissima, surculosa, uestita multis folijs molliusculis, ueluti crispa Lactuca. Folia habet non prorsus acuta, sed parum in rotundum flexa, ueluti Lapatum quod uocant Bonum Henrichum, aut Beta, sed teneriora & contractiora. Caulem uero teretem, striatum, ueluti Betæ, concauum, interdum inferioribus partibus.

Spinachia nobilis.

Olus Hispanicum.
Bynnersch.



tibus subrubentem, multis ramulis brachiatum, ac angustis pluribus foliis uestitum. Ex alarum sinu seminum rotundum, nequaquam spinis horrens, uerrucis aut semini Betæ haud dissimile erumpit. At quæ hæc est sativa, & nobilis Spinachia, quæ cultum requirit in hortis diligentissimum, & quo sæpius in tenera ætate succiditur, eo furculosior euadit.

Altera & uulgaris Spinachia priori partim similis est, nisi quod folia eius sint longiora, acutiora, & astrictiora, & qua pediculo coniunguntur, utrinque lacinata, binis acutis auriculis uel si mauis corniculis, ueluti Acetosa minima, ornata, primo tactu farinacea, ac pinguiuscula, ueluti Bonus Henrichus, quare pro Spinachia syluestri lubens hæc plantam habeo, quanquam quod ad radicem eius attinet, inter Lappas non male collocari posse uidetur. Caulis huic precedenti con-

2.

Spinachia vulgaris.

nula, ut ita loquar, coniunctim apparent, latum, binis spinulis, cornu aliquius animantis, aut corniculantem Lunam referens, nascitur. Hoc olus cum Beta passim in hortis ciborum gratia seritur.

3. *Spinachia tertia*, Tertium Spinachiae genus, cum vulgari plane forma conuenit, habet enim caulem concauum, cui minimi ac flauī adnascuntur flosculi, qui in auras nullo post serelicto semine, euanescent, quod & cannabis foemella uocata facere solet. Possunt autem iam eommemorata Spinachiae genera bis in anno feri, quemadmodum alia quoque olera, nimirum appetente verno tempore, & aduentante Autumno.

NOMENCLATURAE.

Diosco. lib. 2.
cap. 120.

Quod si Spinachia (quam Germani *Bynetsch* & alij ultra Rhenum habitantes *Spinnat* appellant) Lapathum acutum fuerit, quemadmodum si spicatus fuit Comes de Neuenare, certe peculiare illius genus erit (uti indicatum est) nec appellari poterit *σῆχος τράχυν*, quod Romani olim Cicerbitam asperam interpretati sunt, ut & alij Cichoreum, & Affricani Gathuonem. His autem qui hoc loco obijcient Sonchum esse Crispinam, seu Lactucellā, Germanis *Brauser Lattich* eamque in Hetruria Cicerbitam dici, respondemus hoc pacto. Scimus equidem Marcellum Vergilium uirum doctissimum ita scripsisse, & ipsi aliquando sententiae ipsius subscribebamus, sed repugnat ipsa historia Sonchi quae apud Dioscoridem habetur. Nam omnia Lactucæ genera lacteum incisa succum manant, spinisque & aculeis prorsus carient, quæ in Soncho diuersa reperies, quod considerandum alijs ac discutiendum relinquo. Certe Theophrastus lib. vi. Sonchum inter Carduos collocat, quare ut aculeata sit Endiuia, aut Scariola necesse est, quantum mihi quidē uidetur. Sed ut ad Spinachiam reuertamur, culinæ illam reliquam, ac cum Ruellio, *Seutlomalachon*, hoc est, Maluaceam Betam, & Hispani cum olus uocabo.

Vide de Soncho
supra cap. 99.
Ruellius lib. 2.
cap. 147.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTVM.

In culinis nihil fere frequentioris est usus, pultibus ex Spinachia recentis confectis. Temperamento illa frigida & humida est, cibo & medicinæ accommoda.

INTRINSECVS.

Putes Spinachia aluo astrictiori profunt, potestque id oleris in omni pene ægritudine cibo deligi, nam meo iudicio inter omnia culinaria olera Spinachia laudatissima est, & gratissima.

Spinachia aluum emollit, gutturis asperitati medetur, & aridæ tussis confert, testis est Constantinus lib. v. loc. com. cap. xvi. de herbis.

Succus & aqua distillata Spinachiae pota, calorem restinguit, stomachi rofiones mitigat, & lac elicit,

EXTRIN.

EXTRINSECVS.

Spinachia cataplasmatibus instar, stomacho & epati imposita, inflammationibus illarum partium prodest, doloremque tollit. Eadem ictibus scorpio-
num, & araneorum imposita succurrit.

De Euphrasia, seu Euphrasia.

CAP. CVIII.

QUOT REGIONES TOT HERBARVM NOMINA, Li-
ceat enim mihi hoc dicto historiam Euphrasie auspiciari. Nam
cum in omnibus alijs plantis, tum in hac præcipue uarietas ma-
gna deprehenditur, ita ut quælibet regio peculiarem sibi habeat Euphrasi-
am. Quæ cum ita se habeant recensebimus aliquas. Ac primum quidem
Norimbergenses seplasiarj Euphasiam ostendunt suam, quæ nihil aliud est,
quam gramen nodosum, æquali interuallo à se mutuo distantibus genicu-
lis distinctum. Caulis illi dodrantalis, cui ex geniculis singulis bina sibi in-
uicem opposita prodeunt foliola acuta, & haudquaquam obtusa, sed acie
quasi conspicua, formamque linguæ auricularum referentia. Radicem habet
tenuissimam tanquam filum, uliginosis locis, umbrosis dumetis, & sabu-
losis collibus serpendo se propagat. Sub finem Aprilis mensis uiolæ emi-
cant candidæ, quinque foliolis, quæ singula incisuris diuisa sunt, distinctæ.
Atque hi flosculi in folliculos teretes desinunt, quales Linum fert, qui se-
min e repleti sunt.

1.
Euphrasia Nor-
rica.

Altera & nobilis Euphrasia, quam sibi Argentoratenses uendicant, can-
didos similiter fert flores, qui luteo intus aspersi sunt colore. Planta est sur-
culosa, dodrantalis arbusculæ non dissimilis, multis adnascentibus ac folio-
lis exiguis nigricantibus, & per ambitum serratis, (quemadmodum folia
de quo nostrorum commentariorum lib. iij. cap. xviij) uestita,
oboli latitudinem haud temere excedentia. Nascitur illa aridis pratis, &
graminosis collibus secus itinera.

2.
Euphrasia Ar-
gentinen-sim.

Tertia Euphrasia cœsis, eoque dilutiore colore (ut lac quadam modo refe-
rat) tinctos flores fert, non maiores Anagallidæ cœrulea, ac similiter in pra-
tis inuenitur, dodrantali altitudine, folio molli & pinguiusculo Centaurij
folijs simili. At quod nonnunquam contingit, ubi ad ripas gignitur bicu-
bitali interdum proceritate assurgit, folio longo & pingui, quale habet id
genus Salicis, quod uocant Germani Buchweiden / de quo uidetur infra lib.
iij. cap. lx. nostrorum commentariorum.

3.
Euphrasia cœru-
lea.

Euphrasia.
Augentroft.

Pilosella fyluea
Siris.

s. 6.
Euphrasia Haf-
forum et Herm.
Bar.



Quarta Euphrasia, flore emicans cœruleo, quæ interdum ex hortis tanquam uirgum efficitur, supra capaxciij. inter Pilosellas minores descripta est.

Postremo Hassi peculia rem habent Euphrasiam, et Hermolaus quoque Barbarus de quadam scribit, quam ait Pampinulæ uel Bibinellæ, ut uocant uulgo, folijs similem esse, sed minorem & ferratiorem, uide de Saxifrago Dioscoridis lib. iij. Hermolai Collarium.


NOMENCLATURÆ.

Omnium iam commemoratarum stirpium commune nomen apud Germanos est, Augentroft, quasi dicat, Solutum oculorum, Latinis Ophthalmica, Ocularia herba, Euphragia, seu Euphrasia, et multis uidetur esse herba Adhuc nuncupata, de qua Neoterici varias habent sententias, alijs Euphragiam Cassilaginem esse putantibus, alijs herbam verulam interpretantibus. Vide Nicol. et Manl. de confect.

Prima autem candida & Norica Euphrasia in Vuasgoia, Teuffelsblumen, hoc est, Flos Diaboli nominatur, quæ ratione ignoro, Nec desunt qui eam Gramen interpretentur.

Reliqua.

Euphrasia gramen.
Augentrost gras.



Reliqua duo genera cœruleis floribus, prædita, ubique locorum Augentrost appellantur, & tertium in hortis, quidam Germani *Neußölun das wild* / id est, *Pilosellam sylvestrem*, & alij Augentrost dz wild / hoc est, *Euphrasiam sylvestrem*.

Porro Argentinensium *Euphrasiam* ego semper optimum præstantissimam iudicaui.

VIRES AC TEM-
peramentum.

Omnes *Euphrasie* inflammationibus, & caligini oculorum adhibentur, tussæ, ac impositæ, aut succo earum oculis indito. Præstat tamen aqua ex illis distillata aduersus affectiones prædictas uti.

Reliqua si qua plura desiderantur *Euphrasiarum* iuuamenta, quotidiana observatione addisci, ac manifestari poterunt.

Ego certe Argentinensem morbo arquaro utilissimam comperi, uino decoctam ac calidam ægro propinatam.

De Amarantho, Germanis Rhein blümen/ & ca
 quam Germani Rhurfrant uocant, deq; Lagopo, Ger-
 manis Hasenpfötlin dicto.
 CAP. CIX.

Amaranthus.
Rhein blüm.

Heliochryso:
Rheinblüm.



*E*LEGANTISSIMVS
 iste flos, quem Germani
 Rheinblümen uocant, qui-
 que nunquam ut reliqui
 marcescit, nusquam locorū
 prouenit quam sabulosa,
 aspera, aridaq; terra, pra-
 tiscq; ac campis soli maxi-
 me expositis, praesertim ue-
 ro ad tractum Rheni inter
 Spiram & Vornaciam,
 necnon circa Hagenoiam,
 Kiewenburg / & in Vual-
 goia affatim luxuriat. Plan-
 ta est dodrantalis altitudi-
 nis, radice breui & nigra, fo-
 lio albo & lanuginoso, ue-
 luti Verbascum, forma ue-
 ro uulgari Pilosellæ simili.
 Caules illi teretes, & cinera-
 cei, qui singuli in cacumine
 denos aut duodenos, plus
 minus, luteos, instar lini fol-
 liculorum in nodum quen-
 dam rotundos (ut eo nomi-
 ne Corymbi dici merean-
 tur) flosculos, eosq; multi-
 plici foliorū ordine distin-
 ctos gerunt, qui nunquam
 neque marcescunt, neq; co-
 lorem suum natium mu-
 tant, odore grato, sapore au-
 tem subamaro præditi. Lu-
 lio



lio mense circa festum Diui
Ioannis floret hæc stirps.

Sylvestre huius genus
in sabulosis agris & hortis
reperitur, caule proceriore,
& plane cineraceo, corym-
bis seu nodosis flosculis
alijs non perinde aureo co-
lore fulgentibus, sed luteo
mixto ac quasi incano, alijs
ita cineraceis, ut subcœrulei
appareant tota sua substan-
tia, utrisque uero a maturita-
te in pappos euanescenti-
bus, quod in multis alijs
plantis, quarum uilloso flo-
res in auras quoque auolant,
uidere est.

Inueniuntur porro in
aridis campis mense Apri-
li flosculi, diuersicolores,
alijs candidi, alijs subpurpu-
rei, alijs rosei, alijs ex candi-
do & rubeo aspersi colore,
omni odore destituti, for-
ma Heliochryson referen-
tes. Atque si seni aut septeni
breuiusculo insident colicu-
lo, qui similiter nunquam
marcescunt decerpti. Folia
humili in rotam quasi dispo-
sita procumbunt, & qua ter-
ram spectant cineracea sunt,
ac hortenſi & fatiuae Pilo-
selle per omnia similia sunt,

2:
*Sylvestris Helio-
chryson.*

3:
Basenpfölin


qui sit quod a nonnullis hæc planta *Metzßelin* id est, Auricula muris, &
Pilofella dicitur. Nascitur graminosis, incultisque agris, & ouium pascuis,
Floscius nunquam nisi appetente Aprili mense apparet.

NOMEN

Lagopus.
Basenpfölein.

NOMENCLATVRAE.

Primum florem Germani Rheinblümen (quod in regionibusque Rheno adiacent potissimum gignatur) appellat. In Vualgoia Jüngling dicuntur, qd nō senescant, nec marcescant. Alijs Mottenblümen/hoc est, Tinearum, et ἀμύραν nominatur, quod uestes à Tinearum erosionibus uindictet. Multi in ea sunt sententia eam esse Aureliam Theophrasti lib.x.ca.xxi. Nos, ut ueritas ex collatione historiarum & uiuæ imaginis elici possit, adferemus in medium uerba Theophrasti, quæ quidem sic se habent.



Ἐχα δὲ εἰς αὐτὸ χρυσοῦ τὸ μέλι αὐ-
 τοῦ χρυσοῦ δὲ φύλλον δὲ λευκόν,
 καὶ τὸ κατὰ τὸν δάκτυλον ἰσχυρὸν καὶ ἰσχυ-
 ρόν δὲ ἐπὶ τὸν αὐτὸν καὶ λευκόν.
 χρυσοῦ δὲ αὐτὸ πρὸς τὰ δάκτυλα,
 αὐτὸ δὲ καὶ πρὸς τὰ πύρκαυτα,
 κατακαύσαντι καὶ μίαντι μί-
 λτι. Hoc est,

Habet Aurelia florem auro similem, folium candidum, fructum tenuem, durumque, radicē per summa cespitum, atque tenuem. Vfus eius ad serpen-

tium morsus ē uino. Valer etiam ad ambusta, cremata & mixta melli. Hæcille.

2. Alterum genus à quibusdam Bæzlin/seu feldfrazen/a colore & mol-
 litie

itidē dicitur. Alij *Rhurfrant* / & *Hünſchfrant* / a facultatibus quas obtinet, appellant.

Tertiam diuerſicolorem plantā, uocant *Haſenpſötlin* / a forma nimirū, nam ſinguli coliculi ſuis floribus & corymbis figuram pedis reſequent. Nec deſunt qui illius ſoſculos *Engelblümlin* Germanice, hoc eſt, Angelicos flores appellāt. Proinde hoc herbę genere ſupra lxxxvij. & xcij. capitulis plura annotauimus. Quidam illam *Stœchada citrinā* nuncupatam uolunt, quam ſententiam ex capite xiiij. Serapionis de *ſceha* ſtabilire conantur, exiſtımantes eam eſſe uerum *Abſinthium marinum*, de quo paulo poſt nos quoque loquemur. Mihi ſane uidetur ſecundum genus a nobis deſcriptum, eſſe alterum *Polium Dioſcoridis*. At quod ad primum attinet, diuturnum illum inquam, quem Germani *Rheinblümen* / uocitant, duo illi mea ſententiā non male quadrabunt capita apud Dioſcoridem, nempe quinquageſimum quintum, & ſeptimum libri quarti. Equidem utruq; genus noſtrę *Tinearig* ſi florem ſpectes *το δὲ ἀνθηρὸν* (quod *χρυσάνθεμον*, & *Amaranthum* nonnulli cognominant) nomine recte cenſebitur, nam nō in umbroſis locis, ſed apricis & ſub ſole naſcitur. Atqui ut mea fert opinio *ἀνθηρὰ* rectius appellabuntur, quod nequaquam conſenſcant, hoc eſt, quia non marceſcunt ut alię flores. Deſcriptionem *το δὲ ἀνθηρὸν* magis illis quadrat quam *Heliochryſi*, ſiquidē illud folia *Abrotono* ſimilia habere Dioſco. ait, & aquoſis conuallibus naſci, quę omnia *Amarantho*, ſeu *Tinearig* tribui non poſſunt. Iam qui ueritatem ipſam docere nos poſſet, illum libenter ſequemur, nemini enim præiudicare, ſed ſolum quod ſentimus pronunciare uolumus, parati audire meliora & firmiora, tradentes.

VIRE SAC TEMPERAMENTVM.

Amaranthi flores calidę ſunt naturę, id quod & ſapor & odor arguūt, ideoq; poſſunt utrinq; uſurpari commodē.

INTRINSECVS.

Amaranthi flores uino decocti, & poti, lumbricos uentris expellunt, quod ego experientia certum eſſe didici. Eodem modo ſumpti, ſudores eliciunt, quare hanc herbam obſtructionibus epatis, lienis, renum & ueſicę, conferre exiſtimo.

Tertia a nobis poſita, ſi *Polium* eſt, ueneno omnis generis pota aduerſatur, uino decocta, qua ratione & regio morbo laborantibus conducit.

EXTRIN.

3.

ſceha.

Dioſco. lib. 3.
cap. 115.
ωίνου το δὲ τριπλ.

De *Heliochryſo*
plura cum de *Li*
narijs agemus.

Chryſanthemi
appellatio ſupra
in *Chamomillis*
declarata eſt.

Amaranthus eſt
Chryſocome Dio
ſcoridis lib. 4.

cap. 53. necnon
Centaurium mi
nus. lib. 3. cap. 7.
Dioſco.

Nec deſunt qui
Thymbrā *ἀνθηρὰ*
uocent.

Eſt etiam *Agera*
tus lapis coria
rijs idoneus ut
indicat *Galenus*
lib. 9. de ſimp.
facult.

EXTRINSECVS.

Amaranthi flores in lixiuio decocti, si cum illo caput abluatur, furfures capitis & porriginem expellit, pediculosq; enecat.

Idem flores uestibus appositū, a tinea illas tuentur. Aqua decocti, uaporationibus & fomentis induratum, ac tumorem matricem emolliunt.

Altera Amaranthi species easdem obtinet facultates, & pecorū ac armentorum coeliacis affectionibus, quas Germani die Hynsch appellant, succurrit.

De Absinthio. Cap. CX.

ABSINTHIUM FOLIIS VESTITVR INCANIS ACCI-
neraceis, odoratis, multipliciter dissectis, Rutæ folijs similibus sed paulo maioribus, & sapore amarioribus. Secundo demum anno lignosum caulem emittit Absinthium, multis furculis ac ramis brachiatum, radicem lignosam similiter habet & fibratam. Caules porro surculosi altitudinem binorum cubitorum attingunt, aureos corymbos ab imo usque ad summum Iulio mense ferentes, idq; in omnibus ramulis. Flores ij similes sunt floribus Anaranthi supra descripti, qui ubi maturuerint semen excidit minus Tanacetis semine, e quo quotannis repullulascit. Nasquitur in areis aridis & incultis collibus, & ad muros, ad quod alludens Ouidius sequentia cecinit carmina.

*Turpia deformes gignunt Absinthia campi,
Terraq; de fructu quam sit amara docet.*

NOMENCLATVR AE.

Germani Absinthium *Wermūt* appellant, et *Mediomatrices* *Elz*/quod propter insignes quas obtinet facultates rectius *Weronmūt* / quasi dicas, pellens tristitiam, appellari posset. Hebræi *לענה* Laanah. Amos v. Chaldei *מיר* Mirer, & *מירר* Merirura, appellant, uide Thargum. Hieremix v. Theophrastus lib. x. cap. xviij. Pontico Absinthio pasci oues, & pinguiore, ac pulchrior, ac sine felle reddi testatur, una nimirum amaritudine alteram pellente. Sed uerba ipsius auctoris subiiciamus.

Τὸ ἀψίνθιον, τὰ βότρωδα πρόβατα, ἡ παρὰ τινος ῥιμάδα. τὰ δ' οὐ τῷ ποτῷ τινος, ἀλλὰ τῷ πικρῷ καὶ κακῷ, καὶ (ὡς αὖ τινος ἀγρῶν) ἐκ ἔχοντα χολήν. Hecille.

Absinthium ergo præstantissima est planta, tametsi non magni apud Medicos existat usus. Qui ebrietati noctesq; diesq; student, uino Absinthite aduersus

Absinthium.
Wermüt.



aduersus crapulam uti consueuerunt. Cum namq̃ preterita nocte plus equo uino se ingurgitauerunt, mane ad uinum Absinthites confugiunt, tanquam ad sacrā anchoram, quo hesternam reprimant crapulam.

Dioscorides Absinthiū Græce ἀψίνθιον, & a'grauitate amaritudinis παύρινος, et Absinthium rusticum appellat, quod Germanice Aker Wermüt interpretari possemus. Aegyptiis Somali dicitur. Auicenna quinque describit Absinthij genera, Tarsene scilicet, Suisui, Nabathi, Corasceni, & Romanum Absinthium. Serapio trium tantum meminit, quorum primū Absinthium uocat, atq̃ illud Cuscute, & Sceha Romanum esse. Akerum Cretense nimirum, mihi id est qd ille Saricham & Erifion appellat. Tertiū uero est Santonicum, sed de his paulo post.

De Absinthio scripsere Hippocrates, Galenus, Paulus Aegineta, Plinius libro xxvij. cap. viij. & viij. Apuleius cap. ci. Oribasius. lib. ij. de potent. simp. Platina

Apsinthion al. dicitur a contradiendo. pro diuersis quibus datur, quod nullus est de ipsorum amaritudine, hanc leuiter attingit. Vt uero fidei carui et huiusmodi conserui et me uocant, q. impetibilem, q. nullus est de gustu aut bibat.

Diosco. lib. 3.

cap. 24.

Apuleius Aristolochiam quoque Absinthium rusticum uocat.

Auicenna lib. 2. de simp. cap. 2.

Serap. cap. 14.

lib. iij. Ioannes Mesue. Iacobus de Manijs, et Hieronymus Braunschuuicig, quos uidere poterit, qui absolutam Absinthij cognitionem desiderat.

VIRE

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Absinthium tam internis, quam externis corporis partibus utilissimum est, temperamento suo calidum & siccum.

INTRINSECVS.

Absinthij folia uel flores in cibo ac potu usurpati, stomacho profunt, concoctionem adiuuant, calefaciendi uim habent, dolores sedant, uenenum & bilem expellunt, quæ stomacho inhæsit.

Flores uino decocti & poti, aut in Autumno uisum ex Absinthio confectum, quod Absinthites uocant, continuo usurparum, supra commemoratas facultates habent, nam appetitum edendi faciunt, & fastidia discutiunt, quod non ignorant uinofi, qui ut appetentiam cibi concilient, uinum eiusmodi potare consueuerunt.

Absinthium cum Romano Cymino in uino decoctum & calidum haustum, ad tormina & stomachi dolores facit, tinea uentris expellit, arquatil discutit morbum, & menses ciet, uenenoq; sumpto aduersatur, eiusq; uires infringit, nimirum Hyoscyami, Cicutæ, Opij, Draconis marini, aliorumq; id genus.

Absinthium in aceto decoctum, contra fungorum strangulationes conuenienter bibitur.

Commemoratas facultates aquæ distillatæ ascribunt, quanquam non perinde ualidarum sit uirium, quippe quæ infirmioribus, & pueris (qui omnes fortes medicinas ferre nequeunt) exhiberi debeat mensura iij aut v cochlearium.

Absinthium contrarias habet uires, nam aluum durum emollit, laxam uero coerct. Quis ergo est qui omnia iuuamenta eius recensere possit?

Opiliones flores Absinthij resiccatos, et cum sale tusos, pecoribus et ouibus deuorandos exhibent, nam ex longa obseruatione perceperunt, Absinthium omnibus internis affectionibus mederi, neq; tantum dolores mitigare, sed et quæuis noxia expellere, quibus nonnunquam pecora non minus quam homines infestantur.

EXTRINSECVS.

Aqua Absinthij lineis linteolis teporibus illita, dolores sedat capitis, qui ex frigida oriuntur intemperie. Eadem uesperis oculis instillata & auribus, claritatem illorum adiuuat, & dolores harum tollit, anginae cum melle & nitro tusa herba illinitur.

Dentium

Dentium auriumq; dolores decoctum, uaporis suffitu compescit.

Absinthium uino decoctum, & cataplasma inde factum, stomachoq; impositum, fastidia, ructus, & dolores eius aufert, maxime si ceratum cyprium illi adiungatur. Prædictis morbis oleum Absinthij confert illitu.

Herba & flores Absinthij insparfi arcis uestiarijs, uestes ab erodentium iniuria uendicant.

Succus atramento librario inditus, literas a murium erosione tuetur.

Quidam succum illum linimentis lectisterniorum, aduersus mures tuendi gratia imponunt.

Absinthium aqua decoctum, cimices abiguntur, si illo inferiores lecticæ partes illinantur, quod aliæ quoq; amaræ herbæ præstant.

De Scriphio Germanico. Cap. CXI.

AD HERBAS EAS IAM PERVENIMVS, QVÆ CER-
tissimam lumbricis necem afferunt, quarum haud postrema est,
Germanis Wormfraut, seu Wellfamen uocata. Ea autē siue spe-
cies Absinthij, siue Abrotoni sit parum refert, siquidē utriq; Absinthij uoce
appellatur, & sæpe una pro altera usurpatur. Proinde cum utriq; odore,
forma & coloribus, tum uero Abrotono minori quam proxime accedit.
Est enim frutex elegatissimus Arbusculæ similis, ramosus, plurimis cine-
raceis & dissectis foliis uestitus, flore in uertice caulium emicans luteo,
exiguo (sicut Sinapi) semine minutissimo, & luteo in oblongis filiquis cō-
tento, lubrico & læui, cum maduerit aqua, aut alia humiditate. Herba sane
uulgaris & contempta, quippe quæ in cœmiterijs passim, itineribus, ad mu-
ros & sepes luxuriet, non aliter quam uulgare Absinthium. Et quod mihi
me preceundum, inter aliosas stirpes censetur, nam non magis quam uul-
gare Solatrum, frigora ferre potest, ideoq; quotannis ex semine deciduo re-
uiuiscit.

NOMENCLATURAE.

Quanto in honore Absinthium apud ueteres fuerit, passim autores tes-
tantur, imprimis autem Plinius, cuius de uulgari hæc sunt uerba:

1.
Absinthium uul-
gare, seu Roma-
num.

De usu eius conuenit herbæ facilitæ, atq; inter paucas utilissimæ, præ-
terea sacris populi Romani celebratæ peculiariter. Siquidem Latina-
rum ferijs quadrigæ certant in capitolio, uictorq; Absinthium bibit: cre-
do sanitatem præmio dari honorifice arbitratis moribus. Hæc ille. cap. 7.

Scirphium Germanicum.

Well samē,

*Absinthium ma-
rinum.*

*Scirphium quod
Diosco. Santoni-
cum quoq; cog-
nominat.*

exiguū.

Plinius lib. 2.



*Absinthium San-
tonicum.*

De marino quoq; quod
& Scirphium uocatur, e-
dem fere scribit Plinius ni-
mirum Ifiacis eius ramum
Isidi præferre moris fuisse.
Atque hoc alterum Absin-
thij apud Dioscoridem est
genus, nam de primo iam
primum in præcedenti ca-
pite locuti sumus. Iam hoc
quicquid est nominis huic
nostræ, quam modo tracta-
mus, herbæ, libens tribue-
rem (nam cum Scirphio in
facultatibus, forma, graui
odore, & amaro sapore,
conuenit, solum semen pa-
rum dulcius est & usitati-
us) nisi Scirphium in Ægy-
pti Thaphosiri prouenire
traderet Dioscorides. Ve-
rum enim uero, cum uulga-
re Romanum seu Ponticū
Absinthium, ex quo Apia-
cius condimenta facitare
solebat, ad nos Dei Opt.
Max. munificentia peruene-
rit, spero equidem eiusdem
liberalitate ex Ægypto Se-
rphium quoq; ad nos com-
migraturū. Quare interea-
dum meliora aliij doceant,
(nemini enim ea in re impe-
dimento esse uolumus) præ-
sertim Lumbricorum her-
bam, Scirphium Germani-
cum uocitabimus, summæq; gratiarum actione pro illo usurpabimus. In
Bauaria & Hassia semen istud patria uoce Well samē appellant.

Tertium postremo Absinthium Dioscorides Santonicum, à Santoni-
bua

bus Gallix populis nuncupat. Eitq; illud Lumbricorum semen, quod Rizo-
tomi & Pharmacopolæ, ac Agyrtæ uendere solet. Multi putarunt à fa-
cultatibus illud uocari Santonicum, quare in receptis suis (ut uulgo loquun-
tur) Semen sanctum nominant, quod Arabibus Seeha, aut Scheha dicitur. *Anicennalib. 2. cap. 668.*
In Græcis exemplaribus quibusdam *explanis* scribitur, quod quam absurdū *Serap. cap. 319.*
sit, & uitiosum nemo non uidet, cuius rei Manardus Ferrariensis libro. iij
epist. /. meminit.

VIRE S AC TEMPERAMENTVM.

Seriphium Germanicum, calidæ & siccæ est temperaturæ, internis corpo-
ris partibus, & ad Chirurgicam accommodatissimum. Singulari enim ex-
perimento obseruatum est, semen eius quemadmodum Plantaginis, alui
fluxiones quasuis cohibere. Multi etiam crediderunt ossium contractiones
(modo illa rite redintegrentur, ac in locum suum reponantur) in pecoria-
bus sanari quamprimum herba & semen Seriphij Germanici affectæ parti
adalligentur. Quæ quidem indicare non pignit, ut in usum tandem recipe-
retur, herba utilissima.

INTRINSECVS.

Semen Seriphij Germanici, in cibo & potu usurpatum, dysenteria,
alijsq; alui fluxionibus sistendis conducit, id quod experientia testatum fe-
cit.

Herba uino decocta & pota, lumbricos expellit, sicut & alia lumbrico-
rum semina.

Dioscorides scribit eam cum melle & Oryza decoctam, ac sumptam, cō-
tra lumbricos facere.

Ego certe aquam distillatam gratiorem et utiliorem ipsa herba existimo,
propterea quod illa admodum iucundi sit odoris.

At nobile Lumbricorum semen Santonicum inquam aduersus lumbrico-
cos, apud Germanos frequentius usurpatur, nam nisi ab agyrtis illis quos
diximus adulteretur, non tantum aduersus lumbricos ex melle sumptum,
unice facit ut dixi, sed etiam contra quoduis uenenum expellendum sin-
gulari experimento usurpatur.

Quidam pastillos ex eo conficiunt, ut tenerioribus, & pueris usu facilius
sit & gratius.

Porro qui semine hoc recte uti uelit, is puero infra septem annos na-
to, uel peri dimidiæ drachmæ pondere, mane quoque pari pondere, ex mel-
le illud exhibeat, & non ex lacte, ut uulgo solent. Qui adultiores sunt, ijs
singulis uicibus drachma detur,

EXTRINSECVS.

Herba Seriphij Germanici fortida uermes è uulneribus sordidis & malignis pecorum & hominum expellit, adalligata, aut si succus expressus illis instilletur.

Herba rufa & imposita ossium contractionibus medetur, uti Symphyton.

De Abrotono. Cap. CXII.

Theophr. lib. 6.
cap. 7.

Plinius quoq;
duorum generū
meminit lib. 21.
cap. 10. & 21.

1.
Abrotonum mi-
nus.

2.
Abrotonum
maius.

Q VANQVAM THEOPHRASTVS ET ALII NONNVL-
li autores Abrotonum hyemis frigora ferre non posse scribant,
ea nimirum ratione adducti, quod folia eius appetente hyeme
nigrescant & decidant, tamen apud nos Germanos, siquidem diligenti cu-
ra in hortis plantata colatur, caules, uirgæ & radices illius nequaquam fri-
goribus læduntur, sed incolumes manent, ac aduentante verno tempore re-
pullulascunt, uti arbores.

Abrotonum duorum traditur generum, maius scilicet & minus, utrunq;
suauissimi odoris, & amarum gustu: Frutices sunt ambo tota sua substan-
tia lignosi, & ut de minori priuatim loquamur, folijs hoc magis cineraceis
& incanis quam maius uestitur, adeoq; Seriphio Germanico plane simili-
bus.

At magnum Abrotonum uirgas emittit prælongas, tenues, & flexibiles,
uiridantibus & satis magnis folijs, uulgari Chamomillæ quam proximis,
ornatas. Frutex hic nonnunquam uiri proceritatem attingit, odoris gra-
uioris simulq; gravioris quam minus. Atq; his notis abinuicem differunt,
cætera prorsus consimilia, bina isthæc Abrotoni genera. Qui plantando il-
la propagare uelit, is surculos appetere vere, aut in Autumno, decerptos ter-
ræ inferat, non aliter atq; in Lauendula ac Rosmarino facitare solemus.

Abrotonum sub Augusti mensis initia floret, uirgis ab imo usq; ad sum-
mum copioso florere fertis, comantibus in summo fulgore auri co-
rymbis congestim dependentibus, non secus ac in Absinthio, ijs decidenti-
bus par quidem erat, ut inde pro more aliarum platarum sese propagaret,
uerum licet sæpius id à me in terram proiectum fuerit, nunquam tamen ad
frugem peruenire uidi.

1.
Abrotonum cam-
pestre. In agro Vormatiensi nō procul à pago, quem uocant Baseloch, Abro-
tonum quoddam in collibus Autumnos florens inueni, cuius tam herba,
quam odorcum Abrotono minori conueniunt. Flos illi copiosus Absin-
thio similis per omnia, quo nomine primum quidem Absinthium mihi ui-
debatur.

Abrotonum.
Grabwurz.



debatur. Sed cum herbam accuratius contemplatus fuissē, tandem Abrotonum esse cognoui, præsertim cum odore illius esset præditum, et gustu amarū.

Potest autem fieri ut ea *Theophrastus* planta sit Abrotonum *lib. 6. cap. 7* Theophrasti.

Sylvestre denique Abrotoni genus per terram spargitur, nec in altum sese erigit, sed uirgæ eius tenuissimæ humi procumbunt sicut Centumnodia, Germanis Weggras/paucissimis, sed minutim concilis foliis uestiæ. Flosculi eius seu corymbi potius incani sunt ueluti Artemisia, satis boni odoris. Nascitur hoc Abrotonum e regione montium in uis fabulosis, collibus & apricis locis, ubi nulla sunt fenticeta. Hyemis frigorebus non facile cædit, qua propter in aliosarum censu haberi non potest.

Nec desunt qui hanc stirpem, sylvestrem Artemisiam esse opinentur, quod mihi uerisimile non uideatur, nam & odore & sapore propius ad Abrotonum, quam Artemisiam accedit.

Constantinus in libello de gradibus alterius cuiusdam meminit Abrotoni, quod in Armenia nascatur, nomine Syche, temperamento calido, nam urinam illud ciere, matricem aperire, & suffitu eius incensi sortus mortuos euocari. An uero hoc

ficidem Abrotonum quod in agro Vormatiensi inueni, aliorum esto iudicium.

NOMENCLATURAÆ.

Dioscorides scribit Absinthium quod in Ponto & Cappadocia monte Tauro nascatur, bonitate antecedere omne aliud. Hoc nobis in Germania quoque (Deo sit laus) prouenit. De Abrotono uero (quod Germani *Stabwurtz* / & *Gertwurtz* appellant) idem autor commemorat Ponticum illud Absinthium nominari, ita ut duo Pontici Absinthij genera apud nos extant, quæ sane hisdem facultatibus prædita esse, facile credendum est, cum & Galenus in libello de succidaneis pro Absinthio, Abrotonum accipere iubeat, quare Romani olim Abrotonum, Ponticum Absinthium uocarunt.

Diosco. lib. 3.
cap. 26.

Maius Abrotonum idem Dioscorides uetèribus Siculum creditum esse prodidit. Vtriusque uero Abrotoni nomina communia hæc sunt *ἀβροτον*, *ἀβροτον*, *ἀβροτον* simpliciter, *ἡράκλεια*, (ab Hieraclia nimirum Pontis urbe, sicut & Origanum ab illa nomen inuenit, nam in finibus illius multæ sponte sua proueniunt herbæ) Cholopeon, Thelyphthorion, Absinthiomenon, Procampylon, Cynanchites, Ancon glycy, id est, Ancon dulcis, Neura phœnicos. Arabes Abrotonum Catmu, & Halscia uocant, uide Serapionem cap. cccij. & Auerrhois simplicia. folio cccv. Hieronymus Braunschueig Abrotonum Germanice *Schoßwurtz* / & *Gartbag* / quod furculos & sagittas extrahendi uis polleat. Alij *Buttelkraut* / & *Ganserkrut* / Germanica lingua, Arabica uero Hefum, Beremisch, Berengesif, & apud alios Sauschaurarim uocari tradunt. Tametsi autem hæc Arabica nomina (ut Simon Ianuensis putat) non ad Abrotonum pertineant, tamen Belêgesif, siue Berengesif, Artemisia, Sanguosaro, Abrotonum certe est.

Syluestre Abrotonum Germani *Besemkrut* / hoc est, Scopariam herbam, a multitudine uirgularum, quæ uerrendis & purgandis pauimentis idoneæ sunt, uocarunt. Nec inepte Ancon & Procampylon appellari poterat, siquidem uirgæ eius non eriguntur in altum, sed humi sparsæ iacent, sicut & satui Abrotoni uirgæ uersus terram capita sua inclinant.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vtriusque Abrotoni, syluestris inquam & satui temperatura calida & sicca est, quemadmodum Absinthij. Quare unam pro altera usurpare possumus, uti Galenus in libello de Succidaneis testatur.

INTRINSECVS.

Summæ propagines Abrotoni cum stolis suis uino uel aqua decoctæ,

Ax, adiecto melle aut Zaccharo, perq; diem ter aut quater potæ, non nisi re-
cta ceruice spirantibus, & Astmaticis apprime conducunt, nam uitia pecto-
ris expurgant, Cardiacæ medentur & tussi, lentosq; humores pulmonis, re-
num, matricis & uesicæ incidunt, stillicidio urinæ succurrunt, & quosuis in-
ternos dolores sedant.

Aqua distillata non est inferiorum uirium.

Reliqua Abrotoni iuuamenta, require in Absinthij historia.

EXTRINSECVS.

Suffitu Abrotoni uenenata pelluntur ac fugantur animalia, quare non
immerito sagminibus suis mulierculæ adijciunt Abrotonum.

Aqua distillata scorpionum & araneorum ictibus auxiliatur, loca mulie-
bria mundificat & sanat, si illa colluantur, uel linteolis in ea madefactis cu-
rentur.

Herba ipsa in cineres redacta, admixto melle, ita ut unguentum inde fi-
at, capillos tardius enascentes elicit, illitu per aliquot dies.

De Artemisia. Cap. CXIII.

Q VEMADMODVM PLERAEQVE STIRPES VIRI-
bus & iuuamentis alias superant, ita magnitudine & exiguita-
te plurimum a se inuicem distant herbæ, quod uel ex concisis For-
niculi, Anisi, Anethi, Coriandri, Dauci, Pastinacæ hortenſis, Leuistici, fo-
lijs satis demonstratur. Proinde sicut Millefolij folia maiora sunt folijs
Abrotoni minoris, & rursus Abrotoni maioris herba latior Chamomil-
læ uulgaris, seu Cotulæ foetidæ, & his quidem latiora folia Rutæ, quæ &
ipsa magnitudine cedunt Absinthij folijs, denique ueluti Marricaria antece-
dit quantitate foliorum Absinthium, ita certe Marricariæ folia Artemisiæ
cedunt. Sed hæc ita se habere nemo qui stirpes istas cognouerit, insiciabi-
tur, quare ad descriptionem Artemisiæ relictis his nos conferemus. Ea folia
habet prope radicem maxima, multis incisuris diuisa, ut manus figuram
præ se ferant, quæ quo altorem in caule locum occupant, eo minutiora
sunt, & quandoq; ternis tantum digitulis discreta, omnia autem qua terrā
spectant candicantia, superne uero ex nigro uirescunt. E radice lignosa &
capillata quandoq; quini aut seni exiliunt caules oblongi Cannabinis simi-
les, surculosi, multisq; corymbis reſerti, qui cum sub Augusti mensem hisce
recoeperint, in cereum colorem desinunt, iucundoq; odore & grato sapore

Artemisia.
Beißfuß,

1. Rotbucken
2. Weißbucke



pollent, ad multa utilissimi, præsertim ad infarciendos anseres, quos assatos & iucundo quasi condimento palato arridere uolumus. Apud nos Germanos nulla fere Artemisise omnis differentia constituitur, nisi quod alia purpureo, alia uero uiridi ac subpalente caule, utraq; uero altissima, ac medulla plena, ueluti Sambucus, quod ad reliqua attinet forma, odore, et sapore alteri cõsimilis sit.

NOMENCLATURA

Artemisia Germanis Beyfuß/Bucken/ S. Johans frant/& S. Johans gürtel/non secus atq; multæ aliæ plantæ superstitione hominum contaminari coepit. Sunt enim qui illam certis horis & diebus sicut Verbenam effodere, ac sub ea carbones (seu quod fere dixeram) stultorum lapsides aduersus febres, inquirere soleant. Alij eo stultitiæ progrediuntur, ut Artemisia se cingant, ac ex ea scirta conficiant, quæ postea in ignem diuo Ioanni sacræ, una cum omni infortunio,

(ut sibi persuadent) cõficiunt. His cerimonijs, hac superstitione non inuicem homines Lutetiæ Parisiorum quotannis uti consueuerunt. Nec desunt qui Plinio uidelicet doctore, Artemisiam cum Saluia secum deferant, credentes

dentes se nequaquam ex itinere defatigandos. Sed quis omnes illas superstitiones enumeraret, quibus Seducator ille Spiritus optimas Dei creaturas conspurcauit?

Artemisiam unicaulem Dioscorides Monoclonon, eam uero quæ plures habet caules Polyclonon appellat, quibus nomenclaturis, & Absinthium & Abrotonum & Origanum, necnon aliæ plures herbæ distingui possent.

Reliqua apud eundem autorem Artemisiz nomina hæc sunt quæ sequuntur, Toxitesia, Ephesia, Anactarios, Sozusa, Leia, Licophryx, magis sanguis hominis *χρυσόθυμον*, Serpillum, Herba regia, Rapium, Tertana, Gallispona, Dacis, Zuoste, Romanis Valentina.

Artemisiz, nomen primum ab Artemide, hoc est, Diana impositum quidam credere, alijs reclamantibus ac affirmatibus hanc nomenclationem ab Artemisia Halicarnassi regina ortam esse, cum prius Parthenis hoc est, Virginalis *Μειδραυτ* Germanis, uocaretur. Sed parum refert unde nomen traxerit Artemisia, modo illa nobis cognita sit. Sunt qui illam Matricariam hoc est, Germanis *Μύτερφραυτ* appellatam uelint, astruentes apud Hispanos Altiliam seu Altimisiam nuncupari. De Altilia neoterici medici varias habent opiniones, alijs Rob, seu Sapam eam interpretantibus, alijs Abrotonum sylvestre esse dictitantibus. Verum Arabs Auicenna v. Cano, in Theriaca Esdræ, litem dirimit, dum scribit succum Altiliæ esse Albelengeßi, & Abrotonum sylvestre uocari. Atq; hæc est quorundam mater herbarum seu Artemisia.

Neoterici tres ponunt Artemisias, Monoclonon scilicet, quam Matrem herbarum nominant, deinde Tageren, Tanacetum, Tanasiam, siue Athanasiam, tot namq; nominibus Tanacetum Germanis *Groß geel Reinsarn* insignitur, secundo loco collocant, tertio quæ dicitur *ἀρtemisia λιπτόφυλλον*, cuius folia Sampfuchi, uel Maioranæ odorem reddunt. Huic sententiæ subscribit Apuleius quoq;. Atqui si Dioscoridis & Galeni scripta diligentius inspiciamus, duæ solummodo reperientur Artemisiz, nam de Artemisia tenuifolia caput apud Dioscoridem superfluum est, id quod ex uerbis ipsius auctoris colligere licet, cum ait Artemisiam duorum esse generum, maiorem scilicet & minorem, quas cum expedißet formamq; & facultates earundem descripsißet, superuenit alius quidam sciolus, secundumq; de Artemisia tenuifolia caput adiecit, quod nos propter rei ueritatem indicare uoluimus, adijcientes hoc postremo Monoclonon Artemisiam non esse uulgarem nostram, sed fieri quidem posse ut sit *Leptophyllos*, posteaquam folia & semine illius Sampfuci odorem satis repræsentent. Hebrai Artemisiam *חלגלגות* Chalgalugoth uocant, teste Aruch Monasteri.

Plinius lib. 26.

cap. 15.

Diosco. lib. 3.

cap. 118.

ἀρtemisia.

1. *Μονόκλων*.

2. *Πολύκλων*.

Βασίλειον λέχαινον

Artemisia appellatio unde.

Altilia.

Mater herbarum.

Tres Artemisiz Neotericorum.

1. 2. 3.

λιπτόφυλλον.

Dioscor. lib. 3.

cap. 119.

Apuleius ed. 10.

11, 12.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Artemisia tam rubea quam candida (sicenim apud nos Germanos distinguitur) utilissima est mulieribus, quare summo honore ab illis conseruanda erit, nam calefaciendi & discutiendi uim obtinet.

INTRINSECVS.

Artemisia rubea uino decocta, adiecta Mace multa aut exigua prout uolueris, in potu per diem bis uel ter sumpta, locos muliebres excalfacit, menses suppressos ciet, & educit, nec non secundinas, ac quæcunque id genus in internis hærent uitia. Aqua distillata paribus facultatibus est prædita.

Decocto *Artemisiz*, si id cum Saccharo uel melle temperetur, tussis mitigatur, lenti humores circum præcordia extenuantur, calculi comminuuntur, pulmo mundatur, nec non renes & uesica, id quæ tam in mulieribus quam uiris, si decoctum istud per diem bis uel ter bibatur, ita tamẽ ut a potu sumpto postea ieiunes.

Flosculi *Artemisiz* ficcati omnium præstantissimi sunt, nec tantum medicinz, sed & culinæ maxime idonei.

Sunt qui in Autumno uinum ex *Artemisia* conficiant, nam mustum insecta *Artemisia* deferuescere sinunt, illud quæ uinum postea ad dictas mulierum affectiones usurpant.

Et ut paucis absoluam, *Artemisia* uiribus ad *Pulegium* fere accedit, & quantum iudico, in omni cibo gratior.

EXTRINSECVS.

Quemadmodum *Artemisia* omnes internas & superfluas mulierum humiditates incidit & expellit, ita aduersus eadem in defessibus & pessis muliebribus, quæ foris adhibentur, facit.

Artemisiz flores cum *Chamomilla* & *Eupatorio* in uino decocti ad neruorum & articulorum perfrictiones & dolores faciunt, si decocto illorum foueantur, & cum illo confricentur partes affectæ.

Præterea si quis ex longo itinere plus æquo defatigatus fuerit, is aqua in qua *Artemisia* decocta fuerit pedes abluat, releuationem sentiet.


Herba *Artemisiz* uino rubro decocta utuntur aduersus exitum ani, qui ut in in locum suum reponatur, uino decocto calidissimo insidendum erit, ita tamen ut prius cum *Myrrha*, & *colophonia* suffumigetur anus.

De

De Geranijs.

Cap.

CXIII.

Geranium.
Störcken schnabel.

GERANIORVM TRIA sunt genera, quorum minimum fabuloso & macrolo, secus itinera, et quandoque in agris prouenit, radice candida, terete, dulci, ueluti Rapunculorum, digitum longa. Herba huic exigua, sed multipliciter concisa, humi sparsa, & minutioribus crenis dissecta quam Pimpinella. Aprili mense uiolas fert Bersilici colore præditas, multas, nec maiores flosculis Anagallidis, quæ tandem in capitula rostellis gruinis in quibus semen continetur emicantia abeunt.


Alterum huic quod ad radicem attinet simile est, nisi quod radix saporem magis astringentem & asperum præse ferat. Folia illius rotunda, uti Maluæ uulgaris minimæ, per ambitum incisa, & qua terram spectant cinerea, multisque uenis aut nervis distincta. Caulem habet teretem, dodrantalē, geniculatum, nec culmo crassorem, geniculi purpurei sunt & leuiter lanuginosi. Florent per æstatem, flosculo ex purpura coëso, minori

1.
Geranium minus

2.
Geranium altum

Sanguinaria radix.

Blutwurz.

3.
Blutwurz.4.
*Species Sanguina-
riae radice:*

nori quam habeat primū
genus, qui & ipsi rostran-
tur tandem. Semen eius ca-
num est, uti Githaginis Ger-
manis Baden / de qua su-
pra cap. xl. Nascitur hæc
herba inter cætera uitia, in
coemiterijs & hortis. Her-
ba est æstiuā seu alsiōsa, fri-
goris & impatientissima.

Tertium Geraniū, iam
descripto geniculis, caule
& rostris consimile est. Fo-
lia eius rotunda, ut Maluæ,
sed profundioribus & fre-
quentioribus incisuris dis-
secta, ut manus similitudi-
nem quodammodo expri-
mant. Flores gignit purpu-
reos, mediocriter magnos,
rosæ formam referentes.
Radicem habet teretem, lō-
gam, intus, & extra rufam.
Nascitur in altissimis syl-
uis, qualis est quæ Herci-
nia siue Martiana Germa-
nis der Schwarzwaldt di-
citur: E radice quotannis
noua prorumpunt germi-
na.

Postremo alia Geraniū
species, circum oppidum
Cruzenacum gignitur, pro-
ximo caule, flore, semine, &
folijs similis, nisi quod fo-
lia habet maiora ad Ranun-

culum accedentia. Flos illius ex purpura cæsius emicat, ex quo capitella
gruini capitis formam referentia & rostrata rostellis breuiusculis, proueni-
unt, in quorum singulis quina oblonga ac dulcia semina reperiuntur, quæ
tandem

tandem exiliunt e suis filiquis. Nonnulli hanc stirpem in hortis suis plantant.

NOMENCLATURAE:

Comune omnium istarum stirpium nomen est *γεράνιον*. Latinis Geranium, Diosco. lib. 3. Germanis Storcken schnabel/hoc est, Rostrum ciconiae. Primum autē apud cap. 122. Dioscoridem sequentes obtinuit appellationes, Pelonitis, Trica; *γερωνίτις*, Herba gruina (Germanis Brannich schnabel) Echimastrum, uel Ouchinastrum, Iesae.

Reliqua quae Maluae folijs uestiuntur, his nominibus insignitae sunt *βέρβερναι*, *μύρρις*, Myrris, quae uox propter folia primo generi potius attribuenda erat, Cardamomos, Origanos, Sed & haec duo nomina alio pertinent. Magi (ut inquit Dioscorides) Hierobricas, Aphricani, Iec, Romani Pulmoniam (Germanice Lungenkraut) & Cicutariam, hoc est, Schielingkraut/ quae appellatio priori magis conuenit, ob foliorum incisuras.

At duo postrema Gerania quae in Dioscoride peculiaria habeant nomina non est dubium, quae si reperientur, non grauabor indicare. Germani tertium Blütwurtz/ hoc est, Sanguinariam herbam nominant, rationem statim audies.

VIRESCIT AC TEMPERAMENTVM.

Vulgaria Gerania non magni sunt in medicina usus, neque multis ad quid faciant Dioscorides scribit, interim tamen dissecta illa ac incisa utendum suadet, ad interna.

INTRINSECVS:

Geranium quod folia habet incisuris diuisa, drachmae pondere in uino potum, muliebrum locorum inflationes soluit.

Postrema a nobis posita herba, quae coepto emicat flore, tota sua substantia in uino decocta, & pota, singulari experimento aduersus calculum facere dicitur, quod ego a calculosis audiui.

EXTRINSECVS.

De alio Geranio quod Germani Gottagnad dicunt, de quo usu illius supra cap. xxxij. diximus. Reliqua Gerania quae Maluae folia habent, usu abdi Dei gratia. cata sunt in medicina.

At tertium quod Blütwurtz Germanis uocatur, ad sanguinem undecum quem manantem compescendum imprimis conducit, quare non immerito Sanguinaria radix appellata est.

De Cannabe. Cap. CXV.

Cannabis sativa.
Zamer Hanff.

1.
Cannabis foemella

2.
Cannabis maioris
descriptio.



CANNABIS NOSTRA Germanica duorum nascitur generum, ex uno & eodem semine, quorum primum optimum ac præstantissimum est, id nimirum quod primum etiam maturo rescit, & flosculos fert exiguos ex luteo albicantes, qui non aliter atque puluis in auras auolant, nullo neque fructu neque semine post se relicto. Caulis illi rectus & inanis, magisque tenuis, & ad pannos conficiendos aptior, maiori Cannabe, quæ semine pregnat. Illius enim caules surculosi sunt, maxime quod ad superiores eorum partes attinet, ut mediocrem arbusculam referat, ramulorum cacuminibus semine tereti, rotundis uasculis concluso, ac per omnia uulgaris Lathyrus similis, undique refertus. Folia utriusque fere eadem nigricantia, & aspera, dissecta, sed inaequalibus diuisuris, nam alia multitudine diuisionum alijs cedunt, ita ut singula explicatae manus quam proxima appareant, eaque alia septenis, alia denis aut duodenis digitis per ambitum

ambustum instar falcis ferratis, conspicua sint. Porro binæ hæc Cannabæ uno ut diximus ex semine procreantur, sed qua ratione hoc intra terram perficiatur, ut altera ex illis fructifera, altera uero sterilis sit, nemo est qui scire possit, ideoq; cum alia multa tum etiam hoc ipsum naturæ esse miraculum necesse est ut dicamus. Cannabis utraq; quotannis uti & aliæ satiuæ plantæ, e' rotundo & dulci semine plantari consuevit.

Miraculum
naturæ.

Cannabis sylvestris apud nos in censu uitiorum habetur, neq; cum descriptione Dioscoridis conuenit. Nam nostra hæc sylvestris Cannabis hirsutum, lanuginosum & nodosum profert caulem, folio aspero uestitum, vriticæ folijs similimo. Surculi qui e' caulibus exeunt in uertice florent, alij purpureo, alij prorsus candido flore, forma ipsa vriticæ Germanis Bynsaug appellatæ similimo, semine per omnia satiuæ respondentem. Nascuntur autem Cannabes sylvestres in antiquis sepulchris & ad uetustos muros, secus marcerias & sepes, asperisq; & incultis locis, odore grauiore & foetidiorē quam satiuæ, pereuntq; quotannis appetente Autumno.

3. 4.
Cannabis sylvestris duplex.

NOMENCLATURÆ.

Cannabis satiuæ, tenuis illa et semine destituta, dubio procul foemella est, nam & mulierculæ nostræ semel appellant, alludentes ad foemellæ uocem. Semel.

Alteræ quæ semen fert Germanis Hanff dicitur, quanquam foemella seu Cannabis satiuæ, ab altera, mascula scilicet, originem suam traxerit. Dioscorides hanc sequentibus appellat nominibus, *ναρναβη, ναρναβίον, ἀρίσιον*, & a' τε. xendis ex ea funibus, *ἐκ τῆς ναρναβῆς*. (Hebrei seu Thalmudistæ potius uocem Græcam imitati קנאפס Kannafos uocant, testis est Elias in nomenclaturis suis) Syluestrem uero idem autor, Hidrastinam & Terminalem, cognominat. Atq; illam nos non habemus, nisi per illam subintellegerit unam satiuæ speciem Dioscorides, aut certe quod puto, caput illud redundat. Nam syluestrem Cannabem primo contra consuetudinem suam ponit loco, deinde satiuam. Plinius tamen tria Cannabis satiuæ genera describit, quarum primam & optimam, Mesam, alteram Milesiam, tertiam Roscam nuncupat, quæ sane de satiuæ duntaxat Cannabæ cum scribere, uel hinc liquet quod syluestris nusquam mentionem faciat. In libro quidem xx. cap. xxii. rem paucissimis attingit uerbis, cum ait, Cannabis in syluis primum nata est, nigriore folio et asperiore, Hæc ille. Sed de nostra uulgari intelligi ex uerbis commode possunt.

Plinius lib. 19.
cap. 9.

Porro Althææ similes caules, & semina proferre syluestrem Cannabem, autor est Dioscorides lib. iij. cap. clvi. quo in loco deficere aliquid existimo, neq; enim caules illius, neq; semen, neq; radix quicquam affinitatis cum Althæa habent. Tamen si ex Plinio locus emendari & restitui possit, ut dicamus,

camus,

Plinius lib. 20.
cap. 23.

Medici differen-
tiam constituunt
inter Scchedene

giquod est se-
men Cannabis,

& inter Scede-

negi, qui est Ema-

tites lapis qui

sanguinem sistit,

et inter Scchete-

regi qui est su-

mus terra. Vide.

Auicennā lib. 2

cap. 665. et 174.

camus, Cannabem recentem adhuc eo Altheæ similem, quod tusa & aqua infusa eam coagulat, non aliter atq; radix Altheæ facere consuevit.

Serapio cap. ccvij. Cannabem, Canabs, & Scchedenegi appellat. Quo pacto autem Cannabis plantari debeat, indicauit Plinius locis citatis, & Palladius titulo v. sub Februariō.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Omnia Cannabis genera frigidam habent temperaturam, ideoq; magis externis quam internis corporis partibus adhibetur, sed & semen iam pridem leguminibus accenseri coepit.

INTRINSECVS.

In Francia Orientali, alijsq; nonnullis regionibus semen Cannabis quotidie inter cæteros cibos decoquitur, non aliter quam Ordeum. Sed in ueritate qui continuo huiusmodi semine in cibo usus fuerit, is non parum lædetur, namq; semen Cannabis stomachum frigidum & debilem reddit, & genituram extinguit.

Idem semen lacte decoctum, & calidum potum, aridam calidamq; tussim emendat & expellit.

EXTRINSECVS.

Resfiones & qui nendo quæstum faciunt, Cannabis usum omnium optime norunt, quem describere longum esset, & proprium requireret librum.

Herba Cannabis recens, nec non & aqua distillata, quibusuis inflammationibus capitis aliorumq; membrorum illita & imposita, in primis autem podagræ calidæ imposita prodest.

Succus herbæ auribus instillatus, uermiculos, & quodcuncq; animal intrauerit, eijcit & necat.

Syluestris Cannabis herba tusa, ac Erysipelatis, & sacris ignibus imposita, morbos eos incidit, discutit, doloremq; & inflammationem tollit.

De Germanico Lino.

Cap.

CXVI.

Q UOD SÆPE DIXIMVS, RVRSVS HOC LOCO DICENDUM EST. Nam quemadmodum quæ ad cibum & medicinam pertinet, affatim Germaniæ nostræ donauit Deus optimus Maximus, ita quibus rebus uestitus parari posset eadem fundit tellus. Quid enim

Linum Germanicum.

Teütscher Flach.



enim deest illi, si respicias necessitatem et ornamentū, quæ duo in uestitu requiruntur. Siquidem non solū Cannabim & Linum nostrum ut aliq̃ populi, habemus, sed & lanam nobis suppeditant oues, & sericū uellus uermiculi, qui Græcis *σεί*, dicuntur, perficiunt, sicut & apud Ægyptios fit. Quæ nos ergo miseros homunciones insana exagitat superbia, ut his nequam contenti, purpuram Damascenam, Holofericū, et id genus preciosissimas uestes è lōginquis regionibus magnis impensis peramus. Sed is est fastus hominum, ex auaritia originem ducens, ut qui illo tenentur, donis Dei sibi collatis non contenti esse uelint. Id quod passim hodie apud nos Germanos (proh dolor) deprehenditur, qui eo ingratitudinis & luxu peruenimus, ut maiorum nostrorum sobrietatis ac modestioritatis penitus obliti, nō nisi peregrinas ac sumptuosissimas uestes, ut interrim de formæ horrenda uarietate taceā, amemus. De cibus, medicamentis & metal

lis, idem est iudiciū. Nam hodie nihil nisi nouum, incognitum, longè peti-
tum, exoticum, & quod plurimum constet, expetimus, spernentes ea quæ
nobis diuina liberalitas contulit. Rogandus est ergo Deus, ut animos no-

stros, tanta peruerfite & ingratitude liberet, donetq; ut dona ipsius agnoscamus, ijsq; cum gratiarum actione ad salutem nostram utamur. Amen.

1. *Linum satium.* Sed ad *Linum* tandem accedamus, est illud herba tenui caule, folijs angustis, tenuibus, Lenti similibus, floribus coeruleis, rotundis folliculis, in quibus semen fuluum continetur latum & læue. Plantatur *Linum* ex semine, idq; in Germania nostra bis in anno, verno scilicet tempore, & interdum etiam appetente Autumno.

2. *Sylvestre Linū.* Sylvestre *Linum satium* plane refert forma, nisi quod caules habet & folliculos crassiores, & maiores, & in summo surculis multis brachiatis. Et maxima inter hæc duo *Lini* genera in eo consistit differentia, quod folliculi sylvestris *Lini* calore solis non aperiuntur, perinde ut alterius, nam quamprimum exiccati sole fuerint, excutere semen ut aliarū frugū oportet. Apud Mediomatrices hoc sylvestri *Lino* aduentate æstate integri agri conferuntur, & inuenitur etiam quandoque inter segetes auenæ.

Alia *Lini* genera peregrina nimirum, hoc loco de Germanico tantum agentes, alijs describenda relinquemus. Qui uero de ijs aliquid cognoscere uelit, necnon de ratione parandi, deq; usu & nocuentis *Lini*, cum nulla sit inter omnes *Lino* & Cannabe, usitatio plantæ, is Plinium legat & Ruellium.

Pli. lib. 19. ca. 1.
Ruellius lib. 2.
cap. 33.

David Kyberus ad Lectorem.

DE ratione apparandi *Lini* copiose & eleganter, & de usu etiam non nihil auctor noster lingua Germanica in Herbario suo scripsit, quam descriptionē transferre in linguam Latinam nolimus, quin potius oculis eam subiecimus, cum quia gratiam & uenustatem sermonis illius exprimere me non posse sentiebam, tum etiam quod locis citatis, latine fere eadem leguntur, & omnibus nota sunt, cum ubiq; terrarum in usu sit *Linum*.

Also ist der flachs ein gemartert Fraut im Teütschen landt / bede von reichen vnd armen / den armen zur notturfft / den reichen zum wollust / ja den edlen fürstin vnd Gräffin kein schand darmit zu kurzweilen. Die plag vnd marter des flachs seind vnzalbar. Erstlich mit ropffen vnd reffen / dann schwerlich ertrenckt werden / darnach auff der Heiden gedörnt / von newem gedroschen vnd geschlagen werden / dann müß er sich lassen zerbrechen vnd schwingen / von diser marter müß er durch die stäbele spieß der ygeln oder hecheln geschleiffet sein / nach diser plag verbint man ihn ein weil / thüt in wider auff / zeücht in von einander / benect in an den galgen des rockens / da würt er geküßt / gelect / vnd durch die finger gezogen / wider auff gewickelt / schnabs abgehaspelt / darnach von newem mit siedem vnd

vnd braten gemartert / ins kalt bad vom warmen geführt / widerumb ge-
henckt / gedörrt vnd mit solben geplawt / vber den stockt geleg / mit vmb-
treiben auff runde fugel gewunden / abgespült / außgestreckt / als dann
durch die engen strassen der Weber geschirz geführt / in ein verbündnuß ver-
knüpft / mit flüchen vnd schelten durch einander geweben . Noch ist er dem
vngesel nit entrunnen / muß aller erst von den schneidern vnnnd negerin zers-
schnitten vnd zerstoßen werden / kompt er dann nach der marter zu den eh-
ren / eilens beklagen sich die francke gute döchter / vnd allerley gesindt / die
wölle alle sampt seiner nit entpären / da wirt er zu windeln / zu pflastern vñ
zu lersch zu arßwüsch gemacht . Vnd so jederman vermeint es sei gar mit
im auß / kompt er doch nach aller vnehe widerumb herfür / doch nit on pla-
gen der wasser mülen / in den selben würt er zerschnitten / gedretten / ge-
stampft / erdrengt vnd erhenckt hoch vnd nider / begeren als dann seiner
von newem . Er würt gehorsam dem Reiser vnd dem Hirten zu land vnd
auff dem wasser / zu nutz vnd schaden / wie man in brauchen will . Der tode
vnd absterben geschicht im vom feuer vnd meüsen / die fressen in gar / also
muß der güt flachs vnd was feins geschlechts ist / vmbkommen .

NOMENCLATVRAE.

Quemadmodum lingua Latina & Græca tela lineæ, & ipsa Lini herba
communi nomine *λίνοϋ*, & Linum dicitur, ita apud nos Germanos Linum
siue in agro siue domi ad texturam & telam apparatus, commune nomen
retinet flachs. Tametsi non desunt qui Linum nondum euulsam, Linum
agreste & Linocalamum, contra uero telam ex Lino textam, Linum dome-
sticum seu urbanum, uocitent. In Dioscoride Annon, & Pænis, Zerapho-
es, cognominatur Linum. Arabes seminis tantum meminere, uocantes il-
lud Bizerichitem, seu ut Serap. placet Bazarichichen. Hebræis פשתן Pi-
stah dicitur, Esaiæ xliij. & xix. Chaldæis כִּינָה Kifna. Vide Targum Onke-
li, Exod. ix.

Serap. cap. 22.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Linum magnæ est utilitatis, sed & multis & uarijs modis incommodat,
quæ omnia ordine describere nulli hominum possibile esse existimo, postea
quam nouis subinde artibus Linum occasionem præbet. Plinius quædam
de ijs attigit, quem uide loco citato. Nos mulierculis ipsum Linum relinque-
mus, de semine non nihil dicturi, quod communi medicorum consensu cali-
dum & humidum esse traditur, quare utrinque corpori adhiberi commode
potest.

INTRINSECVS.

Semen Lini tufum, ac in puluerem redactum, adiecto modico mellis, & piperis, ita ut eclegma ex his fiat, & per diem quantitate nucis moschatae sumptum, tussim mitigat, & venerem stimulat.

Qui internis inflammationibus infestantur, his semen Lini aqua decoctum, admixto melle, in potu exhiberi potest, & foris emplastri instar imponi, quæ medicina plurimum prodest, & quosvis finit dolores.

EXTRINSECVS.

Ad emolliendum uulvæ & interaneorum propter lentam humiditatem obstructions, in colica etiam passione prodest, corpus oleo Lini inungere, aut semen decoctum calidum foris imponere, aut ex iure seminis decocti & oleo clystere injicere, prout unicuique (intelligenti) visum fuerit.

Semen Lini, necnon oleum eius illitu & impositum ambustis conducit.

Semen Lini & oleum, emolliunt omnis generis duritias, parotidas, cutis in facie vitia emendat, semen in uino decoctum, si cum eo facies abluitur.

Vngues scabros emendat semen cum melle & pari Nasturtij modo decoctum & impositum.

Aliæ seminis Lini facultates, emolliendi & sanandi, ex supra dictis colligi possunt, ut interim nihil dicam de oleo seminis Lini, quo pictores & alij, opifices uti consueverunt.

De Linariæ uarijs generibus.

CAP. CXVII.

LINARIÆ HERBÆ MULTA SUNT GENERA, QUAE

L singula ordine recensēbimus. Vulgatissima Linaria cubiti altitudinem æquat, nascitur incultis agrorum limitibus, in muris,


hortis ac secus sepes. Et ubi semel radices egerit, non facile inde expelletur, nam tenuissimis hinc inde & candidis radiculis per terram spargitur, crassa interim & primaria eius radice eaq̃ recta in terram profundius demissa, quam multæ circumdant fibræ, humi effusæ, non aliter quam Lolij. Est autem hæc herba vulgari exiguæ Esulæ adeo propinqua, ut discerni illæ uix possint, tamen si qui diligenter rerū uiuas imagines considerauerit, differentiam facile deprehendet, nam Esula lacteum stillat liquorem, contra Linaria succo eiusmodi caret, hinc versiculus ille,

Esula lactescit, sine lacte Linaria crescit.

Præterea.

L.
Vulgaris Linaria
fid.

Ofyris, Linaria.
Scheiſtraut.



Præterea *Linaria* flore emicat luteo, forma flores *Consolidæ regalis* referens, quorum acumina seu cuspides, umbilicum aut caninum caput repræsentant. Porro in medio horum florum plane lutea ac omni odore destituta exiliunt stamina, quæ in rotundos abeunt folliculos lato semine impar *Gentianæ* referros.

Alterum *Linariæ* genus tam descripto per omnia simile est, nisi quod flores habet multo minores, sub luteos. Hoc in agro *Vormatiensi* è regione oppidi *Algen* inuenitur.

Tertia *Linaria* uulgaris consimilis est, caule & herba, sed elegantior & tenerior, cuius flores in uertice caulium coniunctim collocati sunt, et multiplices, forma & colore ad *Amaranthum luteum* accedentes, sed maiores & magis rubicantes.

Est & alia *Linariæ* species, cauliculo tenuissimo, folio angustissimo uestita, nascitur in altissimis & asperis campis, nonnunquam in ijs locis ubi *Iuniperi*

2.
Altera Linaria.

3.
Heliochrysos.

4.
Linariæ quarta species.

proueniunt. In summis colliculorum partibus cœruleo et elegantissimo emicarfosculo, forma & colore *Lino* simili, odoris gratissimi ac suauissimi, floret Iulio mense,

Linaria tertium genus.

Das dreit Lynfraut.

5.
Vera Linaria.

Vera autem & quæ pascim occurrit Linaria, Lino adeo similis existit, ut ab illo uix separari possit, unicus coliculi planta, inter Linum prorsum, multis cauis & acuminatis folliculis prædita, in quibus copiosum & luteum ac exiguum continetur semen, vulgaris hortensis Nasturtij semini affine, gustu dulce, auiculisq; pascendis commodissimum. De hoc stirpis genere, secundo commentariorum nostrorum libro. cap. xxvij. plura docebimus, Deo fauente, nunc ad nomenclationes pergamus.

NOMENCLATURAE.

Priores duæ Linariæ species, Germanis Lynfraut/Harnfraut/Flachsfraut (quod scilicet Lino aliquantulum respondeant forma sua) Scheißkraut/et Nabelkraut/dicuntur. Quidam etiam Wild wolffsmilch uocant, hoc est, syluestrem Esulam. Latinis Pseudolinum, Linaria, Vrinallis, Adulterina Esula, quarum appellationum nonnullæ alijs quoque tribuuntur plantis, uidelicet Vrinallis, Germanice Harnfraut/Saxifragiæ alias & Ononi, quibus de suo quoque loco dicitur, assignatur. Multi proinde sunt qui priorem Linariam, quæ nonnullis Gäl ritter sporen/ hoc est, Consolida rega

tur plantis, uidelicet Vrinallis, Germanice Harnfraut/ Saxifragiæ alias & Ononi, quibus de suo quoque loco dicitur, assignatur. Multi proinde sunt qui priorem Linariam, quæ nonnullis Gäl ritter sporen/ hoc est, Consolida rega

da regalis lutea (sic enim interpretandi gratia liceat nobis dicere) appellatur, ad caput Dioscoridis cxxxviiij. lib. iij. referri debere, & Oſyrin uocari ^{ſeupe.} contendant, quod per nos nequaquam impediatur. Verum enim uero ſi & mihi meo ſenſu abundare liceat, uidetur ſane ea planta rectius Cynocephalia dici poſſe, quæ in Ægypto (ut prodidit Apion Grammaticus) Oſyrites cognominatur, & aduerſus ueneficia à Magis uſurpatur. Vide Plin. libro xxx. cap. ij. Duæ uero me mouent rationes, cur hanc Linariæ ſpeciem Cynocephaliæ nuncupandam exſtimem. Primum quidem quod flores eius caninum caput, quod oblongum eſt, repreſentent, deinde uero quia ſingulari medicamento oculorum epiphoris adhibetur, quod non ſolū Apuleius & Hieronymus Braunſchuueig teſtati ſunt, ſed & ego experientia ac obſeruatione longa didici. Apuleius Cynocephaliū ſuum, Antirrhinon, Buccranion, Burrhinon, Ametiſton, Anarrhinon, Pithecion, Oſireos taphen, Canis cerebrum appellat, quæ nomina pro maiori parte ad eam quam ſequenti ſtatim capite deſcribemus herbam, pertinent. Sed credibile eſt apud ueteres non multis rem herbariam curæ fuiſſe, quin potius quemq; ſua aſcripſiſſe nomina, quæ ſibi arridebant, quod hodie quoq; fieri uidemus. Quot enim fere regiones, tot & herbarum, alię atque aliæ ſubinde reperiuntur appellationes. Si itaque Linaria noſtra, Oſyris eſt, certe nomen ab interfecto rege Oſyre traxit, qui laudis aucupandæ gratia ex Græcia in Ægyptum ^{Oſyris.} commigrans, Deus eſt habitus, & ſub imagine bouis adoratus. Quæ quidem ſi ſint uera, Anthirrinon rectius Oſyris diceretur, cum Linaria noſtra forma ſua caninum caput, & Anthirrinon vitulinum naſum repræſentet.

Tertia Linariæ ſpecies magnis illis corymbis, ſeu multiplicibus, & rotundis floribus, qui Amaranthum luteum imitantur, ornata, ſecundum deſcriptionem Dioscoridis Heliochryſon ego appellarem, et ad illud ipſum Dioscoridis caput referrem, nam folia habet acuta plane & aſtrieta, non multo aliter quam in Abrotono uidere eſt. Præterea non in ſyluis naſcitur, ſed in campis ſub dio uerſatur, arenosis & humectis incultis & apricis agrorum limitibus. Sed quæcunque tandem habeat apud Dioscoridem, ego ſane nullum apud Germanos illius nomen unquam cognoscere potui, quapropter à forma Lynfraut/ hoc eſt, Linariam, à floribus groſß Rheinblumen/ id eſt, Amaranthum maiorem nuncupauit.

Quartam quæ in aridis campis, ubi Iuniperi luxuriant, prouenit, quæq; cœruleo emicat ſcloſculo, ueluti Linum, à forma Heiden flachs/ id eſt Linū campeſtre uocaui, cum aliud nomen non haberem.

Quinta Linariæ ſpecies, quæ ſemper inter Linum reperitur, Germanis Dorr/ id eſt Zizania, communi omniū uiciorum, quæ inter fruges enaſcuntur, nomine appellatur. Eſt uero illa nihil aliud quam Pseudolinum. Ruri in agro Vormatiendi Dorrerfraut/ & in Alſatia Bimmel/ & Bluel dicitur.

Porro de hac ultima Linariæ specie, plura infra lib. ij. capite. xxvij.

VIRE S A C T E M P E R A M E N T V M.

Vulgaris Linaria alui turbatrix est, tēperamenti humidi & calidi. Extrinsecus maiorem habet usum, in ijs quæ refrigerationem potius quam calefactionem requirunt. Aqua enim in linteolis imposita id præstat.

I N T R I N S E C V S.

Aquæ distillatæ herbæ Linariæ vulgaris, quantum vitrum exiguum capit, admixta drachma corticis Ebuli in puluerem redacti, sumpta potio, * urinam potenter cit, quare hydropicis tantum id medicamenti exhibendum erit.

Eadem aqua distillata ac pota, aluum laxat, morbum discutit regium, * aduersus quem herba ipsa uino decocta ac pota inprimis facit, sicut & iecur obstructionibus liberat.

E X T R I N S E C V S.

Linariæ aqua distillata, aut succus eiusdem oculis indicus, inflammationes eorum & ruborem tollit.

Linaria, aqua eius, & succus quæuis ulcera mundant, cuiusmodi sunt, cancer, & fistulæ, linteolis imposita, & si cum aqua loci affecti colluantur.

Succus idem maculas & uitia faciei emendat, quare superbis mulierculis, quæ puram & immaculatam faciem affectant, conuenit.

De quinta Linariæ specie, Germanis *Doit* appellatur, quæ esca est auicularum, secundo libro inter fruges, nonnulla annotabimus. Nunc de Heliochrysi uiribus speciatim discremus,

VIRE S H E L I O C H R Y S I.

Linaria quam ego, Heliochryson nominavi, utrinque corporis affectionibus adhibetur.

I N T R I N S E C V S.

Herba cum floribus uino decocta & pota, ueneficia amoris, & alia uena expellit, conuulsis & ruptis prodest, necnon ad disijciendos sanguinis concretos grumos facit, menses & secundinas euocat.

Flores siccati, in puluerem deinde redacti, ac pondere ij. drachmarum in uino poti, ieiuno stomacho, frigidum capitis cohibent fluxum, qui alias Catharrhus dicitur.

E X T R I N S E C V S.

EXTRINSECVS.

Flores isti in balneis sudatorijs, & uaporationibus, calculi, lumborum, matricis, & coxendicum affectionibus medentur.

Flores resiccati, arcis uestiarijs inspersi, uestes ab iniuria tinearum asscunt,

De Antirrhino. Cap. CXVIII.


VLIERCVLAE MEDIUM MATRICES SVAS PECV-
 M liares herbas habent, quibus liniendis lectis suis, (quod illi *Be. Hinc ista & alie*
streichen dicunt patria lingua, aut, *Stercken*) uti consueverunt, *herbe Streich*
 præsertim uero cum linimenta illa colore croceo tingere uolunt, inter quas *Freutter / uel*
 & Antirrhinon connumeratur. Ad quam rem perficiendam Alsata cro- *Sterck Freutter*
 cum Sarracenicum, & qui agrum Vormatiensem incolunt, Chamomil- *dicuntur.*
 las luteas, quas illi ob id *Streichblumen* uocant, & alij nonnulli Tinctori-
 um florem, quem alias Germani *Ackerpfrimmen* dicunt, usurpare solent.
 Quam uero nunc præ manibus habemus plantam, ea incultis arcis, limiti-
 bus agrorum, & secus itinera nascitur. Primo quidem anno nullum emit-
 tit ex se caulem, sed folia eius, quæ habet oblonga, angusta, nigricantia, &
 quasi corrugata, humi proeumbunt, e quibus altero demum anno, pro-
 cერი, teretes & concaui exiliunt caules, nonnunquam bicubitales, multisq;
 ramulis & surculis brachiati. Caules ipsi inferne angustissimis & prælon-
 gis folijs circumcirca uestiuntur. Folia violarum candidarum uel lutea-
 rum folijs similia sunt, sed longiora, uiridiora, & corrugata ac plicata. Flo-
 ribus caules quamplurimis et luteis, ex ordine collocatis, undique ornan-
 tur, non aliter quam Verbascorum genera. Ex his flosculis, suboriuntur
 folliculi, instar crucis dissecti, ac quadripartita distinctione hiantes, quorum
 singuli uitulinas imitantur nares. Atque in his ipsis (ut ita dicam) naribus
 semina nigra & perexigua latent, minora semine Portulacæ. Porro sponte
 sua hæc herba seritur; radicem habens mediocris magnitudinis, albam, re-
 ctamq; & Foeniculo similem. Herba eius utuntur (ut diximus) sicca, & re-
 centi ad tingenda linimenta lectorum.

NOMENCLATURAE.

Linaria, uti superiori capite meminimus, ab Osyre rege, (qui a fratre
 suo Typhone interfectus, ab Iside uxore Memphi Ægyptiaca vrbe hono-
 rifice sepultus, ab Ægyptijs deniq; adoratus fuit, cum enim ad sepulchrum
 eius Bos apparuisset, illi regem suum esse rati, phanum eo loco ædi-

Antirrhinon.

Orant / oder sterckkraut.

Lychnus syl-
vestris.Τύρο & ἰσχυρὸν
τῆς ἀντιρρίνου.

que peculiare aliquod describat, aut ueterum scripta, non satis bene se habere, conijcere liceat. Nam Theophrastus lib. x. de plantarum historia cap. xxi. suum Antirrhinon, uel ut ipse appellat Antirrhizon, simile esse Apari-

ficantes, simulachro bo-
uis in illo constituto, di-
uinos ei honores exhibue-
runt) appellationem suam
obtínuit, sicut & pleræque
insignes plantæ, a regibus,
& inuentoribus suis nomi-
na sortitæ sunt. Verum si
paulo diligentius rerum ui-
uas imagines cōsideremus,
nonne Osyreos nomencla-
tura huic nostræ (quam
Germani Orant / & Medio
matrices Streichkraut /
aut Sterckkraut uocitant)
Tinctoriæ herbæ potius
tribui potest, postquam se-
minis eius foraminulenti fi-
gura, & forma uitulinis na-
ribus satis responderet. Rur-
sus ut dicamus de Linaria,
an non illa si flores spec-
tes rectius Cynocephalea dice-
tur? Dioscorides certe præ-
sentem plantam *αντιρρίνον*,
αντιρρίνον, *λεχνίδα ἀγρίαν*, id est,
Lychnidem syluestrem ap-
pellat. Galenus Bucranion.
Gaza uero Antirrhizon no-
minat. Quantum autem ad
descriptions Antirrhini at-
tinet, quæ passim a pud au-
tores exant, notandum est
illas ualde diuersas esse, ut
uel hinc plura genera An-
tirrhini esse, cum unusquis-

næ testa-

na testatur. Dioscorides Anagallidi folijs & caule, Marcellus deniq; Vergilius Hederę confert. Iam quid magis a se inuicem distat quam Aparine, Anagallis & Hederar' præterea nulli ex his Antirrhinon nostrum forma respondere manifestum est. In hoc tamen omnes conueniunt, quod & certissimum est, semen Antirrhini utulinos nares repræsentare, quod in hoc nostro Antirrhino euidentissime apparet. Ego sane Dioscoridis lectioni ita succurri posse, & ita omnino legi debere arbitror.

Violis, quas Leucoia uocant, caule & folijs similis herba est. Flores habet, purpureis Anagallidis flosculis similes.

Quod si hoc pacto, ut demonstrauimus, Dioscorides legeretur, posset fortassis, ut certū aliquod Antirrhinon inueniremus. Nolumus autem in his & alijs quicquam affirmare, parati interim, meliora docentes audire & sequi. Plinius suum Antirrhinon, Lino confert, quæ uerba ego de Linaria su *Plinius lib. 25. cap. 10.* periori capite descripta intelligo, & uidetur mihi illa esse ipsa Cynocephalea herba, cuius meminit Apuleius ca. lxxxvij. Hinc facile colligere est, non ualde magnum inter Antirrhinon, & Linariam apud ueteres discrimen habitum esse.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Hoc Antirrhino apud nos Mediomatrices non nisi linimentis lectorū luteo colore tingendis usurpatur, & si quid iudico, calidæ & humidæ temperaturæ est. In exterioribus tantum corporis partibus usum suum hodie habet.

EXTRINSECVS.

Dioscorides testatur Antirrhinon amuletum esse, aduersus ueneficia amoris, si quis illud adalliget, & secum deferat, atq; tum neminē Philtris, alijsq; id genus artibus decipi posse. *Diosco. lib. 4. cap. 128.*

Deinde ferunt etiam commendatiores omnibus eos reddi qui hanc herbam secum portant. Ego non dubito quin elegantiores & crocei coloris efficiantur, præsertim si se hac herba tingerent.

Mulierculæ hanc herbam siue sicca sit, siue recens, in aqua cum alumine decoquunt, tingendis linimentis, ut diximus.

De Malua Romana, seu hortensi, & Alcea.

CAP. CXIX.


VM MALVARVM MULTA SINT GENERA, DE ILLIS porro agemus, initium ab hortensiana facturi. Ea ex semine

quod

Malua hortensiana.

Malua Romana.

Ernrosen.



quod illi numerosum, ac ca-
seoli in star coagmentatum,
uiridi ac lanuginoso folli-
culo reclusum est, planta-
tur. Et primum quidem ex
eo semine terræ mandato,
bina emergunt rotunda fo-
liola, obolum lata, postea
uero maluacea, ac plu-
ra subinde & maiora, ita
quidem, ut nonnulla palmi
amplitudinem facile obti-
neant, succrescunt. Altero
deinceps anno appetente
Iunio mense teretes exiliunt
caules, medulla sua referti,
qui nonnunquam instar uir-
garum Coryli, grandescunt,
ut usum baculi præbeant.
Ii undique rotundis & aspe-
ris folijs uestiuntur, quorū
aliqua quinis diuisuris dis-
secantur, ueluti Alchimil-
la, quam alias Leontopo-
dium nominant. Inter folia
& caules, partim capitula,
seu florum prægnantia in-
uolucra, partim rosæ ipsæ
se se pandentes enascuntur,
illis decidentibus aliæ suc-
cedunt, qui fit ut alternis &
per uices a Iulio usque in hye-
mem ipsam, rosæ aliæ, qua-
si curriculo uitæ suæ absolu-
to decedant, alijs in locum
succedentibus, aliæ item se-

mina decutuntur, & uicissim aliæ ad maturitatem properent. Porro produ-
cithæc Malua aliæ rosas candidas, aliæ rosei coloris flores, aliæ plane ru-
bras, aliæ ex rubro colore nigricantes, & rursus uniuersa hæc florum gene-
ra in

Alcea.
Sygmarswurcz.



ra in quibusdam multiplici
 in alijs simplici foliorum
 textura, differunt, omni o-
 dore destituta. Radix om-
 nium longa, levis, & candi-
 da, gustu glutinosa & len-
 ta. Seritur autem nullis nō
 in hortis, sicut & reliqua flo-
 rum genera.

Sylvestre huius Maluæ
 genus passim incultis agris
 & graminosis agrorum et *Alcea.*
 apricis limitibus; e radice *Sygmars-*
 sublutea, longa; & duos di-
 gitos crassa, nascitur. Folia
 habet rotunda, & singula
 profundis, ac quinque par-
 titis, aut senis incisuris dis-
 secta, Caudex fundit cubita-
 les, Julio mense ex rubro
 roseis nonnullis etiam can-
 didis flosculis, usque elegan-
 tissimis, & minoribus per
 omnia quam sint hortensia-
 nae, emicantes. Semen eti-
 am in hac, terete & caseolū
 imitante forma, compactū
 folliculis includitur, quod
 ubi aruerit, & in nigrum
 colorem uersum fuerit, pro-
 tinus in terram decedit, un-
 de altero anno repullulasce-
 re pro more aliarum quo-
 que plantarum assolet.

De uera & sativa *Alcea*,
 quæ e Norimberga primum ad me allata fuit, secundo libro dicemus.

NOMENCLATURAE.

Nobilem hanc Rosam, hortensem inquam Maluam, Metenses Rosam
 ultramæ-

Dicitur illa quæ a nonnullis ultramarinam uocant, Germani *Ern Rosen*, quod scilicet tempore Messis floreat, uel *Herbstrosen*, aut *Winter rosen* / quod a messe usque ad hyemem floreat. Estque illa uera hortensis seu Romana Malua (Germanis *Garten/ Römisch Pap* oder *Römisch Pappeln*) quod Theophrasti satis confirmat autoritas. Is enim lib. i. cap. v. hist. plant. Maluam intra senos aut septenos menses, arbor- rescere quasi, & in altum agi, ac ita crassum caulem acquirere, ut illo tãquam baculo uti & inniti possis, cui sententiæ Dioscorides quoque li. ij. ca. cix. sub- scribit apud quem sequentia eius nomina extant, *μαλάχη*, Anthema, Diade- ma, Chocortem, Caprælien, Muris cauda, Malua hortensis. Proinde apud ueteres Molochæ dicta fuit hæc Malua, ut uidere est in Aulularia Plauti, in qua Molochinarios eos uocat, qui purpura tingeant pannos. Præterea Lucius Columella idem hoc uersiculo testatur.

Et Molochæ prono sequitur quæ uertice solem.

Quo loco obseruandum est, cum dicit Maluam solem sequi, id in minori Malua maxime uideri, nam illa semper folia sua, & flores uersus solem agit.

Serapio ca. 149. Arabes Maluam Romanam, alij Molochiam, alij Muluchiam arboream uocant, & semen eius Bizeri Katmi. Hebræi seu Thalmudistæ, Maluam *חלבית* Chalmuth, & *חרני* Harni appellant, teste Aruch Monstéri. Quod ad alteram pertinet, syluestrem nimirum, dicitur illa Germanis *Sygnars wurzel* / & *Symons wurzel* / id est Radix Simeonis. Dioscoridi & Plinio *ἀλμια*. Barbarus putat eam esse, quæ cauda Leonis dicitur, cuius Poëtæ meminerunt. Alij Peristerion nominant, cum tamen ad Verbenam & Fumariam (de qua supra cap. lxi.) pertingat ea nomenclatura.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Omnia Maluarum genera (sub quibus & Ibis cum comprehensum uolumus) humidæ sunt naturæ, & mediocris temperaturæ, teste Constantino lib. v. cap. xvi. quibuscunque corporis affectionibus utrinque cum primis saluberrima, quare inter olera culinaria & acetaria non postremum debent habere locum. Atqui horrensianæ maximarum sunt uirium, præsertim uero ad emolliendam aluum, quod his uersiculis innuit Marcialis Poëta.

*Exoneratur aluum mihi uillica Maluas
Attulit, & uarias quas habet hortus opes.*

INTRINSECVS.

Maluæ Romanæ, radix aut semen, si uino uel lacte decoctum per aliquot dies

dies bibatur, calidam tussim tollit, exulcerationi pulmōnis medetur, estq; singulare aduersus phthisin remedium. Quisquis ergo huiusmodi morbis infestatur, is in cibo et potu Maluis continuo utatur, folijs scilicet, radice aut semine, aut si quod ex his magis illi arriserit. Possunt etiam ex rosīs Maluarum Syrupi, ut uocant, & conseruæ, confici, ac Zaccharo condiri, quod & in alijs floribus facere solemus.

Et quod hic de Malua Romana dicimus, de omnibus Maluæ generibus intelligi uolumus.

Herbæ & radices Maluæ cum Fœniculo & Anetho uino decoctæ, & potæ, lactantibus copiam lactis adserunt.

Hoc pacto usurpatum idem remedium, erosionibus uesicæ & intestinorum confert, aluumq; subducit.

Aqua ex Romana, aut alia quauis Malua distillata, ac continuo pota, mirifice facit ad omnes internos febrium ardores, refrigerat illa & emollit omnia pulmonis & laterum mala, quæ uicia alias Peripneumoniam, & pleurisin uocant Medici.

Eadē aqua pari ratione pota, sanat & mitigat dysenteriam, calidos matricis renum, & uesicæ abscessus per sanat. Idem præstat id semen in iure gallinaceo decoctum & potum.

Syluestre Maluæ genus, quam Alceam uocari diximus, si herbæ & radicis uino uel aqua decoctum bibatur, torminibus intestinorum remedio est, ruptis & conuulsis conducit, & opitulatur.

EXTRINSECVS.

Maluæ Romanæ (quod et de alijs generibus intelligas) flores uino aut aqua decocti, interdum etiam admixto melle & alumine, prout affectiones id postulare uidebuntur, exulcerationem oris & colli sanant & mundant, gargarizati, & parumper in ore retenti.

Flores Maluæ Romanæ decocti aqua, aut aqua ex illis distillata, remedium est præstantissimum, aduersus ardorem gulæ, omnesq; tam internas, quam externas inflammationes, sacros ignes, anginam, aliosq; tumores, gargarissatu uel lineis lintcolis impositu.

Aqua uel succus omnium Maluarum, contra aculeatos apium & uespærum ictus, illitus facit.

Oleum ex Maluæ floribus confectum, ac illitum, ne quis feratur ab illis animalculis hominem præseruat.

Folia Maluæ cum radice in urina decocta, ulcera capitis manantia, furfuresq; sanant si caput illa decoctione abluas.

Aqua

Aqua Maluæ quæuis calida uulnera sanat, & ad sanationem mature ea urget.

Possunt etiam omnes externi abscessus, folijs radice, & semine Maluæ resolui & emolli. Quidam adipem purissimum addunt hjs medicamentis.

Aduersus tumores epatis, lienis & matricis, accipiantur Maluæ herba, radix & semen, & cum farina ordeacea in aqua decoquantur, cui admisceatur oleum oliuæ, uel rosarum, ex his omnibus deniq; emplastrum conficiatur, imponaturq; locis affectis, id quod non sine magna utilitate fiet, nã resoluendi, discutiendi, & emolliendi omnes calidos abscessus uim obtinet, huiusmodi medicamentum.

Eadem emplastra sacris ignibus & alijs id genus inflammationibus auxiliantur, & impactos corpori aculeos resigunt.

Omni bus clysteribus flores, radices & semina Maluæ, propter sanandi uim mirificam adijci debent.

Qui calculo renum molestantur, h̃s sacculum folijs & radice Maluæ repletum in caldario cum aqua decoquant, ac ea aqua balneentur, quod cum fecerint, meatus qui ex renibus in uesicam descendunt, partim angustis, partim tumoribus obstructi dilatabuntur & aperientur, obstructionibus liberati.

Eo Balneo si ad pedes utaris, fluxiones in caput eleuatas deduces, ac descendere coges.

Breuitè Malua Romana, Alcea, Malua uulgaris, & Ibisus, omnibus talidīs doloribus totius corporis apprimè conducunt.

De uulgari Malua, quam Germani *Bäß Pappeln dicunt. CAP. CXX.*


VULGARIS MALVA IN DVO QVOQVE GENERA distribuitur, & alia quidem maior, alia minor appellatur. Nasctur utraq; inculta terra in pagis, hortis, cœmiterijs, secus itinera, et sepes, et fere ubiq; locorū. Vulgatissima eadēq; uilissima maximi apud me-
dicos nostri tēporis est usus. Ea rotunda habet folia, subpurpureos flores, exiguis uenis inferne interstinctos, caulem aliquando cubitalem. Porro flosculi qui cauli adnascuntur, in rotundos casculos abeunt, quibus pueri lusufus gratia in plateis negotiantur. Atq; hoc semen illius est.

1.
*Malua uulgatissi-
ma.*

2.
*Malua uulgaris
altera species.*

Alteræ uero huius Maluæ species, foliorum, radice, caulium, & seminis magnitudine, proceritate, & crassitie, uulgarem illam excedit. Et flores etiam huius maiores sunt, et plus ruboris habent, & multis purpureis uenis distin-

Malua vulgaris.
Gemein Käß Pappeln.



distinguntur, ac forma uniuerſa florem Alceæ reſ-
preſentant. Nec deſunt qui
putent huius Maluæ folia
cum ſole circumagi, quod
quidam copiè humiditatis
quæ illi ineſtaſcribunt. Vi-
de hac de re Columellam
libro decimo.

NOMENCLATVRÆ.

Germani has plantas
Papeln/uocant, commu-
ni multis alijs herbis no-
mine. Nam Mediomatri-
ces quaſuis latifolias ſtir-
pes, maxime incognitas, ea
appellatione notant. Quo
tamen binæ eius ſpecies di-
ſcerni poſſint, ſolent illi, pri-
mam exiguam illam a ſe-
minis figura Käßpappeln/
Kaſenpappel/ Genßpap-
pel/ & maiorem Roßpap-
peln/appellare. Dioſcori-
di μαλάχη ὀξυφύλλη ἢ χροαῖα, Mal-
ua agreſtis, ſeu inculta terra
proueniens dicitur. Serap.
Maluam Chubeze, & ſemē
illius Bizeri Chubeiz no-
minat. Apud Latinos Mal-
ua a molliendo, nam aluū
emollit uſurpata, nomen
obtinuit, qua de cauſa, Mol-
ua Varroni dicta eſt.

Dioſco. lib. 2.
cap. 109.

Serap. cap. 149.
Auicenna lib. 2.
cap. 199.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vulgares Maluæ ſere calidæ & humidæ ſunt qualitatis, eaſdemq; ha-

bentuires, quas & fatiua. Vide de Malua Galeni de aliment. facult. lib. ij. Tit. Malua. Nequetantum in medicina suam laudem sortitæ sunt Maluæ, sed & in coquinis locum suum inuenere, nam ex his, & alijs Maluæ generibus acetaria confici possunt, teste Platina lib. iij.

INTRINSECVS.

Plinius scribit si quotidie quis succi ex qualibet earum sorbeat cyathum dimidium, eo die ab omnibus morbis qui accidere possent præseruari.

Succus Maluarum potus aduersus morbum comitiale facit.

Recentia & tenera Maluæ folia cum sale commanducata, ritu acetariorum aliorum Ægylopas sanant, qui sunt abscessus inter maiorem oculi angulum, qui ruptus si negligatur in fistulam abit &c. uerum enim uero eidem abscessui folia Maluæ tusa cum melle imposita alligare conuenit.

EXTRINSECVS.

Maluæ tota sua substantia quibusuis ulceribus & tumoribus auxiliatur, quemadmodum superiori quoque capite docuimus.

De Althæa. Cap. CXXI.

BISCVS LANUGINOSVM, ET MOLLE GENVS
E Maluæ est, & dubio procul omnium reliquorum saluberrimum acutissimum, id quod uel nomen Althææ a nobilitate effectus illi impositum testatur, nec non consensus Chirurgorum apud quos semper magno in usu & existimatione fuit. Nascitur autem illa locis humentibus & pinguibus, nimirum pratis uliginosis prope fossas, & paludes, cæterasque aquarum collectiones, & in hortis etiam, si eo translata plantetur. Radix quæ illi candida est & uiscosa, ac multis adnatis radiculis fibrata, & quorannis novos purpurei coloris ocellos, non aliter quam Elenium protrudit, qui in proceros & rotundos caules sub Maium mensem exeunt, multis cineraceis & lanuginosis in fastigium usque folijs uestitos. Inter folia uero mollia, ac rotundos coliculos candidi (& nonnunquam sublucci) erumpunt flores, Campanulæ formam representantes, intra quos apices hirsuti, ac purpurei uisuntur. Floret apperente Iulio. Semen cum uulgaris Malua idem habet, at magis gustu dulce, & lubricum ac glutinosum.

NOMENCLATVRÆ.

Germani *Ybis* hanc plantam uocant, nomine ab *Ebis*, siue *Ibis* uoce tracto.

*Althæa.**Ybisph.*

uam, forte ab excellentiâ uirium & efficaciâ quæ in radice potius quam folijs spectatur. Ea tusa & aquæ imposita, addensari illam atq; congelasce-
re facit, quemadmodum Consolidæ maioris radix, qua ratione colligi fa-

tracto, qua in lingua Heil-
wurtz, seu Hilffwurtz iure
appellari posset, à mirifica
sanandi uir quæ illi inest, si-
cut & Græcis ἀλθαία, hoc est,
Medica belle dicitur. Alias
ἰβισκός & ἰβισκός, unde procul-
dubio Germanica uox Y-
bisph descendit. Plinius Pa-
stinacam hibiscum uocitat,
id quod hoc loco impedi-
mento notis esse non de-
bet. Galeno Anadendro-
malache, hoc est, Arborea,
uel Arborefcens Malua di-
citur, quæ nomina ut mihi
uidetur rectius Maluæ Ro-
manæ tribui possent. Bar-
barus Aristalthæam nuncu-
pat. Theophrastus & Ma-
cer Maluam agrestem, illâ
uocant, quod nomen uulga-
ri Maluæ rectius ascribe-
tur. Nonnullis olus Iudæi-
cum, hoc est, Germanice,
Judenkraut. Dioscorides
Althæam & Ibiscum appel-
lat, aitq; eam esse genus a-
grestis Maluæ, unde id no-
minis hactenus habuit. Ne
mo tamen est, qui non &
Hibiscum & Maluam agre-
stem discernere possit. Medi-
ci nostræ ætatis plurimum
usurpant Hibiscum, eumq;
Maluauiscum, & Bisimal,
Ebisph, ibiscus,
& cum aspira-
tione Hibiscus
passim apud au-
tores indifferen-
ter usurpantur
pro Althæa.

Serap. cap. 76. cile potest, dysentericis & alui fluxionibus cohibendis prodesse. *Serapio* Althæam Chitini uocat, & Rosam Zaneni dici quoque testatur, sed posterius hoc nomen Maluæ Romanæ ego tribuerem. Rursus alio in loco idem *Serap. cap. 207.* autor Alfam illam dicit.

VIRE S. A C T E M P E R A M E N T V M.

Inter omnia Maluarum genera Hibiscus, propter insignes quas obtinet facultates, utrisq; corporis partibus curandis eligitur. Estq; ille temperamento suo fere calidus & siccus.

I N T R I N S E C V S.

Radix Althææ uino aut aqua mulsa decocta, ac pota, medetur quibusuis internis pectoris & pulmonis uitijs, & ut paucis multa dicam, uniuerso corpori confert hæc medicina.

Eodē pacto usurpata radix erosiones intestinorum, ex dysenteria, aliaue Cholerae causa profectas persanat. Iisdem facultatibus pollet aqua distillata.

Ea Astmaticis propinatur utiliter.

Aliæ si quæ Althææ uires desiderentur, sub Malua Romana descriptæ reperientur.

E X T R I N S E C V S.

Quæcunque de Maluis dicuntur, ea dupliciter de Althæa intelligi debent, quo nomine a nonnullis Bismalua uocitur.

Radix minutim concisa, inq; lacte aut aqua decocta, quousque in pul-tem euadat, & emplastri ritu imposita, emollit, & maturat quæcunq; ulcera, quæ sponte sua suboriuntur, quale id est quod in manibus sæpenu-mero nascitur, & a Germanis das Mittel/ nuncupatur, necnon alia huic similia, quacunque corporis parte oriantur.

Oleum ex folijs Althææ confectum, omnes apum ac vesparum aculeatos ictus persanat, illitu. Idem possunt folia per se.

Radix in aqua cocta, adiecto suillo adipe, aut anserino, & terebinthina, in pessis subdita, facit ad inflammationes uulua, & mariscarum. Eodem munere fungitur aqua distillata.

Semen in puluerem redactum, & cum rore qui Maio mense excipitur, temperatum, uittiliginēs & maculas faciei emendat.

Radix, aut semen in aceto decocta, ac calida in ore retenta, dolori dentiū auxiliatur.

Proinde apud Medicos equarios magni nominis & usus est hæc radix.

*De Scrophularia, seu (ut quidam uocant) Por-
tulaca maiore, Germanis Wundkraut.
CAP. CXXII.*

*Scrophularia.
Wundkraut,*



INTER OMNES PLAN-
tas uix alia reperitur quæ
diutius uireat, & ab interi-
tu uindicetur, hac ipsa no-
stra Scrophularia, qua de
causa nonnulli, præsertim
Mediomatrices in uigilia
Diui Ioannis illa ad super-
stitiones suas, uti & Arte-
mista, utuntur. Nam quam
primum ea dies transierit,
suspendunt hanc herbam
in conclauibus suis, alijs et-
iam parietibus imponunt,
& supra ianuas collocant,
quibus in locis longo tem-
pore uiret, & continuo re-
pullulascit, ita ut circa festum
Natiuitatis uiuentem eam
reperias. Hoc uero illi fa-
ciunt, ea spe & fiducia per-
suasi, qua credunt illi homi-
ni qui herbam suspenderit,
nullam lethalem ægritudi-
nem accidere posse, tanti-
spem dum illa incolumis sit,
& uigeat. Sed relictis his
superstitionibus, descriptio-
nem eius potius audiamus.

Nascitur illa sine ullo ne-
gorio, & præcipue locis um-
brosis, radice multiplici
candida, & torosa, impli-

cata & perplexa, referunt autem singulæ radiculæ per se formam Rapuncu-
lorum, ut uulgo uocant, sapore dulci præditæ. Apperente Maio mense
teretes emittit caules, qui usque ad fastigium rotundis, pinguibus, succulen-
tis, ac Fabæ similibus folijs, usque aliquibus instar cristæ gallinacæ crena-
tis, & incisfis uestiuntur. Atque si caules Iulio & Augusto mensibus flores
ferunt in umbellis elegantissimos, purpureos, odoris omnino expertes, in-
star foliorum Origani, sed multo pulchriores, & magis purpurantes, sin-
guli stellæ figuram æmulantes.

NOMENCLATURAE.

Cum aduersus hernias hæc herba usurpetur, apud Germanos Bruch-
murtz appellata est, & Knaben Fraut. Sortita est autem & alia nomina nam
a sanandi facultate Mundefraut, & a forma radicum Zumpenfraut, Foz-
wein, & Fozzwang, a superstitione uero cuius ab initio meminimus S.
Johans Fraut, a similitudine denique foliorum, quæ illi est cum Faba, Bo-
nenblatt dicitur. Et hæc quidem de Germanis eius appellationibus dicta
sufficiant. Cæterum quod illi in Dioscoride sit nomen, Herbarij nostri ni-
hil dum exposuerunt certi. Nam alijs Scrophulariam, alijs Fabam gros-
sam, alijs Portulacam maiorem, alijs postremo Semperuiuum nominat.
quod ad nos attinet, subscribimus opinionibus duabus possemis. Nam si
respicias formam, Portulaca maior non inepte diceretur, licet nemo antiquo-
rum herbariorum ita uocauerit hanc herbam, rursus si perpetuitatem eius
consideres, quid obstat quo minus *Acizoon* uocetur? Et uidetur mihi omnino
esse Acizoon, non quidem illud quod Dioscorides lib. iij. cap. lxxxv. sed
quod libro eodem capite liij. describit & Chrysocomen appellat. Et quam-
uis nomina quæ eo loco adfert Dioscorides, non satis ad præsentem herbam
quadrent, non tamen denominibus semper sollicitos esse oportet, ubi de re
ipsa constat. Vt ut uero Chrysitin quoque, Chrysanthemon & Amaran-
thon eam cognominet, nihilominus tamen adijcit alias quoque, & huic
herbæ magis proprias appellationes, nimirum *Διὰ πύωνα*, Louis barbam,
Dubath, & Buchromat. Sed duæ postremæ uoces peregrinæ sunt, & inex-
plicabiles. Multi propter radicis formam hanc herbam ad Saryria, Germa-
nis Stendelmurtz pertinere arbitrantur. Sed si totam eius substantiam per-
spicias, rectius ad Portulacam, Sedum maius & minus (de quibus paulo
post differemus) referes. Sin uero Telephium fuerit, ut multi arbitrantur,
certe id est quod a Dioscoride Portulaca agrestis dicitur lib. ij. cap. ult.

279000000.

De Chrysitis
Chrysanthemi
& Amaranthi
uocibus supra lo-
cuti sumus. cap.
109:

Quæ sit Louis
barba, sequenti
docebitur capite

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Herba hæc maxime quod ad folia pertinet, humidæ & frigidæ est tempe-
raturæ. Radix uero ferme calidæ est qualitatis. Porro hæc planta utrinque
vulneratis adhiberi.

INTRIN-

INTRINSECVS.

Aqua ex herba & folijs distillata et pota, nō levis est medicina ad rupta, & consuulsa, ac uulnera etiam, & ulcera interna, necnon erosiones stomachi, pulmonis, epatis, matricis & intestinorum.

His omnibus uitijis medetur ista aqua, per aliquot dies continuo bibita: Est autem illa aqua præstantissima medendis erosionibus intestinorum, quæ ex dysenteria accidere consueuerunt.

Radix cum melle in uino cocta & pota, iisdem pollet facultatibus.

EXTRINSECVS.

Herba hæc glutinat & sanat omnis generis uulnera, præsertim uero hernias. Eadem tusa & imposita sanguinem uulneribus manantem sistit.

Sunt & multi erculæ quædam supersticiosæ, quæ credunt & docent, puerorum hernias curari, quamprimum herba ipsa prorumpere cœperit, puer prius intra genua in horto aliquo plantata. *Superstitio.*

Sed relinquam has & illis similes superstitiones suis autoribus, quo omnis offendiculi, & sinistrae opinionis ac superstitionis occasio deuitetur.

Illud tamen de præsentī hac planta affirmari potest, eam magna dolores sedandi facultate præstare, id quod tam in recentibus uulneribus, quam in ueteratis ac sordidis ulceribus efficere tusa folia & imposita.

De Aizoo, seu Sedo.

Cap.

CXXIII.


IZOON SEMPITERNVM VIRENS PLANTA, NVL-

A la sui unquam parte marcescit, nisi caule, qui cum appetente Autumno desloruit, protinus arescit. Præter caules ut diximus, tota sua substantia quamcunque coeli intemperiem ferre potest Aizoon, ferturque illud in regionibus nostris, in tectis, & muris, quibus locis foelicius prouenit. Nam radices eius exiguae, capillataeque cum sint, facile humi herent, nutriunturque. Quin et inter petras, & ad macerias & muros, ubi terra plane destituta est, uirentior quandoque conspicitur. Folia Aizoo pingua, crassa & succulenta, stipata, ac copiose congesta, ut stellam multiplicibus radijs distinctam repræsentent, prima autem & radici proxima in terram conuexa sunt, e quorum medio coliculi erumpunt, ex purpura rubentes, dodrantales, hirsuti, flosculis purpureis, forma seminum Lini receptacula exprimentibus, usque ex ordine collocatis, emicantes. Porro pereunt illi cum caulibus sub Autumnum, nullo post se relicto semine, nam quotannis ocellos suos, siue gemmas ipsæ stirpes emittunt, e quibus noua subinde Aizoi soboles gignitur, non aliter atque in Croci propagatione fieri consuevit.

Sedum.
Haufwurz.

NOMENCLATURAE.

Germani *Haufwurz*, hoc est, si interpreteris, Domesticae radicem, quod scilicet in culminibus domorum seratur &, *Donderbar* a tonitru, & ueteri illa superstitione, qua stultum uulgus credidit non ferri fulminem domum, in cuius tegulis uireat *Sedum*, appellant. Estque ea herba quam alias uocant *Barba Iouis*, tamen si *Barbarus* uir doctissimus, *Chryfocomē*, quam precedenti descripsimus capite, & alij *Amaranthum* (nam is *Stoechas Citrina*, & *Barba Iouis* una & eadem est herba, sed perperam illi sentiunt) hoc nomine insignire uelint. *Dioscoridi* *ἀνίσου τὸ μίνα*, *Sedum* seu *Semperuiuum* maius, uocatur. Proinde & alias appellationes illi ascribit idem *Dioscorides*, nam *Aithales*, hoc est, semper uiuens, & *Ambrosion*, a semper piterno eius uirore (quamquam hoc ipsum nomen alijs quoque plantis commune sit) & *Chrysofermon*, & *Zoophthalmon*, & *Bupthalthmon*, hoc est, *Bouis oculum*, a forma, & *Stergethron*, quod amorem conciliare putetur, *Aeonion* denique, *Aichryson*, *Holochryson*, *Chrysanthemum*, *Protogonon*, *Boron*, *Notion*, *Paronychiam*, *Chrysin*, *Cerium*,



*Diosco. lib. 4.
cap. 85.*

Pluraque ex his nomina *Sedo* inde tribuuntur, quod quasuis coeli tempestates facile ferat, semperque tam in hyeme quam aestate uireat, nullaque coeli iniuria ledatur, quod ego sauisima in grandine non semel uidi.

Bupthalthmon, hoc est, *Bouis oculum*, a forma, & *Stergethron*, quod amorem conciliare putetur, *Aeonion* denique, *Aichryson*, *Holochryson*, *Chrysanthemum*, *Protogonon*, *Boron*, *Notion*, *Paronychiam*, *Chrysin*, *Cerium*,

ara, Cuspiam, Iouis caulem, Leapetes, & Pamphanes nuncupari ait. Plinius *lib. 29.*
 us Hypogeson, & Amerimnon quibusdam, Italis uero Digitellum & Ocu *cap. 13.*
 lum, nominari tradit. Apuleius Semperflorum, & Vitalem. Auerrhoes
 Caylem, Macer Accidulam. Serapio Beihalalem, nominat. Otho Brun- *Apul. cap. 123.*
 felsius Trithales, quod ter in anno floreat, quod ego nunquam animaduer *Serap. cap. 340.*
 ci. Sed hoc nomen ad minus Sedum pertinere, Plinius testatur, dum illud
 Trithales, seu Erithales appellat.

VIRE SAC TEMPERAMENTVM.

Semperuium plane humidæ & frigidæ est qualitatis, adhibeturq; cali- *Plinius lib. 29.*
 dis morbis, & inflammationibus, idq; in externis frequentius quam inter- *cap. 13.*
 nis corporis partibus.

INTRINSECVS.

In intensissimis acutarum febrium caloribus, necnon & dysenterijs, alijsq;
 profluuijs (& præterea in nullis alijs morbis) aqua ex Sedo distillata exhibe-
 ri potest, mensura trium aut quatuor cochlearium.

Dioscoridi succus Sedi in uino potus, lumbricos excutit.

EXTRINSECVS.

Succus Semperuiui, & aqua distillata, linteolis in ea madefactis, ac im-
 positis inflammationibus quibusuis corporis, in primis uero Phrenetico mor-
 bo apprime conducunt.

Quibus oculi propter abscessum aliquem aut inflammationem noctu
 præcluduntur, si aquam Semperuiui distillatam infundant, quo facto non
 solum inflammatio ipsa, sed & dolor tolletur, necnon fluxus oculorum cali-
 dus, idē auribus instillatus efficit. Rursus ille ipse succus & aqua distillata,
 doloribus & inflammationibus iecoris & renum succurrunt, & articulorū
 morbo & podagræ medentur. Auxiliantur autem non solum inflammati-
 onibus, sed & ambustis igni, illita, & in linteolis imposita.

Succus Semperuiui, admixto succo Solatri, cum oculis Populeis, deco-
 ctus in axungia suilla, ac percolatus, ut fiat unguentum, mire efficax est, om-
 nibusq; Populeis unguentis Chirurgorum nostrorum, meo iudicio præfe-
 rendus, & mihi quidem longe gravior.

De Sedi minori, Germanis *Wauerpfeffer*.

CAP.

CXXIII.

Sedum minus.

Klein Haugwurtz.

1. 2.
Duae Sedi minoris
species.



QVOD SUPERIORI capite descripsimus, Sedū maius omnium herbariorum consensu dicitur, cui hanc ipsam plantam, quam Germani *Wauerpfeffer* nominant, adiungere placuit, quia *Sedum minus* esse uideatur, quod non tantum genitalis illius locus, nam plerumque in tegulis domorum, & muris reperitur, sed & id ipsum comprobare uidetur, quod æstatis & hyemis duræ iniurias illæsa sufferre potest, non aliter atq; superius *Aizoon*.

Huius autem minoris Sedi quatuor liquido nobis constant genera, corūq; duo, uidelicet minora, coliculis surculosis, & pinguius ac succulentis acinis uerius quam folijs, nam ñ granum tritici æmulantur, cōsimilia sunt. Rursus hoc pacto inter se differunt, ut alterum candidos & stellatos flosculos ferat, breuissimis & tenuissimis coliculis indentes, alterum uero subluteos & pallidos, similiter stellatos sustineat. Atque hæc duo Sedi minoris genera

Vermicularis.
Ranzen treibel,



nera nusquam alibi quam in tectis lateritijs, & muris reperi. Florent Maio mense, æstate accedente flos eua nescit, sola foliola per integrū annū in caule uisuntur.

Tertium idemq; maximum illius genus in altissimis syluis Vualgoizæ & Hercyniæ gignitur, ad sabulosas nimirum rupes, nec non in quibusdam arenosis agris et campis calori solis maxime expositis. Folia seu acinos fert prælongos, sed tenuiores & acuminati-ores duobus prioribus generibus. Caules emittit appetente lulio, laues & raro dodrantales, qui in uertice exiguis, luteis et stellatis flo-
 sculis, usq; congestum col-
 locatis emicāt, ueluti Ama-
 ranti, pereuntq; illi una cū
 coliculis Augusto mense.

3.
*Sedi minoris ter-
 tia species.*

Quarta Sedi minoris species, in humectis & herbidis pratis prosilit, Maio mē se florem procreat purpureum ac roseum, eumq; stel-
 latum, purpureis insiden-
 tem coliculis, qui plurimis
 & minutissimis acinis undi-
 que circumdantur, multoq;
 uiridioribus, quam in supe-

4.
*Quarta Sedi mi-
 noris species.*

riori sine planta, qui gustu non sunt salso, sed eo fere, quo culinariæ herbar, ut est Beta, sunt præditæ. Assate hæc planta & hyeme pariter ui-ret, quemad-
 modum Sedum maius.

NOMENCLATURÆ.

Sedum maius; necnon ea planta quam altero ab hincapite descripsimus, & hæc herbarum genera, easdem prope facultates obtinent. Nam refrigerant & sanant inflammationes & tumores, præterea uirorem suum retinent, licet decerpæ soli exponantur. Quibus rationibus ego permotus, Aizoon Germanis *Haufwurtz*/Sedum maius, Scrophulariam uero seu ut aliq̃ uocant Telephium, Germanis *Braben Fraut*/Sedum medium, nostrū denique quod nunc præmanibus habemus, Sedum minus appellare uolui: Germanis hoc postremum Sedum *Maucrpseffer* appellatur (quasi murale Piper) quod in muris proueniat, gustuq̃ acris admodum sit, ut Piper, & *Blattloß* (quasi folijs destitutum) eo quod pro folijs acinos quosdam habeat. Alij a forma *Judentreübel* & *Bazgentreübel*/hoc est, uuas Iudaicas, uel Felium nuncupant. Dioscorides *αἰσώπυρον μικρόν*, Sedum minus, & a loco natali *wirpawia*, Brotion, Theobrothion, Crobysson, Chimerinen, id est, Hyemalem (Germanice *Winterfraut*/seu *Winterweissen*/aut ut Hieronymus Braunschueig interpretatur, *Erdweissen*) Cerauniam, hoc est, Fulminarem herbam (Germanis *Sonderzepfflin*) uocat, Ægyptij *Ep̃icelta*. Nostri medici a forma apposite Vermicularem nominant.

Nec desunt qui eam Sedi minoris speciem, quæ pinguior est & luteos gerit flores ac stellatos, Portulacam agrestem esse putant, calidumq̃ obtinere temperamentum, quod si ita se haberet, quemadmodum isti asserunt, sane euulsa hæc herba aresceret, ut reliquæ plantæ, quæ temperamento sunt calidæ. Cum uero id minime fiat, non est quod caliditatem illi ascribamus.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vermicularis frigida & humida est, sicuti Sedum, ideoque externis corporis partibus commodior ac utilior existit.

INTRINSECVS.

Aqua ex illa distillata, aut succus, nunquam intro sumi debet, nisi caloris uehementia & necessitas id postulare uideatur, cum scilicet reliqua medicamenta refrigerantia nihil efficere possunt, id quod in Sedo quoque monuimus.

EXTRINSECVS.

Quæ de Sedo & Scrophularia diximus, ea in hac quoque vermiculari locum habent.

Linteola aqua Vermicularis distillata, aut succo eius intincta, & Phagedænæ (quem Germani den *Murm* appellant) imposita, breui illam enecare, & dolores sedare traduntur.

Sunt

Sunt qui Vermicularem nostram Hippuridem maiorem, Germani Schaffherwe/dicendam putant, quorum error manifestior est, quam ut refutari debeat. Caueant ergo sibi qui sapiunt, ab his, necnon ab illis, qui alteram Vermicularem Portulacam sylvestrem interpretantur.


De Portulaca. Cap. CXXV.

TSI PORTVLACA, VT EST FRIGIDAE ET HVMI-
E dæ temperaturæ planta, citius putredine corrumpitur, quam are
 scat: nihilominus tamen hyemis & frigoris impatientissima, &
 aliofa esse, inde cognoscitur, quod quotannis ex semine, exiguo, tereti, &
 nigro repullulascere necesse habet. id quod in Semperuius superioribus
 tribus capitibus a nobis descriptis, minime reperias, quo nomine Portu-
 laca Sedis, ut multi putant, accenseri non potest.

Portulaca duorū est generum, hortensis scilicet & sylvestris, quod & Di-
 oscorides lib. ij. cap. cxij. necum testatur. Hortensis non ita pridem ex
 Gallijs ad nos, inter cæteras ex quibus acetaria fiunt, herbas in Germaniam
 deuenit. Estq; illa tota sua substantia grandior, pinguior, & succulentior, ^{2.} Portulaca horti-
 ea quam agrestem, seu sylvestrem uocant Portulacam, folia fert rotunda, ^{tensis.}
 pinguia, Scrophulariæ similia, sed magis exigua. Caules eius qui ex una
 radice, eaq; candida & recta plures proueniunt, teretes sunt, & punicei, do-
 drantali longitudine in altum erecti, tamen non raro humi sparsi pro-
 cumbunt. Atq; ij inter geniculos, ex quibus folia cauli adnascuntur, in infe-
 rioribus foliorum partibus, luteis & stellatis, ornantur flosculis, qui a Iunio
 mense usq; ad Autumnum fere apparent, quo tempore in rotundos exiguo-
 os & contextos calyces, semine nigro refertos abeunt. Semen ubi matu-
 ruerit, & uasculis suis exciderit, appetente Autumno, tota substantia Portu-
 lacę putrescit, solo seminio humi relicto, quod illæsum per totam hyemem
 tanquam depositum fideliter ab alma tellure conseruatur, quousque in Ve-
 re cum se aperit, uitæ illud reddat.

Vulgaris autem & agrestis Portulaca, spõte sua in pinguibus aruis, &
 hortis nascitur, superiori per omnia similis, nisi quod angustiora folia, & ^{2.} Sylvestris Portu-
 minores flosculos fert. Semper per terram sparsa iacet, ueluti Centumno- ^{laca.}
 dia, qua de paulo post cap. cxxvij. Hæc Portulaca commanducara suc-
 co abunde glutinosa ac lubrico ueluti Malua, porcis in cibo utilissima,
 unde Germanis Porzel frant/ quasi Porcellorum herba, dicta uidetur.

NOMEN.

*Portulaca.**Burgel/oder Grensel.*

NOMENCLATVRÆ.

Germani has plantas *Burgel/ Burgel/ & Porzel* frant /ac *Grensel* appellare cōsueuerunt. Latini *Portulacas* nominant. Grecis *Portulaca* αἰδ πάχον dicitur. Et hæc quidem uulgaria *Portulacæ* alterius, *hortensis* scil. sunt nomina. At qđ ad syluestris *Portulacæ* appellationes attinet, uariant exemplaria *Dioscoridis*. Et optādum sane esset, ut suo loco quęq; planta, in ueterum scriptis collocaretur, quod si fieret maiori cū fructu illa legeremus. Sed ea semper fuit sciolorum in deprauandis optimorum autorum scriptis peruersitas, ut cum aliquid minus intelligerent, statim immutato ordine pro libito transponderent, aut omnino expungerent, substitutis in locum adulterinis sententijs, qui factum est, ut uetusta & emendata exemplaria prorsus perierint, relictis nouis & de prauatis, quibus si rē diligenter consideres, quod alibi deest, alio loco super-

fluum inueniatur. Id cum in alijs multis capitibus *Dioscoridis* contigerit, tum uero in descriptione *Portulacæ* haud obscure uidere est. Nam *Andrachnen* hoc est, *Portulacam*. lib. ij. cap. cxij. duorum esse generum ait, *horten-*
sem, &

sem & agrestem, sicut rei ueritas sese habet. Rursus lib. iij. sub descriptione Sedi minoris, tertium illius genus, Portulacam agrestem esse, & Illecebram, ac Telephion dici tradit. Præterea Telephio proprium dicatum est caput, nimirum ultimum secundi libri, quo loco Portulacæ agrestis seu Illecebræ iterum facta est mentio. Quis ergo non uidet in his mendosis exemplaribus, omnia esse confusa, nihilq; uel suis proprijs nominibus appellatū, uel suis locis dispositum? Sed cui ascribemus hæc, nisi temporis quo omnia & uariantur & abolentur, iniquitati, & herbariorum, ac medicorum & imperitiæ & negligentiae? Nos, relictis his ad uires Portulacæ transibimus.

In ijs exemplaribus quæ Colonia Ioannes Soter excudit, cum commentarijs Marcelli Vergilij, unius tantum generis Portulacæ, cap. 113. lib. 2. de scribitur, sicut et Ruelliana habet exemplaria.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Portulaca frigida & aquea temperamento est, teste Galeno, utrifque corporis partibus utilissima herba. Est uero illa partim subacidi & salsi saporis, ut uideatur sale condita. Qui factum est, ut apud ueteres inter Salgama, quæ ad usum & uictum sale condire solebant, relata fuerit. Et meo quidē iudicio, æque utile est, & iucundi ac grati saporis hoc Portulacæ condimentum, atq; id quod ex Cappari & oliua conficiunt Itali & Galli, quod ego non semel expertus sum.

Vnum hoc in Portulaca detestandum est, quod atros & melancholicos auger humores, uti scriptum reliquit Hippocrates lib. vi. de Epidemijs.

INTRINSECVS.

Herba Portulacæ, succus, aqua distillata, semen & quicquid denique ex illa conficitur, internis stomachi, epatis & renum caloribus confert, si deuo retur, aut bibatur.

Herba, & aqua distillata, dysenterias, & alias alui fluxiones cohibent, cōfortant & refrigerant renes calida intemperie affectos, & aduersus ardorē urinæ faciunt. Eadem ratione usurpata, menses sistit, & sanguinem ex maris scis defluentem, excreationibus sanguinis tollendis, tussiq; & astmaticis medendis utilissima.

Si herbam, semen, aut aquam distillatam quis continuo usurpet, ille sentiet Gonorrhœam impediri, & veneris impetus inhiberi, sanguinemq; refrigerari.

EXTRINSECVS.

Herba aut semen Portulacæ si tundatur, & cum polenta temperetur, ac permisceatur, & emplastri modo fronti atq; tēporibus imponatur, sedat dolores capitis, quos æstus excitaui, et quam uocant Phrenesin, oculorum inflammationem, & ruborem illorum amouet, sacris ignibus medetur, et erysipelatis.

Si aquæ distillatæ aut succo Portulacæ oleum rosaceum aut violaceum miscueris, ut fiat emplastrum, illinasq; temporibus somnum & quietem induces.

Ea ipsa medicina utilissima est ad prouocandum somnum in infantibus, qui ob nimios calores dormire nequeunt, in stupa cannabina capiti imposita. Potest & aqua distillata quandoque potanda illis exhiberi.

Aqua distillata si prius in illa grana Cotoneorum, aut semen Basilici maceretur, linguæ illita oris fauciumq; ardori & exulcerationi medetur.

Præterea aqua Portulacæ, si ex illa os colluatur, aut certe ipsa herba com-manducata, dentium stuporem ab acidorum contactu ortum, sanari certa experientia comprobauit.

Portulaca deniq; fluxiones capitis, quas uocant destillationes reprimi, quod Plinius lib. xxx. cap. xx. his uerbis testatum reliquit.

Quin etiam inueni apud autores, caput inde litum destillationem toto anno non sentire. Oculos tamen hebetare putatur.

Propter hanc causam, quidam e collo suspensam filo, gerunt &c.

De Morsu gallinæ. Cap. CXXVI.

QUANTUM, QUAE VVLGO DICITVR MORSVS gallinæ, Anagallidi quadantenus, maxime quod ad folia attinet, affinis esse uideatur, non tamen ad illam referri potest, sed ad proprium ac peculiare genus pertinet. Herba est uulgatissima, perq; totum annum in hortis inuenitur, & in uineis, ac quo pinguior locus eius natalis fuerit, eo lætior & pinguior tota sua substantia humi procubens, & hinc inde serpens, prouenit. Radicem habet tenuissimis capillamentis fibratam, caulem teretem, succulentum prorsus, mollem, flosculos exiguos, candidos, eosq; inter foliola ex utraque coliculorū parte nascentes, quitan-dem in cōclusa ac minima (nam non sunt maiora semine Passerinæ) abeunt uascula, in quibus minutissimum, luteumq; semen, multoq; minus seminio Chelidonis, continetur. Planta hæc ex semine deciduo repullulascit, & in omnibus cultis hortis per annum totum uiridis ac recens reperitur, non aliter atq; Senecio, gustu plane eodem, quo & culinariæ herbæ & olera, prædictæ sunt, hominibus, pecoribuscq; utilissima, in primis. autem, carduelibus caueis inclusis, nam cum fastidiunt escam, solent se ex herba recreare.

Et hæc quidem de primo genere (nam sunt & alia huius herbæ genera) dicta sufficiant.

In agris

^{1.}
Primum genus,
morsus gallinæ.

Morsus gallinae.
Hünerdarm/Vogelkraut.



In agris ac hortis, irriguis & graminosis secundum & maius illius genus reperitur, quod in cubitalem aliquando altitudinem excrefcit, cauliculum habet geniculatum, utrinque folia Portulacæ syluestris, interque flosculi prioribus similes exeunt.

2.
Secundum genus morsus gallinae.

Tertio, alia quædam huius herbæ species in hortis & vineis inuenitur, primæ similis, foliis subasperioribus, serratis, instar Chamædryos vulgaris uestita, flosculis cœruleis inter alas ramulorum prorumpentibus. Semen eius rotundum, binis & latis loculamentis conclusum uisitur.

3.
Tertia morsus gallinae species.

Extat præterea aliud eius genus foliolis ualde exiguis, Thymo non dissimilibus, flosculis ex albo cœruleis, semine luteo, paruulis itidem loculamentis contento. Tres hæ posteriores herbæ omnes serpendo per terrâ se propagant, ueluti morsus gallinae, ac Portulaca syluestris.

4.
Quarta Morsus gallinae species.

NOMENCLATURAE.

Germanis hæ plantæ Hünerdarm/Hünerserb/Meier/Hünerbiß/Genskraut/& Vogelkraut/Latinis Morsus gallinae dicuntur. Nonnulli hanc herbam, Morsum inquam gallinae, medium genus Anagallidis esse, Hippiamque mediam uocant

dam concendunt, quibus ut assentiar adduci nullus potero. Neque enim Anagallis est, sed potius (meo iudicio) *ταξιαν* Dioscoridis, maxime quod ad priores tres illius species pertinet. Ut uero sic sentiam, ipsa descriptio, necnon temperamentum & uires herbæ me urgent. Quid enim Portulacæ, folijs, & tota prorsus formâ similis, Morsu gallinæ? An non ille per annum totum, in uincis & hortis, uirentior ipsa Portulaca durat? Exposui sententiam meam, adferant qui possunt meliora, & nullius laudi inuidebimus. Serapio cap. cccxl. cum de Semperuiuis agit, inter cætera huius quoque herbæ meminit, tamen quid dicat, nesciat, nam idem illi quod alijs multis scriptoribus proculdubio accidit, ut sæpe citra experientiam, & cognitionem uiuarum herbarum imaginum, historiam illarum conscripserit. Dicit autem illam Andrachabara, Andrage agria, Tilaphon, Alscebram, nominari. Nemo uero est qui nesciat, quod Arabes per Alscebram nihil aliud intelligant quam Esulam, id quod Mesue & Auicennæ scripta abunde testantur, quæ de resupra. cap. c. didicimus.

De hac herba optime scripsit Plinius lib. xxvij. cap. xij. cuius uerba in gratiam studiosorum rei herbariæ subiiciemus.

Telephion Portulacæ similis est & caule & folijs. Rami à radice septeni, octoni uel fruticant, folijs crassis, carnosiss. Nascitur incultis, & maxime inter uites. Illinitur lentigini, & cum inaruit, teritur. Illinitur & Vitiligini, ternis fere mensibus, senis horis noctis aut diei, postea farina hordeacea illinitur. Medetur & uulneribus & fistulis.

Hæc ille.

Cæterum quod noui quidam herbarij Morsum gallinæ Alsinen faciant, per me hoc illis licebit, modo meas mihi non conculcent herbas.

VIRESCACTEMPERAMENTVM.

Morsus gallinæ refrigerantem & humectantem, quemadmodum Portulaca obtinet facultatem, potest & uirique commode usurpari.

INTRINESCVS.

Aqua distillata cum Portulaca easdem habet uires, sed & hoc illi experientia tribuit, quod ijs qui diuturnis morbis & magnitudine ægriudinum consumpti sunt, uiribusque deficiunt, & macrescunt, utilissima sit, uel per se uel in uino pota.

Eadem

Eadem infantibus, in summis caloribus & ægritudinibus exhiberi debet, nam non solum internas inflammationes restinguit, sed & impedit, qui accidere possent, morbos, ut sunt spasmi.

EXTRINSECVS.

Herba ipsa, succus & aqua distillata, non secus atque Portulacæ & Semperuii minoris, uulneribus calidis & ulceribus utilissima sunt, imposita, illita & si ex illis colluantur.

Ex succo unguenta refrigerantia confici possunt, inflammationibus seorsim aliorumque uulnerum, commodissima, non minus quam Populeon, quemadmodum de Sedo, Semperuiuo, & Solatro docuimus.

De Anagallide. Cap. CXXVII.

NAGALLIDIS DVO CONSTITVIT GENERA DIO. Diosco. lib. 2.
A scorides, altera flore coeruleo, foeminam nimirum, quæ & prior ca. 170.
 floret, alteram uero puniceo, quæ illi mas dicitur. Bini hi & teneri frutices in eisdem uestiuntur foliolis, eodem sunt caule præditi, & consimiles habent radices, non altiores palmo fiunt uterque, in terra iacent sparsi, quemadmodum Portulaca, aut Morsus gallinæ. Radices illis capillatæ & fibratæ prorsus, folia Hypericum, aut Maioranam æmulantur, quæ & bina sibi inuicem undequaque opposita conspiciuntur. Flosculis decidentibus globuli plane teretes subsequuntur, instar Coriandri, in quibus semen exiguum & triangularis figuræ inclusum reperitur, idque luteum. Porro uterque sexus, gustu amarus est.


Nascuntur Anagallides passim in hortis, aruis, uincis, & præcipue agris demessis. Florent per totam æstatem, a Maio mense incipientes. Ceterum quibus superstitionibus ueteres in effodienda Anagallide usi fuerint, extat apud Plinium libro xxv. capite. xi.

Christiani certe nihili faciunt eiusmodi nugas, tamen si, pro dolor, nec illis suæ desinit superstitiones.

Venatores hisce plantulis medentur canibus uenaticis, si quando contagiosa rabie infestati fuerint, ea nimirum ratione ducti, quod intelligerent, ueteribus illas aduersus uenenatos viperarum & serpentum morsus utiliter usurpatas, sicuti etiam nunc hodie contra qualuis a ueneno profectas affectiones usurpari possunt.

Anagallis.
Gauchhey.

NOMENCLATVRÆ.



Anagallis Grace, *Anagallis* Latine, Germanice *Gauchhey* & *Colmarfrant*. Plinius tradit *Anagallidem* quibusdam *Corchoron* uocari, qui proculdubio is est, cuius *Theophrastus* libro vii. cap. vii. meminit, atque ob amaritudinem suam illum in prouerbum abiisse, ut diceretur, *κίχχορ* ὅτι *λαχύνει*, hoc est, *Chorchorus* inter olera. Nemo autem est, modo sanæ sit mentis, qui sententiam nostram refelle re possit, nam *Anagallis* non tantum amarū habet saporem, sed & descriptio *Theophrasti*, cum dicit forsia illius *Ocymo* similia esse, herbæ protinus respondet, *Dioscoride*, *Plinio* & *Theophrasto*, consentientibus id historia illius, *Mirū*, quod *Plinius* commemorat, foeminam *Anagallidē* pecora uitare, ac si decepta similitudine (flore enim tantum distat) degustauere, statim eam in remedio quærere, quæ *Asyla* uocatur, a Romanis *Ferus oculus*. Appellationes plures *Ana-*

gallidis *Dioscorides* annotauit, quas pro more subiiciemus. *Anagallis* purpurea, quibusdam *Aeritis*, aut *Ægitis* uocatur, alijs *Sauritis*, magis *Oculi sanguis*, aut *Chelidonium*. Romanis *Macia*, *Dacis* *Cerceraphon*. *Ana-*

Anagallis communis, quibusdam Chorchoron, alijs Halicacabon, alijs Zelauros, magis Nycteritis, Ægyptijs Mecij, Romanis Aneciaton, Aphris Afirrisæ. Iacobus Manlius & alij nonnulli Morfui gallinæ, Anagallidis nomenclationem tribuunt, cognominatq; illam herbam Morgelinam, & Hippiam, afferuntq; eam quæ puniceos fert flores, sylvestre esse Anagallidis genus. Pandectarum autor Auriculam muris esse dicit, quemadmodum Neoterici quidam Herbarij Morfuum gallinæ ad Auriculas muris referunt. De qua re uide supra caput xciij. & Nicolaum Leonicenum de Alsine. Sera pio cap. clv, Masculam Xantalam, Fœminam Cardabellam nuncupat.

De Anagallide
aquatica uide supra 61. cap.
Halicacabi uox
ad Solana pertinet, uide 101. cap.
put supra.
Chelidonij uox,
Hirundinarie
utriusque tribuitur, uide cap.

VIRESC. TEMPERAMENTVM.

Anagallidis uterq; sexus calidam & siccam naturam obtinet, extergendi mundandi, & expellendi facultate præditus, utrisq; corporis partibus accommodatissimus.

INTRINSECVS.

Anagallis uino decocta, medetur ictibus serpentum & viperarum, si bibatur, aut si ex decocto uulnera colluantur, & herba imponatur.

Propter hanc ipsam causam, aduersus pestem Anagallis utraq; mirifice conducit, ita usurpata, ut posteaquam ex illa mediocrem haustum acceperis, in lectum te componas, probe contextum, & sudas, tum enim omne uenenum per sudores expelletur.

Anagallis canibus morfu læsis utilissima, similiter & hominibus, aduersus canis rabiosi morfus conducit, quisquis etenim hoc pacto affectus fuerit, continuo utatur, uel succo uel aqua Anagallidis, eaq; potet, ac ex illis uulnera colluat.

Pari ratione usurpata Anagallis aquam intercutem expellit, iccoris meatus aperit, purgat renes, calculumq; mouet & expellit.

EXTRINSECVS.

Omnia uenenosa uulnera, ictus & morfus, succo, uel aqua Anagallidis mundificari debent, nam dolorem mitigandi & uenenum extrahendi, atq; impactos corpori aculeos refigendi, uim habet maximam, teste Galeno lib. vi. Simp. facult. Cohibent quas uocant nomas & rheumatismos, eosq; ad sanitatem cito promouent.

Succus melli purissimo admixtus, oculorum caliginem discutit, & argemata claritatemq; illorum adiuuat, illitus.

Succus naribus inditus, cerebrum purgat, pituitam capitis elicit, quæ do-
lorem dentium non raro adfert.

Tradunt eam quæ cœruleum habet florem prociduum sedem reprimere,
quæ phœniceum, illitu prouocare. Hinc sane colligi potest, masculam
Anagallida in expellendo efficaciorē esse, foemella.

De Polygono masculino, uulgo Centumnodia.

CAP. CXXVIII.

ULTI IN EA SVNT SENTENTIA VT EXISTIMENT

M hoc nostrum Polygonon intelligendum, ubicunque de gramine
apud autores incidat mentio, sed quam recte illi sentiant uel hinc
manifestum fieri putamus, quod lib. iij. cap. xxxi. proprium Gramini dica-
uit caput Dioscorides. Nos relictis his ad descriptionem Polygoni nostri
pergemus.

^{1.}
Primum Poly-
goni genus.

Polygonon inter uulgares plantas uulgatissima est, simulq; utilissima.
Quæ enim est regio in qua non reperiatur, quæ uia ad quam non appareat,
qui denique agri (nam illis in primis gaudet) quæ sepes, quæ itinera illo tan-
tum non obruuntur. Nascitur autem Iunio mense primum ex semine, cum
sit æstiuæ herba, & quotannis renasci atq; mori necesse habeat. Radices ha-
bet teretes, breues & tenues. Caules itidem rotundos, teneros & molles,
ac prorsus geniculatos & nodosos, innumeris peneramulis, ac adnascen-
tibus ornatos, geniculis breuissimo intervallo a semutuo distantibus, qui &
binis foliolis utrinq; sese respicientibus, acutioribus Rutæ folijs, Thymo-
feræ aut Satureiæ similibus, uestiuntur. Sub geniculis & folijs flosculus ad-
modum exiguus, nec enim maior est Milij seminio, quibusdam candidus,
alijs expurpura candicans emergit, qui tandem in triangulare granum abit,
Acetosæ semini simile, & hæc illius seminis est, quæ appetente Autumno
ad maturitatem suam prouenit. Porro binorum cubitorum longitudinē
fortiuntur hæc duo Polygoni genera, ut illis tanquam Salicibus & funi-
bus, in uinciendis & colligandis sarcinis uti possis.

^{2.}
Duo Polygoni
maris genera
quod ad florem
attinet.

^{1.}
Polygonon mi-
nus.

Alterum Polygoni genus, huic per omnia simile, sed minus & breuius
est, nam dodrantem nequaquam excedit, florem, quo solo a primo gene-
re diffidet, fert Centauræ uulgari, aut rubræ Anagallidi consimilem. Hoc
ipsum Polygonon Aprilis mense, & per totam deinde æstatem in agris de-
messis inueni.

NOMENCLATURAÆ.

Germani has herbas Weggras, & Wegdritt, a uijs & itineribus tracto
nomine

Polygonon masculum.

Weggras.



nomine nuncupant, quod
plerunque ad itinera proue-
niat, & viatores non raro
remoretur, & sæpe impro-
vidos, nihilq; tale cogitan-
tes in terram prosterнат, so-
lent enim petulantes & ma-
ligni homines ea gramina
colligare, ut pedibus in hæ-
rentia viatores, ut diximus
impediant. Medici nostri
Centinodiam, & Corrigi-
olam uocant, alij Sangui-
nalem Germanis Blüt-
kraut/ est enim Sanguina-
lis mascula, ut ex Dioscori-
de facile constat. Nam is
Polygonon masculum no-
minat, scribitq; alios uoca-
re Polygonatum, alios Cy-
nostalam, alios Heracti-
am, alios Aspalton, alios
Chiliophyllon, alios Cle-
ma, alios Polycarpon, ali-
os Carcinethron, alios
Teuthalida, alios Myrto-
petalon, alios Cnopodi-
on, alios Zaritheam, alios
Pedaliā, Ægyptios The-
phin, aliquos Stemphin,
Magos genituram herois,
aliquos Vnguē muris,
Latinos Sanguinariā,
aut Seminalem. Aphro-
denique Chulum,

Polygonum aipp.
Diosco. lib. 4.
cap. 4.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Magnam apud ueteres laudem habuerunt Polygona, idq; ob mirificas

suas vires, sunt enim natura sua frigida & sicca, sanguinis & alui fluxiones sistentes, & calculum per urinam propellentes, quare utrinque utiliter usum pari possunt.

INTRINSECVS.

Polygonon uino rubro decoctum & potum, alui fluxiones, uomitiones, sanguinis excreaciones, foeminarum profluuia sistit, contra uenenum quoduis auxiliatur, calculos renum pellit potenter, internos calores restinguit, cholerae & feruori stomachi aliorumque membrorum prodest, interno membrorum erosionibus medetur, in summa internis corporis partibus mirifice auxiliatur. Eadem intelligas uelim, de aqua eius distillata, si cum semine suo in puluerem redacto sumatur.

EXTRINSECVS.

Succus Polygoni, & aqua eiusdem distillata, inter praecipua remedia habentur, quae refrigerandis & restinguendis Erysipelatis, & sacris ignibus, & inflammationibus inde profectis, siue eae sint internae siue externae, imponuntur & adhibentur.

Eadem aqua distillata, seu succus herbae, auribus purulentibus instillatur, putrescentibus & gangraenosis gingiuis prodest, & uulneribus tam recentibus quam inueteratis, in primis autem ulceribus genitalium utriusque sexus, conducit: conseruat enim ea ne inflammationibus alijsue accidentibus malis infestentur.

De Polygono quod Germani Knewel
appellant. CAP. CXXIX.

H ERBULA ISTHAEC QVAM GERMANI Knewel AP
pellant, cum humidiores sunt anni tempestates, a vere inde usque ad Autumnum, in agris maxime uero ijs qui Rapis consiti fuere, inuenitur. Fruticulus est unicus, surculosus, dodrantalis, geniculatus, non secus atque Polygonon, quod praecedenti descripsimus capite. Folijs uestitur minutissimis, cineracei coloris, acutis ueluti Chamæcyparissus. Flos illi multiplex & copiosus, quemadmodum & semen, quae duo nihil aliud esse apparent, quam flosculi exigui, uirides, & stellati, instar granorum Milij, odoris uehementissimi. Radicem habet exiguam, capillatam, nec te-
mere digitum longam.

Polygonon Germanis
Knewel.



NOMENCLATURAE.

Quanquam si descriptio nem spectes nostra hæc plā tula, non facile πολύγονον βίλον, hoc est, Sanguinaria foemia na dici possit, tamen quod ad geniculos frequentes, quibus interstinguitur, attinet, Polygoni fortasse gen^o erit, aut potius obnumero sum et copiosum semē πολύ, *Diosco. lib. 3. cap. 99.* καμπύ. Certe si vires eius cō siderentur, comode πολύκνη μιν appellabitur. Nam ad stranguriam & stillicidium urinæ mirifice facit. Polycnemum quidam Clinopodium, alij Polygonatō, alij Iouis colum, alij Echeony monuocant.

VIRESCIT TEM
peramentum.

Dulcem hanc herbulam, quæ apud Mediomatrices Knewel dicitur, a Polygono separare non possum, posteaquam easdem cum illis obtrinet facultates.

INTRINSECUS.

Polycnemum uino decoctum & potum, calculum expellit, quemadmodum Polygonon. Idem de aqua distillata Polycnemī, & po

sentendum est. Potestq; pro Polygono in omnibus sumi Polycnemum. Proinde gratissimū est armentis pabulum, in cum etenim usum a puellis in æstate carpitur.

EXTRINSECVS.

In externis corporis partibus medendis, eundem usum habet Polycnemum, quem & Polygonum.

De Peruinca.

Cap.

CXXX.

Ingrân.



Miraculum
nature

PERVINCA, EX CAPILLATA ac fibrata radice, multas nodosas & geniculatas uiculas emittit, quæ uirgæ, aut si mauis sarmen-
ta ubique terram attigerint, ibi radican-
tur, præsertim ea parte qua nodosæ, aut geniculatæ existunt, & radices acquirunt capillamentis multis fibratas, quæ fit, ut uno de furculo breui tempore amplissima area obducipossit, quam obrem non immerito serpentibus & hederaceis herbis accensetur. Folia eius pleræq; admodum exigua sunt, buxo non dissimilia, nonnulla etiam maiora, ita ut salicis herbam referant. Martio mense florem fert ex purpura cœruleum, quinis foliis distinctum, instar Boraginis, & prorsus inodorum. Per totam hyemem uiuet, & quascunque illius iniurias illæsa suffert, & quod mirandum mihi uidetur, intra humum etiam sepulta incolumis longo tempore manet, id quod testari ipse possum. Nam anno supra millesimum

lesimum quingentesimo, tricesimo nono, in die Marci Euangelistæ, uidi caput effodi, quod hac herba coronatum erat. Proinde ipsa herba uiridis plane erat, ac si recens lecta fuisset, cum tamen multis annis cum cadauere in sepulchro abdita latuisset. Hinc facile liquet, cur eam nonnulli Germanica uoce Todten fraut, aut Todten violen/hoc est, herbam siue violas mortuorū, uocarint, nimirum quod illa mortui coronari consueuerint.

Peruinca gaudet locis umbrosis, prouenitq; in quibusdam hortis, in muris, secus sepes, sub dumeris denique & rupibus.

Historia de Peruinca perpetua uiriditate.

NOMENCLATURAÆ.

Commune apud Germanos Peruinca nomen est Yngrün/a' perpetuo illi uirore inditum, Officinæ Peruinca nominant. Est autem illa ipsissima Clematis Dioscoridis, quæ Plinio & Daphnoides cognominatur. Posset & Chamædaphne, hoc est, Terrestris, seu humilis dici Laurus, aut ut Romani dicunt Laurago, & Laureola, & Vinca Peruinca, quemadmodum alibi meminit Plinius. Apud Dioscoridem sequentia Peruinca nomina leguntur, *δαφνείδης, χαμæδάφνη, ποδάρκεια*. Apud Apuleium uero cap. lviij. multæ extant nomenclaciones illius, nimirum Eueplios, Daphnoides, Hypoglossion, Eupetalon, Diglossos, Nycephyllon, Pelleon, Idæa Daphne, Samothracia Daphne, Alexandrina Daphne, Mitrion, Danae, Stephane Alexandrum, Chamædaphne, Carpophyllon, Daphnitis, Latine Peruinca, Victorix folium, Laurus Alexandrina, Macedonica, Laurago, Mustellago terrestris. In Plinio nonnullæ ex his repetuntur, & alix etiam adijciuntur, uidelicet Hyperale, Pelasgum, Eupetalon, Stephane Alexandri. Sed quantum mihi quidem uidetur, rectius uniuersæ hæ appellationes Laurus Alexandrinæ, de qua sequenti dicemus capite, quam Peruinca tribuentur. Quod uero controuersia nominum in hanc quoque plantam irrepsit, mirum uideri non debet, cum Lauri Alexandrinæ appellatio, multis & uarijs herbis attributa semper fuerit. Nihilominus descriptio quæ apud Plinium lib. xxi. cap. xl. extat, Peruinca nostræ satis respondet.

*quantitè d'apoc.
dis.
Pli. lib. 24. ca. 15.*

*Dioscor. lib. 4.
cap. 7.*

*Plinius lib. 15.
cap. 30.*

Eo in loco Peruinca Chamædaphne dicitur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Peruinca æternum uiuens sicca est temperamento, & utiliter utrisque corporis partibus adhibetur.

INTRINSECVS.

Quod si Clematis sit hæc herba, id quod mihi dubium non est, certe illa uino.

uino decocta & pota, torminibus prodest,alui profluuia & dysenterias sedat,& mulierum menses sistit.

EXTRINSECVS.

Herba ipsa tusa, uenenosis ictibus & moribus imposita, medetur.

Succus expressus, auribusq; instillatus, dolores illarum finit: Dolores etiam dentium sedat in ore retentus.

Succus in pello mulieribus subditus, cruciatibus uulvæ medetur, fluxumq; sistit.

Si quis habuerit uinum turbidum, quodq; colorem amisit, accipiat tantum huius herbæ, quantum pro quantitate & copia uini sufficit, vasq; imponat, ac illud deinde obturet, obturatumq; quindenam relinquat, quod cum fecerit, uinum breui purissimum ac clarissimum reddetur, & genuinum suum colorem recuperabit: præstabit tamen si rite rem perficere uoles, ut uinum prius in aliud uas transferatur, tumq; herba ut diximus, utiliter inijciatur. Hæc ita se habere experientia certa comprobauit.

De Lauro Alexandrino, uulgo Vuularia.

CAP. CXXXI.

HANC PLANTAM ANTE ANNOS ALIQVOT, DOCTISSIMO uiro D. Othoni Brunfelsio piæ memoriæ, in Theophrasto & Dioscoride demonstraui, qui illam deinceps suo Herbario inferuit. Hunc excellentissimus uir Euricius Cordus, Poëta & Medicus secutus, in colloquio suo quod de herbis cōscripsit, Lauri huius mentionem quoque fecit. Præter hos duos, nemo, qui indicasset, quo loco in Dioscoride nasceretur ista Laurus, extitit. Orandus est autem Deus Opt. Max. ut bonos & diligentes uiros excitet, qui in reherbaria ornanda & amplificanda operam suam impendant, quo in hac etiam parte Reipub. seruiatur.

Laurum istam circumforanei Agyrtæ, seu Rizophori, ex Vngaria, sine radice ad nos deportant, asserentes eam in altissimis prouenire syluis. Caudales habet rotundos, ueluti Sigillum (ut uulgo uocant) Salomonicum, dodrantes, utrinq; crassis folijs uestitos, diluti uiroris, Lauro similibus, sed tenerioribus & mollioribus. Porro quodq; folium aliud ex se gignit folium lingulæ, aut uulvæ appensæ similimum, unde apud Germanos no-

Laurus Alexandrina.
 Zapffenkraut.



men inuenit, quod dicitur
 Zapfflin Kraut/hoc est, V.
 uularia. Inter folia & cau-
 les uidi ego rubros acinos
 ciceris magnitudine, idē
 Argentinæ in nudinis, ad
 quas, quidam Agyrta hāc
 herbam partim cum fru-
 ctu, partim sine illo, sed ta-
 men satis sibi inuicem confi-
 milem detulerat ex Panno-
 nia inferiore.

NOMENCLATURAE.

Hic uero habemus tri- *ἀργυρίαν*
 umphalem illam Laurum, *Lauri Alexan-*
 qua Alexander Magnus *drina appella-*
 uictor usus creditur, ut scri- *tio, Chamedaph-*
 bit Vergilius. Marcellus, *ne etiam tributa-*
 unde illi Laurus Alexan- *tur apud Diosco-*
 drina nomen factum est. *ridem lib. 4. ca.*
 Porro hanc Laurum teste *144.*
 Diosco. lib. iij. cap. cxlij.
 aliqui Idgam, a monte Ida,
 in quo affatim luxuriat, alij
 Danaen, alij Hyppoglos-
 ton, alij Zaliā, alij Stepha *Hyppoglossion,*
 nen, alij Daphnon, alij Sa- *à foliolo illo di-*
 mothracicen, alij Methri- *citur.*
 on, alij Hyppoglossion uo-
 cant. Theophrastus lib. iij.
 cap. xvij. *ἐν τοῖς ἀλλήλοις*, ele-
 ganter dicit, quod fructum
 super folijs ferat. Vulgo
 Vuulariā, Germani Zapf-

fenblatt/& Fockenblatt dicunt. Serapioni Gar Alexandriæ nominatur. *Serapio ca. 324.*
 Reliquæ appellationes præcedenti capite commemoratæ sunt.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTVM.

Vim obtinet calidam et exiccatoriam Laurus Alexandrina. Germani in faucium ulceribus, & humecta supra modum columella, & angina duntaxat hodie utuntur. At ueteres utrisq; corporis partibus illam adhibuerunt.

INTRINSECVS.

Radix illius (Dioscoride id afferente) sicca, in puluerē redacta, pondere quatuor, aut quinque drachmarum cum dulci seu Apiano uino pota, difficulter parientibus, & stillicidio urinæ laborantibus succurrit, menses cit, uti & alia quæ uocant Diuretica.

EXTRINSECVS.

Herba & radix in puluerem redacta, exiccant manantia & fluentia uulnera ac ulcera, quemadmodum uulgaris Aristolochia.

Herba in potum iniecta utuntur ad humectam supra modum columellam sicuti diximus supra.

De Sigillo Salomonis. Cap. CXXXII

1. *Primum Sigilli Salomonij genus* GERMANI HANC PLANTAM Weiswurtz / HOC EST, Albam radicem nuncupant, a colore radicis albo, quæ & geniculata ac nodosa est, & intra humum hinc inde repêdo se diffundit, non aliter atque Lupulus, seu Lolium. Gustu primo dulcedinem quamdam præ se fert, deinceps uero acrimoniam & feruorem, quemadmodum gingiber, aut is quem uulgo uocant Calamum aromaticum. Proinde recens adhuc commanducata, succum reddit lentum & glutinosum. Aprili mense asparagos suos emittit, qui in teretes caules, in formâ filiginei culmi, ex utraq; parte pulchris, uiridibus, & maioribus, latioribus, ac longioribus, quam sint Lauri Alexandriæ, folijs, hisq; densis et nonnunquam duodenis, uestitos excrescunt. Inter folia elegantissimi, candidiq; & oblongi, recti, ac teretes gignuntur flosculi, herbæ Paralysis floribus e suis uasculis excerptis, similes. Atque hic partus eius in nostris regionibus Maio Mense æditur. Appetente Augusto mense flos in rotundos, ac nigrificantes acinos, instar heracei fructus, aut Myrtillorum desinit.

2. *Sigillum Salomonij angustifolium.* Alterum huius plantæ genus, quod per omnia primo respondet, nisi quod multo angustioribus uestitur folijs, ad Mosellam in ea sylua inueni, quæ uulgo der Ydar dicitur.

Sigillum Salomonis latifolium.
Weißwurz.



NOMENCLATURAE

De praesenti quoque nostro Sigillo Salomonio, inter herbarios controuertitur, nonnulli enim ad Serapionis illud referunt, alij Polygonaton et sedicū, ea nimirum ratione moti, quod radicem habeant nodosam & geniculatam. Verum enim uero cum ipsa planta, seu caulis eius non sit geniculatus, neque radix ipsa ualde sit odorata, nekio quo pacto Polygonaton esse possit, nolim tamē cuiusquam sententiā cōtemnere, modo & mihi meam in commune rei herbariae commodum, proferre liceat. Ea autem sic se habet. De Polygonato supra cap. xl. diximus, eamq; appellationem herbae Germanis Glidweich uocatē assignauimus. Vulgo solent hanc plantam Albam radicem & Sigillum Salomonium appellare, Germani Weißwurz dicunt, uicilis enim est ad exterendas maculas faciei, praesertim eas quae sub oculis sunt. Hinc proculdubio adductus Eur-

Hermolaus Bar-
barus Radicem
Rhodiam Sigil-
lum Salomonis
uocat. Sed quae
nostra sit senten-
tia statim dicetur

ricius Cordus Polygonaton eam uocauit, nam quod Polygonaton faciei maculas delet ipse Dioscorides testatur. Sed non sunt admittendi, qui non Diosco. lib. 4. sine manifesto errore Elleborum album esse asserunt, quam paulo ante Si-
gillum

Sigillum Salomonis angustifolium.

Klein Weißwurz.

Septuaginta
Diosco. lib. 4.
cap. 143.
De Peplio uide
Dioscoridem lib.
4. cap. 163. & su
pra in commen-
tarijs nostris ca.
100. ubi de Esu
lis egimus.



hæc angustifolia.

gillum Salomonium no-
 minari diximus. Et ut se-
 mel quod sentio pronuncia-
 em, uidetur nobis omnino
 hoc Sigillum, Laureolam
 esse Dioscoridis, quod ille
 ab elegantibus folijs Euphe-
 talon cognominat, addēs,
 alios Chamædaphnen, ali-
 os Peplon uocare. Quod
 uero Sigillum Salomonis
 Laureolam seu Daphnoida
 Dioscoridis esse existi-
 mem, multa sunt quæ me
 permouent. Non enim tan-
 tum tota Laureolæ descri-
 ptio huic herbæ conuenit,
 sed & gustus feruidus, quo
 pituitam in os e' capite de-
 trahit, ueluti Pyretum, &
 uiscosus ac lentus succus,
 et locus natalis adamussim
 illi respondent. Quod si
 quis obijciat id quod Dio-
 scorides ait, radicem illi esse
 se inutilem, huic responde-
 bimus facile potuisse fieri
 incuria librariorum, ut pro
ἄχνη, hoc est, utilis, scri-
 ptum fuerit *ἀχνη*, id est,
 inutile. Sed ut dixi sæpius
 nemini sententiā nostram
 ita obtrudimus, ut diuer-
 sum sentire illi non liceat:
 hæc enim tantum conside-
 randa & dijudicanda do-

ctoribus, a nobis proponuntur. Vnum admonendi gratia adijciemus.
 Quod enim Sigillum Salomonicum certum nomen in Dioscoride hactenus non habuerit, in causa esse puto, ambiguitatem uocis Daphnoides,

quæ

quæ cum multis tribuatur herbis (nam Plin. hunc Cassiæ, nunc Clematidi eam appellationē tribuit, nunc fruticem esse dicit, cuius sententiæ Diosc. & Ægineta partim subscribunt) erroris & dubitationis occasio multis esse potuit. Atqui ego ita existimo, quocunque loco Daphnoides simpliciter legatur, ibi nostrum hoc Sigillum Salomonium intelligi debere. Et hæc de primo illius genere, quod latifolium est dicta sint. Angustifolium enim & alterum genus Chamædaphnen Dioscoridis esse puto.

Plin. li. 22. ca. 22.
& lib. 24. ca. 15.
et lib. 15. cap. 30.
Diosco. lib. 4.
cap. 7.
Diosco. lib. 4.
cap. 143.

VIRESCACIA TEMPERAMENTVM.

Laureola calidæ est naturæ, habetque vim discutiendi & expellendi concretos sanguinis grumos, aliosque viscosos humores, uomitiones mouet, & hodie externis potius quam internis corporis partibus adhibetur.

INTRINSECVS.

Aqua Laureolæ distillata, per aliquot dies mensura iij. aut iijj. ligularum pota, sanguinem concretum expellit, & calculum renum per urinam, menses elicit, & interna apostemata discutit.

Acini Laureolæ duodeni aut sedecim manducati, & aluum & uomitiones mouent. Folia uino decocta aut arida in puluerem redacta, ac ponderis drachmæ singulis uicibus sumpta, pituitam expellunt.

EXTRINSECVS.

Folia Laureolæ recentia manducata, caput inani sunt, & sternutamenta mouent.

Radix tusa sugillatis imposita, breui tempore medetur. Idem aqua distillata lintheolis excepta & calida imposita efficit.

Aqua distillata Laureolæ, nauios, maculasque corporis totius, in primis uero quæ oculis subsunt, lentiginesque emendat efficacissime, si ex illa colluantur, lintheolis etiam in ea aqua madefactis ac impositis.

De ea quæ Germanis Hendeltraut dicitur.

CAP. CXXXIII.

ENSE APRILI DVAE PROSILIUNT HERBVLAE,
M quarum altera cœruleos, altera candidos gerit flosculos. Ea quæ
cœruleum fert florem, arenosis agris & campis, quæ candido
emicat, umbrosis & uliginosis locis, uidelicet ijs qui inter muros & moenia

urbium conspiciuntur, gaudet. Vtraque non ultra dodrantem in altum extolitur, caule rotundo, unico, ac in cacumine multis ramulis, hisque hirsutis, & colore subpurpureis brachiato. Folia illis succulenta & pingua, ueluti Portulacæ & Sedi minoris, forma sua manum paruulam, aut pedem ranæ repræsentant, & in tres quasi digitos plerumque explicantur. Radicem habent rectam & breuem. Natura sua refrigerant, sicut Sedum minus.

NOMENCLATURAE.

^{italis.}
De Peplio Plinius lib. 20. cap. 20
Verba Galeni, et Aegineta de illo à Dioscoride mutata sunt.

Si lacteum succum hæ plantulæ stillarent incisæ, ad Dioscoridis caput clxiij. lib. iij. illas referre non dubitarem. Cum uero non habeant succum, hætenus nihil possum asserere. Ego in acetario hac herba usus sum, quemadmodum Lactuca uti solemus, quod ut facerem occasionem mihi dederunt uerba Dioscoridis, quibus illam sale condiri posse tradit. Siue ergo Peplis sit, siue non sit, certe illam contemnere nolumus. De nomine illius Germanico diu inquisiui diligenter, sed frustra, ne uero nomine prorsus careret, Hendelkraut illam uocare placuit, à forma manus, quoad certius aliquod addiscere liceret.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vim habent refrigerantem & humidam binæ hæ plantæ, & possunt contra noxam utrinque corpori aduersus inflammationes usurpari.

INTRINSECVS.

Possunt hæ plantæ cum cæteris in acetarijs usurpari, sunt enim meo iudicio facultatibus Portulacæ pares.

EXTRINSECVS.


Aduersus calidas affectiones utiliter usurpantur, quemadmodum & Anagallides.

De ea quam Germani Gauchblüm/hoc est, Cuculi
florem uocant. CAP. CXXXIIII.

^{italis.}
Flos Cuculi prætenfis.

M

VLTAE HERBAE APVD GERMANOS A CVCVLO
aue nomen habent, nempe Tragopogon, & ea quæ xxvi. capite supra descripta est, & ista quam nunc tractamus, quæ nusquam lætior prouenit quam in pratis. Ea cum primum profluit, folijs angustis & acua

*Cuculi flos, Germanis**Gauchblüm.*

& acutis Auriculam muris
 repræsentare uidetur, quã
 quam illa sint & angustio-
 ra & magis acuminata, ut
 eo nomine parum à folijs
 Hyssopi dissent. Thyrsos
 emittit appetente Maio mē-
 se, teretes & erectos, pau-
 cissimis folijs uestitos, quo-
 rū cacumina flosculis Berfi-
 lici colore tinctis emicant, *De Superba uide*
 forma uerò flores Superbe *infra cap. 198.*
 quàm uocant, referētibz,
 ita ut singula floris foliola
 rudimentum manus satis
 exprimant.

Alterum huius, sylvestre *Sylvestre huius*
 nimirum genus, in aridis *herbæ genus.*
 montibus humo candida
 nascens reperitur, prior
 per omnia simile, nisi quod
 florem fert prorsus candi-
 dum. Cæterum flore deci-
 dente utrunq; genus in ob-
 longis siliquis, semen con-
 clusum ostendit, non aliter
 atq; flores Gariophyllorū.

NOMENCLATURAE.

Germani hanc stirpem
Gauchblüm, hoc est, Coc-
 cycis florem nominant,
 non enim aliud expiscari il-
 lius nomen potui. Dicunt
 aut id nominis sortitam eā

esse, quod Coccyx avis notissima salua sua caulem herbæ aspergat. Nam
 habet quidem Thyrsi illius spumam quandam, maxime prope geniculos,
 candidam, unde opinio uulgi nata esse uidetur. Si florem consideres, qui

pro ratione tempestatis & clauditur, & recluditur, Anemone dici posse, uerum foliorum forma reclamationat.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Cuculi flores meo iudicio humidæ & calidæ sunt temperaturæ, possentq; usurpari utiliter, præsertim uero aqua distillata. Præterea quod de illis dicta hodie non habeo, nec enim de inexpertis quicquam temere affirmarim. Puellæ & adolescentuli ætate his floribus in sertis suis concinnandis, uti consueverunt.

De Elleboro nigro, adulterino.

CAP. CXXXV.

1.
Elleborus niger
adulterinus.

ELLEBORVS NIGER, QVEM GERMANI NOSTRI
E. Christwurtz nominant, radicem habet nigram, multis capillamentis fibratam. In fine Decembris mensis florem profert, modo in calido loco & aëri exposito, sita fuerit, quem ab eo tempore inde usque ad festum Purificationis, ut uocant, ostendit. Flos ad uiridem potius quam luteum uergit colorem, forma Malorum aut Cydoniorum, aut Capparis florem æmulatur. Bini autem & quandoque trini flores coniunctim coliculo unico, tereti, & subpurpureo insident, abeuntq; demum in filiquas quaternis aut quinis intercapedinibus diuisas, non aliter atque Aquilegia, quæ cum rumpuntur maturitate, semen læue, quod illis inerat, in terram protinus decidit. Folijs uestitur dissectis, & Pæoniæ prope similibus, sed minoribus & magis nigricantibus, perq; ambitum serratis. Radix eius amara est, illa uetulæ mulierculæ, in potum injecta, aluum subducere solent, his quos purgatos uolunt.

2.
Consiligo Ruel.
ly.

Syluestre huius herbæ genus, hortensi simile est. Flores illius in capitula quædam desinunt, ut in Nigella, semen nigrum, Dictamni Germanici semini simile. Proinde nigrati & foetidi est odoris ea herba. Gaudet lapidosis agrorum limitibus, asperisq; montibus, quales sunt illi qui ad Mosellam, Rhenum, inq; Eiffalia, & montanis syluæ Herciniæ, præsertim uero fossis argenti & aurifodinarum. Sed uerus ille & niger Elleborus, quem Rizophorinostri similiter Christwurtz appellant pulcherrima & elegantissima est planta. Nam tota substantia sua nonnunquam binos palmos excedit, radicem habet capillatam, radiculis multis perplexam & contextam, nigram, & alteri quem nigrum uocant Elleborum plane consimilem. Cauliculi illius ab imo usque ad summum teneris, serratisq; foliis ornantur, uer-

luti

3.
Elleborus niger
agrus.

Elleborus niger adulterinus, Germanis
Christwurz.



luti Abrotonum exiguum, sed uiridioribus, quin & toles surculosiores habet quam hoc ipsum Abrotonum.

In cacumine verno tempore lutei & simplices apparent flosculi, Chamois

Elleborus niger uerus.
Schwarz Nieswurz.



millam referentes pene, nisi quod longe maiores sint. Flore decedente capitella quædam in cacumine protuberant, uti & in Pinalstro fieri solet, atque hoc illius semen est.

NOMENCLATVRÆ.

Mulierculæ nostræ hanc plantam Christwurz appellât patria uoce, eo quod quandoque circa seruatoris nostri Christi natalem diem flores producat, præsertim quando temperator fuerit hyems, aut certe quod clysteribus quoque adijciatur, quod Germani Crislieren uocant. Recentiores medici omnino contendunt eam esse Elleborum nigrum Dioscoridis, quæ describit lib. iij. cap. cxlvi. nec multum ab illo ablu die descriptio. Verum non adeo est noxia hæc radix in Germania nostra, sæpenu-mero etenim uidi multos homines citra periculum illa sanatos. Quamobrem mihi quidem uidentur uerba, quæ de perniciæ eius radicis apud Theophrastum & Dioscoridem exant, in utroque autore superflua, augurorq; eam superstitionem ex Theophrasto in Dioscoridis quoque scripta irreplisse, aut certe aliud quid ueteres ut fieri potest, intellexerunt. Si namq; hic noster Elleborus niger, hominibus et pecoribus mortem afferet, quod

augurorq; eam superstitionem ex Theophrasto in Dioscoridis quoque scripta irreplisse, aut certe aliud quid ueteres ut fieri potest, intellexerunt. Si namq; hic noster Elleborus niger, hominibus et pecoribus mortem afferet,

quod

quod de suo prodidit Theophrastus, præstaret eam nusquam terrarum ex-
tare. Atqui ut diximus si moderate illo utuntur homines, non solum inno-
xius est, sed & citra periculum & fodi & usurpari a quibuscunque potest.
Dioscorides loco citato Elleborum nigrum, Veratrum nigrum, Melam-
podion, a Melampopastore, qui hac radice furentes Proetidas purgavit, &
sanauit: Procton a filiabus Proeti regis Arcadiæ, Ecstomon, Polyrhizon,
hoc est, Multiradicem, Melanorrhizon, id est, Nigam radicem, (Germanis
diceretur *Schwartzwurtzel*) Cyranion, Zomarition, Isæam, Elaphine, Ci-
meleg, Saraca, & Prodiorna, appellat. Plinius de utroque Veratro libro
xxv. cap. v. scribit, cuius uerba pene omnia ex Theophrasto desumpta
sunt. Qui usum, utilitatem, & damnum Ellebori nigri cognoscere desidera-
uerit, is legat libellum Hippocratis, quem ad Democritum scripsit, inscri-
ptione Elleborismi. Serapio utrunque Elleborum Cherbachen nominat,
Auerrhoi Barbacus & Condisi dicitur: Mesue uero Barba Alfugi, Et hæc de
domestico nigro Elleboro dicta sufficiant. De syluestri genere quod do-
mesticum per omnia æmulatur, ita ut uix discerni possint, nisi odor & radix
quæ illi non perinde fibrata, sed & breuior ac quasi inflexa est, animaduerta-
tur, supra cap. lxxxij. differuimus. De domestico genere, ut ad illud rede-
am, ego ita sentio, Consiliginem esse Ruellij, cuius meminit & Plinius, ad
quod duo me mouent. Primum quod non perinde sit noxia herba, atq;
Veratrum nigrum cuius ueteres meminerunt, qui sit etiam, ut nō possim cre-
dere eam esse Elleborum nigrum. Deinde Rizophori peregrini longe aliud
ostendunt Veratrum nigrum, quod Ingelheimij effodiunt inter Bingium,
ac Moguntiam, oppida, deferuntq; Venetias usq; , ubi magno pretio eam
radicem distrahunt. Et hic mihi uidetur esse Elleborus niger, quem & ego
anno Domini 1544. in montibus non procul ab oppido Leiningen, effo-
di.

Serap. cap. 319.
Sunt tamen qui
putant Condisi
eam esse herbā
quæ Struthion
dicitur, & a Dio
scoride lib. 2. ca.
152. describit.

VIRE S AC TEMPERAMENTVM.

Omnes prope nostrę ætatis herbarij, eam herbam quam Germani *Christwurtz* dicunt, Elleborum nigrum esse uolunt, quibus ut assentiar adduci nō
possum. Nam sine periculo intra corpus sumi potest, id quod de Elleboro
nigro nusquam legas. Quæ cum ita se habeant, ego in posterum pro in-
noxio Elleboro illam habebō, alterum autem eius genus uenenosum Aco-
nitum, quo & Lupi, & vulpes capi possint, existimabo.

Radix Ellebori nigri adulterini, domestici, *Christwurtz* appellati, uino
per noctē macerata, mēsurā dimidiati cyathi pota, aluū subducit citra dam-
num, & purgat: estq; hæc medicina aniculis admodum familiaris.

Eadem drachmę pondere in puluerem redacta, et cum uino aut alio quo-

piam liquore sumpta, in expellendo efficacior est, præterea nullius apud nostrates usus.

VERATRVM NIGRVM

in ñisopos pñis auerus.

Vtrumq; Veratrum, tam nigrum quam candidum, ex ordine est exaltescientium, & exiccantium, quare non sine singulari cura & iudicio assumi debet. Vide Constantinum de gradibus; gradu tertio.

INTRINSECVS.

Veteres, insanos, melancolicos, & male mentis homines, necnō & comitiali morbo oppressos, vertiginosos, podagricos, hydropicos, febris quartana afflictos, lepra, spasmo, & torminibus laborantes, nigro Elleboro purgare consueverunt. Sed quoniam plus detrimenti quam utilitatis eiusmodi purgatio sumentibus adfert, ideo de illa nō multum nunc dicemus. Vno tamen uerbo quod res est declarabimus. Si quis Elleboro nigro uti uelit, is non ultra drachmam accipiat, ne quod damnum sequatur. Præterea quisquis ea in re peccauerit, sentiatq; senitium grauari Elleboro, confestim lac caprinum, aut aliud quodcunque bibat, ut ueneno resistere possit. Optima autē purgatio ea est, si quis radicem in uino macerauerit, posteaq; moderate de illo uino bibat.

EXTRINSECVS.

Radix Ellebori nigri, locis muliebribus indita, menses potenter elicit, sed ut caute hoc remedio utantur mulieres, necesse est, nisi mali quid pati uelint: fistulas & inueterata uulnera ac maligna ulcera mirifice purgat, si in puluerem redacta illis inspergatur.

Eadem tusa & ex aceto cataplasmatibus instar imposita, scabiem sanat, uirginitatibus, lepris, impetiginibus, serpiginēq; medetur. Erodentibus quoq; medicamentis admiscetur, & gangrænosiss sanandis mirifice conducit.

Reliquas superstitiones quas hac de radice comminiscuntur, prudens prætereo, ociosis illas relinquens.

De Elleboro albo. Cap. CXXXVI

IOSCORIDES ELLEBORVM EVM IN PRIMIS COMMENDAT, qui ad montem Oetam, in Anticyra, ut tradit Strabo, nascitur,

Elleborus albus.

Weiß Nießwurz.



nascitur, Cyrenaicum appellatum. Huic subscribit Theophrastus, cum lib.
 x. cap. xi. optimos & usitatissimos Elleboros quatuor esse (nam ut Dio-
 scorides testatur, & in Galatia & Cappadotia Elleborus provenit) Octavū

ἐλάττω δὲ καὶ οἱ
 γὰρ οὐκ αὖτε, οἱ αὖτε,
 ποσειδῶν, ἰλιώτης,
 μακροχρόνιος, ἄρι-
 στος δὲ πάντων καὶ
 τῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἄλλων
 λαμ, ὁ ἐλάττω.

scilicet, Ponticum Eleaticum, & Messalioticum, inter omnes uero Oetrum
 præstare tradit. Nostri Rizotomi hoc genus Ellebori ex altissimis alpibus
 & montibus deportant, asserentes in sylua Hercinia quoque illum proue-
 nire. Elleborus albus quem mihi recentem uidere contigit, radicem habe-
 bat teretem, digitum crassam, foris pullam, & multis capillamentis fibra-
 tam, intus uero fungosam & candidam, gustu feruentem & acrem nam
 subinde saliuam ciebat, ueluti Pyretrum. Folia latiora folijs Gentiane, quo-
 rum costæ leuiter purpurascebant.

NOMENCLATURAE.

Agyptæ nostrates, qui tum hanc, tum etiam alias radices uenales circum-
 ferunt, solent illas perforare, ac funibus collectas gestare, quemadmodum et
 radices gladioli filo, aut funiculis ut arescant, suspendi consueuerunt. Atq;
 hanc radicem quamdiu integra manserit, & non contundatur, illi Scham-
 panier wurzel / hoc est, Campaniam uocitant, persuadentq; hominibus
 ut huiusmodi Campaniam uino per noctem macerent, ac usurpent: sic enim
 fieri ut omnes præuæ humiditates saluberrimo hoc medicamento extra-
 hantur. Et quantum mihi quidem uidetur, utilior est hæc purgatio, quam
 ea quæ radice in puluerem redacta, & intro sumpta perficitur, quam impru-
 dentes quidam & maleferiati homines sine ullo iudicio, & præter rationem
 etiam hominibus exhibent. Oportandum sane esset, ut huiusmodi Magistris,
 aut medicinæ usus & tractatio interdiceretur, aut certe cogerentur in seipsis
 medicinæ ac inhumanis huius purgationis periculum facere, quod si deinceps
 sibi ipsis eam salubrem & minime noxiam deprehenderent, posset illis
 permitti, ut & alijs hominibus eam præberent. Neque credibile est illos ar-
 tem tenere in usurpando Elleboro, quam Chrysus ille Eudemus tenuit, qui
 cum uno die uiginti duas ex Elleboro portiones sumptitasset, nullum tamen
 sensit damnum, sed pro more sine uomitionibus, & stomachi eructationi-
 bus pransus est & coenauit, prætereaq; balneauit. Quod uero nullam no-
 xam tot portiones Ellebori homini attulerunt, inde factum est teste Theo-
 phrasto, quod post septimam portione pumicem cum fortissimo aceto
 hauserit. Quæ quidem ideo mihi recitantur, ut uel hoc pacto ipsi consulam
 qui per imprudentiam nimio Ellebori usu sese læserunt. Dioscorides Elle-
 borum album ascyda, Sanguinem seu ut alij habent genituram Herculis,
 Polyidos, Anaphyston, Somphiam Vnre, Laginum, Anepsa, uocari tra-
 dit, Sed ut semel tractationem de Elleboris finiam, hæc mea est sententia,
 eam herbam quæ Germanis Christwurz dicitur, nullam esse Ellebori spe-
 ciem, nec enim descriptio nigri Ellebori illi competit, nec in uiribus cum il-
 lo conuenit. Nam sine periculo uomitionum & eructationum intro su-
 mi potest,

ἐλάττω δὲ καὶ οἱ
 Diosco. lib. 4.
 cap. 145.
 Sesamoides quæ
 à Diosco. lib. 4.
 cap. 147. descri-
 bitur, dicitur eti-
 am Elleborus al-
 bus. Sicut &
 Myrtus sylue-
 stris, Genitura
 Herculis cogno-
 minatur. Vide
 Diosco. lib. 4.
 cap. 141.

imipoteſt, quod in nigro Elleboro minime reperias, quemadmodum ſcrip-
ta ueterum & recentiorum abunde teſtantur. Quamobrem utrunque Elle-
borum pernicioſum exiſtimo, nulloq; pacto ſine conſilio periſi medici uſur-
pandum. Rurſus eam quam uulgo Elleborum nigrum omnes nuncupant,
innoxiam eſſe putamus, ſi extrinſecus uſurpetur præſertim uero in meden-
dis pecoribus, ſicut lib. vi. cap. v. Columella docuit. Sed alterum & ſylue-
ſtre eius genus, cuius cap. lxxxij, ſupra deſcriptionem habes, pari in uiri-
bus iudicamus. Nec deſunt qui pulmonis affectibus illam prodeſſe affir-
mant. Ego tamen nolim periculum facere.

VIRE S AC TEMPERAMENTVM.

Uſitatiffimus Elleborus, hoc eſt albus, calidæ quoque & ſiccæ eſt tempe-
raturæ, quamobrem diligenti cura uſus eius opus habet, & raro ad dimidi-
am drachmam exhiberi conuenit, ſemperq; & tempus anni, & ætas ac con-
ſtitutio hominis, & morbi natura conſideranda ac exactiſſime penſanda
erunt, quoties in medicamentis illo uti uolumus, aut alijs exhibere. Qua de
cauſa Hippocrates proprium libellum Elleboro dicauit, in quo docet quo
pacto illo ſit, & quibus utendum, quem docti diiſigenter legere debent. Ca-
uendum eſt etiam, ut conſulit Conſtantiuus de gradibus gradu tertio, ne ie-
ſuno ſtomacho Elleborus uſurpetur, ſed ſemper aliquid cibi prius ſumens
dum erit &c.

INTRINSECVS.

Agyrtæ nonnulli, circumforanei illi impoſtores aduerſus omnis gene-
ris internas affectiones Elleborum, Tithymalos, & Cataputiam, ut uulgo
uocant, hominibus ſæpe cum magno illorum damno propinare & exhi-
bere ſolent, quæ admonitionis gratia mihi dicuntur, quam quiſquis con-
temperit, is pergat uſque Elleboro uti ſibiq; nocere. Nam pro dolor apud
multos ea conſuetudo obrinuit, ut nullo alio quibuſcunq; in morbis utan-
tur remedio. Sed proculdubio dabunt illi imprudentiæ ſuæ poenas. Quid
uero de turpiſſimis ac flagitioliſſimis ſcortis dicam: quæ ne palam flagitia
ſua fateri cogantur, non dubitant, & ſibi & foetui morbum & internecionē
Elleboro conciliare. Atq; illas quidem culeo inſutas, & in flumen deiectas
medicari conuenit. Sed relictis his ſcleribus uires Ellebori albi proſequa-
mur.

Ellebori radix per uiginti quatuor horas, uino aut Oxymelite macera-
ta, poſteaue reſiccata, poteſt dimidiæ drachmæ pondere, aut ſaltem tanto,
quanto pro conſtitutione huius opus eſſe uidebitur, cum uino exhiberi ſu-
rioſis.

riosis & melancolicis, necnon aduersus eos morbos, quorum superiori capite meminimus, nam uomitiones ciet isthæc purgatio.

Sin uero potiunculam ex illa præparare uolueris, tum uel biduo uino illam macerabis, aut iure carniū decoques, & cyathum mediocrem ex illa exhibebis ægroto. Hæc purgatio tamen si & aluum & uomitiones moueat, nullo tamen cum periculo coniuncta est.

*Galen, lib. 2.
Simp, cap. 5.*

Affectiões aduersus quas Elleborus facit, proximo capite commemoratæ sunt. Breuiter tamen hoc scias, nigrum per aluum, album uero per uomitiones purgare.

EXTRINSECVS.

Elleborus cum Sampsucho naribus inditus, cerebrum purgat, sternuta menta mouet.

Ellebori radix aceto decocta, ac in ore aliquandiū retenta, dolorem dentium tollit.

Eadem radix abscessibus scabie, & inueteratis ulceribus purgandis usurpatur.

In lixiuio decocta, si illo postea caput ablwas, pediculos & surfures enecat. Idem unguento aliquo admixta præstat.

Radix Ellebori cum melle & farina temperata, si pinsatur, utilis est ad capiendos glires & mures. Ea in referunt nigrum Elleborum efficaciorē esse, omnibusq; pecoribus lætalem.

Ellebori radix in lacte decocta, & muscis proposita, illas enecat, nam quotquot illud lac degustauerint, intumescunt, rumpentur & illa muscis.

De Elleboro nigro adulterino syluestri, quam nonnulli Consiliginem Plinij & Columellæ esseasserunt, ita perscriptum reliquit Lucius Columella lib. vi. cap. v.

Præsens etiā remedium cognouimus radicula, quam pastores Consiliginem uocant. Ea in Maris montibus plurima nascitur, omniq; pecori maxime est salutaris. Laua manu effoditur ante solis ortum: sic enim lecta maiorem uim creditur habere. Vfus eius traditur talis. ænea subula pars auriculæ latissima circumscribitur, ita ut manante sanguine tanquam O literæ ductus appareat orbiculus. Hoc & intrinsecus, & ex superiore parte auriculæ cum factum est, mediā pars descripti orbiculi eadem subula transiit, & facto foramini prædicta radícula inseritur, quam cum recens plaga comprehendit, ita continet, ut elabi non possit, in eam deinde auriculam omnis uis morbi, pestilensq; uirus elicitur, donec pars quæ subula circumscripta est, demortua excidat, & minimæ partis iactura caput conseruatur.

Hæcille.

De

De Herba uenti.

Cap.

CXXXVII.

Ruchenschell.



HIC VERO RVRSVS incognitam, & quasi peregrinam herbam præ manibus habemus, quam mulierculæ nostræ herbariæ Ruchenschell uocant, uel Rûschell/quod est si interpretris, Campanula culinæ aut vaccæ, ea proculdubio ratione, quod flores eius purpurei, qui intus uti & rosæ stamina quædam seu capillamenta lutea habent, Cymbalis non admodum dissimiles sint. Inuenitur in arena, arida, & argillosa terra, necnō in syluis, floret Martio mense. Radicem habet nigram et capillatā, quem admodum Elleborus niger adulterinus, herbam uero Foeniculo per omnia similem. Maio mense flos in caput quoddam desinit incanum, capillatum, teres, hirsutum, et quod Erinacei animalis rudimentum non infeliciter exprimat, atque hoc illius semen est, nepe singula capillamenta quæ inferne instar setæ suillæ caulis inserta sunt. Caulis illi nonnumquam dodrantalis, feruentis & adurentis saporis her-

ba, & quæ linguam gustata uellicat, non aliter atque Piper, aut Ranunculus,

lus, & Aron. Propter feruentem gustum in horto meo tuta & illæsa, ab iniuria bestiarum mansit.

NOMENCLATURA.

Germani hanc plantam *Büschellen* / *Baekerfraut* / & *Schlotten blümen* / Latini Herbam venti uominant. Gallis & Italis *Cocles* dicitur. Quod illi sit apud Dioscoridem nomen nondum constat, mihi uidetur quod ad acrem & feruentem gustum attinet, Ranunculi genus esse, nimirum id quod *Sardonium* dicitur, de quo Dioscorides lib. ij. cap. clxvi. egit, nam si teratur hæc herba adeo acris est, ut etiam lachrymas eliciat.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Herba uenti calida est & sicca, debetq; magis externis quam internis corporis partibus adhiberi. Si uero sit Ranunculi genus (quod ego mihi persuasum deo) duntaxat extrinsecus usurpari debet, & nunquam intro sumi.

INTRINSECVS.

Si hæc herba *Oreoselinon* sit, quemadmodum quidam putarunt, potest uel radix, uel semen uino decoqui, atq; illis præberi quos calculus uexat, præterea etiam frigidis muliebris ad proritandos menses.

EXTRINSECVS.

Herba commanducata, linguam ualde adurit, quare erodentibus gangrænosam carnem ac causticis medicamentis, necnon & malignis ac putridis uulneribus mundificandis, adhiberi potest, sicut *Perficaria*.


Succo etenim papulæ, mariscæ, verrucæ & maculæ exteruntur.

Aqua distillata aliquanto mitior est, & purificandis uulneribus, & aptior & tolerabilior. Herba recens tusa, cumq; succo suo duris & scabris unguibus imposita, absumit quicquid id est uisum. Radix siccata, naribusq; indita, sternutamenta ciet.

De Petasite. Cap. CXXXVIII.

ETASITES IN FINE FEBRUARII FLORIBVS SV-
is, quos in albo purpureos, agglomeratos, & botri figuram re-
ferentes, caulidodrantali, cauo, et purpureo insidentes, primum
omnium

Petasites.
Pestilenzwurz.



omnium proferre, conspicua est herba. Hi marcescentes una cum colliculo
suo sine fructu abeunt ac decidunt. Postea incana rotunda & cineracea folia
prodire incipiunt, quæ in principio quidem ungulæ caballinæ admodum
similia.

similia apparent, demum uero in tantam crescunt amplitudinem, ut unum interdum orbicularem mensam prorsus tegat, quod ego saepenumero uidi. Singula autem folia singulos habent, purpureos canos & hirsutos pediculos, quibus superposita, pilei ampli baculo superpositi figurā obtinēt. Radix illi nonnunquam brachium humanum crassa, intus candida, fungosa, uehementer odorata & amara, & quæ ubi semel plantata fuerit, non facile eijci possit, propterea quod hinc inde humi serpat & radiceatur. Id quod in horto meo deprehendi, in quo uno anno trium cubitorum spatium occupauit, subinde alias ex se radículas emittens. Nascitur plerunque Petasites humidis locis, marginibus fluuiorum, nonnullis pratis, quæ riuulis irrigantur. Radix sicca gummi quoddam stillat compressa.

NOMENCLATURA.

Hanc Herbam Germani *Rosspappel*, hoc est, Maluam equinam, propter amplitudinem foliorum, & *Pestilenz wurzel* uocant, hoc est pestilentialē radicem, propterea quod experientia comprobatum sit radicem hanc misce conferre pestilentialibus febribus, quod sudorem uehementer moueat, si in puluerem redacta in uino (uti decet) sumatur. Nec minori efficacia bibitur a mulieribus, quas uteri tormina & præfocationes exercent. Quæ omnia eo mihi dicuntur, quod cupiam in usum & medicinā hanc utilissimam radicem recipi. Non desunt etiam veterinarij quidam qui eiusmodi radice utuntur aduersus uermes qui equos molestant, & alios ipsorum tam interiores quam exteriores morbos.

Diosco. lib. 4.
cap. 193.

Latinis posset hæc herba dici *Galerita*, nam quod ad foliorum amplitudinem attinet *metastictis* Dioscoridis forsā fuerit. Sed cum uires & odorem exactius considero, *Costi* genus esse dixerim.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Radix Petasitis dubio procul sicco & calido est prædita temperamento, ideoq; aduersus omne uenenum utrisque corporis partibus adhiberi efficaciter potest. Hæc uero posse, amaritudo eius euidentissime demonstrari. Finis enim saporis amari est abstergere, sicut Galenus lib. iij. de simp. facult. cap. xviij. fusius docet.

INTRINSECVS.

Præcipua iuuamenta quæ hæc radix præstat, sub nomenclatura eius excerpti sumus. Proinde licet non sit genus *Costi*, tamen uino decocta & pota, succurrit ijs qui spiritus difficultate laborant. Facit & aduersus latos uentris uermes, qui semina Cucurbitarum referunt. Postremo & urinam & menses citæ hæc potio.

EXTRIN-

EXTRINSECVS.

Radix siccata in puluerem redacta, efficax est ad quæuis fluentia & præhumida uulnera. Oleum ex hac radice confectum, si illo inungantur febricitantes ante accessionem febris apprime conducit. Idem & ad reliquas cutis foeditates facit, & perfrictionibus neruorum & membrorum unice prodest.

De Tussilagine, seu Vngula caballina.

CAP. CXXXIX.

TUSSILAGO NOBILISSIMA ILLA PLANTA, PETASITI quoad folia in initijs adeo similis apparet, ut discerni uix possint, nisi quis diligenter animaduertat, & consideret & flores & substantiam utriusque. Nam Tussilago tota sua substantia magis tenuis & exigua, breuior & angustior existit altera. Deinde Tussilago Martio mense flores profert luteos, multiplices, cauli hirsuto & lanuginoso insidentes, Auriculæ muris flauis flosculis similes, qui non multo postquam enati fuerint in pappos euanescent, quod in Hieracijs quoque fieri consuevit, tum uero nudi caules relinquuntur, qui & ipsi appetente Maio mense, caduci marcent. Aprili mense folia prodeunt, inferiore sui parte qua terram spectant, cinerei coloris, vngulæ equinæ similia, unde & vngulæ caballinæ nomen sortita est herba. Radix illi alba, culmum crassa, & quæ hinc inde per terram spargatur, non aliter atq; Lolij, neque enim facile ubi semel plantata fuerit, eradicari potest, siquidem ex radiculis quas plures singulis annis ex ueteri emittit, semper repullulascit. In aquosis & humidis agris nascitur.

NOMENCLATURAÆ.


Germani hanc plantam Brandt laticch (quasi ambustorum Lactucam) quod ambustis & inflammationibus quibusuis medeatur: & Rosshub/hoc est, vngulam equinam, a foliorum cum vngula equi similitudine, & nonnulli Brantlerschen, hoc est, Arcion, & Personatiam (sed quam recte ipsi uiderint) appellant. Dioscorides *βίχιν*, Tussilaginem uocat, atq; illis Rhichion, alijs Petrinam, alijs Peganon, alijs Pithion, alijs Pagonaton, alijs Chamgleucen, alijs Procheton, alijs Arcophyton, alijs Chamggeron, Aegyptijs Saathan, quibusdam Pharphariam, aut Farfarum, aut Pustulaginem, Beliss denique Afadicti. Plinius Tussilaginem Cacaliam, Farranum, & Farfugium cognominat, quibus uocibus maxime duabus posterioribus errore

De Arcio & Arcio suo quoque loco dicemus.

Dicitur autem *βίχιν*, quod *βίχιν*, hoc est, Tussilaginem, & Orthopneum sanare creditur, Galenus simp. facul. li. 6. Plinius lib. 26.

ca. 6. & lib. 24. cap. 15.

Vngula caballina.
Koschüb.



subesse puto, rectius enim Farfarus legeretur. Vides rursus unam & eandem herbam quam plurimas obtinere nomenclaturas, quæ ne erroris causa alicui esse possint, diligencius paulo excutiemus, initium facituri a' Bechij & Tussi.

& Tussilaginis appellationibus, nam autores rei herbariæ in illis parum conueniunt. Apuleius etenim cap. c. j. Saluiam, Bechion & Tussilaginem uocat, quare ubicunque in illo autore Tussilaginis aut Bechij incidit mentio, Saluiam semper intellige. Apud Dioscoridem uero & Plinium quoties Tussilaginem aut Bechium legeris, toties de præsentis nostra Vngula caballina sermonem fieri scias. Ex his uides duas herbas Bechij nomine insigniri, & Tussilagine uocari, hoc est, *Gustenkreuter*; sic enim Germani dicerent, nimirum Vngulam caballinam, & Saluiam.

Nec desunt qui non sine magno errore eam quæ alijs Nymphaea dicitur, Tussilaginem esse contendunt.

Iam ut ad alias quoque nomenclationes ueniamus, dicitur hæc herba & Pharpharia, aut ut alijs placet, Farfarella, nulla sane alia ratione, quam quod folia eius, folijs Populi albæ, quam ueteres Farfarum uocitabant, satis respondeant. Idem de uoce Chamæleuces, hoc est, humilis populi, sentias uelim, qua ideo donata est hæc planta, quod folia illius plus affinitatis cum Populo habeant, quam cum Hedera. Dicitur & Chamægyros, quæ & ipsa Populi, cum qua in folijs Vngulam caballinam conuenire diximus, appellatio, esse uidetur. Vide Dioscoridem lib. i. cap. xcviij. Appellatur & Pustulago, quæ uox si in Vstilaginem conuerteretur, non male ad hanc plantam meo iudicio quadraret. Postremo in his appellationibus, hoc unice miror, qui factum sit, quod Pegani, hoc est Rutæ appellatio, inter cæteras Vngula caballinæ attributa fuerit, cum tamen nulla plane similitudo foliorum inter has duas plantas intercedat. Quæ cum ita se habeant aliud quod addam non habeo, nisi Dioscoridis libros esse deprauatissimos, maxime quod ad nomenclaturarum insulsam ac prorsus ineptam illam congeriem attinet. Oprandum autem est, ut aliquando a uiris doctis repurgaretur, quo facilius illius opera uti possemus. Simon Ianuensis scribit Vngulam caballinam, Farfaram, aut Dardanam uocari, duorumque esse generum, maiorem scilicet & minorem. Minorem ait in uineis & agris prouenire, maiorem uero in ripis aquarum inueniri, & a nonnullis Cassulam cordis uocari, eamque habere exiguam & odoratam radicem. Quod si paulo secus hæc uerba haberet, hoc est ut diceret Ianuensis. Maiorem ex his in ripis & humidis locis nasci, radicem habere crassam & bene odoratam, certe facile cum illo sentirem, eiusque sententiam hoc pacto interpretarer, Vngulam caballinam minorem Bechium esse, maiorem uero, Petasiten, quam nos Costum Germanicum appellauimus. Controuersiam de personatis laruis Leonici & Collinuti in præsentia missam facimus, nam uterque de rebus istis scribit, quas pro maiori parte nunquam uidit, quod Plinio illi obijciunt.

Vide Plantum in Pœnulo. Hedera terrestris similiter Chamæleucæ dicitur. Vide Dioscorid. lib. 4. cap. 121.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vngula caballina frigida est & humida, quare non immerito aduer-

sus siccam & calidam tussim usurpatur, necnon aduersus quasuis inflammationes & ambusta igni.

INTRINSECVS.

Aqua herbæ distillata, & per uices mensura quatuor cochlearium pota, & lintheolis foris imposita, inflammationibus iecoris, erosionibus stomachi, uenenosæ ardentis febris, unice conducit.

Quod si hanc aquam efficaciorē reddere uelis, ad ea quæ diximus, tum herbam accipe Ungulæ caballinæ, florem Sambuci, & Solatrum, æquis portionibus, easq; herbas simul minutim concisas distilla, dici non potest quanta huius aquæ sit efficacia.

Dioscorides testatur, folia siccata & incensa, si fumus ille hianti ore rapitur, eos sanare qui sicca tussi atque orthopnoea infestantur.

Tussilago decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus enicit.

EXTRINSECVS.

Folia Tussilaginis, succus illius & aqua distillata, maxime ea cui flos Sambuci & Solatri adiungitur, efficaciter inflammationibus, Anthraci, sacris ignibus, mariscis, quibusuis calidis abscessibus, & ambustis etiam igne medentur illitu & impositu.

Aduersus calidos capitis dolores, & æstus ardentium febrium, folia imponi debent, & aqua etiam distillata in lintheolis.

Aquam distillatam ad quasuis totius corporis pustulas, ab æstu & calore profectas, mirifice facere experientia certa comprobatur est.

In primis uero mulieribus utilis est, quæ cum ardenti aliqua affectione pudendorum infestantur, ex hac aqua locos colluant, & lintheolos in eam defectos imponant, tum sentient breui auxilium. Idem etiam | mariscis remedium esto.

De Angelica. Cap. CXL.

INTER PLANTAS OMNES VIX ALIÆ DVÆ ADEO
 I confimiles apparent atque Angelica & Ligusticum, si enim herbam & caules, & radicem, & flores, semen denique odorem & saporem utriusque diligenter consideres, amabo te quid Angelicæ similis reperias Leuisticæ. Quæ cum ita se habeant, de duabus his nobilissimis stirpibus coniunctim commentabimur, nec enim diuellendas existimamus, quas tanta formæ affinitate natura sociauit. Angelica itaque, ut ab illa au-
 spicemur,

2.
 Angelica satina.

Angelica.
Angelica.



spicemur, folia habet ad ficulnea quadantenus accedentia, sed magis dissecta & undique per ambitum serrata, ueluti herba Brancæ vrsinæ, nisi quod illa sint teneriora, molliora, & uiridiora. Radix illi longa, recta adnatis ali-

Dd ij

Angelica sylvestris.
Wild Angelica.



quando radiculis alijs & fibris capillata, liquorem croceum & lentum incisa stillans, fortissimi & odoris et saporis. Altero aut tertio demum anno caulem emit longum, crassum & concavum, nodosum, instar arundinis, aut bacculi fortissimi, in cuius cacumine tenues, caui, & quasi inflati sacculi nascuntur, ex quibus umbellę prorepunt, uti in Foeniculo uidere est, luteis emicantes flosculis, qui in semen tandem Leuistici aut Brancę vrsinę simile desinunt, odore et sapore acri præditum, non secus atque radix. Ex semine plantatur Angelica, quod sicut Chærefolium ex humo primum prodire solet, folijs primis Petroselinaceis similibus. Radices autem magna cura transplantandę sunt, dū in tenera adhuc existunt ætate.

Sylvestris Angelica satius per omnia similis est, nisi quod nonnunquam candidum fert florem, odor illi necnon & sapor non perinde chemens. Nascitur in opacis & umbrosis locis,

nonnunquam in ripis fluviorum, & quibusdam sylvis.

Alia proinde herba passim provenit, quę Angelicam aliquo pacto æmulari forma videtur, florem gerens in umbellis candidum, radice per terram sparsa,

2.
Angelica sylvestris.

3.
Vitium Angelice.

sparsa, ueluti Lolium. Nascitur ubiq; in hortis graminosis. Ea mihi nihil aliud uidetur esse quam uitium quoddam Angelicæ.

NOMENCLATURAE.

Multi hodie ex recentioribus medicis ac herbarijs, qui eo quod ueterū scripta, aut non legunt, aut negligenter & obiter pertransennam quasi uident, & interea tamen magno cum mortalium damno Medicos se præter simplicium cognitionem, quam ex ueterum scriptis haurire debebāt, uendicare non dubitant, n̄ inquam (nam ad doctos & qui recto itinere ingreditur, hic noster sermo non pertinet) dicere non uerentur, Angelicam ueteribus haudquaquam fuisse cognitam, sed a neotericis herbarijs in altissimis montibus eam fuisse inuentam. Et recte illi quidem in montibus eam repertam testantur, nam si Plinio credimus, iam olim in montibus Arcadiæ ab Hercule inuenta fuit. Quamobrem hanc nostram Angelicam Panaces Herculeum Dioscoridis esse sentio, & ut ita iudicem multis causis moueor. Non enim tantum similis est Angelica Leuistico, sed etiam cum recens adhuc est, thus optimum redolent folia, quod idem Theophrastus una mecum testatur, ut interim præteream uires eius quas habet, aduersus omne tam internis quam externis in partibus corporis uenenum, præsertim uero contra ictus & morsus serpentum & canum rabiosorum, quod ego ipse ex perentia certa didici, efficacissimas. Et ut paucis uerbis multa dicam, tantis pollet uiribus Angelica, ut malim certe, quod ad me attrinet domi meæ habere radices Angelicæ, Astrantiæ, Ligustici, Gentianæ, Elenij, Aristolochiæ, Petasitis, quam omnes Arabicas, ut uulgo loquuntur species, Pefoartici inquam & Liberantis, &c. Serapio hoc Panacis genus Steusir uocat, Succus eius Auerrhoi Opopanax dicitur. Germani Angelicam Angelick/der heyligen geists wurzel/hoc est Sancti spiritus radicem, & Brustwurtzel/hoc est pectoris radicem nuncupant. Syluestrem angelicam, Germani Wild Angelick/& nonnulli Wundkraut/hoc est Vulnerariam dicunt, qd uulneribus mundandis & sanandis conducatur. Postremum autem genus, aut uitium potius Angelicæ Mediomatrices materna lingua Hynfuß/ & Witscherlewetsch nominant, nam hinc inde per humum serpit ueluti Lolium.

πανακίς ἡ ῥάδις
Diosco. lib. 3.

cap. 50.

Multi sunt qui
Angelicā Smyr-

nium appellant.

Sed de Smyrnio
paulo post.

Theoph. lib. 10.

cap. 32.

Scrap. cap. 252.

Non desunt qui

Remescir Aui-

cennæ id esse pu-

tant, quod Opo-

panax alias duci-

tur.

VIRESC TEMPERAMENTVM.

Omnibus prope regionibus nota est Angelica, ob insignes facultates, quas obtinet. Temperamento est calida & sicca.

INTRINSECVS.

Iuuamenta Angelicę sub nomenclaturis partim sunt explicata, inter quę id præcipuum est, quod uenenum educit, sanguinem disijcit, & corpus excalfacit.

Eadem potest aqua ex radice, non herba, distillata.

Si quis peste, febris repentina, aut sudore immodico corripitur, is radicis Angelicę in puluerem redactę dimidiam drachmam, cum Theriacę drachma misceat, in tribus aut quatuor cochlearibus aquę ex radice Angelicę distillatę, bibat, deinde in lectum se componat, seque probe contegat, ac ad minus tribus post horis ieiunet: quod si fecerit, incipiet sudare, & (Deo fauente) periculum omne euadet, morboque liberabitur. Quod si Theriaca non suppetat, tunc pulueris radicis drachmam integram, cum aqua distillata sumas, ut iam diximus, pari ratione liberationem senties.

Radix in aceto macerata, tempore pestis odorata, et nonnumquam etiam aceto illo potio si ieiunus sis, præseruat a lue pestifera corpus.

Aqua radicis distillata, aut radix ipsa in puluerem redacta, ac cum uino posita, tormina ex frigore orta sedat, modo nulla illis alui astricta adiuncta fuerit.

Breuius omnibus internis affectionibus prodest aqua distillata, & radix in puluerem redacta, nempe Pleuritico morbo incipienti, nam collectiones eiusmodi discutit, ruptis & pulmonis uitijs, unde tussis plerumque grauissimę oriuntur, torminibus, stillicidio urinę & strangurię, mensibus & foetibus mouendis & trahendis, internis denique quibusuis tumoribus & flatibus discutiendis.

Ad omnia illa possunt decoctiones & portiones ex Angelica confici, si uel uino uel melle, prout ratio ægrorum postulare uidebitur, decoquatur radix.

EXTRINSECVS.

Succus Angelicę cauis dentibus inditus, dolore liberat. Aqua distillata auribus indita, idem potest. Succus etiam et aqua distillata, oculorum aciem illitu excitat, claritatem adiuuat, pelliculasque oculis obductas, unde caliginem sequi necesse est, rumpunt.

Ex Angelica & pice optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus quę in rabiem effrangentur.

Remedium præstantissimum est aqua distillata, succusue instillatus aut puluis radicis inspersus, in ueteratis & profundis ulceribus, illa enim mundat, & nudata ossa corpore operit.

Aqua distillata, podagricis, Ilchiadicis illitu prodest, dolorem enim sedat, & collectos ac lentos humores dissoluit.

Alia iuuamenta ex his quæ diximus colligi possunt.

Semen eiusdem cum radice est efficaciaz.

Syluestris Angelicæ radix, & semen non tantarum sunt uirium. Hodie illis in uino decoctis in uulneribus recentibus sanandis utuntur.

De Angelicæ radice, Vergilius li. xij Æneid. cecinisse uidetur cum inquit,

Spargit Ambrosiæ succos & odoriferam Panaceam.

De Ligustico. Cap. CXLI.

VM DE PANACE HERCVLEO PRAECEDENTI CAPITE scripserimus, uidetur ipsa affinitas, quæ Angelicæ cum Ligustico intercedit, id postulare, ut deinceps de Ligustico agamus. Ac manifestum est non solum ex scriptis Dioscoridis, Panaci Herculeo simile esse Ligusticum, radice, caule, & uiribus, sed etiam hoc ipsum ita se habere ne minem inficiari posse puto, qui saltem utranque plantam uiderit, & contulerit, ita tamen ut Historiam Panacum cognitam habeat. Quod si quis hoc pacto diligenter has stirpes ad natuias imagines examinarit, & historiam Panacum simul perpenderit, is proculdubio nostram sententiam non abiiciet. Sin uero quod semper addimus, quisquam in Dioscoride alium locum ostenderit, in quem commodius binæ hæ plantæ referri possint, illi subscribere non dubitamus. Sed obijciat aliquis, descriptionem Dioscoridis cum nostro Ligustico minime per omnia conuenire, maxime quod ad folia attinet. His respondebimus, multas tales in Dioscoride & Theophrasto obiectiones inueniri, quæ si ubique locum habere debent, nihil certi nobis fere relinquetur in optimis authoribus. Quid enim de Rosmarino dicam, ut reliqua innumera præteream, amabo te an non descriptio Rosmarini apud Theophrastum plurimum ab ipsa planta dissidet? Verum ut his relictis ad historiam Ligustici nostri ueniamus, retineat quisque suum Ligusticum, ego quid sentiam dixi. Leonhardus Fuchsius Ligusticum Smyrnion Dioscoridis esse dicit. Rursus Smyrni appellationē Angelicæ tribuit Euri-
cius Cordus.

Ligusticum itaque passim in omnibus hortis satum prouenit. Semen illius ubi maturuit Angelicæ semini adeo simile est, ut discerni illa duo genera uix possint. Illud cum satum ē terra proflit, binis suis quæ primum emittit folijs Angelicam refert, sed maiora sunt & contractiora foliola Ligustici, folijs Angelicæ. Herba & folijs, ubi adoleuerint, deinde & concauo, nodosoq; caule & radice, adeo repræsentat Angelicam, ut nulla alia planta. Tria uero sunt quibus ab Angelica Ligusticum distat, nimirum magnitudo

*Theoph. li. 10.
cap. 12.*

Ligusticum satum.

Ligusticum.
Lybstöckel.



do, color uiridis, quem habet dilutiorem, nec tam nigricantem uti Angelica, & incisuræ, quæ sunt profundiores Muscarium in capitibus caulium Fœniculo simile habet, Nullo flore emicans, idq; sub Iulium mensem. Porro quocunq;

quocunque transferatur radix Ligustici, non facile illa interit, sed singulis annis Maio mense asparagos suos rubicundos, ueluti Pæonia emittit. Sæpenuero duodenos annos in terra incolumis manet (si non ledatur) qd in Angelica non contingit Illius namque radix, postquam semel defloruit, semenq; produxerit (id quod secundo plerumq; aut tertio anno fieri solet) purilagine demum corrumpitur in terra, quamuis syluestris Angelica, & uitium eius non perinde facile pereant. Radix Ligustici grauissimo odore, acri etiam gustu, ut linguam uellicet manducata, prædita est. Lentum quoq; & luteum stillat succum incisa.

Syluestre Ligustici genus in fossis, pratis, & lacubus ac paludibus quancumq; prouenit, radice caua & fungosa, adeoq; longa, ut fundum aque attingere non possit, quare aquæ prorsus supernatat. Caulis illius & folia plus habent cum Ligustico affinitatis, quam cum Foeniculo, sed tota sua substantia est minus, & odore etiam ac sapore remissius, cætera Leuistico simile.

^{2.}
Syluestre Ligusticum.

NOMENCLATURAE.

Ligusticum herba est odoratissima, balneisq; accommodatissima, cuius radix apprimè aduersus quoduis uenenum facit, quo nomine proculdubio a Liguribus amata fuit, & in cibis usurpata. Dioscorides Ligusticum Panaceam, & Panaces cognominat. Galenus Libysticum uocauit. Neoterici quibusdam Leuisticum dicitur. Germanis Lybstöckel. Veteres Ligustici, Elenij aliarumq; herbarum radices aceto condierunt, quemadmodum lib. xij. testatur Columella. Quod si loco Piperis & Gingiberis uulgus hac radice in cibo uteretur, parsimonia magnum tandem uestigal acquireret. Sunt qui putent Cheismi, seu Keismi Arabum, esse Leuisticum. Alij alia quoque nomina Leuistico tribuunt, nimirum Thalaspium, Thalapis, & Scandilatum. Et hæc de nomenclaturis Ligustici dicta sufficiant.

Diosco. lib. 3.
cap. 53.
arguunt dicitur
quod in Liguria
inuenta sit hæc
planta.

Syluestre Leuistici genus, ego cum alijs erraticum Foeniculum esse existimo, quod Dioscorides lib. iij. cap. lxxv. Hippomarathron, Marathrida, agreste Marathrum, Thimaricolinū, Myum, Systrameor. Foeniculum erraticum, cognominat. Germani Wilden Fenchel/ seu. Rosfenchel/ & Weierfenchel/ agreste seu syluestre Foeniculum, Equinum fœniculum, & Palustre fœniculum uocant. Serapio. Othomarathrum uocat, estq; id tertium illius quod describit Foeniculum, quod dicit semen Coriandro simile proferre, sed illud alterius esse generis puto, aut si idem cum hoc nostro sit, ut seipsum non intelligat necesse est. Alio rursus loco montani cuiusdam Fœniculi meminit, quod Fahar dicit, atq; illud aliquantulum Hippomarathro Dioscoridis respondere uidetur. Hippomarathri meminit etiam Nicander in Theriacis, ubi aduersus ictus serpentum docet remedia &c. Quod uero ego hoc

*Manlius super
confect. Oximel.
Squil.
Dicitur et Elatrum
Peucedanum.
Dioscor. lib. 4.
cap. 149.*

hoc loco huius herbe mentionem facere uolui, id in causa fuit, quod forma, odore, & sapore ad Leuisticum magis quam Foeniculum accedit. Sunt quidam qui uolunt hanc herbam Cordumenum & Carui agreste dici, & esse semen Peucedani. Sed nemini obscurum est, aliam esse, & peculiarem plantam Peucedanum, quod describit Dioscorides lib. iij. cap. lxxxij. Sed quid hæc ad Foeniculum syluestre? Relinquantur ergo cuique plantæ suæ appellatio, nes. Phriscus Peucedanum sequentibus appellationibus insignit, Foeniculum agreste, Algul, Cusaunon, Porcinum, Herbaturum. Credibile est autem bonum illum uirum hanc herbam non uidisse, sed ex Petro de Crescen- tiijs, qui nomina illa recenset, didicisse.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vtrumq; Ligusticum ex ordine est exiccantium & excalfacientium, ad uenena propulsanda utilissimum, non minus atq; Angelica.

INTRINSECVS.

Ligustici satiui radix, siccata ac in puluerem redacta, condimentum est optimum, quo cibi condiuntur, non minus atq; Piper, quod e' longinquis regionibus ad nos deportatur. Vtilis est stomacho frigido, concoctionem adiuuat, omnes superfluas humiditates consumit: internos sedat dolores in uino pota pondere dimidiæ drachmæ, uenenum educit, urinam & menses trahit, & ad omnia ad quæ Angelica facit, usurpari potest.

Semen in omnibus feruentius est efficacious.

Aqua distillata discutit & sanat anginam, & pleuriticum morbum, gargariffata & pota.

Radix aceto & sale condita conseruari potest uti Elenij, aliarumq; herbarum.

Syluestre, seu palustre Ligusticum, calculos & uenenum expellit, dolores sedat, & omnia præstat quæ satiuum.

Radix illius & semen uino decocta ac pota, morbum regium & atram melancholiam educunt.

EXTRINSECVS.

Vtrumq; Ligusticum in fessionibus & balneis adhibetur utiliter, ad ciendum urinam, calculos ac menses, necnon ad excalfacienda omnia interna membra.

Radix aut semen tulum ac impositum, ictibus atq; morsibus serpentum, uiperarum,

uisperarum, araneorum, scorpionum, & canis rabiosi medetur, dolorem namque mitigat, & uenenum educit.

Puerperæ harum herbarum radices, folia & semina in cibo & potu suo usurpent, & balneis sudatorijs suis adijciant, ut a partu recte purgentur.

Aqua Ligustici distillata & imposita, tumenti capiti utilis est, & gutturi uulnerato apprime conducit, gargarissata, & sicum illa colluatur guttur.

Angina etiam sanatur Ligustico, si per caulem eius continuo bibas.

Aqua distillata clara redditur & pura facies, & uitia cutis deformis ac nigrae, maculas & fugillata, cicatrices etiam a scabie & abscessibus relictas exterit & emendat, si ex illa per aliquot dies colluantur.

Eadem ad oris & colli, ani, & locorum muliebrium exulcerationes & uitia utilis, si lineis pannis aqua affectis partibus imponatur.

De Fœniculo montano.

Cap. CXLII.

DVAE EXTANT PLANTAE, CAULE, FOLIIS, VMBELLIS, & radice Fœniculo quam similitimæ, quarum alteram quæ & odoratior est, nusquam locorum inueni, quam in altissimis montibus & syluis, quales sunt Hercynia, & quæ Germanis dicuntur der Spessart, & Ydar. Ea per omnia Fœniculum repræsentat. Florem in muscarijs habet prorsus candidum ueluti Cicutæ, semen maius Aniso. Radix illius satis bono odore, sed admodum acris sapore est prædita, ut degustantis linguam uellicet, & ipsum gingiber acrimonia superet.

Altera odore, sapore, & forma iam dictæ pene consimilis est, quamuis non tam sit odorata atque acris ac illa. Nascitur passim in pratis. Folia autem eius, caulis & umbellæ, plus habent cum vulgari pratensi cumino, quo etiam tota sua substantia maior est, quam cum Fœniculo affinitatis. Floret Iunio mense, quo & Cuminum. Radix odoris est peregrini, quicquid prope Daucum redoleat, est enim & pilis ueluti ille obducta.

1.
Fœniculum montanum.

2.
Cuminum equisetum.

NOMENCLATURAE.

Si Fœniculum montanum luteum proferret florem, optimo iure Panaces Asclepium dici posset, quod Nicander in Theriaca Phlegyenum, a Phlegijs populis cognominat. Cum uero candidus flos sit, nihil ausim affirmare, tamen de colore nulla moueri debebat controuersia. Equidem sæpe numero a doctissimis rei herbariæ uiris petij, quodnam esset herbarum huius nomen, nunquam tamen quicquam ex illis super hac recognoscere potui.

Quamobrem

Quamobrem, dum meliora quis in medium adferret, uolui illam Fœniculum montanum, Germanice Berg fenichel appellare.

2. Altera uero quæ in pratis nascitur, ad idem caput commode referri posset, tamen si radicem habeat tenuem, & non perinde acrem, vulgo Germani Rosßkummel / hoc est Cyminum equinum uocant, nam semen Cymino simile est, sed multo maius. Serapio cap. ccxcviij. Panacem Asclepion, Panax, & Aschilibet nuncupat. Plinius lib. xxv. cap. iij. ab Asclepiade, qui lapsu de scala uitam finiuit, hanc radicem nomen habere tradit.

Diosco. lib. 3.
cap. 55.

Proinde posset utraque planta ad Selsi referri.

VIRESC TEMPERAMENTVM.

Vtriusq; iam commemoratæ herbæ radix, semen & succus exalfacientem & exiccantem habent facultatem, sed potentius & efficacius est quod in montibus nascitur, Possunt ambæ utrinque usurpari.

INTRINSECVS.

Aduersus uenenatos serpentum, aliorumq; animalium ictus, radix Fœniculi montani in uino decoqui & bibi debet, & ex illa decoctione uulnus collui, quod qui fecerit, nihil à ueneno illo sibi timendum nõ dubitet. In cæteris easdem cum Angelica & Ligustico uires habet.

EXTRINSECVS.

Ad omnia maligna & manantia ulcera, flores & semina trita cum melle, emplastri instar imponi possunt, nam hoc remedio exiccantur & sanantur uulnera. Breuiter eodem pacto usurpari possunt binæ hæ plantæ, quod Angelica & Ligusticum.

De Herba Vulneraria. Cap. CXLIII

I NASPERRIMIS AC SAXOSIS MONTIBVS ET AGRIS, necnon subter Iuniperos, inter muscum nascitur planta quædam, radice tenui, læui, cædidaq; Petroselino simili, subacri gustu. Folijs oblongis & angustis, ueluti Acetosæ minoris, nisi quod longiora hæc sunt & strictiora, & uiridiora. Caulem profert teretem, quemadmodum Pimpinella. Florem in umbellis luteum, instar Anechi aut Petroselini, qui in semine postea abit, semini Ammios, aut Petroselini simile, acre, & peregrini saporis.

Herba vulneraria.

Wundkraut,



sis. Caules huius plantæ nonnunquam spadicei coloris sunt. Floret mense Augusto.

NOMENCLATURÆ.

Diu multumq; mihi de nomine huius plantæ percontanti, tandem mulierculæ in agro Vormatiensi prope Pfedersheim / & Dalsheim indicarunt, Wundkraut / hoc est Vulnerariam eam dici herbã. Eo' pro dolor res herbaria deuenit, ut à mulierculis cognitionem illam accipere necesse sit, (quamuis, quod ad me attinet, uel à puero discere non erubescam) quæ à doctissimis uiris expectanda fuerant. Quod autem apud ueteres illi herbę nomen fuerit nōdum cognoscere potui, quantumuis multos diligenter percōtatus fuerim. Cum itaque nemo esset qui mihi satisfaceret, corpi ipse serio de hac re cogitare. Post longam ergo & diligentē ueterrū scriptorū inquisitionem in mētem mihi uenit, forte hanc herbã Panaces Chironium esse, cuius et Diosc. et

Nicander & Theophrastus meminere. Etsi autem non prorsus in descriptione huius herbæ autores consentiant, (nam Dioscorides & Nicander in *Diosco. lib. 2. Theriaca*, dicunt eam habere folia Amaraci, & breuem radicem, rursus *cap. 2. Theo.*

De *Amaraco*
queri potest,
utrum illa uoce
Maiozanam, an
Parthenium.
quod Dioscori-
des lib. 3. cap.
 146. *Amaracum*
cognominat, in-
telligent autho-
res.

Theophrastus lib. x. de plant. hist. cap. xij. & Plinius lib. xxv. cap. iij. Rumicis folia, & longam radicem habere testantur, ut difficile sit tantos authores conciliare) tamen quod ad flores & uires herbæ attinet, non dissentiunt. Iam si Chironium Panaces hæc herba foret, laudandus certe esset Deus, quod nobilissimam plantam nostris quoque regionibus donasset. Olim enim in altissimo monte Pelio, in quo a Chirone Centauro filio Saturni, medico clarissimo, Cytharœdoque & Astrologo celeberrimo primum inuenta fuit, legebatur. Siue igitur Panax, siue aliud quidpiam sit, certe obseruatione digna est herba. Hoc tamen fatendum est, præsertim si quis diligenter herbam contemplatus fuerit, folia illius minimo Rumici, seu Acetosæ, haud multum dissimilia esse. Serapio Chironium suum dicit folijs uestiri Fœniculi, & hæc eius esse nomina Panax, Caromon, & Cyromon.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Panacum omnium genera omnia unam, & eandem facultatem obtinent, nimirum excalfaciendi, & uenenum educendi, uulnera sanandi & alia mala, quemadmodum supra docuimus.

INRINSECVS, ET EXTRINSECVS.

Vires ac iuuamenta eius, sub Angelica & Ligustico require, & age Deo Opt. Max gratias, quod hac quoque planta te donauit, & uti uoluit.

HACTENVS humanissime Lector per aliquot capita de omnibus Panacibus, quæ ut Plinius perhibet, ad omnes faciunt affectiones, differuimus, nostram sententiam indicantes, non ea sanatione ut uel in eam ire omnes, uel contentionibus occasionem dari uelim, sed ut diligenter aliquando de his & alijs admoniti, ac meo exemplo instigati uiri doctissimi, cogitarent. Nec inuidebimus suam laudem, ipsi qui meliora & certiora in medicum attulerint.

De Smyrnio quod uulgo Osteritium uocant. CAP. CXLIII.

Smyrnion.
hortense

OSTERITIVM, VT VVLGO NOMINANT CVM AD huc recens est, acrimonia recens Piper superat. Ea herba hodie passim in hortis a veterinarijs plantatur, nam in puluerem redactam radicem eius pecoribus cum sale exhibere solent. Radicem habet
 (ut ab

Smyrnion.
Meiſſerwurz.



(ut ab illa exordium descriptionis ſumamus) digitum craſſam, nonnunquam etiam craſſiorem, in ſuperficie terræ magis ſparſam & ſerpentem, quam intra humum deſcendentem, ut ea ratione Serpenticariam maiorem,

Ec

seu Colubrinam, & magnum Phu, quod nos Mariæ Magdalænæ radicem nominauimus, imitetur. Cortex radicis foris est niger, intus uero ipsa candida, a qua aureus & lentus, odoratissimus, & qui fauces gustatus mordeat, linguamq; acrimonia sua uellitet, succus destillat. Folia uiridis sunt caloris, & singula tereti insident coli, ac primum in tres partes, seu diuisuras dissecantur rotundo & circulari se habentes flexu, quarum singulae postea, binis aut trinis, sed dimidiatis incisuris diuisæ sunt, per ambitum uero omnes serratæ. Caules emittit rotundos, geniculos, umbellis multis, candido & numerofo flore conspicuis, ueluti Anisum & Coriandrum, emittentes. Cæterum flosculi in semen subnigrum, latum, & anetho, aut cîmicibus simile desinunt.

2. Syluestre Osteritij genus, quod hortorum omnium uirium est, cuius supra sub Angelica meminimus, non aliter quam Lolium hinc inde per terram radicatur, Osteritio quam Angelicæ similis, nisi quod odore & sapore est imbecillius.

3. Osteritium monæ uicinis nascitur, ab incolis Meisterwurtz, hoc est Osteritium quoque appellata. Ea quinque folia diuisim unico pediculo insidentia habet, non aliter atque Osteritium uerum, aut Sanicula.

NOMENCLATURAÆ.

Cum bona uenia herbariorum nostri temporis, qui partim quonam in Galeno et Dioscoride Osteritium suum referant, in dubio uersantur, partim uero hanc herbam sicut & Angelicam ueteribus incognitam fuisse affirmare audent, meam quoque sententiam de Osteritio proferam. Ea autem sic se habet. Primum enim, an non Dioscorides Smyrnion folia Apio latiora, subpinguia, ad terram infracta, robusta, saporem uero acerrimum, & qui fauces mordeat, & ad myrrham accedat, necnon & umbellas, ut anethum habere dicit. Deinde eodem in libro, cap. cxliiij. scribit Dioscorides Pæoniæ foeminam folia habere Smyrnij more diuisa. Iam si his uerbis Dioscorides uiuas imagines herbarum conseras, nihil aliud colligere poteris, quam nullam in Germania plantam perinde commode ad Smyrnionem referri posse, atq; hoc ipsum Osteritium. Quod si quis Myrrhæ saporem obiecerit, ubi nam ille in Osteritio appareat, huic respondebimus, Myrrham uulgarem nobis nequaquam eam uideri, quam habuere ueteres, quod si hodie copia illius ueræ Myrrhæ nobis fieret, dubium mihi non est, quin ueritatem elicere possemus collatione rerum ipsarum. Interea tamen hoc nostrum & uerum Smyrnionem, nequaquam contemnemus, sed cum gratiarum actione illa utemur, Theophrastus li. x. cap. j. de plant. historia inter succos plantarum,

Diosco. lib. 3.
cap. 72.

2. Syluestre

carum, Smyrnion Hippofelinum, hoc est, Equapium, quemadmodum Gaza tranſtulit, Germanice Roſſeppich uocauit. Cilices (autore Dioſcoride) Smyrnion Petroſelinum dicunt. Quid uero proprie ſit Hippofelinon, & Petroſelinon paulo poſt dicitur. Appellatum etiam olim Coptium ab Anacreonte, quod refert Marcellus Vergilius. Serapio cap. cccxxx. dicit tertium Apſi genus Seniruion appellari, quo loco Smyrnion legendum eſſe puto. De Smyrnio diligenter ſcripſit Plinius lib. xxvij. cap. xij. Poſtremo non deſunt qui cum doctiſſimo Ruellio tam Angelicam quam Oſteritium Silphium ſeu Laſerpitium Dioſcoridis eſſe uelint, cum iſs nequaquam contendere, poſteaquam acrimonia illa ſaporis, quæ ineſt noſtro Smyrnio, non male reſpondeat deſcriptioni Laſerpitij. Dioſco. lib. 3. cap. 85.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Tota hæc planta naturam habet calidam & acrem, & quæ ſuperet tam piper quam alia eius generis aromata. Radix & ſemen plus habent acrimoniae quam caules & herba, nihilominus tamen ſi moderate uſurpentur, utriſque corporis partibus conferunt.

INTRINSECVS.

Primum quidem radix, ſemen, herba & ſuccus, aut certe aqua diſtillata Smyrni noſtri, ad quaſuis frigidas affectiones febrium & ſtomachi, aduſus etiam omne uenenum conducunt, moderate & pro ratione ægritudinis, necnon ægrotantis uſurpata.

Smyrnion uino decoctum ad frigidum pulmonem, aſhma, et humidam, ac frigidam tuſſim, mane ac ueſperi potum facit.

Pari ratione ſumptum, urinam, renum calculum, menſes, emortuos foetus, ſecundinas trahit, mitigat Iſchiadicos, ac frigidos dolores, ſudorem elicit, hydropem educit, & emortuam genituram reſuſcit, id quod tutiſſime credere & experiri certo poteris.

Eaſdem facultates obtinet aqua diſtillata, & facilior eſt ac gratior uſu, quam ipſum ſemen, uel radix. Hæc eadem fere de Laſerpitio quoque apud Dioſcoridem & alios leguntur.

EXTRINSECVS.

Smyrnion, Angelicam & Liguſticum acrimonia feruore & ui expulſiua antecellit, quod ad alia attinet, in uulneribus & uenenatis icribus curandis parium ſunt facultatum tres ex plantæ, ſi foris imponantur, uel ſuccus earum uulneribus inſtilletur, aut ſi aqua diſtillata mundificentur uulnera.

Omnes tumores & collectiones ac duritiæ poſſunt hac radice aut ſucco eius, incidi, deprimi, ac ſanari.


Succus carnes putreſcentes, ſeu gangrænoſas erodit & abſumit.

De Branca. ursina, & Petroselino Alexandrino.

CAP. CXLV.

Petroselinon Alexandrinum.

Peterlin. auß Alexandria.



BRANCA VRSINA nomen suum inde sortita est, quod folia illius, quæ habet grādia, aspera, nigricantia, et dissecta, magnam cum anterioribus vrsorū pedibus similitudinem habeant. Singula uero folia in quina alia aut septena foliola diuisa sunt, quæ foliū Lupuli per se representant. Pediculus, qui folia cum suis incisuris sustinet, quandoque digitum crassus est, puniceis uenis conspicuus. Caulē proferit hæc planta concuum, longum, tere-tem, nodosum ac geniculatum, ueluti cicutæ aut Fœniculi, cuius fastigio è tenuissimis quasi pelliculis umbellæ prorumpunt, (quemadmodum fieri solet in Angelica & Osteria-
tio), florum candidorum plenæ, ita ramen ut exteriores flosculi maiores sint illis quæ in medio muscarij constituti sunt, Aceris flori similimi, nisi quod illo per omnia minores sint. Semē gignit latius anetho, quod ex binis seminij lar is tanquam duobus orbiculis coniun-

Branca urfina.

Beren flav.



coniunctis, constat. Radix non raro cubitalis euadit, ueluti Foeniculum, intus cā dida, luteum stillans liquorem, non aliter atq; Osteridium, odore satis iucundo prædita, sed nō adeo acris saporis, nam quantum Piper a' Gingibere gustu differt, tantum Brancam urfinam ab Osteridio distare arbitror. Floret sub finem Maij mensis. Gaudet locis asperis & saxosis, ac graminosis etiam hortis, & arenosis pratis. Cum verno tempore adhuc tenera fuerit hæc herba, solet a' mulierculis inter cetera olera, urticæ, Ranunculi, Lupuli, & id genus aliarum herbarum, decoqui.

*Petroselinum
Alexandrinum.*

Quod deinde ad peregrinū Petroselini gen^o attinet, semen illius a' doctissimo uiro Domino Conrado Gesnero Tigurino, ad me recens allatum seminaui. Semen est magnum & nigrū, quod cum in terram projectum, emergere cœpit, duo emittit rotunda sed lata & nigricātia folia, instar Maluæ pene Romanæ, post quæ alia quoque sequuntur nigricantia, mollia, & serra-

ta folia, Angelicæ similima, sed nigriora. Altero demum anno, quemadmodum & Angelica, primos suos teretes concauos, & geniculatos caules, flores in umbellis minutissimum et candidum Iunio mense ferentes producit,

Ec iiij

Semine prægnat magno, inflexo & atro, quod gustu amarum & iniucundumprehenditur.

NOMENCLATURAÆ.

Germani priorem plantam *Berenflaw*/hoc est Brancam vrsinam non abredicunt, cum forma pedibus vrsinis anterioribus satis respondeat. Re ipsa autem *Pastinacæ* genus aliquod uideretur, nisi in præsentia olus atrum (quod apud Dioscoridem *Grielon*, Apium agreste, & apud Columellam *Smyrnion*: Theophrasto uero *ἰπποσίλιον*, hoc est, Equapium, Germanice *Groß Eppich*/oder *Koß Eppich* cognominatur) uocare liberet. Hic uero clamabunt aduersum me Iacobus Manlius & Matheus syluaticus, dicētesq; Olus atrum, aut ut ipsi loquuntur *Olixatrum* esse *Petroselinum* Macedonicum & *Alexandrinum*, id quod lubens illis concesserim. Siquidem *Petroselinum* *Alexandrinum* a nostra Branca vrsina haud multum differt. Et fieri potest ut hæc & aliæ plantæ in Macedonia, fortiores & perfectiores, nec non efficaciores generentur, nam & fruges hæc, illas quandoque superant, & uinum alterum, alteri bonitate cedit, quid obstaret ergo, quominus idem in pomis & herbis contingeret? Præterea hoc loco non quid Macedonia, uel Arabia ferat differimus, sed quæ in Germania nostra gignantur herbas exponimus. Quamobrem Brancam nostram vrsinam modo Olus atrum, *Hipposelinum* Germanicum, aut saltem *Pastinacam* erraticam nuncupabimus. De Macedonico *Petroselino* inter *Pimpinellas* loquemur. Hoc tamen obseruandum censeo, *Petroselinum* Macedonicum ab *Alexandrino* multum differre, ita ut *Alexandrinum*, id sit semen magnum, scilicet & nigrum, quo *Seplasiarij* hodie utuntur, quod genus ego haud grauatim sub *Hipposelino* Dioscoridis una cum vrsina branca comprehenderim, est enim magnum sane Apium, sicut nec descriptio quoad utrumq; reclamare uidetur: rursus uero ut Macedonicum minus sit genus, quemadmodum sub *Pimpinellis* & *Apjjs* fufius docebimus. Theophrastus & Galenus Olus atrum & *Smyrnion* pro una & eadem habent herba.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Folia & radix Brancæ vrsinæ, calidum obtinent temperamentū, ideoq; ad cibum & medicinam accommodata sunt.

INTRINSECVS.

Folia Brancæ vrsinæ in tenera sua ætate, necnon & radix in cibo usurpari possunt cum reliquis oleribus.

Diosco.

Diosco. lib. 3.

cap. 71.

Columella lib. 12.

cap. 3.

Theophrast. de

plant. hist. li. 10.

cap. 1.

Equapium

Platina lib. 5. de

Petrose. super

confe. Alexan.

Hippo selinum

Germanicum.

Dioscorides in ea est opinione (cui ego quoque subscribo) ut existimet radices muria conditas ad usum quotidianum conseruari posse, ueluti Capparis, nam cient urinam, stranguriam succurrunt, et dolorem sedant in cibo comamanducatae, quae quidem omnia de Petroselino Alexandrino intelligi uolumus.

Semen uino decoctum ac bibitum, suppressos menses euocat. Sed & hoc de Petroselino Alexandrino intelligas uelim.

EXTRINSECVS.

Nonnulli radicem Brancae uersinae ueluti Althaeam decoctam imponunt ad emolliendos & deprimendos tumores, praesertim uero matricis, epatis, & lienis.

Succus herbae expressus unguentis emollientibus Chirurgorum admiscetur, id quod de utraque planta intelligi debet.

De Pastinaca. Cap. CXLVI.

Q. VID DE PASTINACA ULTERIVS SCRIBAM, CVM
eam sub Branca uersina depinxerim. Est quippe Pastinaca ^{1.} *Pastinaca satina.* uersinae brancae, quoad radices, caules, folia, semen & saporem denique, per omnia consimilis. Haec sola inter utramque plantam constituenda est differentia, primum quod Pastinaca in hortis placetur, ueluti Raphanus & Rapum, quod Brancae uersinae non contingit, ut quae sponte sua proveniat, deinde flos Pastinacae luteus est, instar Anethi, cum uersina branca candidum illum proferat, adhuc folia Pastinacae non sunt adeo hirsuta, & non perinde nigricant atque uersinae brancae. Caeterum, si odorem, si saporem, si formam denique striati caulis, latissimi seminis, prolixae radicis, & incisorum foliorum spectes, nihil non affine in utraque herba reperies. Quin & semina utriusque adeo sunt consimilia, & forma & sapore, ut ego, qui plurimarum herbarum differentias (Deo laus) noui, id quod citra iactantiam dixerim, illa discernere non ualuerim.

Syluestre Pastinacae genus, idem cum satiuo semen habet, eundem etiam ^{2.} *Sylvestris Pastinaca.* florem, sed minus est illo, nascitur passim inter caetera uicia herbarum.

NOMENCLATURA.

Vulgo has herbas Pasticanas Latini uocant, Officinae Bancias nuncupant, Germani Pestnachfen, et nonnulli alij *Mozellen*, Sunt qui Staphylinon, *σταφυλινον*.

Pastinaca.
Pestnachcn.



cinna.

& Pastinacam domesticam appellent, quod equidem per me illis licebit, modo non offendantur, si, quod ad me attinet, Pastinacam Elaphoboscum (quod Dioscorides alios Elaphicon, nonnullos Nephron, alios Ophigenion, quosdā Ophioctonon, aliquos Herpiceen, alios Lymen: Romanos Cerui ocellum: Ægyptios Chemini: Aphros Ascaucau nominare dicit) appellauerim. Sed si quis miretur quæ sit causa, ob quam Pastinacam Elaphoboscon nuncupare uouerim, is herbam ipsam cum historia Elaphobosci conferat, & uidebit dubio procul quid me permouerit, ut Pastinacam sic uocarem. Sin uero aliqui sint, qui Pastinacam Sisarum interpretari uelint, non ero illis impedimento, ea tamen lege, ut Rapunculos ab ea appellatione nequaquam excludant. Rursus summe nobis placet, quod Pastinacas exiguas, quæ Germanis Germani dicuntur, ad Sisar seu Sisarum referant, hoc enim uerum illud hortense est Sisarum, quo Tyberius Cæsar delectatus fuit.

Ex his quæ diximus facile liquet uerissimam brancam nihil aliud esse quam erraticam Pastinacam, & Apiorum maximum genus, sed in his & talibus contro-

Vide Plinium:
 lib. 22, cap. 22.

controuersijs necesse est uiuas herbarum imagines cum ueterum scriptis coniungere, siquidem ueritas inuestigari & deprehendi debeat.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Pastinacæ dulcem habent radicem, quare inflant & replent uentrem. Hodie culinis magis sunt notæ, quam seplasijs. Nam in cibo usurpantur, præsertim a pauperibus, id quod tempore quadragesimali, tunc enim postquam Rapi & omnes aliæ radices esui aptæ defecerunt, ipsæ e terra prorepunt, ac necessitati hominum inferuiunt. Pastinaca naturam habet calidam & humidam. Semen in medicina quoque usum suum habet.

INTRINSECVS.

Dioscorides scribit Elaphoboscum, seu Pastinacam, ceruos aduersus serpentium ictus uenenosos in pabulo usurpare, qua de causa semen in uino decoctum potui datur aduersus serpentium ictus.

De Staphylino triplici. Cap. CXLVII.

E STAPHYLINIS DEINCEPS AGENDVM CENSEO,
D quorum mentionem fecit Columel. lib. xi. cap. iij. licet ignorem utrum eo loco intellexerit Pastinacam, an uero ea Raporum genera quæ nunc commemorabimus, initium facientes a seminjs illorum. Ea namque aspera sunt, hirsuta, echinis quibusdam minutis obducta, magis namque cum Aniso habent similitudinem. Plantatione & scelici cura opus habent, non minus atque Cephæ, Betæ, & Brassicæ, & reliquæ satiuæ ac hortenses herbæ. Mulierculæ nostræ semen quod diximus hirsutum ac asperum, primum quidem exijs umbellis desumunt, quæ medium occupant locum, nam illud optimum ac præstantissimum esse affirmant, deinde delectum iam semen panno laneo egregie confricare, & quasi asperitatem eius domare consueuerunt, existimantes ea ratione, rectas, læues, & minus nodosas radices reddi, quæ ex hoc semine enascantur. Proinde hæ ipsæ rapitiæ radices triplici colore distinguuntur, aliæ enim crocei sunt coloris, aliæ candidi, aliæ postremo purpurei, prolixæ satis longitudinis, ueluti Raphani longiores, inque medio lignosum quid, uti Foeniculi uel Petroselinæ radices, habentes. Folia omnibus eadem, nimirum nigricantia, minutim concisa, instar Cumini agrestis, cuius supra in montano Foeniculo mentionem fecimus.

Tria Staphylini genera.

1. 2. 3.

Ec v

Staphylinus.

Geel/rohte/ond weisse Rüben.

Miraculum
naturæ2.
Sylvestris Staphylinus.

nisi quod hæc Staphylini
rū folia illis sint asperiora,
maiora & nigriora. Altero
demum anno in caules con-
cauos, hirsutos & asperos
exiliunt, qui umbellis can-
didis, ueluti Chærefolij,
uel Cicute, interdum etiam
roseis flosculis emicantes
in cacumine proferunt. Et
quod mirum certe uidetur
in medio cuiusq; umbellæ
purpureus quidam ac capi-
tulatus existit flosculus, Mi-
lii semini magnitudine,
qui cum teritur, magis pur-
purascit. Admiratione au-
tem dignissimum iudico,
quod in medio tot candi-
dorum flosculorum, uni-
cus duntaxat, & is purpure-
us appareat, ac si peculiare
quid per hoc natura signifi-
care uoluerit.

In Coloniensi agro ho-
die nihil frequentius Sta-
phylinis satiuis inuenitur,
tamen & apud nos magni
iam dudum usus esse cœ-
perint.

Sylvestre harum radicū
genus, herba, caule, flore,
purpureo in medio umbel-
læ constituto flosculo, odo-
re et sapore, satiuos Staphy-
linos satis exprimit, sola ra-

dice, quam habet tenuissimam nec culmo aut ad summum digito, quod ra-
men rarissime contingit, crassiorem, præterea etiam lignosam prorsus, in-
tus candidam, ab ipsa differt. Odore & gustu uidebatur mihi fortior, &
magis

magis strenua satiuus. Nascitur sponte sua secus sepes, limites agrorum, ad rupes, & in agris, ac arenosa, siccaq; terra inter Pimpinellam.

NOMENCLATURAE.

Galenus & huius sectator Ægineta, necnon et Auerrhoes, Staphylinum satiuam Pastinacam, Daucum uero erraticum seu sylvestre Pastinacæ genus esse dixerunt. Nos in præsentia opinione istorum minime discutiemus, *Plin. li. 19. ca. 5. Theoph. lib. 10. cap. 15.* recte ne se habeat, nec ne. Nam possent & aliæ nonnullæ radices his nomini bus appellari, quemadmodum & Plinius quatuor generum mentionem facit. Præterea Theophrastus quoque testatur in Patrensi agro Pastinacæ genus nasci, cui sit ex calfactoria uis, & radix nigra, quæ duo sane in nulla Pastinaca uel Staphylino animaduertere unquam potui, qui sit ut de Peucedano locum Theophrasti intelligendum existimem, quanquam autem neminem, quominus aliter sentiat scriptis nostris impedire cupiamus, tamen quæ nostra sit de Staphylinis & Daucis sententia paucissimis exponemus. ^{1.} Primum ergo, una cum Dioscoride dicimus Staphylinum tam satiuum quam erraticum cibus accommodatum, & culinis usitatum, id quod in Dauco minime habet locum. ^{2.} Deinde scribit Dioscorides Pastinacam habere asperum caulem, umbellam Anethi, & in medio florum purpureum quiddam. Quæ cum in tribus nostris Staphylinis (quos Germani nostri *Geelerüben/ Koberüben/ vnnß Weisse rüben* uocitant) omnia appareant, maxime uero posterius, quod omnes fateri necesse est, qui eos in flore uiderint, manifestum esse puto nihil cum Daucis, quibus nullæ ex prædictis notis insunt, Pastinacæ esse commune. Atque his de causis, quod & Dioscorides sentit, Pastinacam erraticam, & Daucū unius & eiusdem esse generis, iudicare non possum. Interea tamen per nos non stabit, quo minus optimi, doctissimiq; uiri, Galenus, Paulus & Plinius Pastinacas suas Daucos nominent. Siquidem & id tolerare cogimur, quod illi ficus Chelidonias, Saluiam Phacon & Tussilaginem (ut plura alia prætereamus, quæ nominetenus tantum non autem re ipsa apud illos coniungi uidentur) fortasse non sine errore nuncupare solent. Itaque ut tandem concludamus, has plantas & culinarias radices iuxta Dioscoridis doctrinam, Pastinacas, seu Staphylinos hortenses, deinceps appellabimus, quarum mentio proculdubio facta est apud Plinium, cum is scribit Pastinacæ quatuor esse genera, tertiumq; ex his Hibiscum, quartum uero Gallinacam Pastinacam, Græcis Daucon cognominari. Sed appellet quisque has Pastinacas quocunque tandem uelit nomine, nos Dioscoridem secuti Pastinacam a Daucis (de quibus paulo post) diuellimus.

Huic descriptioni Apuleius quoque consentit cap. 80. Pastinaca hortensis triplex,

Diosco. lib. 3. cap. 54. Hibisci appellatio ad Altheam proprie spectat.

4.
*Syluestris seu er-
 ratica Pastinaca*
Theoph. li. 10.
cap. 15.

Syluestre Staphylini genus, Dioscorides Cerascomen, Latinis Rustica m Pastinacam, aliquibus Carotam, Aegyptijs Babyrion. Aphris Sticheam, uocitari tradit. Theophrasto Brassica syluestris, Apuleio uero Ceras & Vdonaution, aut ut alijs legendum uidetur, Daucion dicitur. Auerrhoes Pastinacam Halgazar nominat. Habet autem et plura alia nomina, nam quidam Banciam, & cum condita fuerit Algingibel appellant. Iacobus Manlius existimat luteum Staphylinum, qui Germanis Gcel Rüb dicitur, eam esse quæ Chariota, & Lezar, & a Lombardis Guisso nuncupatur. Platina candidum & rubrum Staphylinum, Cariotas uocat lib. iij.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Staphylini tam rufus quam luteus, quantum mihi quidem uidetur in cibo utiliores & gratiores sunt ea Pastinaca, cuius historiam præcedenti capite prosecuti sumus. Sunt autem temperamento calidi & humidi, & utrisque corporis partibus aduersus uenenum adhiberi possunt. Inprimis uero erraticus Staphylinus, qui ad sepes sponte sua prouenit, in medicina commendatur.

INTRINSECVS.

Semen Staphylinorum, præsertim autem erratici uino decoctum & potum, suppressos menses trahit, urinam cit, & aquis cutem subire incipientibus, et ijs quos lateralis dolor excruciat, apprime cõducit. Serpentiũ morfibz ictibusq; prodest pari ratione usurpatum. Præsumentes id nulla affici iniuria a serpentibus traduntur.

Radix in cibo sumpta, foetui, stillicidio, urinæ venericq; stimulandæ commodare dicitur. Solet autem ea aceto & melle condiri, ut aliæ nonnullæ. Has facultates Staphylinon obtinere Orpheus animaduertit, dicit namq; Staphylinio amatorium inesse. Vide Plin. lib. xx. cap. v.

EXTRINSECVS.

Semen herba & radix aqua decocta ac imposita, mortuos foetus, menses & secundinas eliciunt.

Folia trita & cum melle imposita phagedænas ulcerum purgant. Erratica Pastinaca in omnibus efficacia sariuam excellunt.


De Dauco. Cap. CXLVIII.

1.
Daucus Creticus

AVCVS FOLIA HABET FOENICVLO ADEO SIMILIA, ut nō nisi a peritissimis rei herbariæ discerni ab illo, dignosciq; possit,

Daucus.

Berwurz.



possit, præsertim in ijs locis in quibus luxuriat. Caulis illi rotundus, geniculatus, ueluti & Ranunculi, aut Anechi, dodrantalis sicut Anechum, umbella uero Coriandri, flosculis candidis & perexiguus ornata. Semen maturum Petroselinum refert, aut Pimpinella. Radix longa est & recta, digitum crassa, superiori sua parte hirsutis, hispidisq; pilis capillata, admodum odorata, acrior denique & feruentior radice Pimpinellæ. Daucus hic in altis montibus, præcipue uero in Martianæ syluæ quibusdam pratis gignitur. Nam istuc primum illum inueni, posteaque in hortu meo plantaui.

Alter Daucus foris nigriorem habet radicem, 2. *Secundum Daucus* crassiorem, & superne uersus caulem hispidis ac prolixis capillis obductam, feruentiorem & acriorem gustu, denique & odoratiore primo Dauci genere. Folia illius instar Petroselini uulgaris dissecta sunt, sed maiora illo, nam & cauli crassitudine Petroselinum excedit. Hanc radicem in altissimis

montibus ac petrosis desertis, nempe ijs quæ sita sunt prope Curiam oppidum Rhoetiæ, & Thermas illas calidas, quas uulgo Psefferabad, hoc est, Piperina balnea uocant, reperi.

Tertia.

9.
Tertium Dauci
genus.

Tertia Dauci species, nondum mihi cognita est, nisi forte ea sit herba quam supra sub Ligustico Germanice *Rosßümme*l uocari diximus, quę in nostris regionibus in pratis prouenit. Ea siquidem forma sua, odore & sapore Daucum quadantenus æmulatur. De hoc genere Dauci supra capite cxliij. cum de Foeniculo montano ageremus, mentio facta est. Faxit Deus ut de hac & alijs herbis certiora aliquando cognoscamus.

NOMENCLATURAE.

Daum®
Diosco. lib. 3.
cap. 76.

Primum genus Daucus ille est Creticus, quem magni etiam uiri Pastina cis, sed non sine grauissimo errore annumerare non dubitarunt. Nicander in Theriacis *Daumap* uocat, ex quo loco Marcellus Vergilius id emendat, qđ male in quibusdam Græcis exemplaribus *Signap* legebatur. Hieronymus Braunschueig Porcinum Foeniculum (Germanice *Sewfenschel*) & Peucedanum uocat, alijs Creticum Sefeli, quod alias Tordylon, uel ut habet Aegineta Gordylon nuncupatur, esse uolunt. Nostri Rizophori *Berwurß* Germanica uoce appellant, uel quod capillata sit, ut diximus, aut quia matricis suo loco motæ dolor, a mulieribus in ore retenta hac radice, quem patria uoce *Bermüter* nominant, sedari credatur.

Alterius Dauci nomenclaturas nusquam discere potui, unum saltem audiui, qui eam *Birßwurß* nominabat. Mihi certe uidebatur species esse Peucedani, aut certe Sefeli Creticum.

Cymium equi-
num.

Tertia species cuius historiam supra cap. cxliij. habes, quibusdam *Rosßümme*l, alijs *Schwarßbirßwurß* dicitur. Ego certe referrem duas has posteriores herbas, uel inter Daucos, uel inter Tordyla.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Duo Dauci priora genera easdem pene cum Angelica obtinēt facultates. Sunt enim temperamento calida & sicca, doloribusq; sedandis utrinq; utilissima.

INTRINESCVS.

Semen utriusq; Dauci aut radix uino decocta ac pota efficacissima sunt aduersus uenenum Cicutæ, Hyoscyami, Opij, aliarumq; id genus noxiarū plantarum.

Eadem decoctione, necnon si semen aut radix in puluerem redigatur, & sumatur, dolor uentris utriq; cohibetur, & tormina sedantur præstantissimo auxilio. Hoc remedio discutiuntur & educuntur frigidi, lenticq; pulmonis & iliorum humores, obstructionibus liberantur iecur & lien, stomachumq; denique & uterum excalfacit,

Radix

Radix Dauci cum ficibus & Fœniculo in uino decocta, remedio est pre-
sentissimo, tussi frigida & inueterata, astmati, torminibus illorum. Eodem
modo usurpata lentam humiditatem extrahit, à qua hydrops oritur.

Radix & semen Dauci Diuretica sunt, ad uiscosos & crassos humores &
aduersus calculos utilissima, menses enim cient, & inprimis conducunt fri-
gidis mulieribus quæ albis mensibus laborant.

EXTRINSECVS.

Semen Dauci in sacculo lineo calidum ceruici impositum, lentas & fri-
gidas fluxiones capitis, unde sæpenumero magna mala in corpore huma-
no creantur, discutit, inhibetq.

Herba cum radice sua tusa, & calida imposita, tumores, durities, & col-
lectiones, secundum aures alijsue corporis partibus subortas dissipat.

De Fœniculo. Cap. CXLIX.

MNES REI HERBARIÆ SCRIPTORES TRIA Fœ-
niculi genera ponunt, unum satiuum, reliqua duo erratica appel-
lantes. Nos in præsentia de satiuo sermonem instituemus, initiū
facturi à radice descriptione. Eam Fœniculum habet longam, rectam,
gustu dulcem, candidam & odoratam, in cuius medio lignosum quid existit,
quod extrahi consuevit, cum radix desiccanda fuerit. Folijs uestitur Dauco,
aut Hippuri exiguae, quæ in umbrosis ac uliginosis uallibus gignitur, simi-
limis, ipsæ quod ad colorem attinet plane nigricantibus. Caulem emittit
teretem, concuum, Arundinisque instar nodosum, ac plerumque hominis pro-
ceritatem superantem, multis denique adnascentijs & ramulis brachiatum.
Is in cacumine muscario emicat luteo, Iulio mense florente. Semen Septem-
bri mense plerumque maturescit. Fœniculum non facile hyeme moritur, ut
aliæ nonnullæ herbæ, reperias enim fruticem qui denos aut duodenos an-
nos incolumis & illæsus perduret, sicut & Ligusticum, præsertim autem id
contingit Fœniculo petrosi & incultis locis prouenienti, quæ eum etiam
ab iniuria murium & uermium uindicant, quod mecum testantur Palladi-
us & Platina.

Platina lib. 3.
Palla. mense Fe-
bru. tit. 24.

De syluestri Fœniculo cap. cxli. supra disseruimus.

NOMENCLATURÆ.

μαρπηρον Græce, Fœniculum Latine, fenichel Germanice, ירבוך Iarbus,
& כרזח Kæzach (de quibus appellationibus uide Aruch Monstéri, & no-
menclaturas Eliæ) dicitur. Fœniculum nobilitauere serpentes, gustatu se-
nectam

Diosco. lib. 30
cap. 74.

Foeniculum.
Fenchel.

Pli. lib. 20. ca. 23.

Serap. cap. 214.

*Diosco. lib. 2.
cap. 118.*

*Plinius lib. 21.
cap. 15.*



nectam exuendo; oculorumque aciem succo eius reficiendo. Vnde intellectum est, hominum quoque caliginem præcipue eo releuari. Succus Foeniculi in Iberia laudatissimus colligitur, ut testantur veteres. Serapioni Foeniculum Raionegii. Auerrhoi Halcasimieg. Auicennæ; Baralinæ, alijs Haziensis dicitur. Semen uero Arabes Bizeri Atafigeniti uocant.

Foeniculum erraticum inter ceteras appellationes apud Plinium Myrseneum dicitur. Testatur uero idem autor Peridium & Myconem de Hippomarathro scripsisse, ac affirmasse nihil præsentius aduersus serpentium uenenum inueniri hoc ipso Hippomarathro. Sed & ipse Nicander in Theriacis eam sententiam confirmare uidetur. Non desunt postremo, qui Crithimum, seu Crithamon, quod & Batin uocat Dioscorides, Foeniculum marinum esse putant. Iam quod ad Batin attinet, Plinius duo illius genera describit, uocatque alteram Batin marinam, alteram uero hortensianam.

seu Asparagum gallicum. Mihi uidetur hæc posterior genus esse Portulacæ uerum, nobis hodie incognitum, illud nimirum quod Olus cordum uo-

Col. lib. 12. ca. 13 cauit Columella.

VIRE

VIRESC TEMPERAMENTVM.

Magnæ utilitatis est Fœniculum, tum totus ipse frutex, cum primis uero semē eius, quo uix aliud inter omnia semina usitatus reperias. Nam in Germania nostra & pauperibus & diuitibus inseruit, pauperibus quidem illo per se, diuitibus autem Saccharo condito, utentibus. Hoc semen temperamentum obtinet calidum ac modice siccum, utrisq; corporis partibus commodissimum.

INTRINSECVS.

Semen uino decoctum ac bibitum, contra serpentum ictus auxilio est. Venena quoque alia expellit, Menses ciet, ad calculos facit, urinam trahit, & uiscosos humores, lac auget nutriticibus.

Semen Fœniculi, aut flos ipse, qui supremum in umbella obtinet locū, aqua decoctus & potus, nauseam & stomachi feruores sedat. In primis uero calidæ & siccæ tussi confert.

Semen per se mansum, aut Saccharo conditum, & continuo sumptitum, lentam pituitam incidit, & excreabilem facit. Ad caliginosos oculos nihil efficacius hoc semine.

Has vires omnes aqua distillata habere quoque dicitur. In medicina hodie nullum semen adeo frequentis est usus atq; Fœniculi.

EXTRINSECVS.

Aqua Fœniculi distillata mane & uespere oculis indita, caligines oculorum discutit, auribus instillata uermes enecat.

Easdem facultates obtinet succus expressus, & lacryma, seu ut uocant Gummi Fœniculi.

Radix cum melle contrita, ac emplastri more imposita, scorpionum & araneorum uenenatis ictibus, & canum rabiosorum moribus, si prius uulnera illa urina aut aceto lauentur, medetur.

Succus hoc pacto extrahitur, ex radicibus, herba, flore & immaturo semine, quod optimum & laudabilius est, probe contusis exprimitur, soliq; expositus siccatur, posteaq; in medicamenta adiicitur, quæ ad oculorum aciem excitandam commode temperantur. Debet autem succus hic aqua distillata Fœniculi, aut alterius herbæ, temperatus, oculis instillari,

De Anetho. Cap. CL.

Dyll.



ANETHVM ALSIO
 fa est plāta, quæ Aprilī mē
 se binis acutis foliolis, uelut
 Foeniculum (quo tamen,
 ubi adoleuerit tota sua sub
 stantia magis exigua & te-
 nuis, astrictior atque bre-
 uior apparet, nisi quod se-
 men habet latius illo) aut
 Cuminum, ē terra profilit,
 post quæ alia admodum
 dissecta, ac in staminis pene
 modum extenuata subse-
 quuntur. Caulem profert
 geniculatū, & furculosum,
 umbellam floribus luteis
 cōspiciuam, suauiterq; odo-
 ratam. Flore decusso bina
 undiq; & coniunctim posi-
 ta semina relinquuntur, id
 quod in omnibus ijs plan-
 tis uidere est, quæ florem in
 muscarijs ferunt, tamen si ab
 his Corianon excipiendū
 sit. Radix illi breuis, candi-
 da, & lignosa. Proinde
 posteaquam in terram se-
 men deciderit, tota hæc plā-
 ta, illico marcescit, interitq;
 ac anno insequenti ex semi-
 ne deciduo subinde repul-
 lulascit, non aliter atq; Co-
 rianon. Nascitur passim in
 hortis, nam sponte sua &
 quam facillime prouenit.

De syluestri Anetho, quod Germani Brötendyll/ Latini uero Cotulam
 uocant, sub Chamomilla dictum est, NOMEN

NOMENCLATURAÆ.

Vno nomine & herba & semen *Oyll*/apud Germanos nuncupatur, *Dioscorid.* *Anethum*, quibusdam uero *Polgida*, alijs *Anicetum*, Magis *Cynocephali* genituram aut capillos, alijs *Mercurij* semen. *Aphris* *Siciri* am *Ægyptijs* *Arachu*, *Dacis* *Pulpum* dici scribit. *Ægineta* *iniquet*, & *Anemion* uocat. *Serapio* cap. cccxvi. *Anethum*, *Xebeth*, & *Vebet* nominat. *Auerrhoes* *Scenar*.

VIRESCACTEMPERAMENTVM.

Semen *Anethi* naturam habet calidiorem ipsa herba. Porro utrunq; medicinae & cibo accommodatum est. *Anethum* condimentum est optimum, nam olim cum *Serpyllo* & *Allio* contundebatur, fessisque messoribus proponebatur, quemadmodum in *Alexi* *Vergilius* testatur, hodie & herba & caule, & semine tam in culinis quam seplasijs utimur. Tradunt præterea sicut *Foeniculum* caliginosis oculis unice conferat, ita *Anethum* caliginem illorum promouere ac creare. Verum enim uero caliginem oculis inducere *Anethum* dixerim, sed citra noxam. Nam capiti conducit, & somnum conciliat, maxime *Anethinum* oleum, quam obrem quod dicitur uisum hebetare aut caliginem oculis inducere, ego de somno & quiete intelligere potius.

INTRINSECVS.

Aridi *Anethi* comæ, seminisq; decoctum (siue id aqua uinoue fiat) potu lac euocat, inflationes & tormina sedat, singultus lenit, uomitiones sistit, urinas ciet, genituram extinguit assidue potum. Eadem præstare aqua distilla tadicitur. Quid uero in cibis possit culinis non est incognitum, quare non est opus ut diu hic immoremur. Placet autem in gratiam pauperum, quibus opes non suppetunt ad redimenda officinarum sumptuosissima pharmaca, *Theriaca* *Antiochi*, quam ille aduersus omne uenenum ex *Anetho* alijsq; conficere docet, ex *Plinio* ascribere, cuius lib. xx. capite ult. hæc sunt uerba,

Sed discessuri ab hortensibus, unã compositionem ex his clarissimam subtexemus, aduersus uenenata animalia, incisam lapide uersibus in limine ædis *Aesculapij*. *Serpylli* duum denariorum pondus: *opopanax* & *milij* tantundem singulorum, *trifolij* pondus denarij, *Anethi* & *Foeniculi* seminis, & *Anisi*, & *Ammij*, & *Aprij* denariorum senum singulis generibus, *Eruj* farinæ duodecim. Hæc tusa

Diosco. lib. 2.
cap. 60.

Aniceti uox *Smi*
laci quoque aspe
re attribuitur.

Diosco. lib. 4.
cap. 139.

Genitura *Mercurij* ad *Buphthalmum* refertur.

Dioscor. libro 3.
cap. 147.

Anemion ad *Anemonem* proprie pertinet.

Diosco. lib. 2.
cap. 167.

Serap. cap. 316.
Plinius lib. 20.

cap. 18.

Theriace Antiochi compositio.

cribrataq; uino quam possit excellenti, digeruntur in pastillos, us-
toriat pondere. Ex his singuli dantur ex uini mixti cyathis ter-
nis. Hac Theriaca magnus Antiochus rex aduersus omnia ue-
nena usus traditur. Haftenus ille.

EXTRINSECVS.


Anethum foeminis uulua malo opportunis ad deflectiones utile.
Condylomata illius eius cinis tollit.

De Aniso. Cap. CLI.

I IN CRETA SOLVM INSVLA, AVT AEGYPTO, ANI-
sum proueniret, quod scriptores quidam, maxime ueteres asse-
rere uidentur, certe Germaniæ nostræ oblitum esse Deum dicere
possemus, qui præterita illa, omnem rerum pretiosarū thesaurum in Ægy-
ptum, Arabiam, Syriam, & Indiam effudisset. Sed benedictus Dominus
Deus, cuius bonitate & prouidentia, non una tantum terra, nec una dunta-
xat natio, sed potius, uniuersum genus humanum, & unaquaq; etiam ter-
ra, ijs rebus affatim donatur, quæ non solum ad uictum & amictum, sed &
medicinam tuendamq; ualitudinem pertinent. Inter quas haud postremo
loco enumerandum uenit Anisum, quod hodie in tractu Rheni, præsertim
in agro Spirensi ac Argentiniensi magna copia non sine lucro à quibusdam
plantatur, et passim in Germaniæ hortis satium nascitur. Folia eius prima
tenerrimo Ligustico paria uidentur, nisi quod illo sint magis rotunda et exi-
gua, albicantia, ac odorata. Iulio mense caulem profert rotundum, & con-
cauum, cuius fastigio umbella candido flosculo ornata maiori Pimpinelle,
aut Coriano similis infidet. Semen quoque, quod minus est semine Cicutæ,
aliquantulum albicat, odore ac sapore gratissimo mellis fere respondens, ad-
uersus uarias affectiones quemadmodum Plinius prolixè testatur lib. xx.
cap. xvij. utilissimum, nemini autem perinde commodum atq; seplastijs,
qui illud Saccaro condiunt, sicut & Fœniculum, Cuminum, Corianon, &
alia id genus.

NOMENCLATURAE.

Semen Anisi appetentiam ciborum præstat, quo nomine à diuinitibus Sac-
charo conditum usurpatur, ideoq; Anicetum uocari tradit Plinius. Diosco-
rides lib. iij. cap. lviij. *ἄνισον*, Latini Anisum, Germani *ānis* samen (quod no-
men

Anisum.
ānis.

men apud Mediomatrices nonnulli non sine grauissimo errore tribuunt Corianno) appellant. Hieronymus Braunschweiger Fœniculum Romanum dicit, Serapio *ca. 242* Anisum uocat, nonnulli alij Cyminum dulce (quod est Germanis Süßer Bümmel) nominant. Obseruandum est semina Anisi, Fœniculi, Cymini, Anethi, & Petroselini, si ultra quadriennium seruentur, vermiculis erodi, aut si hoc non cōtingat, prorsus amara fieri. Quæ quidem ita se habere maxime quod ad Anisum attinet, non tantum me experientia docuit, sed & ipse Theophrastus lib. vii. de hist. plant. cap. vi. testatum reliquit,

VIRESCIT TEMPERAMENTUM.

In Germania nostra semen huius plantæ duntaxat in usu est, quod diuites uoluptatis potius quam medicinæ gratia, Saccharo ut meminimus conditum usurpant. Temperamentum obtinet calidum & siccum. utriusq; corporis partibus accommodatum.

INTRINSECVS.

Semen Anisi, præsertim si ex illo confectio (ut uocant) pareatur, ac conti-

n timeretur, non tantum iucundissimum, sed & utilissimum est, ijs qui foetidum oris halitum habent, & dormire nequeunt.

Conducit hoc semen & hydropicis, nam iecoris obstructions certo tollit, urinam ciet, sitim cohibet, ad uentris inflationes facit, uino aquaue decoctum ac potum, & in lineis calidisq; sacculis foris impositum. Præcipuū est ad omnes internas erosiones, stomachi, pulmonis, iocinoris, & matricis, nam confortat, calefacit, & sanat stomachum, aliāq; interna membra, concoctionem adiuuat, uapores malos in caput ascendentes deprimit, bonosq; exhalare, & in caput mittere stomachum facit, dolores lenit, tormina sedat, singultus inhibet, & ut paucis dicam omnes dolores, tumores, & inflammationes stomachi, uicāq; pulmonis emendat, finitq;, & alba denique mulierum profluvia sistit. Quā ob rem non iniuria summis laudibus a Pythagora hoc semen celebratum fuit. Qui plura de illo scire desideret, is legat Plinium lib. xx. cap. xvij. quo loco inter cætera commemoratur Dalionem quendam herbarium parturientibus mulieribus semen Anisi cum Anetho rufum bibendum dedisse, Heraclides uero Anisum manducare iussit, quibus intumesceret stomachus, idq; singulari experimento.

EXTRINSECVS:

Ad extrahenda si qua in oculos inciderint, herba aut semen Anisi recentis siue aridi tunditur ac emplastri modo imponitur. Idem medicamentū uenenatis animalium morsibus impositum, uenenum extrahit, uulnusq; sanat.

Suffitu feminis Anisi & storacis calamitæ naribus excepto capitis dolores finiuntur.

Semen Anisi cum oleo Rosaceo calido tritum instillatumq; fractis auribus medetur. Idem efficit succus herbæ expressus.


Omnes commemoratas uires, quas utrisq; in corporis partibus semen habet, aqua e flosculis distillata obtinet.

De Caro. Cap. CLII.

CAROS HELVETIIS, SVEVIS, ET MEDIONATRICEbus usitatissima planta, in aridis pratis, ac ædito loco sitis, nec non graminosis agrorum limitibus, humo forti gaudens, emicat, eoq; foeliciter, quo altiores situs occuparit. Radicem habet læuem & rectam, in medio lignosum quid obtinentem, sapore Pimpinellæ quodammodo respondentem, nisi quod illa mitiore sit & gratiore gustu. Herba

Staphy.

Caros.
Wistymmel:



Staphylinos imitatur, maxime uero cum pingue solum illi obtigerit. Caulem profert teretem, cauum, nodosum seu geniculatum, bicubitalem nonnunquam, & altiozem etiam interdū. Altero demum anno posteaquam ex humo emerge receperit, umbellas gerit in cacumine candido flore ueluti Chærefolium emicantes, idq; Maio mense. Nam Iunio semen mature scere incipit, quo decidente radix, folia & caules protinus pereunt, ac ex semine deinceps deciduo planta hæc repullulascit sponte sua citra hortulani operam.

NOMENCLATURAE.

Germani hoc semen Wistymmel / hoc est, pratense Cuminum, nonnulli etiam Wegstymmel a uis & itineribus, ad quæ, præsertim si graminosa fuerint, Caros reperitur, nominant. Elic hic ipse *αἰ* Dioscoridis, quem officinæ semen Carui appellant. Hebræi כמון Kammon, Chaldæi כמון Kemonā uocant, uide Esaiæ cap. xxviii, dubi-

Diosco. lib. 3.
cap. 59.

to tamen an ad hoc Cuminū an uero ad Cuminū Romanū hæc appellationes pertineant. Ac facile crediderim radicem Cari ueteribus antequam floreret in cibo instar Pastinacæ usurpatam, cum illam gustu satis repræsentet,

Serap. cap. 279.

qua de res libet uide. Aeginetam libro j. & Athenæum, qui hac ipsa de causa illam Pastinacam maiorem uocauit. Auerrhoes ait Nauoca esse semen Carui, & Ammeos. Serapio. Caruia nuncupat. Hoc loco de altero Cumino quod Hippocrates Regium dixit, & alij Germanica uoce Rômmisch Kûmmel/cuius duo tradunt genera, satium scilicet & syluestre, necnon de exterguo illo semine Ammeos, quod omni Cumino et Petroselino etiam minutius est, scribendum mihi fuerat. Verum enim uero quod ad Cuminum attinet, libens illius historiam persequer, si semina illa cum herba recenti uiderem mihi cõgisset, quod quia hætenus mihi negatum fuit, supersedebo in præsentia a descriptione illorum. Ammi autem tametsi in ordinem earum plantarum, quæ umbellas gerunt referendum fuerat, nihil tamen de illo dicere uoluimus, antequam excreuisset a nobis satum, quare alio loco illius mentionem facturi sumus.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Cari semen excalfacit, et exiccat, Aniso per omnia par, ideoq; ueluti illud utrinq; corpori adhiberi potest.

IN TRINSECVS.

Radix cocta ac præparata ueluti Pastinaca, cibo utilissima est ad excalfaciendum stomachum, acciendum urinam. Reliqua in Aniso uide.

Semen Pani adiectum apprime conducit, caseisq; quoque appositum iucundo illos commendat odore, sicut & omnes alios cibos.

EX TRINSECVS.

Semen in sacculo lineo calidum impositum uentri, flatu discutit, a purgatione in colica passione.

Vsus seminis Cari apud Germanos.


Semen hoc passim in Germania usu frequentissimum, ac quouis etiam Arabico aromate sua ratione præstantius. Hodie apud nos pani ut diximus compinfitur, caseis adijcitur, eoq; iuscula carniū & piscium in culina condiuntur. Officinæ deniq; Saccharo semen istud obducunt, magno sane suo emolumento, nam diuitibus hoc pacto magnopere quæritur.

De Cumino montano, quod Germani Rôßkûmmel/hoc est, equinum Cuminum uocitarunt, supra cap. cxlij. differuimus.

De

De Pyrethro. Cap. CLIII.

Bertram.



YRETHRVM AD STELLATAS PERTINET PLAN-
tas, nam flores eius per omnia Bellio maiori respondent, nisi qd

Ff v

breuiores illa habet caules, flores etiam maiores, ac extrinsecus rubro colore tinctos, non aliter atq; Bellis minor. Porro ex interno flore qui luteus est, semen efficitur, quod cum Iulio mense decussum, terræq; commissum fuerit, haudsecus pullulat atq; Foenum græcum, tametsi quæ postea sequuntur folia Millefolium adeo referant, ut discerni duo illa genera uix possint. Radicem habet dodrantalem, digitum crassam, rectam, leuem ut Daucus. Floret altero demum anno in fine Maij mensis. Hodie in hortis plantatur.

Dioscor. lib. 3.

cap. 78.

Dorycnij appellatio ad Solanū referenda est, ut supra docuimus.

Mirum autem uidetur qui fatum sit quod Pyrethro attri-

buta fuerit.

Serap. cap. 356.

NOMENCLATURAÆ.

Germani Bertram deflexa a Pyrethro appellatione, & Speidelwurtz, el/hoc est, Saluarem nominant. Dioscorides *ῥιγιδίον*, Dorycnion, Pyrinon, Pyroton, Pyrothron, ἀρνὸν Pyriten, & Pyriten uocauit. Latini Saluarem. Quas quidem uniuersas appellationes a feruenti gustu, quæ radix obtinet, herba hæc sortita est. Multi putant Tarcon Auicennæ esse Pyrethrum, quod si ita est, apparet illum bis secundo libro de Pyrethro scripsisse. Serapioni Macharcaraha. Auerrhoi denique Halacarta, Haliabbas, & Harcharach dicitur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Pyrethrum apud nos aduersus dolores maxime dentium hodie usurpatur, idq; non sine causa, nam radix eius commanducata, ac in ore retenta, crassos, lentos & frigidos humores, qui ad dentes nonnunq; descendunt, extrahit, dissipatq;. Pariratione ueteres hac radice usi sunt, ad educendos frigidos cerebri humores, quod Ægineta lib. j. cap. xlvj. & Serenus Poeta cap. vij. hoc uersiculo testatur reliquit.

Purgatur cerebrum mansa radice Pyrethri.

Proinde radix Pyrethri feruentissima, ac in educendo ac trahendo humores efficacissima est, quare ad qualuis frigidas & humidas affectiones adhibere illam utrinq; possumus.

INTRINSECVS.

Semen autradix uino decocta & pota, lentos ac frigidos humores per Experimentum. urinam & aluum educit, quod ipse certa experientia addidici. Vide Dioclis epistolam ad Antigonom regem.

EXTRINSECVS.

Radix Pyrethri ad dentium dolores unice facit, quare si quis hīs affectionibus

nibus laboret, is tufam radicem hanc in aceto decoquat, & ex illo decocto os colluat, quod cum fecerit, releuationem sentiet, nam nō solum collectos frigidos humores extrahit, sed & dolorem sedat hoc medicamentum. Atque hæc sunt præcipua mala aduersus quæ Pyrethrum hodie in usu est.

Radix in ore commanducata idem præstat, & cerebrum humidum purgat.

Radix tufa, ac cum oleo temperata, sudorem elicit illitu, excalfacit nervos, perfrictionibus articulorum maxime utilis.

Pari ratione usurpata, totius corporis calorem recuperat, inprimis uero in diuturnis horroribus febrium, alijs uero perfrictionibus membrorum.

Vnguentum ex Pyrethro, & oleo Chamomelino confectum, si eo spinam dorsi inungas, teq; in lectum componas, ac probe contegas, ad rigores febrium ne redeant, mirifice conducit. Ad hæc stupidos & resolutos adiuuat, præsertim uero infantes, si quando hoc morbo infestantur. Et ut paucis multa dicam, quæcunque ex frigida intemperie proficiscuntur mala, ea hac radice curari ac excalefieri possunt.

De Petroselino, & Amomo Germanico.

CAP. CLIIII.

INTER OMNIA APIORVM GENERA, VIX ALIVD
I est usitatius eo, quod officinæ uulgo, sed non sine errore, Petroselinum uocant. Nam nullam in Germania nostra culinam reperias, in qua & herba & radix huius Ap̃i hortensis, suum locum inter præcipua olera, non occupet, ita ut non solum diuitibus, sed & pauperibus, uarijs cibis condiendis magnopere quærat. Sed quid de Germanis dico, an non & ipse Apicius ac Platina summo loco Petroselinum semper habuerunt? Proinde neminem esse existimo, cui usitatissima planta non sit cognita, qui non etiam uires eius perspectas habeat. Quanquam quod mirari satis non possum, quæ notior aliqua herba uulgo fuerit, eo plerunque doctissimis quibusque forma, & nomen illius ignota existunt. Quor enim putas in numero illorum esse, qui Petroselinum, Cheræfolium, Cicutæ, & eius quæ Germanis Gleiß dicitur, differentias proprias cognitæ habeant, aut nomina genuina sciant? Quemadmodum enim, quod ego uidi, Cicutam Chære folium, rursus uero herbam Germanis Gleiß dictam Petroselinum dicere quidam ex his audent, ita fieri facile possit, ut idem Petroselinum Cicutam, rursus autem Cicutam Petroselinum appellare non uereantur. Sed relictis his ad historiam Petroselinini nos conferamus. Semen eius quod aliquanto maius est semine Ammii, hortulani nostri primum Aprili mense, aut potius

^{1.}
Petroselinum
uulgare hortensium
16.

Petroselinum.
Peterlin.

Palladius mense
Maio titulo
quinto.




tius appetēte Maio mense,
secundum doctrinam Palla-
dij, deinde uero, quo sequen-
ti anno in Maio tenerum
Petroselinum, quod maxi-
me in cibis expetitur, habe-
re possint, circa festum Di-
ui Laurentij, & Bartholo-
mei, terræ mandare solent,
e qua duobus primum fo-
liolis acutis erumpit, non
aliter atq; herba seu potius
uitium Gleiß Germanis di-
ctum. Quæ duæ plantæ
cum adoleuerint, (nam cō-
iunctim, iisdem locis nata-
libus gaudentes, proveni-
unt) tāta affinitate copulan-
tur, ut discerni uix possint,
nisi coloris differentiam
probe animaduertas. Pe-
troselinum namq; diluta &
grata uiriditate præditum
est, alterum uero uitium
nigricat magis. Folia utri-
que dissecta, sed profundio-
ribus diuisuris quam Chæ-
refolium. Caulē etiam
rotundum utraq; planta
habet, sed in eo rursus diffe-
runt, quod altero demum
anno Petroselinum excau-
lescat & floreat, illud uero
primo statim anno caulē,
florem in umbellis album,
& semen Cumino simile

proferat. Iam & in umbellis quas habet in flore sublateas, & semine magis
exiguo, odorato, gustuq; aliquantulum acri, a uitio illo diffidet Petroseli-
num, ut interim de radice nihil dicam, quæ uitio illi non ultra dodrantem
longa,

Amomum Germanicum.

Deutscher Amomum.



odorato & acri, atq; ira reddito & flore & semine tota ingruente hyeme perit planta, sicuti & Anethum, Quo loco observandum est omnia alia Apij genera.

longa, ac ingrati plane & foetidi odoris est, huic uero odoratissima, ac prolixa ueluti Foeniculi. Quid quod interdum sponte sua Petroselinum minutim concisa foliola Foeniculo non absterilia sortitur, quod ego culturae tribucri. Nam & Theophrastus & Columella uno ore testatur, herbam Petroselini crispam reddi, si postquam satum fuerit semen in humo depressatur.

Theoph. li. 2.
cap. 5.

Col. lib. 12. ca. 3.

Proinde ea herba cuius semen Seplastiarum uulgo sub nomine Amomi uendere solent, alsiosa est planta, huius namque frigus perferre non potest, quare ex semine quotannis necesse habet plantari, quod primum quidem binis acutis foliolis, non secus atque Petroselinum pullulat, deinceps uero subsequuntur alia & maiora, & profundioribus incisuris dissecta. Caulem profert geniculatum & scurculosum, qui sicut & folia, odoratum paludarium representat. Flores exigui, albo, & copioso emicat, idcirco Iulio mense, semine post florem decussum pregnat,

2.
Amomum Germanicum.

genera hyemem ferre posse, hoc uno excepto, qui sit, ut, quod ad me attinet, illud Apij accensere nullus possim.

NOMENCLATURAE.

Diosco. lib. 3.
ca. 67. Hoc Apij
Melissophyllon
cognominat, sed
hæc vox ad aliã
herbã pertinet,
ut supra ostendi-
mus. Nicander in
Alexiphar. hoc
Apij genere ui-
ctores Corinthi-
os sese coronare
solutos scribit.
Serap. cap. 280.

Isidorus & Platina in ea sunt sententia, ut existiment Petroselinum nostrum uulgare esse Petrapium, seu Apium saxatile, hoc est, si Germanice exprimere uelimus, Stein eppich/aut Stein peterlin. Arqui manifestum est nostrum uulgare Petroselinum, non in saxis, sed hortis plantatum prouenire, licet quandoque illud uiride in muris reperiatur, id quod vento tribuendum est, qui plantarum semina hinc inde non raro dispergit, disijcitq;. Quod si uero eam ob causam Petrapium esset dicendum quod inter petras interdum inueniatur, multa sane haberemus Petrapia, quando luce clarius est multas plantas saxi & petrosi delectari. Sed ut tandem nostram de hac planta proferamus sententiam, eam σίνιον κάρφον, Apium hortense, hoc est, Germanis Garten eppf/Garten/oder zam Peterlin/Dioscoridi uocatam omnino iudicamus. Quod autem uulgare nostrum Petroselinum nihil aliud sit quam Apium hortense, non solum experientia, herbæq; ipsius apud Dioscoridem historia, uerum etiam Constantinus & Manardus Ferrariensis (lib. nempe vi. Epist. Medic. Epist. viij) Medici excellentissimi testantur. Quare quæ hucusq; de Petroselino diximus, nequaquam TEMERE, (sic. n. nonnulli labores nostros interpretantur) sed in gratiam studiosorum rei herbariæ ad monitionis gratia dicta sunt. Quid uero per Petroselinum & Petrapium intelligamus suo dicetur loco. Serapio sex genera Apiorum recenset, inter quæ hortense, (hoc est, Petroselinum nostrum uulgare) Karphs, & Karphi nominat, Arabes quidam semen illius Bizcri Alcarasis nuncupant Ex his itaque quæ adduximus satis liquet, nos quoque hodie ueterum habere Apium, quod quocumq; modo alij uocitent, siue Petroselinum, siue alio nomine parum sumus solliciti, modo sciamus illud hortense esse Apium.

2.
Diosco. lib. 3.
cap. 57. Quod ad Amomum Germanicum attinet, quod a Germanis frembder Peterlin/hoc est Peregrinum Petroselinum appellatur, nos illud Sison hortense dicemus, moti & forma & uiribus huius herbæ, quæ minimum quoddam Apiorum genus esse uidetur. Neq; hanc nostram sententiam a ueritate tam longe abesse putamus, atq; eorum qui hactenus pro Amomo semen eius uenditare soliti sunt.

3.
Gleiss. Postremo eam plantam cuius supra meminimus, uitium Petroselini esse, aut certe aliqua ratione ad Cicutam pertinere arbitramur. —

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Petroselini herbam & radicem, non solum coqui, sed & seplasiarij hodie usurpant,

usurpant, magis uero semen, quod calidius est, & ad ciendam urinam efficacius. Porro possunt utiliter omnes partes Petroselini utrinque corpori adhiberi.

INTRINSECVS.

Radix & herba Petroselini ad culinas spectant, utilesque sunt in omni cibo, nam inflationes stomachi deprimunt, contra epotam argenti spumam auxiliantur, urinam & menses cient, iecur & lien obstructionibus liberant, hydropicis & Ictericis conducunt.

Radix & semen omnibus medicamentis aduersus uenena, tussim, & aquam intercutem facientibus misceri possunt.

Sunt qui decoctionem contra aquam intercutem, morbum regium & calculum renum, hoc pacto conficiant. Accipiunt seminis Petroselini, seminis Foeniculi, seminis Anisi, Cari, singul. unciam unam, radices Petroselini, radices Pimpinellæ, radices Cari, sing. unciam unam, aut unciam & semis. Hæc omnia in mensura uini albi per noctem macerant, alteroque die ultra tertias decoquunt, uesperisque ac mane ægris propinant, ita tamen ut a potu ieiunet æger tres horas. Hac decoctione obstructiones foci noris ac lienis tolluntur, aqua intercutem atque Icteros per urinam expellitur. Eadem aqua distillata iuuamenta ascribuntur.

Decoctio utilis.

EXTRINSECVS.

Herba Petroselini cum pane recens cocto, tusa ac imposita oculorum inflammationibus auxiliatur, illorumque tumores detumescere facit. Pari ratione erysipelatis ac sacro igni illinitur, æstuantem stomachum mulcet imposito, id quod non semel experientia comprobauit.

Experimentum certum.

Mulieres si quando infantes ablactare uelint, herbam Petroselini tusam, mammis imponant, quo facto mammarum duritia ex lacte concreto contracta, intra paucos dies reprimetur. Ad eadem ualere dicitur aqua distillata.


De uulgari Apio, & Sio odorato.

CAP. CLV.

V LGARE APIVM QVOD NVSQVAM LAETIVS
 exurgit, quam humidis & paludosis locis, utpote fossis, umbrosis & uliginosis hortorum angulis, sepibus etiam ac muris, Petroselino hortensi, caule, radice, folijs & umbellis similis apparet, nisi quid per omnia

1.
 Apij uulgaris
 descriptio.

Vulgare Apium.
Gemeiner Epff.



2.
Sion odoratum.

omnia illo grandius, pinguis, odore denique ac gustu uehementius & amarius existit. Flores etiam huius calidi sunt & non lutei sicut Petroselinum, semen multo magis exiguum, Ammios sementi haud dissimile, feruido gustu pręditum, quo ad pilulas aureas conficiendas utuntur uulgo, ego Petroselinum semen in locum eius substituo. De hoc Apii genere uidetur mihi mentionem fecisse Vergilius, cum in Sileno dicit,

Floribus atq; Apio crines ornatus amaro.

Nascitur proinde herba quędam in fontibus ac irriguis Petroselino folijs et caule concauo, quadantenus similis, nisi quod illa maiora habet. Umbellas gerit candido flore emicantes, ueluti Apium uulgare, idę lunio mense. Semen maturum Anisum repręsentat, sed rotundius illo est, acre & suauiter odoratum, ut eatenus cum Coria non prope conferri possit.

NOMENCLATURA.

Germani priorem plantam Bäur Epff/oder Wasser Epff. Latini Apium rusticum, aquaticum, aut palustre nuncupant. Estq; illud meo quidem iudicio in *apio rusticum* Dioscoridis, quod & *apio rusticum* uocat. Quę quidem nomina ad aquaticum quoq;

Sion odoratum.

Brunnen Peterlin.

quoque Apium, cuius supra cap. xxx. meminimus, referri possunt.

Alterum genus Apij qd nonnulli in hyeme una cū Nasturtio aquatico in acetarijs elitare solent, nos Lauer Plinij esse existimamus. Apud Dioscoridem uero Silymbrium est secundum, quod ille Cardaminen & eius cognominat. Ea de causa doctissimus uir D. Conradus Gesnerus eam herbam Sion odoratum recte dixit. Serapio Apium Asialis. Auerrhoes Alcharfas, Karphs, Karphi uocauit capite cclxxx. Postremum hoc Apium quidam Selinum, & Germanice Bynen Fraut uocant.

Plinius lib. 16.
cap. 8.
Diosco. lib. 2.
cap. 117.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Omnia Apij aquatici genera, acriora sunt & feruentiora Petroselino, ideoque culinis abdicata, Septastarijs, qui ea pro placito culisq; preparare norunt, relinquuntur. Dioscorides Eleoselinon ad eadem ad quæ Petroselinum efficax esse tradit, quare plura de

his scribere superuacaneum mihi uidetur. Alterum uero quod ego Lauer, & Sium nomino inter culinarias herbas locum suū obtinet, Hyeme namq;

Gg



cum omnes aliæ herbæ perierunt, hoc Sium cum Nasturtio aquatico acetarijs accersitur.

De Pimpinella. Cap. CLVI.

Bibernel.



2.
Secunda Pimpinella species.

PIMPINELLA TRIUM est generum, una nimis maior, duæ uero exiguæ, radice gustuq; consimiles. Quæ in his maior est, ea in pratis apricis, & arenosis agrorum limitibus erumpit radice recta, læui, candida & longa, Petroselinæ radici similima, gustu acri ac gingiber æmulante. Folijs uestitur nigricantibus, usq; singulis multifariam ac profundis incisuris dissectis, folia nucis recens enata, aut Pastinacæ herbæ referentibus. Aduentante mense Maio caules profert concauos, nodosos & proceros, florem uero in muscarijs candidum, semen denique ubi maturuerit, Petroselino simile, nisi quod acrius feruentiusq; gustu existit.

Alterâ Pimpinella feruore et acrimonia primum genus superat. Nascitur in arenosis agrorū limitibus, in asperis montibus ac saxis, radice saxorum rimas angustissimas penetrante triū quandoq; palmorum longitudine, recta, ac tenui, ut uermis

uermis rudimentum quasi exprimat. Folia, caules, flores, & ipse color, & forma cum primo genere prorsus conueniunt, nisi quod hæc tota substantia minor est, coliculis interdum & uenis foliorum purpurascens. Floret appetente Maio mense, Semen Ammii semini simile habet.

Huic tertia Pimpinella radice, caule, flore, semine, odore & sapore plane similis est, uno hoc nomine ab eadem dissidens, quod foliola habet minutissima dissecta, ac serrata, ita quidem ut à Caro discerni, ac Pimpinella esse credi uix possit, nisi gustata radice. Prouenit autem hæc plerumque in iisdem locis, quibus altera gaudet Pimpinella. Estque hoc crispum Pimpinellæ genus, quale & in Petroselino uidere contingit, quemadmodum supra annotauimus:

^{s.}
Tertia Pimpinella species.

NOMENCLATURAÆ.

Etsi Pimpinella, quæ Germanis Bibernell dicitur, uulgaris est planta, tamen quo nomine ueteribus fuerit appellata, & quid nam illa sit, nemo doctorum uirorum indicauit hactenus, quantumuis multa de illa scripserunt. Sunt enim qui Bibinellam, sunt qui Pimpinellam, Pampinellam, & Pampinulam uocitēt, nonnulli Bipennulam, & Sanguisorbam nuncupant. Simon Ianuensis Petram findulam, & Saxifragiam appellauit, & rectius quidem meo iudicio alijs omnibus, his enim nominibus non solum historia Pimpinellæ, uerum etiam uires respondent, nam Pimpinellæ nostræ radix saxa penetrat ut diximus, & ad ciendam urinam, ac quemadmodum libro iij. testatur Platina ad calculos facit unice. Ego, ut & dehuius plantæ appellationibus meam dicam sententiam, si cum doctissimo uiro Manardo Ferrariensi essem, ubinam Pimpinella in Dioscoride nascatur, illi indicare non grauarer, cum & ipse quodnam hortense esset Apium, seu Petroselinum, studiosos medicinæ pro singulari suo in illos, & amore & candore edocuerit. Existimo autem alijs quoque bonis uiris operam nostram gratam futuram. Hic ergo optimi uiri Macedonicum *πετροσέλινον*, cuius ueteres meminere, in primis uero diligentissimus rei herbariæ scriptor Dioscorides, habemus. Is enim lib. iij. cap. lxx. Petroselinum in Macedonia in præruptis locis, semine Ammii, odoratiore, sapore acri, aroma olente, prouenire scribit. Quid uero aptius Pimpinellæ huic nostræ accommodari poterit hoc ipso Dioscoridis capite? An non hoc ipsum ordo, descriptio, & uires, quæ apud illum habentur, satis testantur? Atque hinc uidere licet, præposterum mortalium iudicium, qui magnis sumptibus e peregrinis & longinquis nationibus ea deportari ad se curant, quorum domi copiam magnam habent, qui sit ut non tantum sese ipsi decipiant, uerum etiam alios secum in errorem deducant, aut seducant potius. Id cum in alijs multis rebus medicis, tum uero in hoc Macedonico Petroselino cōtingere uidemus.

πετροσέλινον
Macedonicum.

Sunt enim qui affirmant Germanos nos hoc Petrapium profus non habere, alij uero semen illud magnum, cuius sub Branca vrsina mentionem fecimus, pro illo exhibēt, id quod faciunt Seplesiarij nostri temporis omnes, sequentes ea in re Iacobum Manlium, quod cōfirmant compositiones Philantropos, & Aurea Alexandrina Luminaris maioris, ut uel ex his colligere sit quales compositiones conficiantur. citra simplicium ueram cognitionem. Sed ut ad Pimpinellam redeam, eam a Theophrasto sub nomine montani Apij describi putamus, cum libro viij. capite vi. in hæc uerba scribit, *Τὸ δὲ σπέρμαρον μέγιστον διαποδίσχεται. Τὸ μὲν γὰρ φύλασται νεώτερον, ἥσα δὲ παλαιότερον, καὶ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς, καὶ ἀπὸ τῆς θήλειας.* Hæc ille. Et hæc quidem de Pimpinellis dicta sufficiant.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

*Germanicum.
Piper.*

Pimpinella calculo comminuendo & expellendo accommodatissima, temperamento calidior omnibus Apij generibus. Radix siccata loco piperis in cibo usurpari posset, nam gustu & uiribus ita Piperi respondet, ut Piper Germanicum non inepte dici possit. Et meo certe iudicio utilior ac salubrior est omni Pipere, quod ego experientia longa didici.

INTRINSECVS.

Herba Pimpinellæ, radix & semen, Petroselini facultatibus pollent, sed in expellendo, ac sedando dolore efficacioribus multo. E radicebus passilli confici possunt stomacho frigida intemperie, crassisque ac uiscosis humoribus laboranti, passioni etiam colicæ & matrici, quam utilissimi.

Radix Pimpinellæ quacunque ratione sumatur, siue in puluerem redacta, siue in potionibus, aut in Ecligmatis, aduersus omne uenenū facit unice, dolorem intestinorum lenit, calculis renum prodest, menses ciet, & si quæ alia per urinam euocanda sunt. Hæc omnia de semine quoque Pimpinellæ intelligenda sunt. Nam & Nörimbergenses Seplesiarij Saccharo hoc semen condiunt, quemadmodum Fœniculum & Anisum.

Aqua distillata easdem plane facultates obtinet, diebus aliquot continuatis mensura iij aut iij cochlearium pota.

Castoreum in aqua Pimpinellæ decoctum, ac potum, spasmus laborantibus auxiliatur.

EXTRINSECVS.

Tradunt nonnulli Pimpinellam uulnerariam esse herbam, capitisque maxime uulnera quamprimum glutinare, si succus herbar expressus instilletur uulneri, Id uero Pimpinellam præstare galli gallinacci mortales primum docuerunt.

docuerunt. Nam cranio illorum subula perforato, ita tamen ne cerebrum læderetur, succum herbæ instillabant, ac herbam ipsam rufam foris imponebant, quo facto intra paucos dies sanatum est uulnus, unde coniectura facta est capitis uulneribus eam herbam imprimis conducere. Atq; hæc in gratiâ Chirurgorum mihi dicta sunt.

Aqua Pimpinellæ si ex illa per aliquot dies facies abluatur, maculas eius detergit, eamq; claram reddit.

De Pimpinella Italica, quæ Germanis Bergotts
bertlin dicitur. CAP. CLVII.

Q VAM FORMAM RADICIS, FOLIORVM, ET
caulium in herba quam modo describendam sumpsimus, Pimpinellæ quadantenus respondeat, tamen si & odorem & gustum spectes, plus illa cum recenti glande, quam cum Pimpinella affinitatis habere certo cognoscitur. His adde quod folia huius ad cæsum quodammodo inclinant colorem, ac molliora, tenerioraq; sunt quam Pimpinellæ. Caulis habet purpurascens, læues ac tenues, ueluti culmus, modicæq; lanugine hirsutos, qui non umbellis uti in alijs Apiorum generibus uidere est, cõspicui sunt, sed potius gerunt in fastigio capitella rotunda, foraminulenta, ut ea ratione rudimentum faui satis exprimant. Inuenitur porro hæc planta in limitibus agrorum aridioribus ac asperioribus, incultis item agris & campis, maxime uero his qui aprici existunt. Floret appetente Iunio mense.

Alterum genus huic per omnia simile est, sed elegantius plane atq; gran-

NOMENCLATURAÆ.

Quoddam genus harum stirpium nomen sic scire nondum potui. In agro Vormariensi & Spirensi Bergottsbertlin, hoc est, Barbulam Dei, illas uulgo nuncupant, forassis a spadiceo colore. Alterum uero genus quod apud Mediomatrices affatim prouenit, Megeltraut mulierculæ uocant, quo & ad anserum Rheumatismos, quo uicio tum illi cum etiam gallinæ frequenter laborant, Germani den Psupffio appellant. Uti consueuerunt. Ego in ea aliquando eram sententia, cum Pimpinellæ similis sit, ad Apia referri posse, uerum multa sunt quæ repugnant. Nec desunt qui dicant eam esse ueram Italicam seu hortensem Pimpinellam, qui mihi certe ne utrumquam satisfaciunt, neque enim sententiam illorum probare possum.

^{1.}
Pimpinella Italica primum genus.

^{2.}
Pimpinella Italica secundum genus. Mediomatrici- bus Megeltraut.

Pimpinella Italica.

Bergotsberlin.

VIRESCIT TEM-
peramentum.

Binæ hæ plantæ ad cali-
dam accedunt temperatu-
ram, quare aduersus quoti-
diana alui profluuiâ usur-
pari forte possint. Quia au-
tem propria ipsarum appel-
latio nobis minime con-
stat, plura in præsentia de il-
lis scribere consultum non ui-
detur. Tradunt tamen nō-
nulli in supprimendis acre
stringendis sanguinis pro-
fluuijs, dysenterijs, alijsq;
alui fluxionibus, necnon et
muliebribus profluuijs, es-
se efficacissimas stirpes,
adeo ut quidam constanter
asserant etiam manibus ge-
statas sanguinem undecun-
que manantem sistere pos-
se, id quod experiatur quis-
quis uolet.


Sunt qui has herbas dum
teneræ adhuc fuerint, in
acetarijs escrare soleant.

De

De Chærefolio. Cap.

CLVIII

Böiffel.



CHÆREFOLIUM in initijs Petroselino prope simile est, sed tenuius, pluribusq; incisuris dissectum, ut eo nomine cum Cicuta maiorem affinitatem contraxisse videatur. Radicem habet albam, tenuem, breviorēq; omnibus Apij generibus, caulem vero læuem, purpuratē, cauum, surculosum, florem deniq; quem Maio mense profert, in umbellis candidum veluti Corianon. Semen a flore generat nigrum ac oblongum aristis auenæ simile, gustu dulce, omnis uero odoris expers, id quod mirari quis possit, cum herba ipsa tota sua substantia satis odorata existat. Chærefoliū alsiosa est herba, nam quotannis satū reuirescit, eodemq; statim anno perit.

^{1.}
Chærefolium sativum.

Syluestre illius genus in hortis graminosis, ac pomiferis, necnon aridioribus quibusdā pratis sponte sua nascitur, satiuo propemodum consimile, nisi quod caules gignit concauos, geniculatos, asperos,

^{2.}
Syluestre Chærefolium.

ac multifariam furiosos, Pastinacæ respondentes. Cæterum magnitudi-

Gg iij

ne totius substantiæ, omniumq; partium, odore etiam & gustu satium su-
perat. Hæc planta interdum in proceritatem Cicutę assurgit. Radix quotan-
nis novos emittit asparagos.

NOMENCLATURAÆ.

Si Chærefolium Apij genus fuerit, quemadmodum Constantinus &
alii multi opinantur, iure equidem post Apia proximum locum occupauit.
Germani Bissel/ & Bœrbelfraut nuncupant, uulgo Latinis Chærefolium.

diuor.

*quæ & Co-
nila dicitur.*

*Sylvius Parrhi-
ensis aliam quan-
dam Myrrhida
commemorat, cu-
ius nos infra lib.
2. cap. 104. men-
tionem faciemus*

Quod uero in Dioscoride habeat nomen, non satis constat, ut sunt uariæ de
ea re autorum sententiæ. Ego certe propemodum mihi persuaferam Chæ-
refolium esse Oreoselinon, seu montanum Apium, sed non prorsus cum her-
ba ipsa conuenit historia. Extant autem duo alia apud Dioscoridem capita,
quæ satis Chærefolio nostro quadrare uidentur, nimirum quinquagesimũ
septimum libri tertij, in quo Sison, seu ut uocauit Hippocrates Sinnon de
scribitur, & centesimum undecimum lib. iij. in quo de Myrrhida tracta-
tur, quorum posterius Otho Brunfelsius ad Chærefolium retulit, quod mi-
hi nequaquam improbat. Nam utrunq; Chærefolij genus odoratum est,
folijsq; per omnia excepto odore & sapore Cicutæ similitimum. Quamobrẽ
ego quidem sylvestre Chærefolium Cicutariam, quam Dioscorides Myr-
rhida quoq; cognominat, esse iudico: de satiuo enim non facile contende-
rim, tamen si enim quod ad odorem, formamq; attinet herbę descriptio Myr-
rhidis satis respondeat, tamen radice, quam habet breuiusculam Chærefo-
lium ab eadem Myrrhida discrepat. Sed uti alias semper inculco, sentiat quis
que quod uult, nemini enim erroris causam præbere uolumus, nostrã dun-
taxat indicantes sententiam. Columella Chærefolium, Chærephyllon ap-
pellauit lib. xij. de cultura hortorum, cap. iij. Plinius & Apuleius longe ali-
ud describunt Chærefolium. Apuleius namq; Chærefolium suũ Boopes,
Bootis, Arctophyllon & Pederos nuncupat. Plinius uero lib. xix. cap. viij.
in fine, scribit herbam Pederota Cerephyllon nominari. Dominus Conra-
dus Gesnerus in Catalogo suo plantarum Chærefolium Gingidium Di-
oscoridis esse statuit, quæ sententia utique probanda uidetur, assentiente eti-
am doctissimo uiro Ruellio.

*Apul. cap. 104.
Acantha Diosc.
lib. 3. cap. 17. Pa-
derotis dicitur.
Plinius. lib. 37.
cap. 6. & 9. Pa-
derotas dicit gẽ-
mas esse, sed nihil
Chærefolio cum
gemmis.
Ruellius de nat.
stir. lib. 2. ca. 70.*

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Chærefolium satium officinis & culinis nascitur, nam in cibo usurpa-
tur ueluti Petroselinum, medię inter calidã & frigidam temperaturæ. In pri-
mis uero ad discutiendos intra corpus concretos sanguinis grumos, effi-
cacissimam esse herbam, certa experientia comprobauit.

INTRIN.

INTRINSECVS.

Succus herbæ sicut & aqua distillata, sanguinem ex casu, contusione aut plagis concretum dissoluit. Posset fortasse non sine utilitate ad calculum renum, mensesq; muliebres ciendos in cibo & potu usurpari.

Si quis in discutiendis concreti sanguinis grumis efficaciorē desideret medicinam, is oculos cancrorum, & carbones Tiliæ in puluerem redactos in succo aut aqua Chærefolij distillata imbibat. Porro & ad Pleurisin seu puncturam laterum hocce remedium facit.

Herba Chærefolij adhuc teneri inter olera mansa stomacho & capiti conducit, ob odorem quem habet gratissimum.

Chærefolium sylvestre, ad ducendos mulierum menses efficacius esse, in uino decoctum ac potum, ac aduersus pestem, aliaq; uenena paratione usurpatum facere traditur.


EXTRINSECVS.

Chærefolium tustum ac emplastri modo foris impositum, omnes tumores, & intra cutem carnemq; casu, contusione, aut quacunque tandem ratione concretos sanguinis grumos discutit, non aliter atq; Sigillum ut uocant Salomonium.

De Cicuta. Cap. CLIX.

A. THENIENSES MALEFICOS HOMINES CICUTA necare soliti sunt, quemadmodum historici passim testantur.

Quo pacto uero Cicutam temperare cōsueuerint, ut sine offensione morte nequaquam difficili e uita tollerent, quos necatos uolebant, ea inquam ratio Thrasix Mantinensi eiusq; discipulo Alexix constitit. Hodie in Germania nostra non Cicuta alijs uē uenenatis herbis homines improbi puniuntur, sed alio quodam pœnæ genere afficiuntur, nimirum Cannabina reſte, quæ Cicuta ipsa celerius uitam quibusdā eripit. Sed ut relictis his Cicutæ descriptionem adoriamur, nascitur illa sponte, nulloq; negotio, incultis & umbrosis locis, propter sepes, dirutisq; muris & inter rudera, Caulē profert quandoque tricubitalem, pene instar Fœniculi, concauum, geniculatum ac nodosum, e cuius alis & sinibus surculi alij prodeunt umbellulis candido flore Fœniculi modo conspicuis emicantes. Semen ubi maturuit satis Aniso respondet, infesto odore ac maligno præditum. Folijs uestitur magnis nigricantibus, dissectis multifariam, instar sylvestris Chærefolij.

*Cicuta.**Schirling.**Historia.*

Diosco. lib. 4.

cap. 77.

Herba Paraly-
sis plerisq; auto-
ribus ea est quam
supra cap. 66. de-
scripsimus

Apud Diosc. ve-
ro hæc appella-
tio Cicuta, Apo-
cyno & Delphi-
nio ascribitur.

Vide lib. 4. cap.

79. & lib. 3. cap.

77.

lysis, nonnullis Aphron, quibusdam Creidion, alijs Cocten, alijs Cathecho-
menion, alijs Abioton, alijs Apeudes, Alijs Ageomoron, alijs Timoron,
alijs Polyanodynus, alijs Dardanis, alijs Catapsyxis, Osthani babary.

Ægyptijs

Radicem habet longam, re-
ctam, atq; Pastinacæ simi-
lem, graueolentem. Appe-
tente Iulio mense floret. Lon-
go usu obseruatum est her-
bam hanc omnibus ani-
mantibus incommodare
præterquam Sturnis, quæ
aves remedia ex illa quæ-
runt.

NOMENCLATURAE.

Germani graueolentem
hanc stirpem Schirling/ &
Wütterich/ quasi tyrannū,
qui ad insaniam editatus
ab animantibus redigat.
Anseres namq; quam pri-
mum Cicutam degusta-
rint, insanire ac furere oc-
cipiunt. Vidi ego hone-
stam quandam mulierem,
cum inter Pastinacas Cicu-
tæ radicem decoctam, forte
fortuna commedisset, ebri-
am quasi ac insanam reddi-
tam, ut in altum scandere,
ac subuolare conaretur, cui
haustu aceti subuentum est,
ut ad mentem rediret. Ci-
cuta ut apud Dioscoridem
legitur, *uivcap*, aliquibus
Ægynos, alijs Ethusa, alijs
Apolegusa, alijs Dolia,
alijs Amaurosis, alijs Para-

Ægyptijs Apemphi. Romanis Cicuta appellatur. Hæc sane uniuersa fere nomina Cicutæ inde imposita sunt, quod & homines & pecora interficere possit immensa sua frigiditate, quod & experientia & Nicander in Alexiphar. testatur. Cicuta apud Auicennam Succara (quod alij Zucharam, Sciacharam, & Sucharam scribunt) dicitur, & non Napellus, qui non est aliud nisi ipsissimum Aconitum, quemadmodum supra cap. cxxxvi. demonstrauimus. Solent autem Auicenna Cicutam seu Succaram suam, alias Euphorbium, alias Helleborum nigrum, interdum uero Alpharphas & Albes uocare. Rursus quarto libro cum de uenenis agit, dicit se existimare Alpharphas, Napellum aut aliud quoddam lætale uenenum esse, ut hinc uidere liceat nullum bono regi inter Napellum & Succaram constituisse discrimen. Vide Auicennam lib. iij. fen. vi. tractatu j. cap. ij.

*Auicenna lib. 2.
cap. 671.*

Serap. cap. 337.

VIRESCAC TEMPERAMENTVM.

Cicuta ob insignem quam obtinet frigiditatem intra corpus assumi non debet. Extrinsecus usum suum habet in multis morbis. Nam & Monachis alijsq; religiosulis, qui castitatem uouerunt, prodesse potest. Quod si quis per imprudentiam lætale Cicutæ uenenum haussisset, illi confestim uinum meraculum propinetur. Vide Plinium lib. xxv. cap. xi.

EXTRINSECVS.

Ad omnes inflammationes & tumores, qui alijs remedijs curari rennunt Cicutæ uel herba, uel succus aut aqua mediocriter calida imposita unice facit, calorem enim repellit, doloremq; capitis omniumq; membrorum sedat.

Anaxilaus autor est, referente Plinio, mammas à uirginitate illitas semper staturas, & quod certum sit, lac puerperarum mammis impositam Cicutam extinguere, ueneremq; testibus circa pubertatem illitam. Sed pertinent hæc remedia ad castos illos ac religiosos cœnobitas, utriusq; sexus.

Pli. lib. 29. ca. 11.

Ad erysipelata, ignesq; sacros Cicutæ herba, succus & aqua distillata eligi debent.

Breuiter quibuscunque affectionibus calidis Cicuta medetur, est enim ex his non postrema, quæ uocant Repercussiuæ, dolorem sedantia, & somnum inducentia, seu Narcotica.

De Millefolio.

Cap. CLX.

ERAACNOBILIS STRATIOTES, QVAMEGO PROPTER FORMAM HOC NOMINE DIGNAM CENSEO, HAUDQUAQUAM PASSIM

**Vere Stratiotes
obuia**

Nobile Millefolium.

Edel Garb.



obuia est, ueluti altera quæ uulgo nota est, quin potius in optimis quibusdā agris frugiferis, maxime uero in tractu Vormatiensi sitis reperitur, herbula proculdubio non multis ex doctioribus uisa. Ea autem ut ad descriptionem eius accedamus, ē capillata radice interdum quinos aut pauciores, lignosos ac teretes colles emittit, eosq; binos palmos æquantes altitudine, non raro etiam proceriores, qui folijs uestiuntur incanis ac cineraceis, incisif, ac Coriani herbæ quam similibus, sed & nonnullis alijs caulem inferiore sui parte circūdantibus, ac humi præcūbentibus. Quod si ulli herbæ alijs, hæc nostra Stratiotes conferenda sit, ego certe luteæ Chamomillæ, quæ Bupthalmus alias dicitur, caules & folia illius compararem, quanq; folia huius Stratiotis tenuioribus ac frequentioribus² incisuris diuisa sint, odore suauissimo, sapore uero acerbo prædita. Mense Iunio flore candido uulgaris Millefolio (quod tamē sua-

uitate & uehementia odoris saporisq; ac elegantiæ formæ omnibus modis antecellit) per omnia simili, emicat. Flos filius in semen forma & sapore Tanaceto consimile, tandem abit.

Vulgare

Vulgare Millefolium.

Schaffrip/oder Gerwel.



Vulgare Millefolium ^{2.}
 tamq̃ herbis quæ florem *Vulgare Millefo*
 in umbellis proferunt, & *lium.*
 uulnerarijs plantis accense-
 ri commode potest. Illo
 enim Chirurgi, in potioni-
 bus, ac emplastris uulnera-
 rijs uti consueuerunt, cum
 longa obseruatione com-
 pertum sit, eam herbam ad
 quæuis uulnera facere uni-
 ce. Millefolium primo ex
 ortu antequam excaule-
 scat folia minutissimis inci-
 suris diuisa profert, odora-
 tæ Chamomillæ catenus si-
 milimum. Porro folia sin-
 gula Costæ formam repræ-
 sentant, gustu subamara.
 Iunio mense appetente in
 caulem rotundum, con-
 cauum, & sesquicubitalem
 assurgit, plurimis subaspe-
 ris folijs ad cacumen usque
 uestitum, quæ quo uicinio
 ra umbellis extiterint, eo
 magis exigua euadunt, ita
 quidem ut suprema superci-
 liorum formam satis expri-
 mant. Flores in umbellis
 radiatos procreat, alios cæ-
 didos, alios subalbidos,
 nonnullos diluti ruboris,
 uehementer ac suauiter o-
 doratos. Semen ubi excide-

Vulgaris Mille-
folij tria genera.

rit, vulgari Chamomillæ simile est. Radices omnium Strationis generum,
 nigrae sunt, capillamentis fibratae intra humum hinc inde serpentes, uelut
 Vrticæ, Artemisiae, & Tanacetii, gustu aliquantulum feruentes, & quæ lin-
 guam

guam uellicent. Nascuntur omnia Millefolij genera in aridioribus sed graminois hortis, agrorum limitibus, præcipue circa uias ac semitas. Illud uero quod rubente emicat flore, eoq; odoratissimo, in syluis quandoque reperitur.

3.
Millefolij tertia
species.

Tertium Millefolij genus quod acuta obtinet & incisa folia, pinnis autem pulli similima, supra sub Tanaceto depinximus, quod odore cum illo conueniret. Quia uero forma, gustuq; cum Millefolijs multum affinitatis habet, ideo in præsentia mentionem eius facere uoluimus, quo sedem sibi debitam occuparet.

NOMENCLATURAÆ.

Si in Thessalia Chironem illum laudatissimum Medicum, necnon & Achillem militem fortissimum uidere mihi contigisset, non dubito quin ex illis primæ nostræ Stratiotis, & nomina & uires addiscere potuissem. Quod cum denegatum mihi sit, nihilominus tamen singula illius herbæ confiderans facile dixerim eam uerum esse *χελιδνλλον*, seu *μυριόφυλλον*, hoc est, Millefolium, cuius in bellis olim sanandis uulneribus magnus fuit usus. Nam & fortissimus ille & decantissimus heros Achilles uulnera sua hac herba sanasse traditur, unde etiamnum hodie ab illo *ἀχιλλας*, hoc est, Achillea cognominatur. Dioscoridi *στρατιώτης*, & *στρατιώτις*, hoc est, Herba militaris, Millefolium, supercilium ueneris, quod Germanis *Jungfrauen augbrawen* dicitur. Plinius Panacen Heracleon, quod nomen ad aliam pertinet plantam, & Sideritim, & Millefoliam uocat lib. xxv. cap. v. Apul. ca. lxxxvii. hanc plantam Melophyllon Chrysiton, Ambrosiam, Acorum syluaticum, Vigen-tianam, Bellicocandium, & Diodelam à quibusdā appellatam tradit. Sunt qui Arabice Relicammolo dictam contendant, & hæc quidem de nomenclaturis primi Stratiotis generis dicta sint.

Diosco. lib. 4.
cap. 34.

Verbenaca apud

Apuleium ca. 3.

Militaris dicitur.

Millefolij appellatio, & Chamo-

mille & Sangu-

nali tribuitur.

Vulgare Millefolium nobis Stratiotes est terrestris apud Dioscoridem lib. iij. cap. xcviij. Germani Millefolium, *Garb/gerwel/Schaffripp* uocant.

Dioscor. lib. 4.
cap. 47.

Tertium ac postremo loco positum genus, proximo libenter adnuerem, nisi quidam Pyrethrum syluestre seu Parmicen iam dudum uocassent. Nec desunt qui Tragion Dioscoridis esse sentiant.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Bina illa ac priora Millefolij genera, sicce sunt qualitatis, astringendiq; & siccandi obtinent facultatem. Proinde uulgare Millefolium contrarijs & mirandis uiribus præditum est, Nam tulum ac uulneribus manantibus impositum,

positum, sanguinem sistit, rursus naribus inditum foliolum, nō multo post sanguinem elicit.

INTRINSECVS.

Primum Millefolij genus per se aut cum alijs herbis internis & externis uulneribus medendis in uino decoctū exhiberi potandum debet, nam quæuis uulnera & erosiones sanat, concretum sanguinem dissoluit, lumbricos uentris, & quicquid uenenosum est e corpore profligat, dolorem uentris sedat, pari ratione usurpatum. Atq; hæc experientia certa comprobata sunt.

EXTRINSECVS.

Chirurgis uulgare Millefolium notissimum est, quippe quod emplastris suis & unguentis adijciant, nam sanandi, exiccandi, & mundandi uulnera uim habet.

Herba uiridis adhuc tusa & imposita uulnera ita glutinat, ac si acu confusa fuissent.

Eodem modo imposita, superfluos mulierum menses constringit. Estq; hæc secreta mulierum experientia.

De Anserina. Cap. CLXI.

ANSERES IIS PASCVIS INPRIMIS DELECTANTUR, in quibus planta hæc prouenit. Nasctur autem illa in cāpis aquosis, & magna quidem ac foelici copia luxuriat. Nam ubi semel locum aliquem occuparit, eum hinc inde serpendo ac sese propagando non aliter atq; Fragaria, seu Quinquefolium, breui tempore prorsus obducet, ut sæpe unicus fruticulus, uiginti alios aut plures ex se procreet. Herba folijs quæ pinnis pulli autium similia sunt, ad Eupatorium proxime accedit, nisi quod illo magis exigua & mollior existit. Folia superne uiridia, inferne candicantia habet, caules nullos, uerum in expansis filis luteos producit flosculos quinis foliolis emicantes, Pentaphylli floribus haud dissimiles. Radix illius fibrata est, nonnunquam dodrantalis longitudinis. Herba odoris & saporis omnis pene expers.

NOMENCLATURAE.

Hanc plantam Germani Grensch/Grensing/Grenserich/& Genserich, Latini Anserinam nominant. Quod ad formam attinet, non inepte Eupatorium,

Anserina.
Genserich.



torium, seu Tanacetum minus dici posset, cum ab utroq; forma non multum differat. Hodie ad dysenteriam & Lienteriam, omnisq; generis fluxiones maxime recentiores hac herba utuntur. Multi etiam sunt qui credunt fluxum

fluxum alui cohereri, si quis herbam in calceo portauerit, id quod nonnulli alij vrticis inertibus tribuunt.

Hactenus aliorum sententias de nomenclaturis & usu huius herbæ recensuimus, nunc quid nobis uideatur exponamus. Posset ergo hæc nostra Anserina Germanice *Groß Garb*/hoc est, *Millefolium* maius appellari. Nam singula eius folia instar pinnæ auium pulli, sed maioribus incisuris dissecta apparent, quoad reliqua *Millefolio* non dissimilia, *Millefolium* itaque maius Latinis dicitur, nam & hoc nomine a Dioscoride libro iij. capit. cx. insignitur, tametsi quædam nomina, quæ eo capite commemorantur, ad alterum *Millefolium* pertineant, cuius præcedenti capite meminimus. Ea sunt *Stratitice*, *Achillion*, *Supercilium veneris*. Quod si quis quæret, quisnam mihi indicauerit Anserinam *Millefolium* appellari, cum neq; *Pandectarius*, neque *Simon Ianuensis*, nec *Gilibertus* & alij id scribant, huic respondebimus. Primum quidem *Pandectarium* suisq; similes perinde multa ignorare atq; me, deinde uero nos semper paratos meliora docentes audire, quisquis ergo sententiâ suam scriptis ueterum firmitus munierit, ille nobis semper præferetur. Interca tamen dum alij certiora proferent, his nostris *Millefolijs* fruemur.

Μυριόφυλλον.
Melophyllum.
Belocandus.
Has appellationes Apuleius uulgari *Millefolio* tribuit cap. 88.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Anserina (quantum mihi uidetur) nequaquam humidum, sed siccum obtinet temperamentum, non aliter atque *Millefolium*. Astringentia etenim teste Galeno, non humida, sed sicca sint necesse est.

Galen. de simp. med. facult. lib. 4. cap. 6.

INTRINSECVS.

Anserina cum aqua & sale decocta, ac exhibita ijs qui ex alto deciderunt auxiliatur, ut quibusdam uidetur, sanguinem concretum dissoluit. Verum hoc mihi nequaquam probatur.

Herba uino decocta & pota torminibus & dorsi dolore laborantibus subuenit, mulieribus quæ albis profluuijs uexantur, conducit, nam astringit haud secus atque *Pimpinella Italica*.

EXTRINSECVS.

Vulgo sentiunt alui profluuia cohibere hanc herbam, si in calceos posita pedibus teratur, aut si illa anus tergatur. Rursus tradunt alij eam uino decoctam, umbilicoq; impositam aluum ciere. Quod cuiq; certius uidebitur id sequatur, ego quod postremo loco dicitur haud facile crediderim.


Aqua Anserinæ distillata rubentibus oculis utilis est, si lincolis in ea

inadfectis imponatur. Hac ratione maculas quasuis extergere, fluxiones
& dolores sedare dicitur. Mihi certe non omnia experta, & obseruata sunt.

De *Perfoliata*. Cap. CLXII

Durchwachs

^{2.}
Perfoliata maior



PERFOLIATAE DVO
apud nos *Mediomatrices*
genera reperiuntur, quæ
ambo in agris zea aut triti
co confitis plerumq; proue
niunt. Chirurgi & qui ra
mices incidunt, ñ in hortis
suis plantare consueuerunt;
nam ad ramices sanandos
ualent, & prominentis um
bilici auxiliantur. Porro
utraq; alsiosa est herba, ex
semine enim quotannis plā
tari necesse habet. Maior &
præcipua teretem ac tenu
em profert caulem, eumq;
furculis multis ramosum,
ut eo nomine arbusculam
fatis exprimat. Atq; is una
cum ramulis suis singula
folia penetrat, quæ uenis ac
costis quibusdam promi
nentibus distincta, nec ome
nino rotunda, sed acumina
ta aliquantū *Hederaceis*q;
non prorsus dissimilia con
spiciuntur. In cacuminibus
omnium furculorum, capi
tula emicant, & in ijs flores
sublutei *Alchimillæ* simili
mi. Semen habet pullum
formam *Psyllij* præ se fe
rens.

rens, sed maius illo. Radix illi recta, brevis, instar Anethi.

Altera Perfoliata, semine, radice, caule & folijs huic similis existit. in hoc ab eadem differens, quod folia eius, quæ habet pinguis, quamprimum e terra eruperint, humi in stellæ figuram strata procumbunt, non aliter atq; Primulæ veris. Maio mense in caulem rotundum assurgit hæc herba, qui & ipse multis ramulis brachiatur, perq; singula folia (quæ crassiora, pinguiora, & magis acuminata existunt, quam sint primi generis, nam linguæ formam non male repræsentant, cineraceoq; colore prædita sunt) penetrat, quemadmodum & altera. Flosculos profert pallêtes, qui in oblongas abeunt filiquas, (digiti namq; longitudinem exprimunt) quales in Crambe sativa uidere est. Æstate pereunte perit & ipsa, posteaq; ex semine proprio, ut memimus repullulascit.

NOMENCLATURÆ.

Quamquam nemo quod sciam, uel ex ueteribus, uel recentioribus memoriarum prodiderit, quodnam his plantis in Dioscoride nomen sit, ita ut parum nobis de ea re constet, tamen in gratiam studiosorum rei herbariæ, eorum nempe qui ueritatem amant, & a contentionibus abhorrent, sententiâ meâ de hac nostra. Perfoliata exponere non grauabor, expectans interea, si quis certiora proferat. Primum itaque genus Mediomatrices lingua uernacula, *Durchwachs* / & *Stopsloch* / cum reliquis Germaniæ populis appellant. Atque id dubio procul primum est *Cotyledon* Dioscoridis, quod *Marcellus Vergilius* *Acetabulum* interpretatur, qua ratione Germanis recte *Ußfelskraut* / & *Nabelkraut* dici posset, cum folia eius leuem quandam ascensum fallentem concauitatem præ se ferant. Reliquæ appellationes apud Dioscoridem hæ sunt. *Cymbalion*, *Scytalion*, *Hortus ueneris*, *terræ umbilicus*, *Stœchis*, *Stergethrō*, *Vmbilicus ueneris*. Altera perfoliata haud dubie secundum Dioscoridis *Cotyledon*, seu ut *Marcellus* uocat *Acetabulum* est, cuius folia latiora aliquanto sunt & pinguiora. Dicitur & hoc quibusdam *Cymbalion*.

VIRESCACITATEM PERFOLIATÆ.

Binæ hæ herbæ vmbilici affectibus, alijsq; rupturis aptæ sunt, & in medicina utiles, temperamento (ut mihi quidem uidetur) calido & sicco prædictæ.

INTRINSECVS.

Utraq; Perfoliata ad internas affectiones ac rupturas uino decocta, aut in puluerem redacta ac pota hodie utuntur.

Ego pueris & infantibus ramice laborantibus, semen in lacteis cibis est-
tandum exhibeo.

Aqua distillata pariteratione usurpari potest.

EXTRINSECVS.

Perfoliatæ utriusque herba recens rufa, & cum propoli temperata, ut
emplastrum fiat, ramices sanat impositu, inflammationibus omnium mem-
brorum, & strumis unice auxiliatur.

Herba aut aqua distillata, sacris ignibus, erysipelatis medetur, stomachi
ardorem refrigerat.

Quæ de amore conciliando huic herbæ ascribuntur, missa facimus, tanq̃
superstiosa, ac Christiano homine indigna.

De *Cotyledone sylvestri.* Cap. CLXIII

1.
Cotyledon. sylve-
stre.


C VM PLERIQUE PLVRIBVS ALIIS PLANTIS PER-
foliatæ nomen assignent, consentaneum est, ut de illis porro aga-
mus. In syluis Maio mense plantula reperitur, quæ ut plurimum
unico folio constat, eoq̃ rotundo, sed ita ut interim in leuissimum & quod
sensum fere fallat, acumen desinat, quod in folijs maioribus Hederæ uide-
mus, quandoque uero foliolum, aliud perexiguum, supra maius hoc quod
descripsimus cauli adnascitur. Quanquam non raro reperiatur eius generis
plantulas, quæ tria proferunt folia, id quod naturæ luxurianti & soli fecun-
ditati ascribi debet, nam idem & in Trifolij contingit, quæ non raro qua-
tuor aut quinque conspiciuntur prædita foliolis. Sed pergamus in historia.
Hæc folia caulis tenuissimus ac plane iunceus, dodrantalis proceritatis pe-
netrat, elegantissimis candidis flosculis Limonio similibus emicans, qui
tandem in rubros acinos, in modum coralli, aut Liliij conuallij, ut uulgo uo-
cant (de quo infra cap. cxcvij) abeunt. Radicem habet tenuem, candidam,
& fibratam, hinc inde sese propagantem.

2.
Bifolium.

Proinde in humectis ac uliginosis quibusdā pratis herba provenit, folio
& radice Plantagini similima, eaq̃ binis duntaxat folijs aurem medio crite-
magnam satis referentibus uestitur, per quæ spica quædam erumpit. Maio
mense in altum sese attollens, flore & caule terete ad Saryrion accedente con-
spicua. Euanesceat autem circa festum Ioannis Baptistæ. Quotannis uero (qd̃
obseruatione dignum censeo) bina illa folia simul, tanquam gemelli e terra
exiliunt.

*Vnifolium, sic enim docendi gratia
lingere uocabulum necesse est.*

Zinblat.



NOMENCLATURAE


Germani priorem plantam *Zinblat* / quasi *vnifolium* dixerunt. Latine uero *Cotyledon sylvestre*, hoc est, Germanice *Wild durchwachs* / forte appellari posset, cum caulis eius folium ex parte penetret. Atque hoc nomine utendum censeo, donec certiora quis doceat. Posset etiam ab unico folio *Ceratia* dici, nisi radicem adeo exiguam haberet.

Alteram Germani *Zwei blat* / *Zweiling* nominant, nonnulli *Wilden durchwachs* / hoc est, *Perfoliatæ sylvestrem*, quemadmodum doctissimus uir *Otho Brunfelsius* piæ memoriæ testatum reliquit, & sane si formam spectes, non adeo male, tametsi ea plus cum *Saryrio* affinitatis obtineat, quam cum supra descriptis *Perfoliatæ* generibus. Sunt qui *Wasser wegerich* / hoc est, *Plantaginæ palustrem* appellent, qui & ipsi a uero non multum ab sunt, si folia confideres. Euricius Cordus in ea est sen-

tentia, ut omnino statuatur eam esse *Alisma Dioscoridis*, quod tamen mihi

*De Alismate sum
præ cap. 53.*

Hh ii

*Bifolium.**Zweiblatt.**Ruellius lib. 2.
cap. 144.*

non sicuerisimile. Ruellius
herbæ cuiusdā quæ bina ge-
rat folia meminit, Ophrin-
eam uocans, quæ utrū hæc
nostra sit necne, nondum
mihi constat.

**VIRES AC TEMPE-
rumentum.**

Nos priorem plantam
(nam de altera sub Satyrijs
in secundo libro plura di-
centur) vulnerariam esse iu-
dicamus, ut quæ recētibus
uulneribus utrinque adhi-
beri commode possit, non
aliter atq; quæ statim se-
quente capite describemus.

INTRINSECVS.

Hanc herbulam Empiri-
ci nonnulli una cum radi-
ce magni faciunt, dictitan-
tes aduersus pestiferam lu-
em præstantissimum esse
medicamentum, si dimidiæ
drachmæ pondere in pulue-
rem redacta in aceto uel ui-
no sumatur, ac postea quis
in lectum se ad eliciendum
sudorem componat.


EXTRINSECVS.

Herba & radix uulneribus adhibetur, ueluti & aliæ uulnerariæ herbæ

De

De Solidagine Sarracenica. Cap. CLXIII

Solidago Sarracenica.
Heidnisch Mundkraut.



SOLIDAGO SARRACENICA, de qua laudatissimus uir Hierony. Braun-
schuueig diligenter & copiose scripsit, non ubiq; locorum, sed in umbrosis solum ac uliginosis syluis & minime apricis ad uiri quandoq; proceritatem asurgens, reperitur. Caulem profert teretem, leuiter cauum, alium quidem purpureum, alium uero uiridem, non secus atque Artemisia, folijs per ambitum serratis, Salicijq; similibus uestitum. Æstate luteo cacumina emicant flore, coq; radiato ac in pappos tandem uelut Lactucæ euanescente. Radix huius fruticis modice fibrata conspicitur & geniculata, quæ per hycmem intra humum salua ac incolumis manet, quotannis Maio mense rubescentes asparagos emittens. Herba fortis & uirosi ac syluestris odoris ac saporis est, quare a nonnullis herba fortis dicitur.

Aliud proinde quoddam Sarracenicæ genus Bernar-
dinus de Kentzingen supe-
Hh iij

2.
Alia Sarracenica
ca Solidagine
species,

Herba vulneraria ad fluvium

die Pſrim uocatum nascens.

Wundkraut auff der Pſriemen.



3.
Tertia Solidagi-
nis Sarracenicae
species.

nioribus annis mihi indica-
uit, quod mirifice sanandis
vulneribus si ex decocto
herbæ colluantur, prodesse
astruebat, addens insuper, se
id expertū esse, cum namq[ue]
equum haberet, a lupo ue-
hementer læsum, curasse se
hac herba vulnera illius.
Nascitur autem illa in apricis
collibus ad ripas aquæ
rum sitis, acutis et angustis
folijs ex pallido uiridibus,
uestita, florem ferens in ca-
cumine caulis qui sesquicu-
bitalis aliquando euadit,
purpureum ac stipatum.

Tertia Solidaginis Sar-
racenicæ species in asperis
ac lapidosis agrorum limi-
tibus proflit, in primis ue-
ro ad fluvium illum quem
Germani die Pſrim uo-
cant prope Wachsenheim/
et ad montē tonitruī Germa-
ni den Dursberg uocāt, co-
piose provenit. Ea herba,
radice, caule, & folijs quæ
habet cineracea, Balsaming
acutæ per omnia similis es-
se uidetur, floret Iulio et Au-
gusto mensibus. Flosculi
lutei, qui multi cōiunctim
e' rotundis ac orbiculatis ua-
sculis crumpunt, primo So-
lidaginis Sarracenicæ gene-
si conferri possunt, nā sicut illius, ita & huius flores in auras evanescūt. Herba
est.

est gustu amaro prædita, unde conſicere poſſumus eam eſſe ſiccę qualitatis, nimirum penetrantem obtinere.

NOMENCLATURA.

Dabimus in præſentia alijs quoque locum, auſcultaturi quo nam laudabiliſſimam nobiliſſimamque plantam relaturi ſint. Vt tamen appellare uoſuerint, inter uulnerarias herbas facile primum locum occupat, tametſi ea uox *Wundkraut*, hoc eſt, uulneraria herba, late ſe extendat. Nam quemadmodum uarię uulnera curandi rationes extant, ita non unum tantum, ſed uaria herbarum genera ad id perficiendum uſurpantur, quę omnes uno nomine Vulnerarię herbę ab imperitis dicuntur, nimirum hæc ipſa noſtra *Solidago Sarracenica* aut *Herba fortis*, quam Germani *Heidniſch Wundkraut* nominant, *Aiſine*, *Aristolochia longa*, *Verbascum*, *Plantagines*, *Millefolium*, *Prunella*, *Satyrium*, *Anagallis*, *Althæa*, & *Veronica*, quas omnes & ſingulas ſupra deſcripſimus. Proinde quęcunque herba certo apud doctos deſignatur nomine, ea a *Rizotomis*, *Iudæis*, *Agyrtis* & *aniculis*, *Vulneraria herba*, *Wundkraut* appellatur. Cum itaque quę huic herbę genuina competat appellatio nobis nō conſtet, rogamus doctiſſimos quoſque rei herbarię ſtudioſos, ut nomenclaturam Herbę fortis propriam in ſcriptis ueterum diligenter inquirant, pro quo beneficio immortalem conſequentur dubio procul gloriam.

VIRE. AC. TEMPERAMENTVM.

Solidago Sarracenica apud nos Germanos inter uulnerarias herbas primas tenet, licet plures alię & præſtantioreſ reperiantur. Verum quod cuique placet, id in primis commendat. Habet autem ea *Solidago* temperaturam ſiccā, & ad ſananda uulnera uſurpatur, ueluti *Sanicula*.

INTRINSECVS.

Herba hæc uino prius macerata ac poſtea diſtillata, eroſiones ſanat ſtomachi, iecoris, matricis, totius denique corporis, tormina ſedat, & proriuſ ad eadem ad quę *Sanicula* adhiberi poteſt.

Quanquam, uires, & uſum herbarum uulnerariarum iam pridē ſub *Conſolida* maiore, *Verbascum*, *Auricula muris*, & *Millefolio* ſatis indicauerimus, pauca tamen quædam *Solidaginis* noſtrę iuuamenta perſtringemus, idque in gratiam ſtudioſorum medicinę.

Aqua diſtillata utilis eſt mundaudis & extergendis uulneribus recentibus.

bus ac ueteribus, præcipuè uero erosionibus exconfrictu in locis muliebribus & uirilibus ortis mirifice efficax est; si ex ea uulnera colluantur, ac linteo-
teolis etiam in ea madefactis ac impositis.

Eadem aqua disillata aphtas & ulcera oris sanat, collutu & gargaris-
satu.

Eadem potest tertia species præsertim quando sicca, uino decocta fuerit.

De Herba ut uulgo uocant S. Kunigundis.

CAP. CLXV.

ERBA S. KVNIGVNDIS QVAM OFFICINAE HA-

Hætenus pro Eupatorio non sine errore usurparunt, in procerita-
tem Cannabini caulis assurgit, caule terete, candidaq; medulla
referto, folio nigricante, serrato, instar. pene Ebuli, umbellis in cacumine sa-
tis magnis, flore quem Iulio mense profert, perexiguo, Valerianæ simili, in
candido purpurascente, tandemq; in pappos in modum Endiuæ, sed ma-
gis tenues euanescente. Radicem obtinet uillosam, multisq; capillamentis si-
bratam, perq; terram hinc inde serpente, sicut & Ebulus & Tanacetum,
ea quotannis nouos emittit caules. Nascitur hæc herba in ripis fluminum,
alijsq; humidis & aquis uicinis locis, gustu amaro prædita, quo nomine ca-
lidis & siccis. plantis accenseri potest. Vide Galen, de simp. medi. facult.
lib. iiii. cap. xviij.

NOMENCLATURAE.

Quia frutex iste grandis florè copiosum, ac in umbellis residentem gerit,
uolui illius in ordine earum quæ umbellas habent herbarum mentionem
facere, rameri autem multæ aliæ eius extent generis, quarum historias ali-
as persequemur, tamen in præsentia hæc nobis tractanda occurrit, licet ho-
die nihil nobis de nomine eius apud Dioscoridem constet.

In agro Vormatiensi Germanica lingua *Sirgflœ* / hoc est, Trifolium
ceruinum uulgo nuncupant, asserentes eam esse uulnerariam herbam, & ta-
lem ex qua Philtra conficiantur, de quibus & Vergilius in Pharmaceutria
& Iuuenalis his uersiculis commemorat.


Thessala uendit

Philtra quibus ualeat mentem uexare mariti.

Alij Kunigundesfrant / hoc est, herbam S. Kunigundis, Wasserdoß / id
est, Organum aquaticum, & Albfraut uocant, Marcus Platearius putat
eam

Herba S. Kunigundis.

Bonigundi fraut.



eam esse quæ Marum apud
Dioscoridem appellatur,
cuius sententia mihi minime
probat.

VIRES AC TEMPE-
ramentum.

Hic frutex præsertim in
flore uulnera & ulcera sa-
nandi vires obtinet. Apud
nos in pecoribus tantum
curandis usurpatur. Cum
namq; nomen eius incog-
nitum nobis sit, haud ma-
gnum usum habere potest.
certum tamē est uino deco-
ctam herbam, aut aquam
distillatam, utriusq; interno-
rum membrorum utilissi-
mam, quod quia non om-
nibus palam factū est, ideo
pleriq; ab usu eius absti-
nent. Ac posset quidem fieri,
ut progressu temporis,
in medicina notior euade-
ret.

EXTRINSECVS.

Suffitu herbæ siccatae ue-
nenata animalia fugantur.

Aiunt ceruos telis læsos
remedia ex hac herba pe-
tere.

Reliqua quæ illam nonnulli posse affirmant, missa facimus.

De Gallio. Cap. CLXVI.

Megerkraut / Wälfstro.

1.
Primum Gallij
genus.



QUEMADMODVM plurimæ plantæ radiatis emicant floribus, ita non paucae herbæ extant, quarum folia stellatim decussantur, de quibus porro nobis agendum est, initium facturis à Gallio, cuius duo aut tria ad minus inueniuntur genera.

Primum Gallij genus caulem profert tenuem, teretem & iuncum, quem in modum rotulae seu stellæ folia angusta, acuta & nigricantia, ex ordine ab imo usque ad summum æquali distantia posita circumdant. Florem fert in cacumine luteum, densum, odoratum copiosum, quemadmodum Pycnocomon, qui Maio mense potissimum omnibus numeris absolutus conspicendum se præbet. Eo decusso semina bina, nigra, instar gemellorum coniunctim posita, magnitudine Papauer haudquaquam excedentia, singulos flosculos consequuntur. Radix huius capillamentis fibrata existit, seque serpendo hinc inde intra humum propa-

gat, quod & Lolio familiare esse uidemus. Gaudet aridioribus agrorum limitibus, pratis & semitis.

Secundum

Secundum uero Gallij genus, quod itidem luteo emicat flore in hume-
ctis fossis & pratis; necnon uliginosis quibusdam hortis prouenit, caule *Secundum Gallij
genus.*
quadrangulo, geniculato, cubitali interdum, folio radiato, sed maiore, geni-
culos stellatim ambiente; e quorum medio flosculi perexigui, densi, ac non
perinde frequentes; Maio mense prorumpunt. Radix illi hinc inde serpens.

Tertium Gallion flore exultat candido, primo generi per omnia simile,
nisi quod caulem habet quadratum; & folia latiora. E geniculis ramuli
alii profiliunt, radiatis seu stellatis equali interuallo discretis, uestiti. Florem *3.
Tertium Gallion*
habet densum, & copiosum, exiguum & pene innumerabilem, radicem te-
nuem et serpentem. Nascitur in humectis senticetis, cœmiterijs, secus muros
& sepes, ad binum quandoq; aut trium cubitorum altitudinem assurgens.
Floret Maio mense. Semen huius primo generi simile est.

NOMENCLATURAE.

Istas plantas ego ad Gallion Dioscoridis, quod ille Galerion, & Galati-
on cognominari tradit, referēdas censeo, cum tota Gallij descriptio in uni-
uersum illis competat. Siue ergo a flore cādido, siue a lacte, quod iniectum
spissare ac coagulare dicitur, nomen Gallij ortum sit, parum refert, utraq;
enim ratio satis probabilis est. Prīmū eius genus (nam de secūdo nihil rescī-
re certi potui) Germani Wālstro, aut Wiserlieben frawen Berstro, nonnulli
Aspergulam nuncupant. Tertium Gallion quod candidos gerit flores Ne-
gerfraut Germanis nominatur, quo in sananda scabie infantum arida, quę
Negerrey Germanica appellatione uocatur, uti solent mulierculæ. Obser-
uandum est hoc loco Plinium a Dioscoride dissidere, in eo quod Galeopsin
suam Gallion cognominat. De satiuo Gallio statim dicetur. *Diosco. lib. 4.
cap. 91.
γαλλιον, γαλλιον,
γαλλιον.* *Plin. li. 27. ca. 9.*

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vires & facultates istarum herbarum in descriptione annotatæ sunt, ho-
die apud nos extrinsecus plerunque adhibentur corpori, temperatura sua
siccæ.

EXTRINSECVS.

Dioscorides Gallion nomen ex eo traxisse asserit, quod in contrahendo
lacte, coaguli uicem impleat, id quod opiliones proculdubio prodiderunt.

Gallion quod luteum fert florem tusum ac impositum, sacris ignibus,
ambustis igni medetur.

Naribus inditum, sanguinis profluvia sistit.

In lauacro pedum decoctum, lassitudines reficit, quidam cerato admi-
scent

scant Gallion, idem aduersus lassitudines. Mulierculæ in aqua Gallion decoquunt, eaq; infantes arida ac exigua illa scabie, quam *Mägercy* appellatam diximus, laborantes abluunt: asserentes singulare id esse aduersus illam experimentum.

De Aparina. Cap. CLXVII.

Kleberkraut.



APARINA, QUAM nonnulli *Aspergulam*, seu ut *Ruellius* censet legendū, *Asperulam* ab asperitate qua attingentium uestimentis pertinaciter adhæret, in agris frumento & Lino cōsitis prouenit, idq; non sine magno frugum incommodo quas in terram detrahit, quo nomine olitoribus & hortulanis inuisa est. Nec enim sine adminiculo aut ut uerius loquar, detrimento aliarum plantarum, quibus quasi nititur, in altum sese attollere potest. Spectatur pluribus ramis, exilibus, quadrangulis, asperis, furculosis ac brachiatis, per interualla orbiculato foliorum stellatorum ambitu, ut in Gallio tertio, flore candido, semine rotundo, à medio umbilici modo, leuiter concauo, duro & aspero, ac uestium tenaci sicut et caulis, & tota plantæ substantia, Radice tenui, breui, & capillata. Reperitur per totum annum, præsertim uero Maio mense.

NOMEN

NOMENCLATURAÆ.

Aparina tam Lappis quam Hederis accenseri poterat, uerum a nobis ob foliorum, quæ in ea stellatim decussantur, figuram, hoc loco tractatur. Dioscoridi *ἀπαρίνη, ἰσχυρὰ ἀπαρίνη*, (unde Germanica uoce semen Aparinæ ab umbilici figura *Nabelsamen* non inepte dici posset) & Viscus dicitur. Plinio *πίνακλον*. Manlio Purpurea & Lappago, Germanis *Blebsfraut* nominatur.

quia blanda & respiratio, et uiscus quoniam adpenditur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Απαρίνη, plurimum ueteribus commendatur, apud nos haud magni usus herba, licet fieri possit, ut ob insignes suas facultates aliquando pristinae dignitati restitatur, Calida & sicca temperaturæ est, sed mediocriter.

INTRINSECVS.

Seminis caulium ac foliorum succus cum uino potus contra uiperarum & phalangiorum morsus uenenatos, ne uenenum cor occupet, auxiliatur.

Eadem efficit aqua distillata, necnon decoctum seminis & foliorum, si uino decoquatur.

Aquam distillatam bis in die mensura iij ligularum potam, aiunt aluuma cohibere, efficacissimamq; esse aduersus morbum regium.

EXTRINSECVS.

Vtebantur olim, ut tradit Dioscorides, herba & semine Aparinæ pastores in lacte coli uice excipiendis, si qui substituerint, pilis. Quod si ita est optationibus, & qui lacti operam dant, hæc herba inseruire poterit.

Infusu aurium dolori medetur succus Aparinæ.

Herba cum axungia trita, strumas, aliaq; id genus uicia, quæ sponte oboriuntur, discutit.

De ea quam uulgo Syluæ matrem nominant.

CAP. CLXVIII.

ATRISYLVA M QVOD AD SEMEN ATTINET,

Lappaceum, quod itidem uestibus adhærescit, Aparinæ genus facile quis dixerit. Ea quadrangulos, dodrantesq; coliculos *Matrisylua* gignit, stellatis folijs, orbiculato ambitu per interualla uestitos, non aliter atq;

Aparinæ nomen
Xanthio & Per
sonatiæ quoque
tribuitur, uide
Diosco. lib. 4.

cap. 102. & 133.

Diosco. lib. 3.

cap. 95.

Plinius. lib. 27.

cap. 5.

Visci appellatio
ad eam proprie
pertinet, quam
cap. 94. lib. 3.
describit Diosco
rides.

*quam semen
uig. 97. folio.*

Matrifylua.
Waldmeister.



2.
Asterula.

atq; Gallion cādīdum, Flores in fastigio caulium profert lacteos numerosos, frequentes & racematim coactos, odoratos, Maio mense emicantes. Matrifylua ubi semel plantata fuerit, intra terram candidis acteneris radiculis late se propagat, alioquin in altissimis syluis plerunque reperitur. Hanc herbam dum in flore est, nostri uino imponunt, bibuntq; pollicentes sibi inde nescio quam lætitiā cordis, epatisq; prosperam ualitudinem.

Est & alia quædam huic cognata herba, sed procerior & pinguior, quæ in altissimis syluis Vogesi, atq; ea quam den Ydar nominant, provenit, terete caule & iunco, folijs stellatis per intervalla caulem ambientibus, flore candido, Maio mense conspicua.

NOMENCLATURAE.

Priorem plantam Germani *Hertzfreudt* / hoc est, cordis lætitiā, & *Leberfraut* / Epaticā, ob prædictas causas nominant. Et

Hepaticæ plura sunt genera, quemadmodum post dicetur.

quia in syluis maxime reperitur, ideo uulgarior nomine *Waldmeister* / ab illis nuncupatur. Herbarijs uulgo *Matrifylua* (quod nomen quidam *Petriclimeno* attribuunt) *Hepatica*, & *Cordialis* dicitur. Nobis *Galatij* genus, & tertium quidem esse uidetur.

Alteram

Alteram herbam, recentiorum Asperulam esse existimamus, licet id nominis Aparinæ quoq; assignetur, uti supra audiuius.

^{2.}
Asperula.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vires ac iuuamenta Matrisyluæ in descriptione annotatæ sunt, deinde etiam sub Gallijs, nimirum quod cor exhilaret, uicjsq; epatis auxilietur.

Asperulam uero tradunt ob insignem quam obtinet caliditatem, duros abscessus tufam ac extrinsecus impositam, emollire atq; discutere.

De Rubia tinctorum.

Cap. CLXIX.

Q VEMADMODVM OPTIMI QVIQVE AGRI AD Aquisgranum & Duram siti, Isatide hodie quæstus gratia conserruntur, ita in aruis Argentoratensibus & Spirensibus loco tritici Rubia ista radix plantatur, propter emolumentum quod ex ea sentitur quæstuosissimum. Ante hæc tempora in Gallia & Italia colebatur Rubia, nunc in Germaniam quoq; commigravit, ita ut pleriq; agricolæ, de coloribus quam de frumentis magis sint solliciti. Sed ut ad descriptionem deueniamus, Rubia caule anguloso, geniculato, asperoq; folijs uirentibus, contractioribus per interualla ex singulis articulis emicantibus, & rotatim in stellæ modum radiatis, ut in Aparina, quam & uestium tenacitate imitatur, radice rubia, rotunda & quæ tertio anno binos cubitos per humum hinc inde se extendat, colore intus Minij. Effoditur illa tertio anno, uenunq; exponitur. Proinde e semine nequaquam hæc herba plantatur, sed surculis seu asparagis tenellis abscissis, opportunoq; tempore in æstate terræ infertis, unde nouæ progressu subnascuntur radices. Atq; hæc de satiuæ seu domesticæ Rubia, nunc & syluestrem persequamur: Ea satiuæ similima, depræhenditur, quæ cum agris inclusa, sepes ac senticeta attigerit, in altum prorsus se attollit, interq; spinas uiri quandoq; proceritatem æquans emergit. Proinde cum inter sentes & spinas hæc Rubia degat non multum a mortalibus curatur. Theophrastus lib. x. cap. xiiij. Rubiam folia habere Hederæ similia dicit, quod si interpretandum sit, dicam in eo Rubiæ folia Hederæ conuenire, qd facile ut illa, adhærescant, alioquin cum Dioscoride, Theophrasto non satis conueniet.

^{1.}
Rubia satiuæ.

^{2.}
Rubia erratica.

NOMENCLATURAE.

Germani Rubiam Rôdt nuncupant. Vulgo Rubea tinctorum, Vena

Avicem. ca. 580.


Iacobus Manlius

Rubia.

Rôde.

Plinius lib. 24.
cap. 11.
Dioscor. libro 3.
cap. 151.
Euthrion apud
Marcellum dici-
tur Teuthrion,
quæ uox Folio
montano compe-
tit proprie.

Serap. cap. 60.
Galen. de simp.
medi. lib. 8.
Aegyn. lib. 7.



tingtorum, Spargula, non-
nullis Crocus Vasicus, Ro-
xa, Roxani, Falma, Rodia,
& Ena dicitur. Sed utcumq;
his quidem uocitur, certe
apud Dioscoridem hæc se-
quentia habet nomina *ἰν-
θρόδιον, ἰνθρόδιον*, Euthri-
on, Dracanon, Cinnabaris,
Lappa minor, & Sopho-
bi. Marcellus Florentinus
commentator Dioscoridis
a' uulgo, radicem & manū
picceatē, quod asperitate
sua tractata manibus pi-
cis modo hæreat, uocatam
tradit. Serapio Paue. Gale-
nus Rhodiam Rhizam. At
que hæc de Rubiæ tingtorū
appellationibus.

VIRE AC TEMPE-
rumentum.

Rubia licet aqua ueteres
frequentis fuerit usus, tamē
infectores nostri temporis
effecere ut prope in uniuersum
ab officinis exulet. Est
autem Rubia natura sua ca-
lida & sicca, aduersus uene-
na, scabieq; & maculis ex-
tergendis maximi momen-
ti.

INTRINSECVS.

Radix uino decocta ac pota, ijs opitulatur qui a serpentibus alijs uene-
natis.

natis animalibus præmorfi fuerint. Idem præstat succus radicis & herbæ expressus, ac in uino usurpatus, siq; ex illo abluantur ictus & læsæ partes.

Pari modo urina potenter mouetur, mensesq; aliquandiu suppressi trahuntur. Ad eadem radix in puluerem redacta dimidiæ drachmæ pondere sumi potest.

Radix hydromelite decocta, perq; dies bis bibita obstructions iecoris, lienis, renum, & matricis soluit, qua de causa regio morbo inprimis opitulatur, id quod experientia testatum fecit.

Semen tufum ac cum Oximelite, seu cum aceto et melle potum lienem absumit, melancoliam diminuit.

EXTRINSECVS.

Radix & herba, fomentis, balneis & pessis, aut quacunque alia ratione usurpata, mulieribus apprime comodat, trahit enim partus, menses, secundasq; & emortuos foetus.

Herba & radix tusa, & ex aceto illita, albæ uutiligini, papulis, serpentibusq; in aculis cutis, & scabiei medetur.

De Fragaria. Cap. CLXX.

FRAGARIA IN NOSTRIS REGIONIBVS TERNA
duntaxat, uno pediculo foliola per ambitum instar Betonicæ herbæ ferrata, quaq; terram spectant parte cineracea & mirum in modum uenosa profert. Ea cum Martio mense e radice fusca, intus uero sublutea, multo fibrata capillitio, gustuq; Tormentillam referente, prorepunt, rugosa, & non aliter atq; Trifolium complicata, conspiciuntur. Nascitur sponte sua, quod & Plinius testatur, in dumetis, hortis, apricis agrorum limitibus, inprimis uero in syluis, maxime cæduis, quorum ligna ante biennium aut triennium combusta fuere. Germani Rödter / seu Reudten uocant. Solet autem hæc herba ita sese hinc inde serpendo propagare, ut iuxta folia longa fila eaq; geniculata emittat, quæ terræ undiquaq; adhærescunt, nouasq; subinde e nodis suis progignunt Fragariæ soboles. Floret uero Fragaria plerunq; Aprili mense, demumq; ad Autumnum usq;. Flores illius nihil aliud sunt quam violæ albæ, intus luteæ, quorum quina foliola ubi deciderint, e medio quod relinquitur, fructus editur pulchre rubens, intus multis perexiguis seminijis refertus, gustu dulcis, & odore suauissimus.


Inueniuntur huius generis Fraga, quæ prorsus candida euadunt, a maturitate, eaq; non ita pridem a bonis amicis mihi communicata fuere.

Pli. lib. 21. ca. 15.

1.
Fraga rubra.

2.
Fraga candida.

Fragaria.
Erdbeer.



3. Tertium *Fragariae* genus superiori cosimile est, sed herba hispidior, *Fragi* partim ru utrinq; cineracei-coloris. Fructum gerit partim rubrum, partim candidum, bra, partim can- gustu dulcem, odore gratissimum. Nascitur in aridioribus & graminosis dida, agrorum limitibus, necnon & dumetis.

Alia

Alia proinde *Fragaria* species in humectis pratis reperitur, ea uno pediculo septena folia gerit, florem uero stellatum, spadicei coloris, cætera *Fragariae* flori non dissimilem, quem fructus subsequitur similiter phoeniceus, iniucundi saporis. Radix illi ex fusco rubra, longa, geniculata & nodosa, & quæ intra terram serpit, instar Lolij.

4.
Quarta *Fragariae* species.

NOMENCLATURAÆ.

Germani herbam *Erdbbeerfraut*/fructum uero *Erdbbeer* nominant. Latini *Fraga* dicuntur teste Vergilio, & ipsa planta, *Fragaria*, & herba fragi. Quo pacto ueteribus appellata fuerit nondum constat, tamen si quid iudico, a foliorum triade recte dicetur *τριφυλλον*. Nec obstat huic nostræ sententiæ, quod *Triphyllon* peculiaris apud Dioscoridem & Nicandrum sit herba. Nam id nominis alijs quoque plantis apud eundem autorem, nimirum *Staphidi agriæ*, *Medio*, & *Saryrioni* alteri attributum legimus. Et hæc quidem de nomenclaturis priorum duum generum dicta sint. Tertijs generis fructus *Spirensis* ager uernacula lingua ab hispeditate foliorum *Harbeer*, & *Hüttelbeer* uocat, tamen si posterior appellatio alio referenda sit, quemadmodum suo dicetur loco. Postremum genus quia septenis constat folijs, quod & alijs una mecum animaduertunt, fortasse *πενταφυλλον*, Germanice uero *Sibenfingerfraut* appellari poterit.

Diosco. lib. 3.

cap. 114.

Diosco. lib. 3.

cap. 124. lib. 4.

cap. 20. lib. 4.

cap. 150.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Herba & radix *Fragariæ* calidæ & siccæ sunt temperaturæ, quare aduersus pleurisin, & calculum renum decoqui in uino consueuerunt. Rursus fructus ipse humidam obtinet naturam, tam cibis quam medicinæ accommodus.

INTRINSECVS.

Coqui ex *Fragis* pulcriculas utilissimas conficiunt, quæ ob refrigeratoriæ uim, inflammatione laborantibus, rectius quam sanis exhibentur.

Aquæ *Fragis* distillata præstantissimo est remedio internis quibusulsi, secoris & pulmonis, alijsq; totius corporis inflammationibus, sicutq; restinguendæ. Ad eadem *Fraga* ipsa faciunt.

Leprosi quibus nimium calet sanguis, faciesq; plurimum rubet, aqua *fragorum* distillata longo tempore uitam ac ualitudinem tueri possunt, si bis aut ter quotidie illam bibant mensura trium ligularum.

Aqua *Fragorum* distillata pari ratione bibita, cor confortat, uitæ thoracis expurgat, morbum arquat, sanguinem purgat & emendat.

EXTRINSECVS.

Herbæ *Fragariæ* tussæ succus malignis & calidioribus uulneribus appropri-

me concludit, nam glutinat ea & ad sanationem perducit.

Aqua Fragorum ulceribus oris, & anginæ auxiliatur gargariſſatur.

Eadem facit ruborem & maculas tollit collutu.

Vicera tibiarum hac aqua ablui & purgari debent, linteolisq; in ea ma-
defactis ſemper illis imponi.

Nonnulli ad oculos collyria ex Fragis conficiunt, nam ſal illis admiscēt,
poſteaſque diſtillant. Alij Fraga cum ſale æneo uafe recondunt, ac per
octiduum cellæ uinariæ committunt, quoad in uiridem aquam mutetur.
Ea poſtea ad oculorum ſuſſuſſiones utuntur.

De Tormentilla. Cap. CLXXI

TORMENTILLA PLERVNQVE IN AGRORVM LI-
mitibus & ſyluis, præſertim uero cædvis, ubi & arbuſta rurfus
ſuccreuerunt, & terra aliquantulum arenosa extiterit, naſcitur.
Radicem habet ex puniceo ruſſeſcentem, forma Amygdalum referentem,
multo capillitio fibratam uti Valeriana, quæ cum reſiccata fuerit foris ex pu-
niceo nigricantem obtinet colorē, guſtu glandē repreſentans. Ex unica radi-
ce quotannis Aprilī menſe quaternæ aut quinq; tenues, teretes & iuncē ſeru-
læ exeunt, non ultra dodrantem longæ, quæ ab imo ad ſummum uſq; per
æqualia ſpacia folijs per ambitum ſerratis, iſq; ut plurimum quinſ natio-
ribus inciſuris, nonnunquam & ſeptenis, diuiſis, uestiuntur. Tormentilla
Maio menſe appetente ſorem proſert luteum, forma Fragariæ aut uulga-
re Quinqueſolium æmulantem.

NOMENCLATURAE.

Germani hanc plantam Tormentilla à latina uoce deriuato nomine nū-
cupant, alij Birckwurtz à Betula, quod in iſs ſyluis quæ magna copia Betu-
las producant, & hæc luxuriat, nonnulli Blütwurzel, aut Korkwurzel, hoc
eſt, Sanguinariæ radicē, aut rubram radicē uocant, eo qd ad dyſenterias, &
uitia inteſtinorum, nec non uenena per ſudorem expellenda apprime cōdu-
car. vulgo ab Herbolarijs Tormentilla, & Biſſorta, à nodis nimirū radicis,
(nam eſt proculdubio prima Pandectarij Biſſortæ ſpecies) à pleriq; etiam
Ferula diſcitur. Hermolaus Babarus in ea eſt ſententia ut putet Tormentil-
lam, Septiſolium, *πεντάφυλλον*, appellandam, eo quod interdū ſeptena inueni-
tur habere folia. Quod tamen ſi ut diximus interdū contingit, tamen apud
Mediomatricos noſtros maior pars Tormentillæ quinq; folia habere de-
prehenditur.

*Tormentilla.**Tormentill.*

prehenditur. Sed non est quod hæc nobis scrupulū aliquem injiciant, posteaq̃ luce clarius est, vulgare Quinquefolium, septena aliquando uno pediculo sustinere folia, sicut & Trifolium quaterna aliquando & quina ac sena etiam non raro profert folia. Ita siquidem natura quandoq̃ luxuriat, ac quid possit ostentat. Quisquis itaque ea naturæ misteria, seu ut rectius dicam miracula considerat, eum certe diligentem hominem dixerim. Ex his quæ hactenus diximus facile liquere puto Tormentillam nostram Pentaphylli nomine merito insigniendā, Si cui uero hæc minus ardeat sententia, is vulgare potius Quinquefoliū, de quo statim sequenti capite amplectatur, Dioscoridisq̃ Pentaphyllon nominet.

πεντάφυλλον.
Dioscor. lib. 3.
cap. 40.

VIRE AC TEMPERAMENTUM.

Tormentillæ radix nobilissima ac præstantissima est, quæ et urrinq̃ ad omnis generis fluxiones cohiben-

das adhiberi potest. Temperamentum namq̃ siccum obtinet.

INTRINSECVS.

Succus radicit & herbæ recentis expressus ac potus, ueneno omni siue

in cibo siue potu hausto resistit, sicut & pesti, nam per sudorem uenenum expellit. Si quis uiridem radicem habere non possit, is siccam in puluerem redigat, singulisq; uicibus aduersus supra commemoratas affectiones drachmæ pondere exhibeat. Potest etiam manipulus herbæ & radicis uino decoqui, quod decoctum ad eadem calidum bibas. Radix cum herba uino per noctem macerata, inq; balneo Mariæ postea distillata, ad prædicta uitia utilissime bibitur, quod experientia certa obseruatum est.

Herba, radix, succus, puluisq; eiusdem, meatus iecoris & pulmonis aperiant, morbumq; regium breui tempore incidunt & expellunt, præcipue uero succus potu id præstat.

Si quem horror aliquis subito occuparit, & nesciat quis sit futurus morbus, is accipiat Theriacæ drachmam unam, ac cum aqua Tormentillæ distillata (cuius iam fecimus mentionem) bibat, seq; in lectum ad sudorem eliciendum componat, quod si fecerit, omni ueneno, febris & pestilentia (Dei auxilio) liberabitur. Hæc ita se habere non semel experientia docuit.

Est & hæc communis regula obseruanda. In omnibus medicamentis quæ aduersus uenena & pestem componuntur, Tormentillam adhibendam esse.

Nec inuenias aliam radicem quæ dysenterijs & lienterijs, alijsq; quibuscunque alui fluxionibus coercendis aptior sit. Nam ad eas affectiones ex illa pastilli, pulueres, electuaria, potiones, & sacculi, conficiuntur, quibus quilibet pro libito suo uti potest.

Opiliones etiam hac radice ægrotantibus ouibus subueniunt.

Radix Tormentillæ in puluerem redacta ac ex uino rubro pota, dysentericis succurrit. Verum obseruandum est, si febris dysentericæ coniuncta fuerit, ut puluerem illum ex aqua in qua candens chalybs immersus fuerit, aut ex aqua Tormentillæ distillata, drachmæ podere exhibeas, idq; bis per diem.

Sunt qui Tormentillæ radicem cum albo oui, admixta dimidia nuce Myristica, & tantundem farinæ auenæ, subigant, ac in ferreo cochleari super carbonem lente decoquant, subinde uertentes placentulam illam.

Fluxiones mirifice cohiberi aiunt, si quis quotidie unam talem placentulam deuorauerit.

Alia proindè ratio coficiendi has placentulas, & quæ ijs quibus cholera fastidia & uomitus excirat, profuerit, hæc est. Accipe puluerem radicis Tormentillæ, & cum albo oui subige, deinde uero super lacerem candentem decoque & reconde. Quod si quis prædicto morbo laborauerit, ei huius placentulæ partem drachmæ pondere contusam, ex aqua Balsamig bibendam propina.

Ex his quæ diximus plura colligi possunt.

E X T R I N S E C V S.

Tormentilla uulneraria quoque est herba; debetq; omnibus uulnerarijs portionibus, emplastris & unguentis adiungi, nam uetera & putrida sanat uulnera, & abscessus, uino uel aqua decocta, collutione & insperfu. Chirurgi ergo emplastra sua & unguenta succo Tormentillæ conficere merito debent.

Aqua Tormentillæ cum Tutia præparata, uel Succino albo oculis instillata, destillationibus illorum medetur.

Herba & radix simul tusa ac imposita; sanant duritias & tumores & colicsectiones iuxta aures subnatas, strumas discutiunt, coxendicum dolores sedant, cuius fluenti seu mananti scabiei medentur, nec non et mariscis, alijsq; id genus affectionibus, maxime uero hoc efficiunt cum ex aceto imponuntur.

Aqua & succus Tormentillæ secreta mulierum medicina est, ad sistendos menses.

De Quinquesolijs. Cap. CLXXII.

VM DE FRAGARIA AGEREMVS, DIXIMVS MVLTAS reperiri plantas quæ unico pediculo quina proferent folia, inter quas præcipue Pentaphyllon quod nunc tractamus connumerandum uenit. Illud in tria aut quatuor secatur genera, quæ singula quinque partitis unico pediculo folijs dependentibus uestiuntur, tamen si reperias quæ septena etiam proferant.

Minimum itaq; Pentaphylli genus sub initia Aprilis floret, nascitur in arenosis locis, sine caule, folijs per terram sparsis, flore luteo instar Anseri-^{1.} *Minimum Quin- quefolij genus:* næ, qui si deciderit medium quod in illo erat capi tellum, magnitudine exigua Fraga referens, durum, modice purpurascens, esui minime aptum sicut & radix, acre, & quod linguam commestum uellicet, non aliter atq; Galla, relinquitur.

Huic simile aliud quoddam cernitur, folia habens cineracea, incisa plane & profundioribus quidem diuisuris quam ulla Pentaphylli species. Pro^{2.} *Alterum exiguum Pentaphyllon.* uenit illud similiter in arenosis & incultis agris, flore itidem luteo, radice nigra, longa, gustu glandem representante.

Maius autem & uulgarissimum quinquesolium, quod & septenis non raro folijs uestitur, late se propagat serpendo, nam non secus atq; Fragaria te-^{3.} *Vulgare Pentaphyllon.* nuissima ex semittit fila, quæ humo quamprimum adhærescunt, nouasq; phyllon,

Quinquefolium exiguum.
Sünff finger kraut.



4.
 Verum ac nobi-
 le Pentaphyllum.

progignunt subinde soboles. Sub finem Maij mensis violis luteis, Anserinæq; per omnia similibus emicat. Radicem habet longā, tenuem, puniceam, serpente[m], gustu eodem cum superioribus præditam. Gaudet sepib⁹, muris, alijsq; in cultis sed graminosis locis.

Præter has iam commemoratas Pentaphylli species, aliam mihi uidere contigit. Cum namq; deserta & sylvas Vualgois perlustrarem, reperi Pentaphyllum elegantissimum, non procul ab oppido Cæsareo Luthra, radice breui ac Fragarie in modum capillata, folijs multis, sed singulis suo pediculo coq; rotundo insidentibus, quinque incisuris diuisis, ut eo nomine rudimentum manus explicaræ satis exprimerent, sed non crenatis per ambitum sicut in reliquis Pentaphylli generibus uidere est, colore uiridi præditis, & quateram spectabant plane cineraceis. Augusto mense apertente, violas fert niuei cādoris, quinquefolias, iuncisq; ac tenuissimis pediculis, nitentes.

NOMENCLATURAE.

Germani has plantas omnes uno nomine a' quinque folijs Sünff finger kraut

Quinquefolium Tragi.

Des Boecks fünf finger kraut.



Frut/Latini *Quinquefolium*. Græci *πεντάφυλλον* nomen. Et ut seorsim de singulis aliquid dicamus, uideatur sane nobis primū, *Tormentillæ* genus dici posse maxime si gustū eius consulas. Quod ad formam attinet uitiū *Fragariæ* facile dixerim. Alterum quod cinerea habet folia, cum superiori idem habet temperamentum in nostris regionibus nondum peculiarem sortitum est appellationem. Tertium, uulgarissimum, nempe officinæ hodie uerum *πεντάφυλλον* dicunt esse. Et licet hæc ipsa planta suum quoque usum habeat, tamē ego *Tormentillam* nobilissimam *Pentaphyllum* *Theophrasti* & *Dioscoridis* esse statuo, nā ut ita sentiam *Theophrasti* me mouet descriptio, quam in gratiam studiosorū ascribere placet.

Sententia Tragi de Pentaphyllo.

Theoph. lib. 10. de hist. plant. cap. 14.

Ἡ δὲ τοῦ πενταφύλλου, ἢ πενταπέταλου, (καλεῖται γὰρ ἀμφοτέρως) ἑρπυλλοειδὲς ἱερὴ ῥίζα, ἔχει αὐτοῦ ὁμοῦ διὰ τὴν αἰσθητικὴν καὶ κατὰ τὴν ῥίζαν. ἔχει δὲ τὸ μέγιστον ὅσον ὁ ἄνθρωπος, μετὰ δὲ καὶ τὴν χρυσάνθεμον, καὶ αὐτὴν καὶ καὶ φθίνει ἅμα τῇ ἀμύλη. πάντα δὲ πίνε

τοῦ φύλλου, διὰ καὶ τὴν προσπερίεσιν. καὶ δὲ ἐπὶ γῆς ἵσκι λατρεῖ, καὶ πρὸς αὐτὴν ἔχει πικρὰ. Hoc est, Radix autem *Pentaphylli*, seu *Quinquepetæ* (nam utroq; appellatur nomine) cum effoditur rubra existit, siccata uero nigra & quadrangula euadit.

Folium.

Folium habet Pampino simile, quod ad colorem attinet, sed minus. Equidem augetur & desinit cum vite. Folia omnia quina, unde illi nomen natum. Caules supra terram mittit tenues, crebris constantes internodijs.

Hæc ille.

Auic. cap. 554.

Quantum genus Quinquefolij, cuius nomen nullibi cognoscere potui meum esto Pentaphyllon, quod ~~ἑξήνους~~ Dioscorides, hoc est, florem in candido pallidum habere testatur. Atque hæc de Pentaphyllis dicta sufficiant. Vnum est cuius lectorem admonitum uelim. Nam Dioscorides cum de Pentaphyllo loqueretur, inter alia tradit teneræ radicis succum, contra iocineris, pulmonisq; uitia prodesse, item aduersus uenena. Contra scribit Auicenna, Quinquefolij radicem noxiam esse. Quis non uel hinc Arabum errores uidet? Sed mirum certe uideri non debet, tam turpiter aliquando illos impingere, cum de nomenclaturis stirpium in plerisque nihil certi habeant. Nam (ut de præsentis nostræ planta loquamur) Quinquefolium illorum interdum hoc ipsum nostrum Pentaphyllon existit, aliquando uero Esulæ genus traditur, id quod in Serapione animaduertere licet, qui Ricinum Pentadactylon cognominauit. Sed pergamus ad reliqua.

Serap. cap. 212.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Omnia quæ recensuimus Pentaphylli genera, siccæ sunt temperaturæ, quare utrinq; corpori profunt, maxime contra alui fluxiones omnes, sicut & de Tormentilla audiuisti.

INTRINSECVS.

Radix Pentaphylli, succus eius, & aqua distillata, eundem habent usum cum Tormentilla, quare non est quod illa reperamus.

EXTRINSECVS.

Herba Pentaphylli cum melle & aqua decocta, ulcera oris sanat, gingiuis medetur, arteriæq; scabritias gargarissatu, & collutione læuigat.

Aqua distillata isdem pollet uiribus.

Cocta in aceto & illita serpentia ulcera cohibet, fistularum inquam & cancri, aliq; manantia & putrida ulcera.

Aqua distillata Pentaphylli maximi, tremulas manus iuuare traditur, si ex illa sæpe abluantur, ita tamen ut per se rursus siccentur, non enim panem siccare oportet, quod aliàs in ablutione manuum facimus.

Reliqua in historia Tormentillæ reperias.

De Sanicula. Cap. CLXXIII.

Sanicel.



VM SANICVLAE FOLIA QVINIS AVT SEPTENIS
 C incifuris diuifa fint, uoluimus hiftoriam illius Pentaphyllo sub-
 iungere.

iungere. Radix eius foris nigra, multoq; capillitio fibrata, veratro nigro pene similibus, intus candida, gustu astringenti & amaro prædita. Ex illa multa exeunt folia, forma Ranunculum, uel Acerem imitantia, utpote quæ purpureo insidentia pediculo in quinas aut senas partes findantur, quæ & ipsæ singulæ in duas rursus partes leniter dissecantur, id quod in supra dictis Pentaphyllis non animaduerti potest. Sanicula tamen in humidis syluis & uallibus per hyemem illæsa, natuacq; sua uiriditate conseruata perdurat, tamen quotannis in initijs Aprilis mensis noua emittit folia, eaq; eleganter uiridia, ac læuia, solet etiam ex semine proprio subinde repullulascere, hoc pacto. E medio stirpis tenuis iuncusq; erumpit caulis, omni nodo & geniculo destitutus, & quandoque cubitalis, in cuius fastigio exigui, copiosi, & candidi flosculi, ex ordine in circulum coronæ instar acti, uisuntur, qui cum deciderint capitella relinquuntur, uestibus more Lapparum adherescentia, seminiq; Aparinæ, uel Eupatorii similia, ex quibus Sanicula feri potest. Hoc semen si terræ mandaueris, primum binis exit folijs, non aliter atque Asarum. Atq; hoc pacto e radice, & semine suo Sanicula subinde rursus emergit, cum filis expansis per terram Pentaphyllon repullulascit.

2.
Sanicula foemina
adulterina.

Herba, quam quidam non sine errore Saniculam foeminam dicunt, supra in historia Oseritij descripta est.

NOMENCLATURA.

Habemus & hic uulnerariam herbam, eamq; laudatissimam, nam non solum uulnera sanat & conglutinat, uerum etiam in puluerem redacta, & decocta, interna quæuis & externa purgata uulnera, quare merito Consolidida, et (ut multis placet) Consolida minor dici potest. Mihi certe uidetur uerum esse *σινικυρον πικρὸν* Dioscoridis. Vulgo Sanicula, Sennicula, Diapensia, Ferraria minor. Germanis uero Sanicel dicitur. Neque prætereunda est doctorum super hac herba contentio. Quidam enim Peplin esse statuunt, alij Pentaphylli genus esse contendunt, qui mihi rogandi sunt ne ægre ferant, quod Saniculam Symphyton Petreum dixerim, non tantum enim ut hoc facerem formæ delineatio, sed etiam uires ac iuuamenta me permouerunt, tamen nostra non ita proponimus, quin meliora edocti, cuiuscunque sententiæ facile sumus cessuri.

Diosco. lib. 4.
cap. 10.
Plin. li. 27. ca. 6.
Apuleius ca.
59. Symphyton.
Petraeum Alum
uocant, cuius rei
supra cap. 79. a
nobis facta est
mentio.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Sanicula Chirurgis familiarissima, siccum obtinet temperamentum, & utrinque commode usurpari potest.

INTRINESCVS.

Sanicula hsdem pene cum Tormentilla pollet uiribus. Nam radix & herba

herba in aqua mulsa decocta ac bibita pulmonis uitia purgat, rupturis ac uulneribus internis medetur, uino uel aqua decocta & pota.

Parti ratione sanguinem reijcientibus, renum uitijs, torminibus uentris opitulatur, sanguinisq; profluvia in utroque sexu cohibet. Proinde ad omnes interna nitia herbam hanc cum radice sicut & Tormentillam adhibere possumus utiliter.

EXTRINSECVS.

Sanicula mira sanandi ui prædita est, (unde & nomen traxisse uulgo constat) nam recentia uulnera ualide glutinat. Quare cum cæteris id genus herbis, uulnerarijs potionibus recte addetur.

Ad omnia genera ramicum Sanicula uti, eamq; emplastri ritu affectis locis imponere possumus, non aliter atque Consolidam maiorem, quemadmodum in historia illius fufius declarauimus.

Sanicula tanta ui glutinandi pollet, ut carnes cum radice illius decoctæ coalescant.

De Alchimilla. Cap. CLXXIII.

I N CENSU VVLNERARIARVM HERBARVM ALchimilla haud postrema habetur, non enim tantum uulnera glutinandi sanandiq; sed & calidos illorum tumores deprimendū obtinet. Herba est uiridis coloris, in hortis graminosis, limitibus agrorum apricis, nonnullisq; syluestribus & ædito in loco sitis pratis proueniens. Radicem habet digitum longam, foris nigram, fibratam & lignosam, Tormentillæ pene similem, gustu subamaram & astringentem. Folia rotunda, complicata, per ambitum serrata, sed non profundis serraturis, forma stellam nouem aut decem diuisuris distinctam, aut pedem leoninum apertum imitantia, inter quæ tenues, breues & rotundi enascuntur coliculi, exiguis foliolis ad summum usque uestiti, in cacumine uero flore exiguo, copioso, luteoq; emicantes. Illo decusso in folliculis uiridibus semen Papaueris non maius, & subluteum relinquitur. Maio mense floret, Iulio autem semine prægnat.


NOMENCLATVRAE.

Hanc herbam Germani Sinnaw / appellant, nonnulli Omfraut / dicunt, eo quod inflammationes uulnerum & tumorum sedet. Alijs Unser frawen mantel / quibusdam Lewensfuß / hoc est, Leonis pes uocatur, Atque

Alchimilla.
Sinnaw.

Leontopodium
Diosco, lib. 4.
cap. 126.

Dioscolib. 39.
cap. 14.



Atque hi existimant eam esse *Leontopodium Dioscoridis*, quod si uerum est bene scire habet, sin minus, faxit Deus, ut *Mercurius* aliquis hanc plantam in *Dioscoride* nobis monstraret. *Marcellus Vergilius* caput de *Leontopodio* intergrum esse negat, atque uidisse se antiquissimos codices, in quibus titulus huius capituli, non *Leontopodium*, sed *Camos capituli*, fuisse scriptus, unde si *Alchimilla* nostra *Leontopodium* sit, posset Germanice *Jaumkraut* & *Gassekraut* dici. Inter ceteras appellationes quæ memorato capite recensentur, *Aëtonichæ* quoque extat, quod nomen *Lithospermo* nonnulli tribuunt. Sed ut tandem e nomenclaturis huius herbæ, nos extricemus, dicitur illa *Hicroni*, *Braunschuucig*, *Alchimilla*, & *Planta leonis*, cui nos in præsentia subscribimus. Quid uero de *Leontopetalo* sentiamus, secundo ab hinc capite aperimus.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Alchimilla rupturas internas & ramices sanandi uim habet, temperamento suo ad refrigerationem inclinans.

INTRIN-

INTRINSECVS.

Alchimilla uino decocta (ut idem de aqua distillata tibi pollicearis) ac pota, internis uitijs & rupturis sanandis mirifice conducit, eodem plane modo quo & Tormentilla & Sanicula, de quibus cum copiose satis dixerimus, non est operæ pretium, diutius hic immorari.

EXTRINSECVS.

Alchimillæ folia tumoribus, & uulneribus inposita, dolorem sedāt, inflammationemq; tollunt. Idem efficit aqua distillata.

Herba & radix Alchimillæ cum cæteris huius generis herbis, uulnerarijs potionibus, pulueribus, emplastris & unguentis adiunguntur.

De Eupatorio, uulgo Agrimonia.

CAP. CLXXV.

QUÆMADMODVM BENEDICTÆ HERBÆ RADIX, Martio mense suauissimo commendatur odore, ita Maio mense Eupatorii herba dum adhuc tenera est, odoratissima esse deprehenditur. Quod cum ita se habeat nō usq; ad o male Auicennā sentire fatendum est, cum scribit Eupatoriū Aromaticarū, hoc est, maxime odoratarū herbarum genus esse. Proinde (ut ad descriptionem eius ueniamus) tota sua substantia aspera & hirsuta est herba Eupatorii, folijs cineraceis, & plurifariam, quam Benedictæ, scissis, nam singula utrinque in quinās aut senas incisuras finduntur, easq; per ambitum serratas, instar Cannabis, aut quemadmodum Scapio tradit, in modum Pentaphylli. In fine Maij in caulem se erigit Eupatorium, longum, lignosum, hispidum, & asperum, quem lutei ac stellati & frequentes flosculi ex ordine undiquaque ad fastigium usque, circumdant. Post florem apparent exigua & lappacea capitella, uestibusq; & quicquid attigerint adhærentia. Hoc Eupatorii semen existit, nam in medio granula quædam alba, gustuq; dulcia reperiuntur, e quibus Eupatorium seritur. Radix illi nigra, inodorata, amara gustu & astringens. Nasctur in dumetis, locis umbrosis, secus itinera, maxime uero aspera & lapidosa.

Cæterum aliud quoddam Eupatorii genus, e Norimberga ad me missum est iam pridem, duos aut tres palmos haudquaquam excedens, coliculo terete, folio angustio, sed maiori Centaurea uulgarī, minori autem Amarantho luteo, tenuissimis crenis & serraturis inciso, flore in cacumine capi-

Auicenna lib. 2.
cap. 244.

1.
Eupatorium
uulgare.

2.
Eupatorium
Mesue.

Eupatorium.
Odermeng.



Diarrhœa.
Diosco. lib. 3.
cap. 39.

Scrap. cap. 77.


Auicenna lib. 2.
cap. 244.

tulato, subluteo, & Amarantho per omnia cōsimili, odore Absinthium, gustu uero Santonicum representans.

NOMENCLATURAE.

Herbam, quæ Germanis Odermeng/ uulgo uero of ficinis Agrimonia dicitur, uerum esse Eupatorium ueterum, nemo ueritatis amans inficiabitur. Hæc nimirum ea est planta, de qua tot & tam uarię, ueterum, præsertim uero Arabum extant sententię. Quidam enim ex his asserunt Eupatorium habere folia similia Cannabinis, aut Pentaphylli, quorum quidem sententiā maxime probanda uidetur. Alij (inter quos præcipuus est Auicenna) dicunt, folia habere Cannabis, odoratum esse, florēq; ferre Nymphæę similem. atq; in hac sane descriptione, nihil desideratur, nisi qd ad florem attinet. Habet enim Eupatorium nostrum (ut uulgo constat) florem multo magis exiguum quam Nymphæa. Quod si uero colorem citreum utriusque

plantę, non totam substantiam contulisse Auicennam dicamus, tolerari utiq; sententiā eius potest. Nam altera Nymphæę species luteum profert florem, sed Eupatorio longe maiorem. Tertius Arabs, Mesu as nimirū Eupatorium

Eupatorium Mesuæ.

torium suum ita describit, ut statuatur illud folia habere Centauræ minoris. Est autem posterior hæc sententia, manifesto cum errore coniuncta, nisi tu uerba Mesuæ aliter interpreteris, nempe ut hoc pacto dicatur, Eupatorium serrata habere folia instar Centauræ maioris, aut, flosculos illius substantia & forma cum Centaurea minori conuenire. Hoc igitur pacto descriptiones Arabum admitti possent, non aliter. Sed rem deploratam. Nostri sæculi medici scientia sua omnes autores superant, quorum nulli cum subscribant, incertis interim nitentes fluctuant. Vident etenim Arabes in descriptione Eupatorii dissentire, quod & in alijs plerisque contingit, nihilominus tamen illos optimis autoribus præponunt, cum se penumero rerum notæ et plantarum uiuæ imagines maxime ab illis diuersæ sint. Verum quid dico, ne ipsos quidem Arabes sciolli isti & imperiti seplasiarij, (ad doctiores enim & ueritatis studiosos, hæc nostra

minime pertinet oratio) sequuntur. Nullus enim ex his unquam Arabum Eupatorium ostendere potuit, quin, quod prauum est ingenij, uno consensu peculiare quoddam & adulterinum mortalibus spectandum exhibent Eupa-

Error officina-
rum.

torium, quod perinde illis incognitum est atq; Arabum. Nam quam nos supra cap. iiii. Nepetam montanam (& recte quidem) nominauimus, eam isti pro Eupatorio suo uenditare non erubescunt, & ut errorem errore refarciant, dicunt eam Germanis proprie Wild Salbey / hoc est, Saluiam syluestrem dici debere. Ex his itaq; candido lectori errores tam Arabum quam officinarum facile constare puto. Reliquum est, ut quoties Eupatorii in autoribus sit mentio, Agrimoniam hanc nostram intelligamus (nam qd Agrimonia uulgo uocata uerum sit Eupatorium, descriptiones Plinii & Dioscoridis luce clarius ostendunt) rursus uero ad uerum illud & officinis hactenus usurpatum Eupatorium, quod & Saluiam syluestrem uocant, Nepetam montanam esse statuamus. Quod uero Barbari hanc herbam Agrimoniam, Ferrariam minorem, Concordiam, Marmorellam & Scelam uocant, quæ nomina partim Saniculæ tribuenda uidentur, nihil nobis impedimento fuerit, præsertim scientibus eam herbam uerum esse Eupatorium, quod inuentorem habet Eupatorem regem, a Dioscoride Hepatorium & Hepatitis, & in uolucrum masus cognominatū. Quid uero Argemone sit, supra cap. xxxviii. differuimus. Serapio Eupatorium suum Cafat uel Gafit. Auerrhoes Olibarda uocat. Nec defunt (ut & hoc annotemus) qui Eupatorii uocem Marrubio tribuant, & alij quidam Conizæ. De Eupatorio meminist etiam Manlius super confect. Eupato. uerum nec ipse quodnam uerū esset Eupatorium assecutus est.

Plinius lib. 25.
cap. 6.

Altera herbula cuius fecimus mentionem, tradunt Eupatorium esse Mesuæ. Ego Amaranthi genus esse iudico, nimirum id quod in *χρυσό* uocauit. Dioscorides, aut certe Santonici genus.

VIRESCACITATEM ET TEMPERAMENTVM.

Eupatorium mediocriter calidum & siccum est, potestq; utrinq; commode usurpari, præsertim ad luxatos nervos restituendos suoq; loco reponendos.

Alterum quod Mesuæ Eupatorium uocant, calidius est, & ad Absinthii accedit.

INTRINSECVS.

Eupatorium ad epatis obstructions soluendas a ueteribus præcipue fuit usurpatum, uino decoctum & potum, qua ratione etiam colicis medetur.

Aqua distillata potu tussim emollit, piritam crassam incidit, morbum æquatum expellit, febris laborantibus conducit, tinea uentris enecat. Eadē potest

potest & Eupatorium minus, potestq; pro Absinthio usurpari, quemadmodum Mesuas testatur:

EXTRINSECVS.

Folia Eupatorii contrita, & cum suillo adipe imposita, ulceribus quæ ægre cicatricem trahunt, & quæ secus quam oportebat suta & sanata fuerint, medentur.

Hodie Eupatorio frequentissime ad restituenda membra luxata, uulgo utuntur, non sine magno certe commodo. Accipiunt enim herbam eam recentem uel aridam, & furem triticeum, simulq; in vappa decoquunt, quoad instar pulmenti spissa reddantur, tumq; calida imponunt. Sunt qui prædictam herbam cum fure, cum butiro & aceto ad eadem mala decoquant.

Aqua distillata exulcerationibus oris, alijsq; ulceribus & uulneribus si ex illa colluantur, & purgentur, succurrit.

De Benedicta sylvestri. Cap. CLXXVI.

VPRA CAPITULO XXI. ODORATAM ILLAM CARYOPHYLLATAM descripsimus. Nunc uero præ manibus habemus syluestrem Benedictam, quæ non nisi in altissimis syluis reperitur. Nam è sylua Gengenbacensi, quod oppidum supra Offenburgum unum miliare situm est, ad me primum allata fuit. Cæterum caule, folijs, & semine Caryophyllatæ adeo similis est, ut ab ea uix discerni dignoscique possit. Sola autem radice inter se differunt binæ hæ plantæ. Nam sylvestris radicem habet fere dodrantalem, rectam, nullo fibratam capillitio, subruffescentem, digitum crassam, gustu amaram, omni denique odore destitutam. Cuiusmodi uero Caryophyllatæ radix sit, iam antea diximus, cum de illa seorsim ageremus. Florem ferè hæc sylvestris Benedicta Maio Mense, eumq; forma sua ad Gymbala accedentem, colore tinctum roseo aut purpurascens, quo decusso caput extuberat circinatis acinulis cumulate stipatū, per omnia Caryophyllatæ simile.

NOMENCLATVRÆ.

Cum Benedictæ herbæ genus sit ista quam modo describimus, opere prædictum fuerat, ut historiam eius sub capite xxi. primi nostrorum commentariorum libri absoluissimus. Sed quoniam tum quidem nobis haud dum uisa fuit, & longo demum post tempore ad manus nostras uenit, reiecit

tractationem eius in hunc locum. Qui hanc plantam nobis exhibuerunt, uocabant illam Germanica uoce *Wild Benedicten wurzel*/hoc est, Syluestrem Benedictam, quod sanenomen ut retineat in posterum, quoad uerā ipsius in Dioscoride appellationem didicerimus, per nos licebit. Fecimus supra cum de Alchimilla nobis esset sermo, mentionem cuiusdam herbæ quam Dioscorides lib. iij. cap. ci. *λεοντοπέταλον* nominat, quod nomen, & caput, ob floris & seminis figuram lubens ad nostram hanc syluestrem Benedictam referrem, si sine offensione quorundam id fieri posse putarem. Sed quid obstat, quo minus sententiā nostram indicemus, quam non ideo proponimus, ut quenquam illi subscribere cogamus, sed ut alijs de his rebus cogitandi ansam præbeamus.

VIRE S A C T E M P E R A M E N T V M.

Si hæc syluestris Benedicta Leontopetalon sit Dioscoridis, certe utrinque sine offensa usurpari potest.


I N T R I N S E C V S.

Leontopetalo Dioscorides duo in primis tribuit, primum enim dicit radicem eius serpentium ictibus auxiliari ex uino potam, deinde uero celerissime dolorem finire, ischiadicorumque clysteribus misceri. Si quæ uero sunt alia, quæ de hac radice dicuntur, mihi nondum sunt comperta, possent tamen progressu temporis melius innotescere.

De Trifolio magno, seu aureo, quameo nobilem Hepaticam uulgo uocant.
CAP. CLXXVII.

NOBILIS HEPATICA MARTIO PRIMVM MENSE plicata emittit folia, in initijs Oxytriphyllo similia, sed maiora, ubi uero adoleuerint, cum Asaro conferri possint, nisi quod Trifolij formam referunt. Porro tam flores singuli (de quibus paulo post) quam singula etiam folia, singulis hisque lanuginosis insident pediculis. Florem ergo mense Martio profert hæc Hepatica, in albo cœruleum, non maiorem Oxytriphyllo, qui in capitulū postea abit, quod est seminum ex ordine positorum receptaculum echinatum. Porro semen itidem cœruleum oblongum, ac Aquilegie consimile existit. Hæc planta non ubiuis locorum obuia est, tamen si hodie passim in hortis, locis umbrosis, quibus gaudet, plantari cœpta sit. Nascurur autem sponte sua in syluis Vualgoiæ, e' regio-

Nobilis Hepatica.
Edel Leberfraut.



nemontis Tonitruī, in di-
tione Dominorum de Sal-
ckenstein.

NOMENCLATURAE:

Qui hanc herbam Li-
chen esse statuunt, nō assen-
di nō possum, posteaquam
descriptio Lichenis nostrae
Hepaticae minime respon-
deat. Quae uero planta Li-
chen dicatur proprie, sta-
tim explicabitur, secundo
ab hinc capite. Nolumus
autem hoc loco in contro-
uersiam uocare, ac inquire-
re, faciat ne ad Hepatis ui-
tia, an minus, nam omnes
Emperici eam Hepaticam
esse statuunt, qua ratione
Germanis Edel Leber-
fraut/hoc est, nobilis He-
patica dicitur. Hieronymus
Braunschueig ait Germa-
nica lingua der Gulden
flee/hoc est aureum Trifo-
lium uocari, id quod à ue-
ro non multum abest, si fo-
liorum figuram perpen-
das. Ut uero in Dioscoride
appelletur, & an Trifolij ge-
nus sit, necne, definire non
ausim, quin potius in me-
dio hanc disputationem re-

linquens aliorum sententias audiam, intereaque Trifolium aureum seu ma-
gnum cum cæteris appellabo.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Optandū sane esset, ut ex ipso Dioscoride ratio nominis nobis cōstaret, quod si contingeret nobis, certius de uiribus illius disputare possemus. Sed cum id nobis hodie negatum sit, ut experientia contenti simus necesse est.

INTRINSECVS.

— Herba uino decocta & pota, obstructione liberat secur, præsertim in his qui veneri nimium indulgere, pari ratione urinam trahit, renes & uesicam omnibusq; internis uisq; apprime conducit. Eadem præstare dicitur aqua distillata.

EXTRINSECVS.

Hæc herba (quod & de aqua eius distillata intelligas) inflammationes imposita tollit, doloresq; finit.

Alia quæ ex hac herba peti possent remedia, quotidiana experientia docebit.

De Oxytriphylo. Cap. CLXXVIII.

OXYSTRIFOLIUM, SEV TRIFOLIUM ACIDUM IN FINE MARTII complicatis folijs pro more omnium Trifoliorum e terra prorepat. In initio uero Aprilis tripartito distincta folia integra

& absoluta, coloris herbacei conspiciuntur, eaq; singula peculiari suo pediculo, qui exiguus, breuis, digito haud temere longior, tenuissimusq; existit, insident, numerosa & frequentia e radice geniculata subruffa, Saxifragæq; albæ pene consimili, sed minori, profluentia. Inter folia flores candidi, Cymbalaris figuræ, singuli in simplici scapo, uenisq; qua terram spectant purpureis præditi, forma deniq; Saxifragam albam repræsentantes prorumpunt, qui Maio mense in lunatas filiquas ruffo semine, quod Cardami semini conferre possis, refertas abeunt, quas si a maturitate tetigeris, protinus dissilient, sicut & uascula illa seminiorum in Cataputia minori. Hoc Trifolij genus plerunque in syluis, e radicibus magnarum arborum, & in petris aliquando nascitur.


NOMENCLATURA.

Germani Büchampffer / Saurflee / Guckgucksoflee nominant, potestq; fieri.

Observatum est, ubi arbor, ad cuius
truncum arbor opprimuntur, quibus
lactisq; flos, eadem illi arbori
plurima, & aqua in multitudine
perstante, pami eadem fructuosa.

Oxytriphylon.

Büchamper.



fieri ut sit *oxy*, seu *oxytriphylon*,
apud Dioscoridem. Quod
nam autem uerum & odo-
raturum Trifoliū sit, & quot
genera Trifolij apud nos
extent, suo loco dicetur, nā
in praesentia de acido Tri-
folio loquimur, quod si sa-
porē spectes, Walde sanz-
ampfer / hoc est, sylvestris
Acetosa seu Oxalis dici pos-
set, nam non minus quam
illa in acetarijs expetitur.
Sunt qui hoc Trifolium,
Panem cuculi, Germanice
Gaußbrot / Alleluia, Luy-
ula, Bachael, Trifoliū ace-
tosum nuncupent. Vide
Mesuen, Math. Syluaticū,
Leonardum Gilibertum,
& Iacobum Manlium su-
per vng. Marciaton.

*ut q. cuculus aut eo usque,
vel q. de erumpente, cuculus pe-
nitus uerum suum amittat.*

*Fruct. est in plancula temperatior.
Gruuina. si quidem appropinquat an-
tūq. temperata ariditate contrahit
temperatā cellulaturā.*

VIRES AC TEMPE-
rumentum.

Oxytriphylon calidū
& siccum est, uulgarī Oxali-
di per omnia respondens,
quare etiā loco illius usura
pari commode potest.

INTRINSECVS.

Oxys, seu aqua eius di-
stillata pota, refrigerat ieu-

en, confortat cor, sitim sedat, utilisq. est in omnibus calidis morbis, & in
flammationibus, non aliter atq. Malo granata.

EXTRINSECVS.

Succus refrigerantibus quibusdam unguentis miscetur, ob mitem quam in sanando obtinet facultatem.

Aqua distillata cum alumine temperata, uulneribus, ulceribus, & fistulis potissimum autem oris uicij, collutu medetur.

Reliquas Oxytriphylli uires in historia Oxalidis comperies.

De Pulmonaria, & Hepatica fontana, seu Lichene.

CAP. CLXXIX.

1.
*Iecoraria, seu He-
patica fontana.*

L ICHEN, SOLIS AESTVI INIMICVS, VMBROSIS Si-
mulq; humidis locis gaudet, ideoque in fontibus profundio-
ribus ac frigidioribus, necnon rorulentis petris duntaxat nasci-
tur, folio copioso, succi pleno, squamarum instar stipato, & contexto, & qd
hinc inde serpit, non aliter atq; Lichene seu Impetigo in cute se longe lateq;
diffundit. Radix Lichenis nihil aliud est quam tenuissima, tomentosa, &
mollis lanugo, qua saxis hæret, quibus si detraxeris herbam, altera sui par-
te plane uiridis illa conspicitur, folio multiplici & pingui uestita, altera ue-
ro & qua petrae cõiungitur, emplastrum modo lita uidetur. Maio mense appe-
tente super maiora quæ diximus folia, alia quædam per exigua, & musco
palustri similia nascuntur foliola, quæ in cauliculos pingues, breues, pedi-
culorum forma, capitula stellata Maio mense proferentes, sese attollunt. Li-
chen gustu subamarus est.

2.
Pulmonaria.

Herba, quæ uulgo pulmonaria dicitur in muscosis quercubus & fagis
prouenit, nonnunquam etiam in muscosis petris, & umbrosis syluis, præ-
dictæ Iecorariæ consimilis, sed maior per omnia. Folia habet rugosa, inui-
cem incumbencia, uiridia, lentiora & sicciora præcedenti, ea qua arboribus
adhærescit parte albida, lanuginosa, similiterq; aspera & lenta instar corij.


NOMENCLATVRÆ.

Multræ sane existunt plantæ, quæ a iocinore appellationes suas traxe-
runt, nimirum Trifolium aureum, Matrisylua, Eupatorium, & hic quem
in præsentia tractamus Lichen. Verum enim uero Eupatorium uera est He-
patica, quo nomine si uires spectes, fortasse & hæ duæ plantæ, appellari po-
terunt. Si autem ueterum scripta consideres, nihil aliud sunt quam serpentes
herbæ, quæ uno nomine à Dioscoride ~~λεχας~~ appellantur, qui simul Lichena
saxis

Iecoraria, seu Hepatica fontana.

Bunnen leberfraut.

Λεγόμενον πύρε.



saxis familiarē esse tradit, Serap. cap. 113: quod idem Serapio testatur, apud quem Arabica lingua Hazezalsacher dicitur. Iam ut locorum natalium ratione differunt hæ plantæ, ita eodē pacto nominibus facile secernentur, ut altera quæ Germanis Bunnenleberfraut / hoc est, Hepatica fontana vocatur, λεγόμενον πύρε, seu aquaticus, altera uero quæ Germanis Lungenfraut / hoc est, ut uulgo loquuntur Pulmonaria nuncupatur, Lichen sylvestris, seu arboreus uocitur. Vterq; Lichen teste Plinio impetigines sanat, unde & nomen obtinent, præsertim prior, nam alter ad uitia pulmonis à veterinarijs præcipue usurpatur.


Muscus syluest. frus.

Est & Musci quoddam genus, quod fibris quibusdam instar Polipodij adhærescendo, & serpens supra terram se propagat. Sed de illo suo dicemus loco.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Hepatica fontana, frigida & humida est, Pulmonaria uero frigida & sicca, potest utriusque adhiberi commode.

INTRIN

*Pulmonaria.**Lungenkraut.*

INTRINSECVS.

Lichen uino decoctus, aut præter decoctionem e uino potus uitij pulmonis iocinorisq; medetur, inflammationes sedat, fluxiones capitis cohibet. Ad multas præterea calidas affectiones efficacior est Lichen, quam uulgo existimetur.

Tragea ex eo siccato confecta, Saccharo, alijsq; aromatibus & speciebus admixtis, ijdem succurrit uitij.

Pulmonaria herba uulgo ad pulmonis affectiones, astma, suspiria, & tussim utuntur, confecto ex ea puluere, aut aqua distillata. Puluerem ex ea sic conficies. Accipe Pulmonariam herbam siccam, Anisi semen, pulmonem vulpis in aëre siccatum, semen Fœniculi, glycyrrhizam, radicem Enulgæ, ginger, æqualis ponderis, eaq; singula seorsim accurate contunde, posteaq; cribro purga, ut tenuissimus fiat pulvis. Demum accipe optimum Saccharum, tanti ponderis, quanti reliqua omnia extiterint, & misce omnia simul, utreq; in modum Trageæ mane & uespèri. Hoc puluere astma soluitur, obstructione liberantur pulmo & iecur, aspera denique tussis iuuatur.

Magistri pecorum & veterinarij pulmonariæ herbam seu puluerem sale mixtū, pecori aduersus spirandi difficultatē, & tussim, singulari experimento exhibent.

EXTRINSECVS.

Lichen saxis rorulentis familiaris omnes inflammationes arcet, impetigini medetur, impositus.

De Saxifraga alba, seu magna.

CAP. CLXXX.

Q VEM AD MODVM CALCVLIS COMMINVENDIS VARIa adhibentur remedia, ita non una Saxifragæ (Germanis *Stein-*

Saxifraga alba.
Weiß Steinbrech.



Steinbrech) species reperitur, quin, quod mirum uideatur, quæq; regio propriū & peculiare sibi ostēdit Saxifragum, quemadmodū & rei herbariæ scriptores in delineanda Saxifraga, non consentiunt. Plinius *Plinius. lib. 22. cap. 21.* namq; suam Saxifragam,

Polytrichon, Trichomanes, & Saxifragum nominat. Marcellus Vergilius Tragopogona, hoc est, Hirci barbulam (cuius supra cap. xcv. historiam habes) in Hetruria Saxifragū passim dici tradit. Barbarus existimat Tormentilā Saxifragam esse. Simon Ianuensis Pimpinellam, pro Saxifraga Dioscoridis uendit. Præter has iam commemoratas Saxifrage species, aliæ quoq; emergunt, nimirum, Halicacabum, Milium solis, et quod statim describemus Empeptron, ita ut nihil certi de Saxifraga Dioscoridis statuere liceat. Nam caput illud

Diosco. lib. 4.

cap. 17.

Diosco. lib. 4.

cap. 174.

Quid de his duobus capitibus

sentiatur Marcellus

lib. 4. uide in annotationibus ipsius

in 174. caput li.

4. c.

tur. Sed relictis his, nostram Germanicam Saxifragam, uulgoq; officinis usitatam tandem delineemus. Ea igitur Maio mense, in aridioribus, asperis, saxosis, & arenosis agrorum limitibus reperitur, folijs, quæ plerunque humi

humī procumbunt, rotundis, ac parum serratis, viti, seu Hederæ terrestris similibus, ac pinguioribus, mollioribusq; e quorum medio, nudus, iuncceus, lanuginosus, & rotundus profilit caulis, cubitalis, in cacumine albis flosculis, hisq; frequentibus violarum formam referentibus, emicans. Hi cum mense Iunio deciderint, nullum post se nec uasculū, nec semen relinquunt, unde sunt qui dicunt se minis loco radicem huic herbæ datam. Ea multis granulis coaceruatis, teretibus & purpureis, nec Coriandro maioribus, ac apprimè amaris constat, quæ cum, seminassent sequenti anno e singulis granulis, singulæq; stirpes proruperunt.

NOMENCLATVRÆ.

Hæc herba Germanis Weiß Steinbrech / Latinis Saxifraga a radice & facultate quam obtinet, dicitur. An uero illa sit Diosc. Saxifraga, alijs discutendum relinquo. Non enim contendimus, sed docendi gratia ista scribimus. Quod si ergo Saxifragon Dioscoridis, ad hanc nostram herbam pertinere uidebitur, poterimus illam cum Dioscoride Empetron album nominare, nam de altero Empetro statim dicetur. Platearius suspicatur Saxifragam hanc *επιθώρακ* Diosco. lib. ij. cap. cxxxij. esse. Collinutius Saxifragam suam, Sampetran, Basichiam, Baticulam, Batin marinam, & Rumpi saxū nuncupat, quæ sane nomina non inepte huic nostræ Saxifragæ tribui posse existimo.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Inter omnes Saxifragæ species, quæ albos fert flores præcipue commendatur, magni usus herba aduersus calculum & stranguriam, excalescentem & expellentem uim obtinens.

INTRINSECVS.

Saxifraga una cum radice sua in uino decocta et pota, urinam ciet, expurgat renes, expellit calculum renum & uesicæ.

Semen huius, quod in radice consistere diximus in puluerem redactum, & in modum Trageæ, aut Ecligmati præparatum, ad eadem efficax est.

Aqua in Maio mense e floribus & radice distillata, usu gravior & iucundior existit, & ad supra commemoratas affectiones usurpari potest, ita ut singulis uicibus mensura trium aut quatuor coelcarii cum bibas, posteaq; in solium calidum in quo sit Maluæ decoctum, descendas, modo nulla prædictis morbis coniuncta sit febris.

De *Empetro*, & *Polytrichi Apuleiani uarijs*
 generibus CAP. CLXXXI.

Empetron.
Barnkraut.



QUAM NOS EMPE
 tron uocamus herbam, ea *Empetron.*
 exigua est plantula, uirgis,
 aut filis potius tenuissimis,
 humi procumbentibus,
 quæ folijs perexigujs uesti-
 untur lenticulæ similibus,
 semine inter folia copioso,
 ac mirum in modum stipa-
 to, non aliter atq; Atriplex
 simaria minor. Nascitur hæc
 arenosis in locis, interdum
 etiam prope ripas fluui-
 orum humecta in terra. Nam
 Argentinæ in campo lani-
 onum, non procul a ponte
 Rheni, in arenosis fossis,
 deinde etiã in Vualgoia ad
 Luthram fluuium, è regio-
 ne pagi quem ab illo Lu-
 terecken nominant, præ-
 terea ad oppidulum Reichs-
 hofen / in colle nõ procul a
 flumine, illam reperi. Circa
 festum Bartholomei spe-
 ctandam se præbet ince-
 gram, omnibusq; numeris
 absolutam.

Iam ut ad *Polytrichon* *Varia Polytrichi genera.*
 ueniamus, quod Germani
Jungfrauenhar appellat,
 & *Widerrödt* / quod & ad
 Magicas nonnulli artes ad-
 hibent, est illud trium gene-
 rum,

*Polytrichum primum.**Polytrichum secundum.**Polytrichum tertium.**Jungfrawhar/oder Widertodt.*

1.
*Polytrichon non
bile.*



2.
*Polytrichon
maius.*



3.
*Polytrichon
minus.*

rum, quæ tamen omnia è musco tanquam natali suo loco prodeunt.

Elegantissimū, præstantissimūq; ex his, in muscosis semperq; humidis & inter montes sitis pratis, Iulio mense prouenit, capillo potius quam caule, læui, eq; purpureo aureo, digitum longo, capitulo in summo, quod grano tritici conferri possit, protuberante, folijs rufescentibus ternis aut quaternis magnitudine Lenticulam palustrem æquantibus, sed longioribus, & acutioribus, humis sparsis.

Alterum Polytrichon, maius, nimirum quod Circulatorios inter radices & Theriacas suas uenale circumferunt, aureos de illo pollicentes montes, primo aliquanto procerius est, & ad purpureum magis accedit colorem. Hoc in altissimis syluis è muscosis & antiquis, quæ corruerunt arboribus profilit, sine folio, solo caule in altum sese attollens, sicut flos Hepaticæ fontanæ.

Tertium, iam dicto simile est, nisi quod breuius eundem, ac magis exiguo protuberat capitulo. Plerumq; è rorulens

rorulentis faxis prodit. Et ut paucis rem absoluam, tria hæc genera Polytrichi, necnon & pediculi fontanæ Hepaticæ florem stellatum sustinentes, reuera nihil aliud sunt, quam coliculi florentes musci, in suo tamen quodq; genere.

NOMENCLATURAE.

Priorem plantam quæ folium habet Lenticulæ, Germani *Barnfräut* uocant, potestq; fieri ut sit *univert*, quod & *pannula* quidam dixerunt, Galeno *Praoides* appellatum. Reliqua tria Polytrichi Apuleiani (ut uulgo nominant) genera, Germanice *Jungfrauen har* & *Widertod* appellantur. Nos ea ad *Empetron* quoque referimus, tamen si illorum mentionem ueteres non fecerint, nisi forte quis sub capillo veneris, seu *Adianto* descriptas putet, cui sane nullus repugnari.

Diosco. lib. 4.

cap. 174.

Apul. cap. 47.

VIRESCENTIA TEMPERAMENTVM.

Quatuor hæ plantæ meo quidem iudicio siccæ sunt temperaturæ, ac calculum comminuendi & educendi, urinamq; trahendi uim obtinent. Quæ propter non aliter atq; *Saxifraga* ad calculos usurpari poterunt.

INTRINSECVS.

Empetron in hydromelite decoctum ac potum, non tantum calculos, sed & bilem, pituitam, & aquam trahit, hydropicis commodissima herba.

De Polytrichi uiribus nihil nunc dicimus, cum hodie ad phyltra, amatoria, ueneficia, & Magicas artes potius, quam ad tuendam uel instaurandam corporis sanitatem, in usu sit. Proinde si quid de eo dicendum sit, uidetur nobis quidē facultatibus *Capilli veneris*, de quo proximo capite, pollere.

De *Adianto*, eiusq; uarijs speciebus.


CAP. CLXXXII.

VITA MVRARIA E' SCISSVRIS ET INCVTIVRIS MV

R rorum antiquorum profilit, caule breuiusculo, non enim digitū *Capillus Veneris*

excedit longitudine, frequenti, nam e radice unica nigra & capillata sæpenumero, quadraginta aut quinquaginta coliculi prodeunt, foliolis copiosis, & quincunciali ordine inuicem coniunctis incisuris suis instar teneri *Coriani* diuisis, ceterū forma *Rutæ* prorsus similibus, quaterram spectant, aureis punctulis lulio mense notatis, quod & in *Polypodio* ui-

Trichomanes, officinis Polytrichon.
Roter Steinbrech.



*Capillus
 Veneris,
 seu Ruta
 muraria.
 Mauriauten.*

deas, uestiti. Hæc plantula nullum alium, quam cum quem diximus sortitur caulem, nec florem etiam profert, & quod admiratione dignum existimo, cum perexiguus sit fruticulus, nihilominus tamen æstatis, hyemisq; tēpestates quasq; illęsa trāsit, nec prius emarcescit, quam noua inceperint emergere foliola, quæ quotannis Aprili mense appetente inter vetera prodi re conspiciuntur, inflexa quodammodo, cuiusmodi & prima Hernionitidis folia, cum e terra prorūpunt, apparent. Neq; uero hoc Rutæ genus plantationem admittit, sicut pleræq; plantæ, sed sponte sua natura sua cooperante e' saxi ut diximus enascitur, culturam refugiens.

Quod uero nunc diximus de Ruta muraria, idē de Trichomane intelligi uolo. Nam & ipsum ex antiquis emergit muris, sed plerunq; in umbrosis & humidis locis, interdum etiā in arenosis & sabulosis saxis, interdum etiam specubus, ut plurimum autem

tener

Adianton magnum,
Fraxenhar.



tenebrosis ut diximus, & humidioribus reperitur. Habetuero similiter radicem capillatam & superuacuum, coliculos tenuissimos, digitum longos, et eo ampliores, puniceos, ex utraque parte ordine quodam, foliolis rotundis Lenticulae palustri consimilibus vestitos, ut rudimentum pennae satis exprimant. Porro colles folijs nudati Polytrichum maiori, quod proximo descripsimus capite, similes euadunt, sed nigricantiores. Caterum gustu utraque haec herba cum Henionitis de satis conuenit, nisi quod in his austerior paulo & asperior deprehenditur.

NOMENCLATURA.

Priorem plantam Germani Maurtauten/hoc est Rutam murariam, alteram Koten Steinbrech. i. Saxifragam rubeam nominant. Vulgus Herbariorum Capillum veneris, & Cinnamon herbam nominat praedictam Rutam, estque ea Adiantum album, cuius meminerunt veteres, in primis uero ipse Dioscoridus. Nolo autem quid in

Adianton.

Diosco. lib. 4.

eo capite Dioscoridus desiderare dissimulare. Nam cum Marcello Vergilio uiro doctissimo suspicor aliquid deesse loco. Principio siquidem ibi dicitur, Adiantum folia habere Coriandro similia, exigua, &c. non multo post subiungitur, fo-

cap. 131.

Ita Filici similia, è quibus sane uerbis satis conijci potest deesse potius, quam superuacanea reperiri eo in loco uerba. Credibile est etenim Adiantum à Dioscoride in sua quoque genera distributum fuisse, posteaquam & ipse Theophrastus lib. vii. de hist. plantarum cap. xii. idem fecisse cognoscitur, cuius hæc sunt de Adianto uerba, γίνετ' ἀπὸ δύο, τὸ μὲν λευκόν, τὸ δὲ μέλαν. hoc est, genera ipsius duo, album & nigrum. Iam si hæc Dioscoridis uerba hoc pacto adiungas, ut dicas. Duo sunt Adianti genera, album, quod folia habet incisuris diuisa, Coriandro similia; nigrum uero, quod folia habet Filici similia. Si inquam ita scripta ueterum conciliauerimus, possemus forte defectum Dioscoridis non solum refarcire, sed & cognoscere quodnam uerum & præcipuum ueterum fuerit *Adianton*, alioquin certe nunquam eo cognitio nis peruenturi. Sunt enim qui uulgarem Capillum ueneris uiridi coliculo prædictum, quod Theophrastus album dixit, uerum esse Adiantum contendat, alijs id negantibus, aliamq; in locum eius substituuntibus. Quapropter quamdiu contentiones uigent, ueritas latebit oppressa, quæ tum procul dubio emerget, cum dicemus Rutam murariam album esse Adiantum, aut certe genus illius (nam uerum & maius Adiantum, cuius imaginem iuxta appoluiimus, & quæ Germanis *Fräwenhar* / appellatur, non ita pridem è peregrinis terris ad mē aridum delatū est) rursus uero Trichomanes illud Adiantum nigrum statuamus. Hinc facile liquere puto, duo illa apud Dioscoridem capita, Adianti scilicet & Trichomanis, ad unum redigenda, nec separanda in posterum, cum de Adianti generibus loquantur, & ab autore ipso dubio procul utraq; planta uno capite tractata fuerit, id quod uel ex Ægineta colligere licet, qui Trichomanis sub Adianto mentionem fecit, nec in proprium illud & peculiare caput coniecit. Qui sicut plane mihi persuadeam, caput de Trichomane ab alio quodam super additum præcedenti, quemadmodum & Apuleio id contigisse uidemus, apud quem cap. xlvij. hæc leguntur nomina, Græci (inquit) Callitrichon uocant, idem Adianton, idem Polytrichon, idem Trichomanes, idem Trichophyes, alijs Selinophyllon, alijs Dyphyes, alijs Heracleos pogon, alijs Hippomanes, item Scolopendrion, Asplenon, Scolibrochon, alijs Amianton. Latini Capillum ueneris, idē herbam capillarem, Crinitam, Saxifragā, Punici Nello esse fide. Rursus capite. xcvij. ita scribit: a Græcis dicitur Adiantos, alijs scolopendrion, quibusdam Scolymos, nonnullis Scoliprochos, Asplenon, & Prochos agrios. Ægyptijs Phepere. Itali Saxifragam, alijs Vitem canam, alijs Apruco, alijs Lampago uocant. Iam quemadmodum in his duobus capitibus nomina aliquantulum uariant, ita descriptio herbæ in utroq; plane conuenit, nisi quod in priore dicitur, locis aquosis, cum in posteriori sit, nascitur in montibus, locis saxosis, quæ quidem uariatio facile scriptorum uitio cōtingere potuit. Quis igitur non uidet unam & eandem plantam bis in Apu-

lelo descriptam: Sed ut ad Dioscoridem reuertamur, nosq; ab his tandem expediamus, recensēbimus, pro more nostro, appellationes præsentium plantarum apud Diosco. extantes. Sunt autem istæ, *ἀδίατον, πάλιτρον, καλλιτρον*, Trichomanes, Ebenotrichon, Argiō, Corion enydron, hoc est, Coriandrum aquaticum (quod Germanis Wasser Coriander diceretur) Epier Ægyptijs quidem. Cinnamalis, Terræ capillus, Supercilium terræ Latinis, Phithophthethela Dacis. Atque has uniuerfas nomenclaturas ad Trichomanes, quod uulgo Saxifragam rubeam, & officinæ Polytrichon appellant, pertinere putamus, nam sub Trichomane in sequenti capite fere repetuntur, in quo ita legitur, Trichomanes, alioqui Pterion, alij Opteron, Romani Capillarem, alij Pinulam, alij Fidiculam, nonnulli & eam Adianton appellant. Serapio Capillum veneris, Coriandrum putei, Capillum algol, Capillum porcinum, & Berscegnascen. Auerrhoes Cusfaralber uocat. Cæterum cum exacte Adianti descriptiones pensito, uideo sane Polytrichi Apuleiani primum genus, recte ipsi coniungi, præsertim cum rorulentis saxis & fontibus plerumque reperiatur, quod equidem ex Theophrasto colligere licet, qui Adianti genera locis humidis prouenire scripsit. Hæc fere sunt quæ de Adianti generibus dicere habebam, in quibus ideo prolixior fui, quo exactius discerni possent à studiosis Adianti genera.

Quedam exemplaria habent Filiculam.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Contrarias duæ hæ plantæ facultates obrinēt, astringendi, digerendi, ac educendi: temperatura frigida & sicca, tam cusi Rutam murariam nonnulli calidam & siccam statuunt.

INTRINSECVS.

Binæ hæ herbæ uel simul, uel singulæ uino aut hydromelite decoctæ, perq; aliquot ex ordine dies potæ, obstructions iocineris soluunt, morbum regium expellunt, pulmonis uicia purgant, spirandi difficultati prosunt, melancoliam per urinam ducunt, tumores lienis dueros emolliunt, calculos trahunt, necnon uenenum haustum: mulierumq; menses expellunt.

Rursus prædicta decoctio, pulueres herbæ utriusq;, necnon ex ipsis confecta Ecligmata, syrupi, aqua denique distillata, quasuis alui fluxiones inhibent, inflammationesq; iocineris refrigerant. Eadem efficere posse Polytrichum Apuleianum, de quo præcedenti capite, tradunt.

Pastores quidam Trichomanes in medendis porcorum affectionibus utuntur, singulari experimento.

Omittimus autem prudentes hoc loco ueneficia & phyltra, aliasq; im-

pías artes & superstitiones muliercularum, ad quas Adianti & Polytrichi genera adhibent, utpote Christianis hominibus indignas.

EXTRINSECVS.

Ruta muraria in lixiuio decocta, si ex illo caput abluatur, defluentes capillos continet, ictibus serpentum medetur, alijsq; uenenatorum animalium moribus.

Eadem Polytricho facultates, si pari ratione decoquatur, tribuunt.

De Milio Solis. Cap. CLXXXIII.

^{2.}
*Milium solis fa-
tuum.*

A NTEQVAM AD FILICES ACCEDAMVS OPERAE pretium duxi, remedia calculorum, quæ ab herbis quibusdam petuntur, absolvere, inter quas Milium solis haud postremum occupat locū. Quanquam autem una tantum illi herbæ tribuatur facultas, nimirū qd semine cum uino albo potu calculos frangat, pellatq; urinam, men tanta diligentia historiam ipsius persecutus est Dioscorides, ut uel cæcus Milium solis solo tactu agnoscere posse uideatur. Plinius lib. xxvñ. ca. xi. semen ipsius Ciceri confert, & recte quidē quantum ad figuram attinet, at si magnitudinem spectes non item, quod omnes n̄mecum fatebuntur, quibus hoc Milij genus cognitum fuerit. Nam nostrum Milium solis non multo maius est Milio satiuo, quod inter fruges & legaria refertur. Quapropter pro magnitudine Ciceris, ut nunc habet lectio Pliniana, forte similitudine Ciceris, legendum fuerit, aut certe aliud quoddam semen Plinius intellexit, nimirum id quod Lachrymam Christi nominant. Sed in his nihil affirmamus, ne temeritatis notam incurramus. Folia (ut ad descriptionem herbæ accedamus) habet acuminata, angusta, Oleæ similima, sed multo asperiora, acutiora & magis nigricantia. Caulem teretem & rectum, superioris sua parte quandoq; ramulis brachiatum, instar arbusculæ. Radicem uero nigram, longam, rectam & lignosam. Inter furculos & folia, granula dura, læuia, & candida Margaritæ instar profiliunt, numero quandoque terna, interim & plura, prout plures aut pauciores, præcesserunt flosculi. Acque hoc illius semen est, gustu dulce cum recens fuerit, mense Iulio legitur: Cæterum sesquicubitalem plerunq; attingit proceritatem. Nasctur autem in incultis agris, secus itinera, magna copia in tractu Rheni inter Basileam & Bingham luxurians.

^{2.}
*Syluestre Litho-
spermon.* Syluestre huius ac plane asperum genus, in quibusdam hortis apud Mediomatrices reperi, folio, caule, flosculo & semine iam dicto per omnia simile.

Passerina.

Wilder Meerhirs.



mile, nisi quod semen pro-
fert, non adeo læue & gla-
brum, sed rugosum aliquā
tulum, ad uulgarem Bu-
glossam eatenus prope ac-
cedens. Semen huius simi-
liter Iulio mense maturum
conspicitur.

Aliud deniq; Lithosper-
mi genus inter oppidum
Alzeim / & montem toni-
trui, post messem in agris
frumentarijs deprehendi,
unico eoque tenuissimo coli-
culo, dodrantali, folio Li-
ni, semine inter folia nigro,
læui, forma uulgari Litho-
spermo similimo, præditū.

3.
Passerina.

NOMENCLATURAÆ.

Priorem herbam quæ
mei iudicio recte der Weiß
Steinbrech / hoc est, Sa-
xifragum album dicere-
tur. Germani Meerhirschen.
Officinæ Milium solis, Gra-
num solis. Semen lapideū,
& lapidosum uocant, Dio-
scorides *λίθιον*, Agony-
chon, Leoncion, Leoninū
lapidem, Gorgonion, Tan-
talidin, Diospyron, Colum-
bam, Gonolera, & Hera-
cliam appellat, quæ omnes

*Diosco. lib. 3.
cap. 149.*

ferenomenclaturæ a feminis duritie, herbæ fuere inditæ. Sunt & qui Aëto-
nichon, hoc est, vnguem aquilinum dictam uelint. Serapioni cap. lxxij. se-
men, Kulb, herba uero, Astonchos dicitur. Phrisus in Synonymis suis inter

*Milium solis.**Neerhirsē.*

Plinius lib. 25.
cap. 11.

cæteras eius appellationes
Hebræum, deinde & Chal-
dæum nomen recenset מילין
Dochan (quod alias Milli-
um significat) & מילין Ar-
mel nuncupans.

Duo reliqua huius her-
bæ genera, una uoce Ger-
manice Wilden Neerhirs-
sen dicere possumus, quo-
rum prius ego Cacaliā
Plinij, posterius uero, quod
à quibusdam Lingua passe-
rina uocitatur, Dyospy-
ron Theophrasti esse existi-
mo.

**VIRES AC TEMPE-
ramentum.**

Dioscorides Lithosper-
mo suo nullas alias, quem
admodum supra quoque
diximus tribuit facultates
quam quod calculum uesi-
cæ comminuat, perçuri-
nam educat. Hinc semen
istud calidum & siccum es-
se colligimus. Omnia siqui-
dem urinam cientia, Gale-
no lib. v. de simpl. medic.
facult. capite xij. teste, cali-
da & sicca sunt.

INTRINSECVS.

Semen in puluerem con-
tritum, ac è uino potum, calculum uesicæ frangit, ac potenter expellit.

EXTRINSECVS.


Herba quoq; in solio calido decoqui potest, ad leniendum dolorem cal-
culi.

culi. Sed & obseruandum est Lithospermon inter medicinas quas calculo adhibemus haudquaquam postremam, cumq; expellente ui magna sit praedictum prudenter & sobrie illo utendum.

De Filice arborea, & saxatili.

CAP. CLXXXIII.

Filix arborea. Steinsarn.



POSTEA QUAM Igitur calculo destinatas herbas, earumq; descriptiones & usum, absoluimus, consequenter deinceps ad Filices exponendas progrediemur, a minimis illarum generibus exorſi. Primum itaq; duo Filicis exiguae genera reperiuntur, non quidem forma, sed loco natali differentia, nam hoc ex arenosis saxis & rupibus proſilit, illud uero in ueterum & caeterorum roborum caudicibus nascitur, Folio utrunq; Filici simili, multo tamen minore incisura diuisum, caule non altiore Polypodio, sed multo tenuiore. Caeterum non ubique locorū duae hae plantae inueniuntur, nec passim occurrunt, sed in altissimis montibus, quales sunt der Ydar / Hercinia sylua, Vuasgoia, & mons tonitru.

Duo Filicis exiguae genera.

Reperitur porro alia quaedam Filix, folio nudata, caulem proferens, digitum longum, multiplicem & copiosum, una e radice caetera

Filix nuda, seu saxatilis.

*Filix arborea.**Eichelfarn/ Baumfarn.**Diosco. lib. 4.**cap. 181.**ἄφροντις φῖλ.**Apul. cap. 51.*

quod ē saxis prorumpit, quodq; Germanice *Steinfarn* appellamus, *Capilli veneris*, seu *Politrychi* Apuleij genus esse existimamus, nempe eius quod ramusculos habet quasi seta porcina.

pillata, sicut & *Ruta muraria* in cacumine binis uel ternis corniculis, aut si maioris incuruis quasi setis, quę purpureis aliquando notantur punctis, conspicuū. Gustu, & odore cum *Filice* uulgarī conuenit. Hoc genus *Filicis* ē saxis quibusdam prodire uidi, in viculo *Ernsweiler* / prope *Bipontium* sito, deinde & in sylua *Bidiscensi* non procul a *Walßborn* / ubi sunt *Thermæ*, non quidem natura calidæ, nihilominus tamen salubres, si calefiant.

NOMENCLATURAE.

Dioscorides primo fruticulo quę *Germani Eichelfarn*, & *Baumfarn* dicunt, proprium dicitur caput, in quo illū uocat *Dryopteris*, eo quod cęsarum quercuum caudicibus plerunque proueniat. Alterū cum natali tantum loco a præcedenti differat, *Pterin* & *Pterion* dici posset.

Itaque utrunq; ab illo eodem fere nomine appellatur, præterea & *Nymphæam* *Pterin* dici tradit.

Tertium *Filicis* genus,

VIRES

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Priores binæ plantulæ, nō multis ut opinor cognitæ sunt. Ego temperatura uulgari Filici multicauli respondere puto.

Saxatilis autem Filix eiusdem cum Capillo veneris, pro quo usurpari posset, temperamenti est.

E X T R I N S E C V S.

Dioscorides Dryopterin Psilotrū esse cum radicibus tritam scribit, illi niri enim primum usque dum sudorem euocet, mox sudorem ablui, & recens imponi.

Ego sane puto posse has herbulas pro Filice, cui gustu satis respondent, usurpari.

De Polypodio. Cap. CLXXXV.

OLYPODIUM FOLIA HABET NON PERINDE TENUI incisura, atq; Filix, eaq; singula singulis pediculis teretibus & tenuissimis subnixa, parte auersa fuluis & rotundis maculis notata, copiosa ac frequentia ex una & eadem radice, quæ ipsi est pilosa, serpens, rotunda, nodosa, instar coralli, & nigra. Dersa hæc intus coloris est herbacei, austera aliquantulum, & gustu subdulcis. Polypodium caule, semine & flore caret, quemadmodum & Ruta muraria, & Filix saxatilis. Nasctur in syluis, radice in muscosis petris serpente, necnon radicibus arborum, præsertim uero quercuum, & ornorum. Non raro autem in umbrosis & uliginosis uallibus, e musco iam memoratis arboribus adhærente, Polypodium proflire uideas. Adde his quod eam radicem in Alsatia in capidibus antiquarum & cæduarum salicum affatim luxuriare uidi, gustu amariorem altera quæ syluatica censetur, qua & præstantiorem nonnulli iudicant.

NOMENCLATURÆ.

Polypodium Germani Engelsüß / nonnulli Steinfarn / hoc est Filicem saxatilem, sed perperam nuncupant, sicut & Trichomanes quidam ea uoce insigniunt, unde satis colligere licet, illos Filicem Saxatilem nunquam uidisse, ideoque nihil certi de illa statuere posse. Quidam inter Germanos Polypodium Dropffwurz, a maculis quibus notatur, plus quam aliud quodcunque Filicis genus, nonnulli Süßwurz / hoc est, Glycyrrizam syluestrem, a gustu denominant. Dioscorides *αρωματικη, αρωματικη, αρωματικη*, a similitudine

Diosco. lib. 4.
cap. 180.
nimirum

Polypodium.
Engelsüß.



nimirum & affinitate quam habet cum Scolopendrio, licet illo multo minus sit, Polyrhizon hoc est, Multiradicem, Pterita, Filiculam, & Filicularē herbam uocatum prodidit, Serapioni cap. cclxviij. Bisberg. Manlio uero Besgeg.

Cato *Feliculam*
uocauit.

Besgeg. Auicennæ deniq; Desbers, & Budeig dicitur. Phrifiſius in ſuis Synonymis plura alia recenset nomina, quæ hic omittimus. Quis enim tot barbaras appellationes enumerare poſſit.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Polypodium temperatura ſicca eſt præditum, & modice calida. Radix eius purgandi uim obtinet, in hominibus & pecoribus bilem, & pituitam trahens. Hodie internis frequentius, quam externis adhibetur corporis partibus.

INTRINSECVS.

Radix Polypodij, maxime eius quod quercubus & ſalicibus adnaſcitur, cum gallina decocta, admixto ſemine Aniſi, & gingibere, ſlauam & atram bilem, necnon & pituitam detrahit, ſi à ieiuio iuſculum illud calidum bibatur.

Quidam cum Beta, alij cum Malua decoquunt Polypodium.

Alij nonnulli Cumini Romani, ſeu ſatiui Rœniculi, Aniſi, ſemina cum radice Polypodij & Gingibere in minutas particulas conſciſis, æquali pondere cum uetulo gallo gallinaceo decoquunt, poſteaꝑ iuſculum hoc colica paſſione laborantibus exhibent. Eſtꝑ decoctio hæc medicamentum certe perquam utiliſſimum torminibus uentris.

Radix Polypodij in puluerem redacta, drachmæ pondere ad minus, ex aqua muſſa pota, ita tamen ut poſt tribus aut quatuor horis ieiuēs, n̄ ſdem pollet uiribus, quibus & decoctio iam dicta.

Aqua diſtillata Polypodij ad febrim quartanam, tuſſim, aſhma, & pulmonis affectiones, aduerſus melancoliam, & grauia & moleſta ſomnia, aliꝑ quot dies continuos bibita facit.

Cum peſtis inter ſues graſſatur, hæc radix in uino illis exhiberi poteſt, ſic enim purgabuntur, & à peſtifera lue conſeruabuntur. Nam ita uſurpari cōſueuit hodie, nulla alia proculdubio de cauſa, quam quod conſtet eam choleram trahere, quæ multum etiam ſuius negotij faceſcit. Quanquam non ignorem, Serapioni, pituitam & melancoliam extrahere. In ſumma purgandi uim maximam habet, quemadmodum Cato de re ruſtica capite clviij. teſtatur reliquit.

EXTRINSECVS.

Radix Polypodij cum melle trita, aduerſus rimas quæ inter digitos & pedes hiant, efficaciter illinitur.


De Filice maiore.

Cap. CLXXXVI.

Filicis maioris primum genus.

Groß Farn Kraut.


1.
Filix agrestis
 Vergil.
 Neglectis urena
 da Filix innascitur
 agris.



QUANQVAM FILICIS multa sint genera, quem admodum antea quoque indicauimus, omnium tamen usitatissima Filix ea est, quae in arenosis agris prouenit, unico, purpureo, rotundo, longo & laui caule, quem multifida, lateribusque pinata, & uiridia folia uestiunt. Radix huic longa, lauis, foris nigrans, longelaetque intra humum sese propagans, quo nomine magno est nocumento agricolis. Quemadmodum enim arundines in pratis herbae & graminis impedimento sunt, ita Filices frumenta in agris remorantur, atque ita quidem, ut non facile extirpari queant. Quamobrem ad superstitiones quidam confugiunt, persuasi, si frumentarius ager, quem Filix obsedit, in die Ioannis Baptistae sacro aratro uertatur, perituram Filicem, nec unquam eo in agro locum habituram. Theophrastus lib. ix. cap. viij. certiorempendendi Filices rationem demonstrat, asserens id fieri

Filicis maioris alterum genus.

Der zweit groß Farn.



ri posse fimo, qui cum omnibus frumentis tum herbis gratissimus sit, soli Fi
lici inimicus existat, ad eiusq; perniciem spectet.

Altera maior Filix, quæ & forma & colore reliquas omnes antecellit,
huic

*Filicis maioris
alterum genus.*

huic fere consimilis est. Habet namq; caules longos, uiri proceritatem attingentes, uirides plane, radicem crassam, nigram & pilosam, Folia in utroque caulis latere, pinnata, & incisuris distincta, instar foliorum Polypodij. Florem fert in uertice candidum, copiosum, Pycnocomo similem, qui circa festum Ioannis Baptistæ nullo post se relicto semine decidit. Raro equidem hoc Filicis genus reperitur, nec multis cognitum est. In Vuasgoiæ altissimis syluis, prope Circulum arcem Ducis Bipontini, prouenit. Atq; has duas Filices quas hoc capite descripsimus, masculas, & maxima genera Filicum esse statuimus. Antequam uero ad nomenclaturas & uires Filicis transeamus, de semine eius nonihil dicendum erit. Tameſsi namq; omnes qui de herbis scripsere, Filicem neq; florem, neque semen proferre asserant, tamen rem aliter se habere non semel ipse comperi, quod hoc loco in gratiam studiosorum herbarie rei commemorandum duxi. Nam cum quaternis annis ex ordine in uigilia, ut uocant, festi Ioannis Baptistæ, noctu id semen indagare constituissem, inueni summo mane, antequam illucesceret, nigrum, exiguum, Papaueriq; haud absimile semen, quod ut colligi posset, expanderam prius sub Filicibus pannos, & Verbasci folia. Multæ autem Filices nullum semen reddebant, cum sub alijs uicissim singulis, centena liceret seminia legere. Cæterum id negotij, nullis characteribus, nullis coniuurationibus, nullis preculis, nulla deniq; superstitione usus sum, sed citra huiusmodi Magicas uanitates semen hoc duobus aut tribus comitibus stipatus, igne per uiciniam eam incenso, totaq; nocte flagrans, quæsiui, quæsitumq; nonnunquam inueni, aliquando non inueni, nunc multum, nunc parum colligens. Quare uero hæc diuersitas contingat, aut quid sibi in ea re natura uelit, mihi sane non constat.

Semen Filicis.
Farn samem.

NOMENCLATURAE.

Germani Filicem maiorem, Grossen Farn/oder Farnfraut appellant. Dioscoridi *πριον*, & *πριον* dicitur. Alij ut idem autor scribit, Pterineon, alij Dasyclonon, alij Anasphoron, alij Blechnon, alij Polyrhizon uocant, Magi Hermubain, Romani Filicem, alij Iaculam, alij Filis fanariam, Aegyptij Asini sanguinem. Nicandro in Theriaca Bletrum, seu Blethrus, Serapioni Sarax. Auicennæ, Childarum, uel Kildarum appellatur. Obseruandum hoc loco, subscripta nomina, Pteris scil. Pterion, Filix, Filicula, Polyrhizon, omnibus fere Filicū generibus attribui. Mirari autē satis non possum, quo pacto Filiculæ appellatio, ad Catanancem, de qua Dioscorides lib. iij. cap. cxxix. agit, peruenierit, ut uel hinc uidere sit, exemplaria Dioscoridis undiq; fere erroribus scatere, maxime quod ad nomenclaciones attinet.

VIRES

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Filices apud nos raro in medicina locum habent, quanquam enecandis latis uentris tinea conducant, natura sua sicca temperaturæ.

INTRINSECVS.

Radix in puluerem redacta, ac pondere semunciae ex aqua mulsa sumpta, latis tinea uentris excutit. Quod si Scammoneam aut Veratrum nigrum adieceris, eo efficacius euadet medicamentum. Sed qui sumunt alia prægustare debent.

Radix uiuo decocta ac per aliquot dies pota, laborantes lienis incremento recreat.

EXTRINSECVS.

Radix & potu & illitu cum axungia uulneribus sagitta arundinea est auxilio, nam impactas carni arundinis particulas extrahit.

Ad ambusta uel igne, uel seruida aqua aut oleo, singulari experimento radice succus expressus facit, si ei miscueris aquam rosaceam, aquam e simo vaccino, aut e flore tiliae distillatam, uel si harum nulla suppetat fontanam, posteaq; percolaueris, tum enim lentus quidam succus ex his cōficietur, qui mirifice ambustis ubi reliqua omnia medicamenta negauerint auxilium, medebitur.

Mirum & utilissimum experimentum.

De Filice sylvestri, seu uulgari.
CAP. CLXXXVII.

V **VLGARIS ALTERA FILIX PASSIM IN VMBROSIS, uliginosis, & arenosis uallibus, limitibus etiam quibusdam agrorum, & arenosis saxis, foelicissime autem in syluis prouenit, radice compacta, pilosa, & inuicem contexta, cespitis instar, radicem Scolopendriae referente, e qua Aprili mense multi exeunt asparagi, primo exortu inflexi, cano capillitio obducti, nō aliter atq; Scolopendriae primæ folia, atq; n̄ progressu temporis in magna tandem folia abeunt, instar reliquarum Filicum lateribus pinnata, pediculo purpureo & hirsuto suffulta. Cæterum incisuræ horum parte auersa Maio mense quamplurimis exiguis, rotundis, & excrementis bruchorum similimis punctulis notantur, quæ cum maturuerint, ac nigra euaserint, id quod circa festum Ioannis fieri solet, prorsus decidunt, & a mulierculis quibusdam colliguntur, proq; Filicis**

Filix vulgaris.

Waldsfarn.



semine deinceps uenduntur. Nolo enim recensere quas uanitates & super-
 fustiones eiusmodi semine exerceant. Hoc genus Filicis saporem præ-
 se fert subamarum, acralem prorsus qualem glandes habent, quem neote-
 nici medici Ponticum nominant.

NOMEN

NOMENCLATURAE.

Cum ista Filix plerunque in syluis, locisque saxosis moretur, a Germanis *Waldfarn*, a Dioscoride uero *ἰακίνθῳ*, Formella Filix, & Nymphaea Pteris dicitur. Diosco. lib. 4. cap. 179. De Nymphaea suo loco dicitur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Hanc Filicem formellam esse tradunt, temperamentum pene idem, eademque cum praecedenti facultates obtinentem.

INTRINSECVS.

Radix in puluerem redacta, & pondere iij drachmarum ex aqua mulsa latis lumbricos, ex uino uero sumpta, longas & teretes tineas pellit.

Radix isthaec mulieribus inimica, sterilitatem enim facit, conceptionem impedit, aliaque efficit, quae honestatis gratia omittimus.

Quod si equus conciderit, nesciaturque qua aegritudine laboret, particula huius radices, linguae eius subiiciatur, quo facto equus confectum utrinque desiciet recrementa, rursusque consurget, id quod ipse ita se habere comperi.

Folia Filicis tenera adhuc decocta & comesta, uentrem emolliunt.

EXTRINSECVS.

Radix in puluerem redacta humidis ulceribus, & cicatrici repugnantibus inspargitur. Pari ratione iumentis adhibetur.

Filices siccatae, uice straminis asseruantur pro pecoribus, maxime in his locis, quae a culta terra longius absunt, ut sunt pagi in Hercinia sylua, aliisque similibus sitis.

Haec fere habui, quae de Filicibus dicerem, superest ut explicatis syluestribus nonnullis plantis ad hortos nostros, qui multis & elegantissimis sca- tent flosculis nos recipiamus. Sed antequam ad Scolopendriae, nam de illa proximo capite agere statuimus, uaria deueniamus genera, uice coronidis de Filicibus quaedam proferemus, non iniucunda cognitu. Primum itaque scribunt ueteres Filicem arundinis familiaritatem plane refugere, ita quidem ut perituram dicant Filicem, quam per ambitum lata copiosior arundo coronet, & contra euanescentem abituram arundinem, quam oblespens multa Filix in orbem cinxerit: hoc est, quantum ego quidem intelligo, quemadmodum arundo nusquam laetius prouenit, nulloque alio genitali loco gaudet, quam fossis, uliginosis & humectis pratis ac campis, ita Filix syluis, torulenti saxis, arenosis agris & limitibus in primis gaudet, ita ut binae

Cornelius Celsus lib. 5.

hæ plantæ, ob diuersitatem natalis loci, simul habitare non possint. Deinde de uero, quam contrarijs polleant uiribus, & quemadmodum altera alterâ expellat, breuibus uerbis declarauit. Plinius, cum lib. xxiij. cap. xi. in hunc modum scribit.

Siquidem harundinis radix contrita et imposita, Filicis stirpem corpore extrahit, item harundinem Filicis radix. Hæc ille.

Postremo & hoc admiratione dignum censeo, quod Filicis maxime uero masculæ radix incisa, utraque in parte aquilam nigram duo habentem capita ex albo ostendit, quæ nihil aliud re ipsa est, quam congeries uenarum quæ per uniuersam radicem sparsæ sunt. Quæ cum ita se habeant, non semel cum amicis deposui, me uno ductu seu una incisione insignia Imperatoris Romani posse depingere. Atq; hæc hæcenus, nunc ad Scolopendriam accedamus.

De Scolopendria.

Cap. CLXXXVIII.

VULGARIS SCOLOPENDRIA SEU UT VOCANT


V. Lingua ceruina, nullo ex femine sed sponte sua in umbrosis & uiliginosis montibus, uallibusq; necnon quibusdam fontibus, & humectis muris nascitur, præsertim uero in montanis Heluetiæ, & sylua ea quam vulgo den Westerswalde nominant, e regione Mosellæ, & in ijs montibus qui ad Comitatum Valentis pertingunt. Quanquam hodie passim in hortis plantari consueuerit, Hæc si uires & odorem spectes, Filicis genus facile fuerit. Habet enim uillosam radicem, compactam, nigram & capillatam, non aliter atque postrema quam descripsimus Filix. Folia profert longa, linguæ aut lieni non dissimilia, lunæ corniculantis instar falcata, caule uidua, nisi quod fusca, rotunda & lanuginosa per folium procedens uena uicem illius obire uidetur. Singula folia parte auersa multis subul teis lineolis, quæ uer miculos repræsentant, notantur. Cæterum ea appetente Maio mense recurua & lanuginosa prodeunt primum, quemadmodum & Filix. Hanc Scolopendriam nonnunquam in fontibus & antiquis ac humectis muris, admodum exiguum inueni, ita ut digitum uix excederet, nec binis aut ternis plura haberet folia, quæ cum in hortos meos translata fuisset, maior deinde euasit.

Alterum Scolopendrium seu Asplenon similiter in tenebrosis, & humidioribus syluis, uidelicet in sylua Hercinia, & ea quam den Ydar nominant, Vuasgoia, & monte tonitruui inueni, radice præditum, nigra, uillosa, compacta, ac inuicem cespitis instar contexta, e qua supra sexaginta aliquando folia,

^{1.}
Vulgaris Scolopendria.

^{2.}
Asplenon syluestris.

Scolopendria vulgaris,
Bizzung.



folia, primo exortu linguae ceruinæ modo recurva, postea cum se explicue-
rint, nō tam lata quam illius, sed astrictiora apparent, utrinq; profundis, me-
diamq; uenā quæ punicea est coloris, et uicē caulis tenet, attingentibus incisū

Mm in


Asplenon sylvestre.
Waldt Asplenon.



ris diuifa, nequaquam in altum erecta, sed humi procumbentia, uermemq;
per omnia longum imitantia exeunt. Iunio mense appetente alia multa &
longe angustiora prioribus folijs subnascuntur, Polypodi inftar incisa, in
altum

Scolopendria uera.

Des recte Scolopendrium.



altum sese attollentia, longissimis gallorū gallinaceorum pennis similima, altera sui parte exiguis & luteis punctulis notata, sicut & Polypodij, proinde uena ea quæ per mediū folij transit, punicea est coloris. Autumno accedente hæc quæ iam diximus folia, protinus pereunt, reliqua uero quæ subinde noua erumpunt, humi per totam hyemem illæsa procumbunt. Elegantissima sane planta, sed quæ non passim occurrat. Vbi tamen inuenitur, ibi magna copia prouenire solet.

Tertia, eademq; uera ac minima Scolopendria, quam Dominus Georgius Ollinger Norimbergenfis ciuis, ad me e' Norimberga misit, in asperrimis montibus e' scissuris petrarum profilit, non aliter atq; Ruramuraria, folio haud temere supra digitū longo, incisuris ueluti Polypodiū diuiso, sed breuiori, & angustiori, superne uiridi, inferne uero aspero, sublutco, ac puluerulento quasi, densæ & frequenti. Nam ex

^{S.}
Vera Scolopendria.

unica nigra, uillosa, & capillata radice, quadraginta nonnunquam, interdum & pauciora, proueniunt.

NOMENCLATVRAE.

De uulgarī nostra Scolopendria, quam Germani *Sirzjung*/ hoc est, Linguam ceruinam, appellant, magna apud scriptores rei herbariæ controuersia uiget, quam qui cognoscere uolet, is Manardum, Nicolaum Leonicensem, & Cordum legat. Nos in præsentia quædam, quæ ad rem facere uidebuntur, in medium afferemus. Sunt ergo qui putent eā esse Asplenon Dioscoridis, alij Hemionitum, alij Phyllitum, esse iudicant. Atq; horum quidem sententiam approbo, tam eorum qui Phyllitum, quam qui Hemionitum eam statuunt. Nam quemadmodum & in Dioscoride, & in alijs scriptoribus unam eandemq; plantam binis & diuersis capitibus & nominibus descriptam uidemus, unde non raro contentiones ortæ sunt inter doctos, ita dubium mihi non est Phyllitum & Hemionitum unam & eandem esse stirpem, sed gemina appellatione appellatam, diuersisq; capitibus explicatam. Phyllitum Dioscorides *φύλλιδα, ἀκανθου*, hoc est, caule uiduam, & *λάπαθον ἄγριον*, Rumicem agrestem, & Pyrgitum a turribus, quod ad radices earum nascatur. Hemionitum uero & *σπληνιον*, Splenion (quod si Germanice interpreteris *Milzfraut* significabit) uocari tradit. Splenij autem uox controuersie cuius suprameminimus, occasionem dedit. Cum plerique sentiant uulgarem suam Scolopendriam, non tantum Splenion, sed & Scolopendrion uocandam, ita ut ad Asplenon. siue Scolopendrion Dioscoridis referatur illa. Proinde in eo uersatur error, quod Splenion duarum plantarum commune nomen est, & isti sane non nisi unam illam & uulgarem Scolopendriam cognitam habent. Quod si hi inter Nymphas, in syluis inquam & montibus herbarum cognitionem consequi studuissent, dubium mihi non est, quin multæ controuersie, quæ in rem herbariam inciderunt, iam dudum sublatae fuissent. Sed omiſſis his quid de memoratis plantis sentiamus tandem explicemus, nequaquam enim scriptis nostris alios offendere, sed ueritatem inuestigare propositum nobis est. Vulgata itaque nostra lingua Ceruina, Hemionitis, & Phyllitis Dioscoridis nobis creditur, ita ut ea bis ab autore ut in alijs quoque stirpibus non semel contigit, descripta uideatur, possetq; Splenetica & Lunata, Germanis *Milzfraut*/ seu *Monfraut*/ a foliorum forma appellari. Nicandro Petalites dicta. Huic nostræ sententiæ doctissimus uir Manardus Ferrariensis lib. xviij. epist. iij. subscribit. Seplasiarij Serapionem secuti Scolopendriā uocant, necnon & Ceterach (tametsi Asplenon de quo statim dicemus, id nominis a nonnullis tribuatur.) & herham doratam, & Calcifragam, Spicantum, & Filicem petream. Atque hic uidere est, quam perniciosæ sint contentiones in his rebus, ut quæ errores non leues, rerumq; ipsarum obscuracionem pariant, quanquam quod cuiq; maxime placuerit id sentire ipsi per nos liberum esto. Nos (ut pergamus) secundam.

Diosco. lib. 3.
cap. 142.

φυλλίτις
Diosco. lib. 3.
cap. 112.
ἡμιονίτις
Dioscor. lib. 3.
cap. 143.

dam a nobis in hoc capite descriptam herbam uerum Dioscoridis *ἄσπληνον*, Verum Scolopendrium, seu Asplenon. quod ille & Scolopendrium, & Splenion, & Hemionium, Pterygo, Lonchitum, Aturion, Phrygiam, Phrygitum, Philtradoten, Mustelæ sanguinem Aspleni nomen apud Apul. & cognominari tradit, esse censemus. Equidem Lonchitis appellatio, quæ capite clij. lib. iij. a Dioscoride describitur, non male quadrat ad hoc nostrum Asplenon, quod & Simoni Ianuensi, teste Manardo, olim cognitum, & Cistrium appellatum fuit. Iam ut Splenis uox Apuleio Cynoglossæ quoque ascribitur, ita, eadem a Plinio Hemionium insignitur, quod & Teucrium a rege Teucro nuncupat, quo in loco hoc nostrum secundum Asplenon seu Scolopendrium intellexisse mihi uidetur. *Callitricho, & Saxifragæ attribuitur, uide caput 47. & 97. Apul. cap. 96. Plinius lib. 25. cap. 5.*

Tertia Scolopendriæ species a nobis posita, Filix petraea, Germanice Steinfarn non inepte dici posse, ac uerum Scolopendrium ueterum esse, ideoque ad caput cxlij. lib. iij. apud Dioscoridem referendum, arbitramur.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Tres istæ Spleneticae herbæ naturam habent siccam, et aliquantulum calidam, possuntque utrinque corpori adhiberi. Posteriori in tamén efficacior em. iudico, cæterisque præferendam.

INTRINSECVS.

Herba uulgaris Scolopendriæ uino decocta & pota, serpentium moribus aduersatur, quadrupedibus per os infusa auxilio sunt.

Prædicta decoctio potui datur calida, si dysenteria, aut resoluta aluus & diarrhoea exercet.

Folia aceto decocta, per quæ dies aliquot pota lienem absument.

Alterius Scolopendrii uim hanc habent folia in aceto feruæ facta, ut per dies quadraginta pota lienem absument, quibus etiam contritis lienem ex uino illini oportet.

Hoc Scolopendrium siue syluestre Asplenon uino decoctum, & potum, morbo regio prodest, in catus iocinoris & lienis aperit, calculos renum & uesicæ pellit, febri quartanæ auxilio est, nam atram bilem discutit, sanguinem ex casu aut contusione concretum a corde submouet, stranguriæque medetur. Quæ hic recensuimus uulgaræ Scolopendriæ a nonnullis ascribuntur. Quia uero experientia id nondum confirmauit, ideo præcipue ad Scolopendrium uerum quod tertio loco posuimus, pertinere uidentur.

Utriusque Scolopendriæ, uulgaræ inquam & ueræ, aqua distillata pota, cor confortat, singultum quiescat.

E X T R I N S E C V S.

Vtriusque Scolopendriæ aqua columellæ supra modum humectæ, gar-
garillatu prodest.

Eadem stupa Cannabina imposita ardorem epatis & stomachi extrahit,
malignaq; ac aperta ulcera & uulnera collutu mundificat. Quidam (q̃d co-
rollarij uice adijcere placuit) has herbas aut mane ante ortū solis, aut uespe-
ri antequam Luna appareat, colligunt, persuadētes sibi ipsis hac ratione uul-
sas efficaciores euadere.

De Musco terrestri, & Sauina syluestri.

CAP. CLXXXIX.

1.
Muscus terre-
stris.


A NTEQVAM AD HORTENSES STIRPES ACCEDA-
mus, expediemus nos prius a binis istis plantis syluestribus. Ea-
rum prior caule & semine caret, & nihil aliud est, quam siccus, &
serpens quidam muscus, qui multifariam dilatatus tenuissimis quasi filis,
quibus radicis uice utitur, petris adhærescit, seq; serpendo uulgari syluestri
& saxatili musco admiscet, per omnia uermi admodum longo (nam inter-
dum nouem cubitos lōgitudine equat) & hirsuto similimus. Mense Iunio
fulos non aliter atque Corylus emitit digitum longos & luteos, qui fari-
na aspersi uidentur. Atq; hic illius flos esse uidetur, qui & protinus sine fru-
ctu decidit. Reperitur in syluis ac desertis, cuiusmodi sunt, Hercinia sylua,
& ea quam den Odenwalde / den Speßhart / den Westermaldi / & Ydar ap-
pellant, item & in Vualgoiæ plerisque locis. Virgines, & ferra & cingula ex
hoc musco conficiunt.

2.
Sauina syluestris Ceterum in aruosis altissimorum nemorum locis dodrantalis nascitur
herbula, æstate & hyeme uiuens, per omnia Sauinā fatiuam referens, odore
omni destituta, gustu plane amara, quæ Musci terrestris instar luteos in ca-
cumine fert iulos, qui & ipsi nullo post se relicto fructu, protinus pereunt.

N O M E N C L A T V R A E.

Germani uarijs nominibus priorem plantam donauere Beerlappen/
Teuffesflawen / Seil / oder Gürtel fraut / Kleinbeyl / Kleinleych / Bar-
schar / & Gürtel fraut illam appellantes, Latine Muscus terrestris non ma-
le dicetur. Dioscorides lib. iij. cap. xciiij. plantam quandam *ἑρπύλλιον*.
Muscum marinum uocat, quod de corallio interpretatus est Manardus lib.
xi. epist. iij. Quoniam uero hic noster Muscus forma sua corallium imita-
tur,


Muscus terrestris.
Beerlap.



sur, ideo Muscum terrestrem in præstantia appellare volui, alias enim cum
nonnullis alijs herbarijs Soldanam, & Soldanellam appellare solebam,
quam Serapio cap. lxxv. Chalkile & Solabar uocat. Hic uero aliqui clama-
bunt

Sauina sylvestris.

Wald Seuenbaum.



bunt Soldanam esse Brassicam marinam, quibus nequaquam repugnamus, quocunque tandem nomine illam uocare uoluerint. Neque enim de illa nunc agimus, sed de ea potius, qua hodie ad calculos utuntur, & restituendum uinū.

Altera herbula quod ad formam attinet Sauina sylvestris, seu sterilis, Germanice Waldseuenbaum nuncupabitur.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Musculus terrestris siccam, Sauina sylvestris, calidam & siccam qualitatem obtinet.

INTRINSECVS.

Musculus terrestris uino decoctus ac potus, calculos comminuit & educit, experimento, ut plerique testantur, certissimo. Nonnulli etiam aquam ex eo distillant, ad eandem affectionem.

EXTRINSECVS.

Musculus terrestris contusus, aut in uino decoctus,

dolorem & inflammationem sedandi uim obtinet, id, quod podagræ calidæ impositus prodest.

Musculus

Muscus terrestris uino pendulo impositus, intra paucos dies illud restituet. Tantum autem Musci accipiendum erit, quantum vas ipsum, siue paruum siue magnum postulare uidebitur. Hinc quidam apud Germanos Muscum terrestrem Weingrein nominant.

De Viola nigra seu purpurea. Cap. CXC.

SYLVIS AD HORTOS NOSTROS TANDEM ACCE-
dimus, in quibus odoratissima & speciosissima sese primum om-
nium offert viola, quam purpuream seu nigram uocauere. Eius
duo sunt genera, quorum alterum & præstantissimum quidem purpureo
seu nigricante potius, interdum etiam, ac rarissime, candido flore, simulq;
odorato: alterum uero cœruleo, & inodoro flore conspicuum apparet,
ideoq; sylvestre hoc, illud satium censebitur. Folium utriusque idem, rotun-
dum nimirum, forma Asaro aut Chamæcisso, uel certe Hederæ respondens.
Hoc humi procumbit, sine caule, & sese non aliter atque Fragaria serpendo
propagat. Violæ ipsæ nudis suffulciuntur pediculis, fila referentibus, digi-
tum longis, singulis singulæ quinis ut plurimum distinctæ foliolis, quorū
mediū pileolo quodam opertum uidetur, intrinsecus luteo puncto notatū.
Folijs decidentibus capitula rotunda pisifolia, seminis quod cum milio
conferri possit, plena relinquuntur. Violæ postquam defloruerunt duplici
ratione repullulascunt, ex semine deciduo, deinde filis suis quæ Fragariæ
instar, longe lateq; per terram extenduntur, qui sit ut ex uno fruticulo deni,
aut duodeni alij procreentur, quos subinde alio transferre & plantare pos-
sis: Atque hac de causa non iniuria violæ inter Serpentarias herbas, & He-
deras connumerari queant.

^{1.} Viola odorata,
purpurea, ali-
quando et candi-
dis prædita fo-
liolis.

^{2.} Viola purpurea
sylvestris.

NOMENCLATURAE.


Nobilissimi hi flosculi, qui Martio primum mense profiliunt, nouumq;
ver annunciant, Germanica lingua Diolen, & Nierzen violen. Latine vio-
læ purpureæ seu nigræ dicuntur. Græci *ἰορροφίδιον* uocant, à Virgine Io in
vaccam à Ioue conuersa, qua de causa latine fortasse Vinulina pro Viola ap-
pellari possit. Sylvestris Viola, canina cognominatur, Germanice Hundes
violen.

Viola Martia,
quadragesim-
a malis quibus-
dam.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Violæ frigida sunt & humidæ naturæ, ardentibus febribus intro sume-
ptæ, & foris impositæ quam utilissimæ.

INTRIN-

*Viola Martia.**Morgen Viol.*

Viola cantina,
seu sylue
stris.
Rundes Viol.
len.



INTRINSECVS.

Et violis nigris seu purpureis, acetum, oleum, conseruæ ut vocant, Zula-
 pia, & Serapia conficiuntur. Quibus Saccharum per uitæ rationes emere
 non

non licet, ij violas in aqua decoquant, & ad quasvis calidas affectiones adhibeant, præsertim uero pueris, qui morbo comitiali, & ardentibus febribus non raro infestantur. Quo pacto violas uero decoquere oporteat pauperes præcipue, quibus sumptus non suppetunt, docebimus. Accipiant ergo illi violas Martias cum adhuc odoratae sunt & in flore, ac in cantarum insectas, aqua feruenti super infusa per horas sex aut octo macerent: deinde expressis flosculis aquam eam rursus seruefactam alijs & recentibus violis super infundant, per q̄ sex aut octo horas violas ea aqua macerent, posteaq; exprimant; quod cum ter aut quater prædicto ritu fecerint, aquæ toties violis super infusæ & expressæ Sacchari optimi tantum admisceant, quantum aquæ quantitas postulare uidebitur: & demum aquam cum Saccharo super carbones ardentes paulatim decoquant, donec spissetur mellis instar de spumati: atque tunc decoctio illa ubi refrigerit, uitro angustiori & diligenter obturato ad usus conseruetur. Ista ratione Serapia e' rosis alijsq; recentibus herbis & floribus confici possunt.

Serapium violarum, mensura duum aut trium coclearium sumptum ardores febrium acutarum tollit, laxam aluum conseruat, emollit apostemata, roborat cor, pleuritidi medetur, breuiter omnibus calidis affectionibus summe conducit. Sunt qui Serapium violarum aqua fontana misceant, sicutq; restinguendæ exhibeant, quæ sane potio ægrotantibus non potest non grata esse.

Id quod in medio residet violæ luteum punctum, negligi non debet, sed diligenter asseruari, nam decoctum in aqua & potum Anginæ auxilio est, & comitialibus maxime in pueris, uti tradit Dioscorides.

EXTRINSECVS.

Violarum oleum, aqua distillata, & acetum, dolorem capitis sedandi uim habent illitu, necnon inflammationibus epatis foris imposito, opitulantur.

De Leucoij uarijs generibus. Cap. CXCI.

VLTI SANE FLORVM GENERIBVS, VIOLAE

M nomen communicatur, præsertim uero ijs, quæ forma sua ad violas Martias accedunt, cuiusmodi sunt Peruincæ, Herbæ trinitatis & Gamandreæ, aliq; id genus flores. Dioscorides lib. iij. cap. cxxix. Luteas violas in primis commendat, quæ & ipsæ Germanis cognitæ esse ceperunt.

Viola lutea.

Viola lutea.

Gál Violén.



2.
Sylueſtre Viola
la lutea.

coeperunt. Nam ubicunque plantatæ fuerint, ibi nullo negotio proueniunt, maxime uero in muris & antiquis ædificijs. Colonie certe paſſim in muris reperiuntur, nuſquam autem maiori copia quam in muris cathedralis (ut uocant) Eccleſiæ, quo in loco eſt iuncturis ſaxorum, procul dubio citra ſationem & culturam, quod admiratione dignum cenſeo, proſiliunt. Frutex euadit arbuſculæ comparandus, ramolis, folijs oblongis & anguſtis herbacei coloris ueſtus, in cuius cacuminibus quam plurimæ erumpunt violæ, quadrifoliæ, nonnunquam & quinqueſoliæ, odoratiſſimæ, idcirco dum adhuc recentes fuerint, alias enim inodoratæ ſunt, quæ cum deciderint ſiliquas poſt ſe relinquunt quincunciales, ſemine lato & luteo reſeratas. Floret bis in anno, nimirum uere appetente Maio menſe, & Autumno appropinquante. Nonnunquam & per hyemem illæſi hi fructes perdurant.

Sylueſtre huius genus, herba, caule, radice, & flo-

relatiuo ſimile exiſtit, niſi quod flores habet perexiguos, & prorsus inodoros, Naſcitur inter cætera hortorum uicia, ſed non ubique locorum.

Sunt

Viola purpurea, coerulea, rosea, candida.

Braun/rot/leibfarb ꝛc. Violaten.



Sunt uero & aliæ violæ ^{3.} quæ per hyemem quando *Viola alba, ro-*
 que florent, in quadragesi- *se, rubra.*
 ma interdum incipientes,
 flore aliæ albo, aliæ roseo,
 nonnullæ rubro; quæ-
 dam etiam purpureo con-
 spiciuntur, quod ad culturam
 attinet teneriores, nam
 has antequam hyemis fri-
 gora ingruant in figuli-
 na transplantare, cellisq;
 uinarijs alijsue calidiori-
 bus locis committere sole-
 mus. Hæc omnia violarum
 genera, caule, ramis, folijs,
 seminumq; receptaculis ma-
 iora sunt luteis, substantia
 teneriora, folijs latioribus,
 pallidioribusq;, & ad cine-
 reum colorem magis acce-
 dentibus, ornata. Flores
 istorum recentes, admodum
 odorati sunt. Primo anno
 cum ex semine nati fuerint
 hi frutices florem non fe-
 runt, sicut & luteæ violæ,
 sed altero demum.

Rursus in hortis puella- ^{4.}
 rum violæ aliæ primo an- *Viola diversico-*
 anno ex semine exortæ flo- *lores, aliose.*
 rem ferunt, idq; Iunio & Iu-
 lio mensibus, aliæ album,
 aliæ roseum, nonnullæ ru-
 brum, quædam purpureffi.

Porro uniuersæ hæ violæ odoratæ, iisdemq; folijs, caulibus, siliquis, & se-
 minibus, superioribus violis prope consimilibus, sed magis exiguis, te-
 nerioribus, & angustioribus præditæ sunt, frigoris impatientissimæ.

Quamobrem ubi primum semen in siliquis suis maturuerit, prorsus pereunt ipsi frutices, ideoque antequam hyemis frigora adueniant, semen legere, posteaque verno tempore rursus terræ committere consentaneum est. Cæterum semen hoc terræ mandatum, non aliter atque Basilicon, binis folijs primum emergit.

NOMENCLATURÆ.

Quotquot de violis scripserunt, ñ, omnes violas cuiuscunque sint coloris, uno nomine Leucoia nominant, unde Hippocrates ipse nigra Leucoia, hoc est, Martias violas querere iubet. Cæterum Leucoi quox, nihil aliud significat, quam violam albam. Sed utcunque se hæc habeant, parum forte referret, quo nomine plantas appellaremus, modo de ipsis plantis certi essemus, cum & ipse Dioscorides, omnis generis violas Leucoia nuncupat, adiiciens insuper alijs hoc violarum genus, Basilion, Latinis violam albā, aliquibus Augustiam, nonnullis violam matronalem, aut Passarinam, aut Polyphuram, dici. Hermolaus Barbarus testimonio fretus Columellæ, Ligustriam Romanis, hanc violam uocatam tradit. Serapio bina habet capita quæ an ambo ad has nostras pertineant violas, nunc definire nolo, quin in præsentia sub priori, hoc est, clxxvi. Herbam Trinitatis, de qua sequenti statim capite, sub posteriori uero, hoc est, ccx. in quo Keirici describitur, ista nostra Leucoia comprehendam. Diuersæ porro hæ violæ, a diuersitate colorum apud Germanos nomina sua sortitæ sunt,

nam	{	luteæ	}	apud illos	{	gäl	}	Violaten / dicuntur.
		albæ				weiß		
		purpureæ				braun		
		rosæ				leibfarb		
		rubræ				rot		

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Inter omnia violarum genera, luteæ in medicina commendantur, calido fere temperamento præditæ, præsertim aridæ.

INTRINSECVS.

Viola lutea in uino decocta sicut & aqua distillata, uitijis epatis & renum apprimè conducit, venerem stimulat, per diem bis pota, quatuor aut quinque coclearium mensura:

Semen eiusdem & succus, si è uino bibantur, non solum menses, sed & secun-

Diosco. lib. 3.
cap. 129.
xviiiij.

secundas & emortuos partus extrahunt. Neq; debent exhiberi nisi summa in necessitate constituta.

Flosculi recentes in aqua decocti, & poti, contra uulæ inflammationes ualent.

Aquam violæ luteæ distillatam, per aliquot dies continuo usurpatam, omnia interna membra roborare, sanguinem & mentem exhilarare, dolorem sedare, & quietem inducere tradunt.

EXTRINSECVS.

Succus omnium violarum oculis inditus, purgat illos, omnesq; maculas & caligines discutit.

Aqua distillata cum melle, oris ulcera sanat.

Radix luteæ violæ aceto decocta & imposita, lienem & podagram sedat, teste Plinio.

De Herba Trinitatis.

Cap. CXCII.

HERBA TRINITATIS DVVM QVOQVE EST GENERUM, alia enim satiuæ, alia sylvestris dicitur. Satiuæ incolumis per

hyemem in hortis interdum conseruari potest. Ea flores habet diuersi colores, inodoratos, singulos singulis pediculis nitentes, instar violæ Martiæ, quinquefolios, quorum bina superiora folia plerunque plane purpureo sunt prædita colore, reliqua tria cœruleo. Non raro autem bina quæ purpureis coniunguntur foliola alba sunt, tertium luteum cernitur. Rursus tria alba quæ purpureis subsunt foliolis, quandoque cœsi existunt coloris. In horum omnium medio stella emicat lutea, quinis aut septenis nigris lineolis ueluti radijs quibusdam distincta. Folia huius plantæ serrata uisuntur, Nasurtio aquatico tenero adhuc fere similia, aut Grossulari ut uulgo nominant, nigricantia. A flore capitula conclusa gerit, quæ cum maturuerint, rumpuntur protinus, atque tunc semen apparet exile aurei coloris, Chelidonio minus. Radix illius brevis, multoq; capillitio fibrata. Floret per totam æstatem:

At sylvestris quæ sponte in hortis & frumentis nascitur, uitium frugum & hortorum merito censebitur, satiuæ per omnia similis, nisi quod flosculos magis exiguos procreat, candidos & luteos, interdum etiam cœruleos, & luteos. Semen idem cum satiuæ habet.

NOMENCLATURAE.

Quantum mihi quidem uidetur, hæ ipsæ violæ, proculdubio eæ sunt, quas

1.
Herba Trinitatis satiuæ.

2.
Florum Trinitatis tria genera.

3.
Herba Trinitatis sylvestris.

Herba Trinitatis.

Dreissam / oder Dreisaltigkeit.



gros.
p. d. p. p.
d. d. d. d. d.
Sunt qui Rosam
Marianam, lo-
uis florem, et Ta-
geten (ut quidā
uocant) Indiciū,
Violam flamme-
am, seu Phlogi-
on esse dicant,
que sententia nō
usq; adeo mihi
improbatur.

Columella Sarranas non i-
nat, nec dubito quin per
Flammeam & Phlogen,
herbam Trinitatis intel-
lexerit Plinius lib. xxi. ca. xi.
ita ut Phlogion dicatur sa-
tiua, Phlox uero syluestris.
Si quis uero Iouis flammā
& Iouis florem hanc violā
appellare uoluerit, cum eo
non multum digladiarim.
Ego sane ut & hoc addam,
hanc plantam ad caput
clxxvi. Serapionis refero,
ubi Iesemin describitur, cu-
ius Dioscorides lib. i. cap.
lxxii. meminisse uidetur,
cum docet salmini olei con-
fectionem. Nostri herbarij
& seplasiarij Herbam Tri-
nitatis, & Iaccam, forte nō
sine errore, cum porius Ias-
me dicenda erat, nonnulli
& violam Albeset, Germa-
ni Dreissaltigkeit / & qui
Rheni tractum incolunt,
Dnnūs sorg nuncupant.

**VIRES AC TEMPE-
ramentum.**

Herba Trinitatis nec-
non flores eius, mediam
obtinent temperaturam, in

ternis corporis partibus medendis, quam externis usitatiores.

INTRINSECVS.

Aqua distillata puerorum inflammationibus, & torminibus uentris
auxilio

auxilio esse quandoque pota traditur. Hodie apud mulieres in usu est.

Eadem (uti testantur plerique) pus in pulmone & thorace collectum purgat, si continuo bibatur, eaque uinum misceatur.

Herba Trinitatis anginae suum medetur.

EXTRINSECVS.

Virginum fertulis hæ & aliæ plæræque violæ natæ sunt præcipue.

De Baptifecula. Cap. CXCIIL

BAPTISECVLA (VT VVLGO VOCANT) CINERACEA habet folia, angusta, & acuminata, quorum nonnulla auri- Baptifecula
ria genera.
culas binas obtinent, ueluti Saluia minor. Frutex est surculofus, multisque ramis brachiatus, flore (quem in incisis Iunii mensis fert) alias candido, alias purpureo, alias cœruleo conspicuus, nonnunquam etiam cœruleo candidus interspersus color cernitur. Hi flores e calyce paruulo, rotundo, & squaroso profiliunt, cumque deciderint, uascula seu capitula illa, albo, & capillato semine referta relinquuntur. Posset hæc planta Scabiosæ generibus accenseri. Puellæ hodie in hortis hos flores plantant, præsertim uero niueos, purpureos, et mixtos, nam cœrulei passim in frumentis reperiuntur.

NOMENCLATVRÆ.

Sunt qui & hunc florem Flammeam violam, Rosam Græcam, & Matronalem dictum uelint, quæ appellationes partim ad herbam Trinitatis pertinere superiori docuimus capite. Hermolaus Barbarus Cyanum uocat, nīar.
Diosco. lib. 2.
cap. 105.
& Alysum in patria sua dici testatur. Nobis sane uidetur esse αλχμς γερμανικη
Dioscoridis, quam ille Athanaton, hoc est, immortalem, Acylonium, Ballaryon, Gruis pedem, Corymbion, Taurion, Sceptrum, Maloion, Semon Sanguinem Apocathemenes, Genicularem, & Ballariam, cognominat. γερμανικη.
Inter has uniuersas nomenclaturas nulla est, quæ aptius respondeat huic plantæ, quam Gruis pes. Folia namque illius antequam exaulescat, pedibus auicularum admodum similes sunt, in primis uero eius quæ in frumentis nascitur, quod & ea de causa recte Hieracopodium appellari posset. Vnde caput cvi. lib. iij. in quo Lychnis αλχμς una cum subscriptis nominibus describitur (Tragonaton, Arocion, Hieracopodion, Lāpas, Semura, Apocathemenes taurus, Agrestē Intubū, & Seris, quæ duo posteriora nomina a foliorū forma obtinet) syluestri Baptifeculæ (sic. n. a multis uocatur) tribuo.

Baptifecula.

Kornblüm.



Hermola⁹ Lychnida quam
dam describit, quam ait Ve
netijs in littore maris inue
nire de qua, cum nobis
haudum uisa fuerit, nihil
in præsentia statuere possu
mus. Germani hanc plan
tam a frumentis Kornblü
menuocant.

**VIRES AC TEMPE
ramentum.**

Lychnides coronariæ
puerorum & puellarū præ
cipue lufibus natæ sunt,
tamen in medicina suum
quoque usum habeant, na
tura frigida.

INTRINSECVS.

Flos Baptifeculæ una
cum semine uino decoctus,
& potus contra araneorū
& scorpionum ictus auxi
liatur.

Semen in puluerem re
ductum, ac pondere dimi
diæ drachmæ sumptum bi
lem per alium detrahic.

EXTRINSECVS.

Aquam Baptifeculæ di
stillatam rubētibus oculis,

instillatu, inflammationibusq; oculorum præcipue, imposito linteolis in
camadefactis, prodesse nonnulli tradunt.

De Persica, seu Parthica uiola Barbari.

CAP. CXCIIL.

Viola alba, Persica Hermolai Barbari.

Weiß winter Violen.



PVELLAE IN HORTULIS suis aliud quoddam violae niver genus plantare consueverunt, quod hyemis frigora minime abhorret, flore partim candido, partim dilutae purpureae, alio denique roseo, suauissimi odoris praeditum. Huius flores, seu violae reliquis Leucoij generibus forma sua similes sunt, sed in folijs manifestaprehenditur differentia. Nam huius quam modo tractamus violae folia in uiridi nigrescunt, aspera tactu, forma Verbasci herbam emulancia, sed magis angusta & exigua. Postquam defloruit semen luteum in angustis, rotundis & oblongis siliquis reperiuntur, uti & in Brassica.

Ceterum viola alia in dumetis, & agrorum limitibus quibusdam prouenit caule geniculato, instar Rosae Marianae, quam Glideweiß a geniculis & articulis quibus medetur, nominant. Porro e singulis geniculis bina folia acuminata prodeunt, Oliuae similia,

Nn iij

ē regione inuicem opposita, inter quæ bina alia, sed longe minora spectantur. In cacumine caulis multæ rosei coloris violæ quadrifoliæ satisq̃ odoratæ emicant. Radix eius subpallida, hinc inde serpit intra humum.

NOMENCLATURAE.

Viola hyemalis. Priores violæ Germanica lingua Winter Violen/ eo quod hyemem ferre possint, aut ad discrimen aliarum gross Violen appellari possunt. Hermolaus Barbarus cum in confectionem Iasmini unguenti commentaretur, Persicam, Parthicam, & Peregrinam uocauit. Quod si hæc viola radicem habet nigram, & instar cornu duram, facile dixerim Æthiopida esse Dioscoridis, quam ille lib. iij. cap. c. describit. Verum cum & in Idamonte Arcadiæ Æthiopis nascatur, tanquam peregrina planta, nihil statuere possum.

Viola magna. Syluestris viola ut dicatur, scire nondum potui. Ego ne nomine prorsus careret, agreste *αγροίαν*, Germanice Weißacker viol nominauit. Videtur autem genus esse eius quam supra Glydweich Germanica uoce appellauimus cap. xl. nonnullis species Saponariæ seu Struthij putatur.

Viola Persica, Parthica, Peregrina.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Persicæ seu Parthicæ violæ puellarum corollis inferuntur. Nec dum hodie constat quis earum in medicina sit usus.

Leucoion agreste calidum & siccū est, uiribus luteæ violæ fere respondet. Hodie Chirurgi nonnulli ad emolliendos induratos articulos & neruos, herbam cum floribus & axungia contritam, calidam, uicibus iteratis imponunt.

De Consolidæ regia. Cap. CXC.

VPEREST PURPUREA, SIMVLQVE ELEGANTIS.

Sima viola, quam uulgo Consolidam regalem uocant. Ea Iunio mense in frumentarijs agris nascitur, unico caule, uti & Cyanus, eoq̃ multis tenuissimis uirgis ac ramulis brachiato, folio admodum serrato, perq̃ omnia Nigellæ seu Melanthio simili, viola purpurea, Martiā emulante, nisi quod maior hæc est, & quod unum ex foliis oblongum, acutū, & concuum habet, modiceq̃ inflexum instar Lycoctoni, quod Germani Eisenhut uocant. Flore decedente semina in corniculata filiqua inclusa profert bina aut terna, rotunda, incana, exigua, Gith similia, commanducata gustum, Erui representantia.

NOMEN.

Consolidaregia.

Ritter Sporn.



NOMENCLATURAE.

Germani hanc violam Ritter sporen / hoc est, Calcarequitis, quod forma calcar referre uideatur, uocauerunt. Sunt qui Hyacinthum, sunt qui Vaccinium appellent, plerique Consolidam regalem nominant. Otho Brunfelsius suspicatus est hanc Aegylopa esse Dioscoridis. Ceterum Vaccinia posse has violas dici, purpureus color earum indicat, unde in Gallo Vergiliij versiculus ille his suffragari uidetur,

Diosco. lib. 4.
cap. 134.

Et nigrae Viola sunt ex Vaccinia nigra. & alias, Vaccinia nigra leguntur.

Non autem una & idem planta esse potest, Vaccinium inquam, & Hyacinthus, habet namque hic Bulbosam radicem, illud uero longe aliam. Quare libens admittam ut Consolidaregia, Vaccinii nomine insigniatur, Hyacinthus uero ueterum alia sit planta, de qua suo quoque dicemus loco. Ego, ut quod sentio ingenue fatear, Consolidam re-

Diosco. lib. 4.
cap. 93.
Plinius lib. 27.
cap. 13.

Θάλαττον
in quibusdam
exemplaribus
Thalietrum legi-
tur.

giam Θάλαττον Dioscoridis & Plinii esse existimo, quod alij ad Cotulam foetidam referunt, Ruellius et Gesnerus Cuminum sylvestre, maxime posterius

καμίνον αγγιν
Dioscor. libro 3.
cap. 62.

Na v

huic Consolidæ attribuunt, Platearius censet eam esse quæ aqud Plinium Alektorolophos dicitur lib. xxvij. cap. v.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Flores Consolidæ regiæ sicut & aqua eius distillata, ad caliginem oculorum fere adhibentur. Tradunt etiam aquam quasuis inflammationes internas & externas iuuare potu, & imposito. Quod si illa Thalictron fuerit, uti mea fert sententia, certe testimonio Dioscoridis trita illius, antiqua ulcera ad cicatricem perducit.

Sin Cuminum syluestre sit, quemadmodum quidam existimant, si uel e uino uel decoctum uino potetur, omnium serpentium moribus præsidio est, calculosis & ijs qui urinis stillicidio uexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur.

De Polygalo. Cap. CXCVI.

VB INITIA IVNII CIRCA FESTVM PENTECOSTES, in aridioribus quibusdam campis fruticulus reperitur dorantalis, humi procumbens, cauliculis seu uirgis potius tenuibus & lignosis, folijs lenticulæ, sed longioribus, & magis acuminatis, ac solidioribus, planeq; Satureiæ similibus. In cacumine uirgarum seu coliculorum flosculi frequentes proflunt, forma & magnitudine ad flores Fumariæ accedentes, coloris diuersi. Nam alij sunt niuei, alij Bersilici, alij cœrulei conspiciuntur. Omnium uero generibus idem folium, idem caulis, eadem denique radix, nimirum lignosa. Flosculi hi non magnopere odorati sunt, decora potius elegantia arridere possunt hominibus. Semina in exiguis uulgis, lenticulaq; haud maioribus profert, quæ & aduersus iniuriam cœli, alis binis ijsq; pendulis munitæ sunt, qua in re mirabilis Dei Opt. Max. providentiam uidere est, cui etiam minima quæq; curæ sunt, ita quidem, ut non minus illa, quam uel nobilissimas creaturas defendat, tueaturq;.

NOMENCLATVRÆ.

Germani hanc plantam Creutzblumen uocant, quod eo tempore, quo Vexilla ecclesiastica hinc inde, prout Romana fert religio, circumferuntur, isti flores prodeant, quibus puellæ ut eiusmodi festis ornatiores intersint, sese coronare solent. Alij nonnulli Kamsel nuncupant. Ego illam Polygalon Dioscoridis esse cōiicio, maxime eam quæ candidos fert flores, nam quæ purpu

Polygali triage
ner a

Werbeger
Diosco. lib. 4.
cap. 137.
Plinius lib. 27,
cap. 12.

Polygalon.

Ereuzblümlin/ oder Ramsel.



purpureo & coeruleo emi-
cat, eam ad Glaucen refero,
quam Plinius ab abundan-
tia lactis quam facere ait
Eugalacton nominat.

γλαυκ.
Diosco. lib. 4.
cap. 136.
Plin. lib. 27, ca.

VIRES AC TEMPE-
ramentum.

Ethi flores puellis præci-
pue dicati sunt, quanquam
in medicina non contem-
nendi usus.

INTRINSECVS.

Glauceseu Polygalon ut
no decoctum & potum ex-
tincti lactis ubertatem re-
uocat. Veteres hos flores
cum ordeacea farina, sale et
oleo in sorbitione deco-
quebant, & ad prædicta
usurpabant.


EXTRINSECVS.

Polygalon aduersus tu-
mores & inflammationes
tufum imponi potest. Ea-
dem potest & aqua distilla-
ta.

De

De *Lilio conuallio.*

Cap. CXCVII.

Meienblümlin.

LILIVM CONVAL-
lium, tunc inter Nymphas
 locum natalem sibi delege-
 rit, tamen nemini ignotum
 est. Aprilis mense e tenui &
 fibrata, Lolioq; simili (nam
 quemadmodum illa, ita &
 hæc intra humum longe la-
 teq; serpendo sese propa-
 gat) radice, germina noua
 uiridi colore prædita, aspa-
 ragis haud dissimilia profi-
 liūt, quæ nihil aliud sunt, q̃
 gemina folia, unico pedi-
 culo suffulta, quæ in initijs
 compacta ac complicata
 apparent. Vbi uero primū
 ab se inuicem discedere so-
 lūsq; Lilijs albi similia esse
 cœperint, tum e medio il-
 lorum pediculus triangula-
 ris figuræ, emergit, quinīs
 aut senis ex ordine globulis
 magnitudine cicer arietinū
 æquantibus, ornatus, qui
 Maio mēse appetente pan-
 duntur in modum Cymba-
 li, euaduntq; in flosculos ni-
 ueos, rotundos, cauos, infe-
 rioreq; sui parte serratos,
 in medio uero internæ par-
 tis purpureo punctulo no-
 tatos, odoratissimos, gustu
 uero amaros. His pereunt
 bus Iulio mense appropin-

quante fructum profert rubrum, corallis rubris, aut fructui Asparagi non
 dissimilem.

NOMEN.

NOMENCLATURAÆ.

Doctissimus p̄æ memoriæ uir Otho Brunfelsius *Lilium conuallium* Hemerocallida Dioscoridis esse putauit. Quia uero illa bulbosam radicem habere traditur, nō uideo quo pacto Hemerocallis ad nostrum *Lilium conuallium*, quod serpentem hinc inde habet radicem faciat. Germani *Meienblümlin*/hoc est, *Mañ flosculum*; vulgus herbariorum, *Lilium conuallium* uocat. Ego hoc ipsum secundum *Lilium Theophrasti*/quod vere duntaxat apparere tradit, cum dicit, Vere nonnunquam cum *Leucoio*, hoc est, *Viola alba*, aut paulo post *Lilium* exit. Quæ sane uerba de *Lilio albo* (cuius, suo quoque loco mentionem faciemus) intelligi non possunt. Quamquam quod semper addimus nihil affirmamus, sed nostram sententiam doctoribus diiudicandam proponimus. Sunt qui *Lilium conuallium* *Ephemeron* esse statuunt, quod nobis plane probari non potest, cum nihil sit in descriptione *Ephemeris*, quod huic nostro *Lilio* conuenire uideatur.

Dioscor. lib. 3.
cap. 128.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTUM.

Lilij conuallij flores dum adhuc genuinum odorem spirant magni usus existunt. Ex illis etenim aqua distillatur, quæ ad uarias affectiones adhiberi solet. Cæterum gustu animaduertitur flosculos hos calida qualitate præditos esse.

INTRINSECVS.

Flores *Lilij conuallij* uino generoso & forti macerati, ac aliquoties distillati, loquelam amissam restituunt, syncopa correptis auxilio sunt, tormina sedant, ueneno aduersantur, cor & cerebrum roborant, attonitos et phreneticos mentis compotes reddunt, mensura coclearis poti.

EXTRINSECVS.

Aqua *Lilij conuallij* oculorum inflammationibus apprime conducit imposita.

Eadem capiti inprimis utilis, nam amissam memoriam recuperandi, uim obtiner, multis modis salubris & expetita aqua.

De Garyophyllea. Cap. CXCVIII.

GARYOPHYLLEAE VARIA SVNT GENERA. ALIA enim syluestris, alia altilis, de qua primo agemus loco, censetur. Garyophyllea altilis.

Garyophyllea

Grasblüm.



Rursus quædam simplici foliorum in floribus ordine contenta est, alia multis
plici prædita. Iam uix in omni genere stirpium ullam existere arbitror,
quæ tanta colorum varietate flores suos commendet, atq; altis Garyo-
phyllea.

*Superba.**Mürwillen.*

phyllea. Alij namque nuda
 uei prorsus existunt, alijs di-
 luta purpura ex candido
 emicant, alijs cœco rutilât,
 alijs uersicolore uariât com-
 mistu, idq; non una sed ua-
 ria ratione. Inuenias siqui-
 dem in quibus candidus et
 cocceus color ita miscea-
 tur, ut in alio candida, in
 alio uero rubra foliola nu-
 mero superiora euadant.
 Quidē quod nonnullos uideas
 ita candidos, ut inter-
 rim minutissimis rubris
 punctulis, contra qui ru-
 bent lacteis notis aspersi
 uideantur. Postremo ex
 uno & eodem caule non ra-
 ro duo florū genera quod
 ad colorem attinet, hoc est,
 partim cādidī rubrisq; ma-
 culis notati, partim uero
 coccei, prosiliunt, & quod
 mirum magis uideri possit
 sepe uno pediculo diuersi
 colores flores suffultos depre-
 hendas, quod ipse non se-
 mel uidi. Omnibus eadem
 folia, nimirum alijs penete-
 neri, at breuiora, magisq;
 exigua, cineracea. Quanq;
 illius quæ candidos fert flo-
 res, herba plerunque gran-
 dior existit, quam eius quæ
 coccineum profert florem.

Caulēs illis teretes, nodosi, cubitales, in quorum fastigijs longiusculis spe-
 ctantur calyces, quibus Iunio mensibus hiscentibus paulatim diuersa appa-
 rent florū genera, simplicia scilicet, multiplicia, candida, rosea, coccinea, ni-
 gricantia.

Garyophyllea sylvestris.

Sonder Negelin.



^{2.}
Superba.

gricantia, uermiculata, diuerſoq; colore uariiegata. Si flores non decerpantur Autumno appetēte, in his calycibus nigrum & latum ſemen cæpe ſimile reperitur, unde Garyophyllea repullulaſcit, ſed demū tertio anno flore cōſpicua. Hæchyemīs præſertim durioris impatientiſſima eſt, qua de cauſa in ſigulinis vinarijs cellis committi, ibiq; a frigoris iniuria a puellis conſeruari conſueuit. In floribus Garyophylleæ cuius herba, cauſes. & radices, in odore proſus exiſtunt, ueluti & alia graminis genera, hoc unum deſiderari uidetur, quod non niſi recentes et uirides odorem ſuum gratiſſimum ſpirant. Et hæc quidem de ſatiua, quæ & paſſim cognita eſt, dicta ſint, nunc de ea quoque diſſeramus quam Superbam nominant. Hæc, herba, cauſe, calycibus & flore longe inferior eſt altili. Florem habet ſimplicem, odoratum, ex candido leuiter purpureum, cuius ſoliola ſingula ſerraturis profundis incifa ſunt illi quam Germani Gauchblum uocant (cuius

ſupra cap. cxxxliij. meminimus) ſimilima. In hortis qui illam quoq; hodie receperunt nullo negotio prouenit, raroq; hyemis frigoris læditur. Naſcitur & ſponte in quibuſdam incultorum agrorū & uinearum limitibus, præſertim

Præsertim uero in tractu Rheni in montibus istis, qui è regione oppidorum quæ uulgo uocantur die *Niemenstätt* & *Siedesheim* siti sunt. Radix illi capillata, & qua quotannis noua germina iuxta caules florentes prorumpunt, quæ & ipsa sequenti anno suos ferunt flores.

Garyophyllea uero syluestris in syluis cæduis, deinde & arenosis aridis & incultis campis cuiusmodi sunt *Vaalgoix* & *Bidiscenses*, gignitur, *Garyophyllea syluestris*. flosculis, radiculis, colyculis, calycibus, Garyophylleæ, sed longe minutis simis. Caules enim habet teretes, nudos, tenuiores quæscirpis, in quorum uertice seni aut octeni interdum nascuntur flosculi, rubore nigricante quasi, nonnunquam & dilucidiores tincti. Caules quandoque cubitales euadunt, quo uero proceriores extiterint, eo exiliiores apparebunt flores, quibus pereuntibus, semen in oblongis purpureis *Papauericis* similibus uasculis inclusum reperitur.

NOMENCLATURA.

Nullum ex his Garyophylleæ generibus meo iudicio ad *Betonicam* pertinet, id quod cuius animaduertere licet, qui utraque uiderit. Sed parum sum sollicitus, quo quisque nomine plantas suas appellauerit. Ego prius genus Garyophylleam & *Narcissum Germanicum* uocabo, quoad certiora alij docuerint. Germani *Graßblumen* & *Negelin* ab odore Garyophylorum nominant.

Alteram *Nürwillen* dicunt, Latinis uulgo *Superbam* nuncupatam.

Posterius genus, hoc est Garyophylleam syluestrem, seu campestrem, Germani *Wild negelin blumen* / *Seld negelin* / *Beiden blümlin* uocant. Of ficinæ in lumine suo Garyophylleam, Herbam *Tunicam* nuncupant, quod nominis *Veronicæ* herbæ alias tribuunt, ut uel hinc appareat nihil illas ferre certi in cognitione stirpium habere.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Garyophylleæ flores diuitem delicias sunt, non solum forma grati, sed & odore suauissimi, ad multa utiles, temperatura media præditi.

INTRINSECVS.

Sunt qui ex floribus Garyophylleæ conseruas ut uocant, conficiant, quemadmodum & *Rosæ*, *Buglossa*, & *Violæ* *Saccharo* condiri consueuerunt. Eiusmodi confectio imbecillitati cordis præsertim in ardentibus febribus apprimè conducit.

Alij aceto imponunt flores Garyophyllæ rubros, quod iucundo odore commendant. Hoc acetum doloribus capitis olfactu & illitu tēporibus, opitulator.

Flores Garyophyllæ campestris quī natura cæteris calidiores existunt, distillantur. Ea aqua singulari experimento ad pellendum calculum mensuratum aut trium cochlearium bibitur.

De Circeæ. Cap. CXCIX.

VELLAE ALIVM QVENDAM PRAETER COMMEMORATA florum genera in figulinis & hortulis suis florē plantare consueverunt, quē qđ nihil illo gratius aspectu cernatur *Tausentschon* & *floromoz* lingua germanica uocant. Atque is perpetuo uirere uidetur, non aliter atque *Amaranthus luteus*, quo nomine a puellis ad hyemales corollas referuatur, reliquis enim omnibus pereuntibus purpurea hæc spica virgines coronat. Cæterum planta ipsa quæ hos fert flores alsiola est, hyemis impatiens, quotannis enim e semine suo repullulascit. Iulio mense in caulem teretem, pinguem, purpureum, surculosum, folijs *Strychno* & uulgarī etiam *Solano* similibus uestitum exit. Florem profert purpura saturata tinctum, spiceum ad *Ligustrum* cuius lib. iij. cap. xxvij. nostrorū commentariorum historiam habes, accedentem forma. Semine dum floret, nigro, læui, exiguis quasi corniculis incluso, aliquanto minori *Portulaca*, per omnia uero agrestis *Atriplicis* semen referente prægnat. Radix illi candida, recta, quandoq; & fibrata, inodora, sicut & tota planta. Sapor idem qui & cæteris culinarijs herbis.


NOMENCLATURAE.

Quanquam hodie plantę huius nomen nobis minime cognitum sit, adduci tamen non possum, ut credam ueteres eius nullam fecisse mentionem. Ego sane posteaquam diu multumq; de nomine ipsius cogitassē, tandem super ea re *Circen* consului, quæ respondit *Circæam*, aut ut alij uocant *Dircæam*, in ueterum scriptis inuestigandam. Sumpsi itaq; *Dioscoridem* in manus, qui de *Circæa* lib. iij. cap. cxxv. ita scripsit.

- » *Circæa*, quam & *Dircæam* aliqui uocant, folijs est hortensis
- » *Solani*, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso, semine *Milij*,
- » nascente in quibusdam ueluti corniculis: dodrantali radice, triplici
- » ferme aut quadruplici, candida, odorata, exalfaciente. Nascitur
- » in apricis, saxis, & uento perflatis. Radicis tussæ pondo quatuor, in sextarijs

Circæa.

Sausentshon.



sextarijs tribus uini dul-
cis, per diem & noctem
macerantur, potuq; tri-
duo uulvas expurgant.
Semen in sorbitioni-
bus datum, lacte mam-
mas nutricum explet.

Hactenus Dioscorides,
postquem ad Plinium me
conuerti, qui naturalis hi-
storiæ libro xxvij, capite
octauo ita scriptū reliquit.

Circæa Strichno satis
uo similis est, floren-
ti- gro, pusillo, paruo semi-
ne ut Miliij, nascente in
quibusdam corniculis,
radice semipedali, tri-
plici ferme aut quadru-
plici, alba, odorata, gu-
stus calidi. Nascitur in
apricis saxis. Diluitur
in uino, bibiturq; ad do-
lorem uulvæ, & uitia.
Macerari oportet in
sextarij tribus quadran-
tem radicis tusæ, nocte
& diem. Trahit eadem
potio & secundas, semi-
ne lacminuitur, in uino
aut aqua mulsâ potio.

Hæc ille. Vbi primum

ergo scripta duorum perlegissem, uidebatur mihi hanc plantam non inepte
ad Circæam referri posse, nisi quod radix non usq; adeo quadrabat, in illa
namque nullum singularem odorem deprehendere licuit. Nihilominus

Epina. tamen *Circæam* illam appellare placuit. quoad alij certiora proferant. Neque *Theophrastus* lib. vi. cap. ultimo de hist. plant. hanc præterisse uidetur, tametsi ubi inter violas ipsius nascatur. mihi incognitum sit. Arbitrabar olim *Vitissioram* esse. Quisquis *Amaranthi* genus esse dixerit, cum conon magnopere digladiabor, habeo enim & ego meum *Amaranthum*.

VIRESCAC TEMPERAMENTVM.

Flores, folia, & radices huius plantæ ad sicciorē accedunt temperaturam. Hodie in corollis puellarum texendis duntaxat usurpantur. Tametsi enim ad medicamenta non sit inutilis *Circæa*, tamen propter ignotum nomen, ignotus quoque in medicina usus illius existit.

INTRINSECVS.

Quod si *Circæa* sit quemadmodum conieimus, ad ea efficax erit, quæ ex uerbis *Dioscoridis* recensuimus, sin minus, quid possit, ignorare nos facerē oportet.

EXTRINSECVS.

Ruellius de natura stirp. lib. 2. ca. 129.

Mirum cum defecere cuncti flores, madefactus aqua reuiuiscit, & hybernas coronas nectit. Quæ dote iam in scitilibus seritur, ut ab *Augusto* florē, at in *Octobrem*, quo tempore gestit frequenter carpi. Collectum & furni tepore siccatum, puellæ ad coronarios hyemis usus recondunt.

De Pæonia. Cap. CC.

IN DIEBUS VITAE NOSTRAE VEL SEMEL PÆONIAM illum antiquum artis medicinae peritissimum audire nobis contigisset, certiora forsā de rosa *Pæonia* scribere possemus. Sed ut cunctæ hæc quidem sese habeant, conabimur nihilominus quædam non prorsus inutilia de illa proferre in medium. Nam in *Germania* nostra uix elegantiorē reperiās rosam, ipsa *Pæonia*. Eius duo apud nostros *Mediomatrici* genera reperiuntur, adeo consimilia, ut discerni uix possint, nisi accurata adhibita diligentia. Vtraque radicem habet longā, corosā, nodis glandi similibus, & crebris distinctā, quæ quo antiquior euaserit, eo nodosior magisque glandosa efficitur. Nam primaria radix nisi lædatur alio quorānnis gignit ocellos, ex quibus noui subinde fruticant stolones, ita ut in processu temporis pluribus illa nodis augeatur. Verno tempore accedente quæq.

Pæonia.

Peonien Rosen.



quæq; radícula primariæ ut diximus agnata rubentes suos asparagos emittit, qui Aprilis mense in caules attolluntur, totidem sane, quot discriminibus radix ipsa diuisa fuerit, colq; cubitaels. Folia quæ Xerampelino in initis 2. *Vulgaris peonia*
 Oo iij *nie descriptio.*

colore tincta fuerant, paulatim in uiridem abeunt, tandemq; cineracei apparent. Forma iuglandis herbam recens natam Dioscoridi, mihi uero Veratri nigri potius præ se ferentia. In fastigijs caulium capitula rotunda instar exigui mali Persici protuberant, eaq; mense Maio appetente rumpuntur, tumq; protinus rosa rubra, satis lata, staminibus luteis ueluti Rosæ syluestres rubræ, conspiciendam se præbet. Hic flos ubi post triduum aut quadri-
duum folia sua excusserit, in medio sui tres aut quatuor hirtos crassosq; folliculos mox resupinandos inuicem coniunctos, Amygdalis similes ostēdit, qui si illæsi Augustum mensem attigerint, satiscunt, conspiciturq; intus semen purpureum, magnitudine pisi, oblongum, intus candidum, quod orbiculorum precatoriorum more corda colligere, auroq; & argento includere solemus.

Pæonia nobilioris historia.

Elegantior uero, simulq; odoratior ea est, quæ primo exortu herbam & caulem, floremq; admodum rubentes fundit, quæ omnia etiam in hac maiora sunt, quam in uulgari, cuius rosæ diluti ruboris apparent, & folia caulesq; cito in uiridem uergunt colorem, nec tam profundis incisuris cum primum e terra proruperint, diuiduntur, quod discerniculum doctissimum Marcellum obseruasse puto, cum scribit utramq; Pæoniam sibi uisam. In nostris regionibus non nisi sata proueniunt bina hæc Pæoniæ genera, nostris procul dubio Germanis non ita pridem cognita, nam posterior hodie etiamnum satis peregrina existit, quam præstantissimus uir Dominus Georgius Ollingerus e Norimberga amoris ergo superioribus annis ad me transmissit.

NOMENCLATURAÆ.

Germani Peonien rosen/ Benedikten rosen/ Pfingst rosen/ Königsblumen/ Gichmurg. Latini Pæoniam & Hastam regiam nuncupant. Atq; hæc ego foeminam Pæoniam Dioscoridis esse existimo, quam ille lib. iij. capite cxlvij. sequentibus nomenclaturis describit. Tradit enim illā Glycysidem Pentoboton, Orobelion, Orobaca, Hæmagogon, Pææden, Monogenion, Menion, Pæonion, Panthiceraton, Ideos dactylos, Aglaophotin, Theodonion, Sclenion, Selenogonon, Phthisin. Romanis postremo Castā cognominari. Quibus addit Apulcius cap. lxiij. Dichomenion, Gludim, & Rosam fauinam. Et hæc quidem de Pæonia foemina dicta sunt: nunc & masculam Pæoniam inuestigemus. Hic uero tristes illi ac malefani lemures, Faunioq; qui ludibrijs suis homines uexare ac oculos perstringere solent, timendi mihi rursus sunt, si a sententia ipsorum discessero, qua radicem illam candidā, quæ in altissimis montibus magno negotio effoditur, folijs recenti iuglandi, aut ut supra diximus cap. vij. Fraxino, uel potius Glycyrrhizæ similibus, pro Dictamno uenditant. Aduersus hos Pæonia mea munitus, auda-

Et pronuncio eam non esse Dictamnium, sed potius ipsissimam masculam omnium ueterum scriptorum Pæoniam, quæ in montibus tanta difficultate effoditur, nullam sane aliam ob causam, quam quod illa intra scissuras saxorum se abdit. Hinc proculdubio ueteres agyrtarum & Rizotomorum imposturis decepti crediderunt uana superstitione Pæoniam interdum effodi non posse, quia Picus Martius facere in oculos impetum dicatur, ideoque noctu colligendam radicem. Pari impostura mortalibus hætenus illusum fuit, ut sentirent eum oportere fortissimum esse periculorum contemptorem, Satanamque coercere posse, qui Filicis semen colligere uelit. Quæ quidem omnia astu Satanae ipsiusque membrorum, qui diuinam herbarum cognitionem & usum hominibus inuidet, excogitata fuere, ne scilicet homines ipsi has herbas suo tempore colligerent, usuique reponerent, & ne hoc pacto auaritiæ & imposturis circumforaneorum nebulonum male consuleretur. Ut autem tandem ab his nos absoluiamus, sciat optimus lector, eam radicem quam Rizotomi & Seplasiarij, pro Dictamno uenditant, Dictamnium non esse, sed potius Pæoniam siue Pioniam ueram, id quod quidquid alij dicant affirmare non dubito. Neque etiam curo insulsam illam sciorum quorundam distinctionem, qui Pæoniam, uulgarem illam Germanis Benedicten rosen uocant, Pioniam uero Lapathum Germanis Mengelwurz esse statuunt, tamen si apud Dioscoridem Chelidonio quoque Pæoniæ nomenclatura tribuatur. Pæonia Serapioni cap. lxi. & Auicennæ lib. ij. cap. 562. Feonia. Auerrhoi Rosa asinorum, quibusdam alijs Harabdes, Pinuser, & Aglaphrois dicitur. De illa Manlius super confect. Epilent. Auicenna canone v. & Ioannes Arculanus cap. de Melancolia egerunt.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Utraque Pæonia ad uarias utrinque corporis affectiones, unice facit, planta nunquam satis laudata.

INTRINSECVS.

Radix Pæoniæ rubræ siccata & in puluerem redacta, sceminis à partu non purgatis datur, in uino magnitudine Amygdali. Hoc medicamento purgantur mulieres, menses cientur, calculi renum & uesicæ pelluntur, morbo regio succurritur, uentrisque doloribus, aluum sistit radix uino decocta, perque dies aliquot pota.

Grana Pæoniæ duodecim tusa & pota rubentes menses sistunt, cructationes & uomitiones coercent, pueris initia calculorum eximunt.

Grana Pæoniæ quindecim numero trita etque uino exhibita, sceminas rursus excitat, quæ aliquando propter uuluastrangulationes & matricis dolores quasi mortuæ concidunt,

Aqua e radicibus & floribus distillata, cor roborat, pueris comitiali morbo laborantibus auxilio est, interdum mensura duum. aut trium coctuarium pota.

Candida Pæonia quam nostri pro Dictamnino uenditant, hsdem pollet uiribus, uenenis omnibus aduersatur.

E X T R I N S E C V S.

Radices & grana Pæoniæ aduersus lemorum & Faunorum ludibria, in primis uero contra morbum comitiale e collo suspendi debent, quod Galenus primus animaduertit, quod & multi comprobarunt, & ipse non semel salutare esse expertus sum.

Atq; hic esto nostrorum de stirpibus maxime Germaniæ nostræ cognitis, commentariorum libri primi finis, quem una cum sequentibus duobus iudicio candidi lectoris subiectum esse uolumus. Domino Deo optimo.

Maximo soli in perpetuum.

fit gloria.

AMEN.

);(

HIERONYMI TRAGI DE STIRPIBVS COMMENT.
LIB. I. FINIS.

HIERONYMI TRAGI DE STIR-

PIVM, MAXIME EARVM, QVÆ IN GERMANIA NO-

stranascuntur, usitatis nomenclaturis, proprijsq; diffes-

rentijs, nec non temperaturis ac facultatibus com-

mentariorum Liber Secundus, Interprete

Dauid Kybero Ars

gentinensi.

)(

De Trifolio pratensi. Cap. I.



RIFOLIUM PRATENSE, INTER OMNIA TRI-
foliorum genera, quæ sane multa sunt, non solum forma,
sed & usu notissimum uulgo habetur; nam pabulis pe-
corum accommodatissimum est. Eius duo existunt gene-
ra, colore duntaxat florum, & magnitudine differentia:
hoc enim album, illud purpureum fert florem, hoc ma-

ius illud exiguum censetur. Maius itaque e capillata radice, teretes, iunce-
osq; emittit coliculos, cubitales interdum, adnascente circa eos propagine.
Folia in singulis germinibus terna habet, florē in cacumine mediarum uir-
garum purpureum, rotundum, Stoechadi pene consimilem. Iulio mense ap-
petente cum flos emarcuerit, semen in uasculis aceruatim coactis, reperitur,
gustu Orobo fere respondens. Trifolij pratensis quotannis. Aprili mense
complicata exeunt folia, eaq; terna unico pediculo suffulta, quanquam non
raro quaterna aut quina appareant. Ego sane non sine magna admiratione
uidi pratense Trifolium, quod sena protulerat folia. Sed sunt hæc naturæ
miracula, quæ sæpenumero etiam in uulgatissimis plantis animaduertun-
tur. Nam & hoc nostrum Trifolium, sicut aliæ plæræq; plantæ, præstigia
tempestatum habet, inhorrescit enim & subrigitur contra eas.

Exiguum pratensis trifolij genus, præcedenti per omnia est simile, nisi qd. *Trifolij pratensis alterum ge-*
candidum profert florem. *nus.*

NOMENCLATURÆ.

Trifolij nomenclatura apud Latinos multis plantis familiaris est, sicut
& uox Germanica *Blut*; nam quæcunque herba ternis in germinationibus
gaudet folijs, ea Latinis Trifolium, Germanis *Blut* dicitur, qui fit ut multa

Trifolium pratense.


Wysenflee/ Fleischblumen.

Diosco. lib. 3.

cap. 114.

Idem lib. 4. cap.

108.



τριφυλλὸν τὸ ἐν χορ
τοῖς πεδίοις γινώσκ
ται.

& uaria passim reperiantur
Trifolij genera. Cæterum
apud doctos nondum con
stat quo nomine uulgare
hoc & pratense Trifolium
apud ueteres appellatū fue
rit. Sunt enim qui τριφυλλόν
Dioscoridis esse statuunt,
nec desunt qui Cytisum in
terpretentur. Verum utraq;
repudianda est sententia.
Tametsi enim Trifolio pra
tensi Dioscorides propriū
caput non dicauerit, nullā
aliā forte ob causam, quam
quod notissima ubiq; ter
rarum sit planta, tamē lib.
liij. cap. cvij. sub Loto syl
uestri mentionem illius fa
cit, cum scribit Lotum syl
uestrem habere φύλλον ὁμοίαν
τῷ τριφυλλῷ ἢ χορτοπόποις γε
νομένῳ, hoc est, folijs esse præ
ditam Trifolij pratensis.
Nos itaque una cum Diosco
ride hoc Trifolij genus,
pratense nuncupabimus.
Germanis Wysenflee/ alijs
Braunfleischblumen/ hoc
est, purpureum Trifolium
pratense, & Weißfleischblu
men/ hoc est Trifolium pra
tense candidum.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Trifolium pratense in medicina non contemnendi est usus, siquidem
utrinque

utrinque usurpatum, emolliendi uim obtinet. Flos maturus, & semen inprimis commendantur.

INTRINSECVS.

Flores Trifolij pratensis cum semine aqua mulla aut uino decocti, & poti, aut in clystere exhibiti uiscosos & lentos humores in intestinis incidunt, erosiones & dolores eorundem sedant, sanantq;. Apes de floribus Trifolij pratensis uti & de Thymo mellificant. Nec teneris uitulis agnisq; utilius est pabulum, quam Trifolij pratensis tenera herba.

EXTRINSECVS.

Flores Trifolij pratensis cum semine aqua & oleo decocti ac impositi ad maturationem perducunt inflammationes & duritias.

Easdem pene obtinet facultates hoc Trifolium, quas Fœnum græcum, sed non perinde usitatum.

Atq; hæc de Trifolio uulgaris seu pratensi dicta sufficiant, nunc ad alia eius genera nos conferamus.

De Trifolio, Dioscoridi simpliciter τριφυλλον dicto.


CAP. II.

CRIBONIUS LARGVS ANTIQVVS AVTOR BRE-

uissimis uerbis plantam hanc graphice depinxit, tamen a paucis ea hæcenus animaduersa fuerint. Germani Siben gezeit appelliant, propterea quod singulis diebus septies odorem suum habeat, & toties etiam amittat, quamdiu in horto creuerit. Decerptum autem & exiccatum odorem suum perpetuo retinet, qui certe pluuiosa temporis constitutione & tempestate imminente multo uehementior est, sic sane ut rotas ædes in quibus hæc herba reposita est odore suo compleat, quo nomine tempestatum nuncia, Germanis uero Wetterfraut haud iniuria dici possit. Nuncia tempestatum.
stræ mulierculæ supra mensas & lectos suspendunt, aduersus ludibria Satanae, & uenena. Nam & ueteres Trifolij semen ad Theriacam conficiendam usurparunt, nempe eam quæ olim incisa fuit lapide in limine ædis Æsculapij. Proinde ut ad descriptionem tandem accedamus, hoc Trifolij genus, de quo nunc agimus in nostris regionibus haudquaquam campos ornat, sed in hortis plantatur, quæ de causa in censu peregrinarum herbarum mihi habetur. Planta est alba, quippe quæ quotannis ineunte vere ex fulgore & exiguo semine non aliter atq; Corianon pullulare soleat, primo exortu Tri-

Plinius lib. 20. cap. 24.

Τριφυλλον.
Sibengezeit.



tu Trifolio uulgarī quam
similima, nam terna folia
singulis insident pediculis,
sed magis acuminata, &
cineracea. Iulio mense ap-
propinquante in caulē sese
attollit, teretem, cauum, læ-
uem & candicantem, mul-
tis tenuissimis uirgis bra-
chiatum, folijsq; Trifoliū
acutis uestitum. Adnata ue-
ro singula flore emicant ex
purpura cœruleo, stipato,
multoq; magis exiguo Tri-
folio uulgarī. Flos quisq;
in aculeatum echinum ue-
luti & Garyophyllatæ desi-
nit, in quo semen teres, sul-
uum, Milioq; fere par con-
cluditur. Radicem habet re-
ctam, breuem, & albam ue-
luti Anethum. Tota planta
(radice excepta) odorē ha-
bet picem odoratam refe-
rentem, saporem uero ama-
rum.

NOMENCLATVRÆ.

Sunt qui præter omnem
rationem huic nostro Tri-
folio Nardi nomen tribu-
ant. Quæ uero Nardus ue-
ra sit, satis ex scriptis Dio-
scoridis, & Hieronymi
Braunschueig liquet, tam-
etiā nobis nondum uisa sit.

Hoc autem Trifolium licet & ipsum peregrinum existat, tamen in magno
honore apud mulierculas nostras habetur, a quibus Sibengezeit / pro-
pter expositas causas nominatur. Latine aliter appellari non potest quam

Trifolium

Trifolium acutum & odoratum, quod est Germanis *Spiziger* / vnde wol-
 rechner *Flee* / quo de Dioscorides lib. iij. cap. cxliij. Cognominatur autē
 a Nicandro in Theriacis Menianthes & Tripetalon, a Dioscoride uero
 Cnicion, Alpaltion, Oxytriphillon. Columellæ deniq; Trifoliū Symoni. *Coll. de re rusti.*
 anū. In his nomenclaturis primū omniū Oxytriphylli uox non ad hoc Tri- *lib. 6. cap. 16.*
 folium, sed ad id proprie pertinet qd libro primo ca. clxxviij. descripsimus.
 Deinde Trifoliū, seu *tripetalon* nomenclatura late admodum patet, quemad-
 modum in Onomastico suo diligenter annotauit Brunfelsius. Nam Trifo-
 liū nomine apud Dioscoridem uocatur non tantum præsens herba, sed &
 Maiorana lib. iij. cap. xliij. & Medion lib. iij. cap. xx. & Satyrion quoniam
 tria fert folia ad terram infracta. lib. iij. cap. cxxxiij. & Lotus utraq; lib.
 iij. cap. cvi. & cvij. & Cytisus lib. iij. cap. cvij. & Staphis agria lib. iij. cap.
 cl. Est & hoc obseruandū quoties in Galeno, Plinio, Rhase, & Nicolao Tri-
 foliū mentio habetur; toties Trifolium odoratum quod modo tractamus
 intelligendū, quemadmodum Manlius super. confectt. Theria: ad mor.
 Ruel. & super Syrup. contra quarta. ex descriptione Francisci recte docet.
 Et ut breuiter nos ab his expediamus, sciendū est hoc Trifolium Menian- *Tria usitati*
 thes esse ueterum, quod & Asphaltion nominant. Alterum uero quod supe- *apud ueteres*
 riori capite explicuimus, pratense censi, Tertium uero ueteribus usitatum *Trifolij genera.*
 Oxytriphillon est, id nimirum quod lib. j. ca. clxxviij. a nobis descriptum *Plinius. lib. 21.*
 est. Postremo de odorato Trifolio scribere & Arabes, Sarapio scil. ca. vi. *cap. 9.*
 & Auicenna. li. iij. ca. cccxliij. apud quos hæc illius nomina leguntur, Hana-
 dachocha, Lythos, Garchi, & Thuff. Quod si scripta horum examinaueri-
 mus, deprehendemus Trifolium odoratum domesticam illis esse Handa-
 chochan, pratense uero syluestrem.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Trifolium odoratum in medicinam recipi, & Antidotis misceri debet,
 quoniam ueneno intro sumpto aduersatur, uenenatisq; moribus & uulne-
 ribus extrinsecus medetur, natura sua calidum & siccum.

INTRINSECVS.

Semen, flores & folia Trifoliū odorati in aceto & melle decoqui, & ad-
 uersus uenenum, siquidē illo se infectum quis suspicetur, exhiberi possunt.
 Ea propter semen præcipue Theriacæ, alijsq; quæ aduersus uenenum dan-
 tur antidotis miscere conuenit.

Flores, semen & folia, si uel singula, uel uniuersa simul uino aut aqua
 mulsa decoquantur, & bibantur pleuriticum morbum discutiunt; urinam
 ciunt.

cum, stillicidio & difficultati urinæ subueniunt, comitialibus, in primis uero mulieribus quæ ob uulvæ affectiones quasi mortuæ concidunt, ijs qui aquæ inter cutem principia sentiunt, auxiliantur. Eadem decoctio febres tertianas & quartanas impedire potest.

Ternæ drachmæ seminis, aut quaternæ foliorum tusorum datæ, menses ciunt.

EXTRINSECVS.

Tradunt aliqui serpentium, aliorumq; uenenatorum animalium ictibus si decocto totius fruticis, radicis, foliorumq; seminis & floris foueantur, ex eo continuo collutis, succurri. Eadem præstat aqua distillata.

Galenus lib. primo de Theria, scribit decocto huius fruticis dolores eorum finire, quos aranei aut serpentes percusserint, si uero sana quis parte hac aqua foueatur, ea dolorem excitari.

De Meliloti uarijs generibus.

Cap. III.

QUANQVAM INNVMERABILES FERE TRIFOLIORUM reperiantur species, tamen singulæ ad sua genera referri possunt, ita ut multitudo ea nullam pariat confusionem. Hoc pacto Fragaria suo ascribetur generi, Oxytriphillon Acetosæ adnumerabitur, Trifolium ut uocant aureum, ad Iecorarias herbas pertinebit. De reliquis idem esto iudicium. Pari ratione Melilotus, Trifolium pratense, odoratū, et Lagopus sub uno comprehenduntur genere, licet uiribus & forma, necnon magnitudine inter se multum differant. Nam inter omnia Trifoliorum genera, odoratum longe præstantissimum est. Meliloti cuius historiam hoc capitula tractandam suscepimus nouem in uniuersum describemus genera, quorum quinque maiorem repræsentabunt Melilotum, quatuor uero exiguum.


1.
Vulgaris maior
Melilotus.

2.
Melilotus maior
candida.

Vulgaris itaque & maior Melilotus primum obtinet locum. Ea florem profert spiceum, lutei coloris. Huius alterum genus reperitur, flore comans itidem spiceo, sed candidi coloris, cæterum caule, radice & folijs superiori per omnia simile. Nascuntur binæ hæ Meliloti in agris frumentarijs, & lapidosis agrorum limitibus. Florent ante messem, & in ipsa quoque messe. Radix utrique longa & tenuis, ueluti Pimpinellæ, caulis teres, uiri proceritatem interdum attingens, ramulis frequentibus brachiatus, folijs Trifolij nigricantibus & acutis uestitus, semine fere in singulis, ijsq; per exiguis, filiquis unico contento a flore prægnans.

Alia

Vulgaris Melilotus.
Gemeiner Steinflee.



Alia deinde Meliloti species passim extat, quæ florem fert rotundum, coactum ac stipatum, luteum, pratenfi Trifolio similem. Eo decusso, semē in siliquis, quas habet multas inuicem incumbentes, singulasq; cornu capri, aut semicirculum exprimentes, forma & gustu Genistas æmulans, reperitur.

Quarta Melilotus licet foliis tenuissimisq; ulgis, & adnascētijs, necnon longa radice, flore q; luteo & multiplici iam descriptæ respondet, tamen flores huius maiores, & magis crocei apparent, quo nomine a superiori differre uidetur. Est & aliud discerniculum, et certius quidem, quo inuicem binæ hæc Meliloti species discerni queant, nimirum forma siliquarum, quas posterior hæc Melilotus gignit, ex uno flore plerunque ternas duntaxat aut quaternas, digitum longas, unguibus auicularum similes, terete seminio Orobo haud dissimili refertas.

Restat postrema Meliloti maioris species, ea in asperis & salebrosis agrorum


limitibus, flore Trifolij pratensis multiplici, ex roseo, simulq; subpurpureo, candicante, folio Orobis prope consimili. Et hæc quidem de grandi Meliloto, nunc ad exiguum nos conuertamus.

Melilotus maior.

Grosser Steinflee.

6.
Meliloti exigua
Species prima.

7.
Meliloti exigua
Species altera.



8.
Lotus caespitius.

regerminat, virgasque tenuissimas humi sparsas emittit. Huius plantae su pra
 in primo quoque libro mentionem fecimus.


Postremo in segetibus & aruis tempore messis duo Trifolij genera re
 periuntur,

Ea in agris quoque frum-
 mentarijs & hortis exsemi-
 ne deciduo quorannis ve-
 re pullulat, est enim al-
 biosa herba. Folijs uesti-
 tur rotundis, non aliter at-
 que Triphyllon pratense
 album. Florem gignit mel-
 se appetente, luteum, tere-
 tem, Ciceris arietini instar.
 Is ubi defloruerit in capitu-
 la desinit nigra, nam talem
 formam semen in uasculis
 suis recuruum ac inflexum
 pra se fert. Ceterum semen
 e siliquis suis nequaquam
 exilit, uti alia faciunt legu-
 mina, sed in illis manet usque
 ad saturationis, eruptionis, &
 fructificationis tempus.

Nascitur & in agrorum
 limitibus, & secus itinera,
 aliud quoddam Meliloti
 genus, aureo emicans flo-
 re, qui forma quintam
 maiorem Melilotum repre-
 sentare uidetur. Eo decusso
 siliquae ternae aut quaternae
 unguiculos auicularum imi-
 tantes, seminio rotundo,
 copioso, Oroboque minori
 simili refertae, singulos se-
 quuntur flosculos. Radix
 huius longa est, lignosa, hy-
 emem minime reformi-
 dans, siquidem quorannis

Melilotus minor.

Kleiner Steinflee.



periuntur, tum enim flo-
rent. Fruticuli sunt furculo-
si, breuissimis radiculis præ-
dicti, folijs uestiti cineraceis.
Horum alterum florē fert
luteum, stipatum, multoq̃
copiosorem exigua Melilo-
to, quam sexto descripsim⁹
loco.

Alterū uero albidū, oblō
gumet lanuginosum, pani-
culis salicū quę verno tēpo-
re profiliunt, aut pedi lepo-
rino similitum. Vtrunq̃
horum Trifoliorū semen
luteum, rotundumq̃, quod
Milio magnitudine, Oro-
bis uero gustu responder,
in paniculis mucosis, lanu-
ginosisq̃ conclusum gerit.

Lagopus.

NOMENCLATURAB

Germani uniuerfas Tris-
folij species, a nobis nunc
descriptas (nam uera & o-
dorata Melilotus nobis
haud dū uisa in Campania
nascitur, teste Dioscoride,
præterea de Germanicis Lo-
tis nobis est sermo) Stein-
flee/Vogelswicken/vnnd
Basenpförtlin/ appellant,
quas si diligenter examina-
uerimus, deprehendemus
nihil aliud eas esse quam

1. 2.

Lotos. Cæterum seorsim singularum nomenclaturas discutiemus, quò re-
ctius discerni queant. Priora ergo duo maiora genera (quæ non nisi florum
colore differunt) ad Melilotum Dioscoridis referentur, quam ille Zoode-

Dioscor. libro 3.

cap. 43.

Melilotus.

Pp

Melilotus nobilis.

Edelx Steinflee.



ten & Orthanon cognominat. Marcellus & Manardus Sertulam Campanam uocant, Cato Sertam Campanicam, Auerrhoes Alchelilamelech, hoc est, Coronam regiam appellat. Quibusdam Trifoliū vrsinum, Germanice Berenflee dicitur.

Sequentia duo Germanis Vogelwicken dicta, forte Serapionis Melilotisunt, nā descriptio satis quadrat.

Quintum Trifoliū Germanis Steinwicken appellatum, Lotus est campestris, quemadmodum altero ab hinc capite fusius explicabitur.

Sextum quod Germani Gulden/ oder FleinSteinflee nominant, mihi Medica est herba Dioscoridis li. ij. cap. cxxvi. Auicennae Cot, Alistifcat, Alfas, Asar, quibusdā alijs Codab nuncupata. Olim in hortis plantabatur quemadmodū ex Columella lib. ij. cap. xi. patet, nunc uicij hortorū accensetur & negligitur. Quae enim a ueteribus frugalitatis studiosis magnificebant, ea hodie prorsus contemnantur.

Septimum similiter Melilotis Serapionis accenseri poterit. Tamen meo quidem iudicio non male ad Hedyfari alias Securidacę & Pelecinus frutex dicti, caput referri posset. Nostri herbam flauam, & Leporinam, Germani

7.
Diosco. lib. 3.
. 17. 137.
Idem cap.

Lotus campestris.

Bazgen Flee.



mani Unserfrawen schück-
lin nuncupant.

Postrema duo Trifolij
genera, Germani propter
paniculas lanuginosas Ba-
zen Flee / & Basenspörtlin
appellant. Suntq; illa mea
quidē sententia Loti campe-
stres. Nostræ mulierculæ
duas has posteriores plan-
tas ad cohibendas alui flu-
xiones usurpant singulari
experimento. Ego certe
tam florem quam semen
earum, easdem cum Fœno
græco uires habere depre-
hendi. Nam ad emollien-
dum, & dolores sedandos
non parui sunt momenti.

VIRESC. AC TEMPE-
ramentum.

Omnia Meliloti genera
in hoc capite a nobis de-
scripta, calidam & siccam
obtinēt temperaturam,
quapropter abscessus emol-
liendi ac maturandi, & do-
lores sedandi facultate præ-
dita sunt, id quod & de se-
minibus & de floribus eo-
rum intelligi uolumus.

INTRINSECUS.

Meliloti duo priora genera, necnon Melilotus exigua prima, primo ex-
ortu dum adhuc tenera est herba, cum aceto et sale in cibo usurpari possunt,
non secus atq; aliæ herbæ in acetarijs eduntur, Nam stomacho admodum
conducunt.

Hæ ipsæ Meliloti species in uino decoctæ, & ex melle potæ emolliunt omnia interna, apostemata, dolores sedant. E uino Cretico decoctæ potu tumoribus matricis auxiliantur.

Loti campestres Germanis *Hasenpfortlin* dictæ cum semine *Malu* uino dulci decoctæ & potæ, uitiſ uesciæ medentur, eiusq; dolores mitigant.

Loti campestres uino rubro decocti & poti, continuo alui profluuiio haud parum auxilij adferunt.

EXTRINSECVS.

Meliloti omnes fere ad omnes externos dolores mitigandos, præsertim uero ad inflammationes oculorum, tusæ adhibentur, non secus atque *Chamomilla*.

Ad eadem aqua distillata linteolis in ea madefactis ac impositis facit.

Succus e floribus expressus caliginosis oculis prodest, argemata namq; ipsorum & nubeculas dissecit. Auribus instillatus dolores illorum finit.

Meliloti quatuor priora genera singula per se, uel omnia simul uino dulci decoctæ, additis capitulis *Papaueris*, *Lini* semine, aut *Fœni græci* farina, foru, & imposito tumoribus matricis, sedis, & pudendorum unice profunt. Sunt qui admisceant ovi luteum, & oleum.

Lixiuum in quo Meliloti dictæ decoctæ fuerint, recentes meliceridas, & ulcera capitis manantia sanat, si ex illo caput abluatur. Herbæ sunt sudoribus eliciendis accommodatissimæ.


Loti uero campestres quæ in segetibus nascuntur aqua decoctæ, uitia cutis in facie maculasq; cum melle illitæ expurgant.

Vetulæ nostræ in ea sunt opinione, ut credant Lotum campestre, profluuium alui mensesq; mulierū albos sistere, in sessionibus & potu, id quod mihi nondum experientia manifestum fecit. Dies fortasse & usus docebit.

De Fœno græco. Cap. IIIL.

VM IN TRIFOLIORVM HISTORIA ADHVC VER-
semur, operæ pretiū fuerit & *Fœni græci* meminisse, posteaquam iam pridem apud *Argentorarenſes* & *Mediomatrics* uulgo innotescere cœpit. Hoc e semine luteo & quadrangulo, quod in vere cum *Coriano* & *Aniso* terræ mandatur, binis statim a satione pinguiusculis folijs prouenit, non aliter atq; *Linum*. Deinde uero non multo post folia acuta, terna unico pediculo pro more *Trifoliorum* aliorum, prorumpunt. Iunio mense caules subnascuntur teretes, proceri (nam quandoq; tres cubitos æquant.

Foenum græcum.
Bockshorn.



æquant) surculosi, multisq;
ac frequentibus ijs q; (ut di-
xitimus) ternis uestiti folio-
lis. Florem fert candidum,
seu pallidum potius, mul-
toq; magis exiguum Lupi-
no, qui in siliquas lunatas
& incuruas, necnō mucro-
natas, luteoq; semine refer-
tas protinus abit. Ceterū bi-
næ siliquæ coniunctim uno
pediculo enatæ formā cor-
nuū hirci representāt, unde
proculdubio Ægoceros il-
li nomen factum est. Planta
est alsiosa, hyemisq; impa-
tientissima, quamobrem
non nisi cultura diligenti
adhibita in Germania no-
stra prouenit.

NOMENCLATVRAE.

Semen apud nos Ger-
manos in medicina usum
suum habet. In cæteris na-
tionibus pabulo pecorum
nascitur, ideoq; ab incolis
earum regionum bis in an-
no plantatur, vere nimirū
& autumnō, quod testatū
reliquit Columella. lib. ij. c.
cap. xi. quo loco siliquam
rusticis dici annotauit, q; Plinius lib. 24.
Varro Siliculam, Plinius cap. 19.
Siliciam nuncupat. Diosco-
ridi lib. ij. cap. xcij. τῆς ἀγρίας, ἀγρίας, βούνης, (Germanice Bockshorn / Bock-
horn / Bockes, nāpes seu nāpes, & Italis nominatur. Serapioni Olba, nonnullis Serap. cap. 174.
Pp ij

Theophr. lib. 8. alijs Helba, & Astulba. Fœnum græcum habet suum quoque hostem, qui illi subnascitur, *ἡ ἀντίστυς* Theophrasto dictum.
cap. 8.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Semen Fœnogræci utile est ad emolliendum & maturandum ulcera & abscessus, & ad mitigandum dolores, quæ omnia utrinque in corpore humano efficit. Natura sua ad caliditatem & siccitatem accedit.

INTRINSECVS.

Semen in aqua mulla decoctum & potum internas collectiones emollit, vitia, doloremq; internorum membrorum sanat & mitigat.

Decoctum farinæ Fœnogræci exulceratè pectori & longæ tussì mederi, testatur Plinius.

EXTRINSECVS.

Fœnogræci semen maiorem in externis corporis partibus medendis obtinet usum, nam cremore seminis in aqua decocti expresso, manantia capitis ulcera, & furfures sanat, pilos capitis crescere facit, locos dilatat & emollit, si cum anserino adipe pesti uice subiiciatur. Est & semen decoctum in defensionibus ac fomentis ad easdem affectiones multebres utile. Ad eadem facit herba recens eodem quo diximus modo usurpata.

Decoctum hoc aduersus tenesmon, foetidamq; dysenteriorum proluuium prodest.

Hoc semen clysteribus adijcere conuenit, quæ aduersus tormina ab exulceratione orta usurpantur. Ad tumores uero quosuis, unice conducit.


Spleni addito nitro & aceto emplastri uice imponitur, illud deprimens, & imminuens.

Farina porrigines, furfuresq; cum uino & nitro celerrime tolli scribit Plinius.

De Fœnogræco syluestri. Cap. V.

QVANTQVAM NON TERNA SED DVODENA INTERIM & plura, quandoque etiam pauciora folia uno gerit pediculo hæc herba, tamen in ordinem Trifoliorum ideo referri posse uidetur, quod singula ipsius folia rotunda sunt oboli instar aut Trifolij. Patet nimirum ratione & Maioranam Trifolium uocitatum legimus, ab affinitate.

Fænogræcum sylvestre.
Wild Joenum Græcum.



affinitate quam habent singula ipsius foliola seorsim spectata cum Trifolijs. Sed haud multum forte refert quo loco quæq; planta recēscatur, ideo ad descriptionem herbe properabimus. Hæc planta radicem habet sesquicubitalem nonnunquam, quæ quotannis denas aut duodenas tenuissimas ac rotundas uirgas emittit, humi procumbentes, utrinq; rotundis foliolis (ex ordine collocatis, ut mutuo sese respiciant, instar pene Orobi maioris) uestitas, flore albicante ex pallido, copioso, sed cōiunctim posito, ut moris est cæteris leguminibus, idq; in fastigijs, emicantes. Hoc decusso siliquæ relinquuntur oblongæ recurvæ, sed magis exiguæ Fænogræco satiuo, semine prægnantes anguloso, sed per omnia minori quam sativi sit seminum. Gustu Orobos representat. Nascitur in montibus inter arbusta, in sylvis cædulis, agrorum limitibus secus itinera,

NOMENCLATURÆ

Quemadmodum multa sunt Trifolij genera, ita Loti non una, sed plures ^{Λατὴς.}reperiuntur species. Primum quidem Lotus arbor est, cuius Dioscorides ^{vide Manardū}meminit libro primo cap. cxxxix. Plinio & Theophrasto Faba Græca & ^{lib. epist. medi.}

Syriaca, & Anacabea dicta est. Deinde & Fœnogræcum Loti nomen ob-
tinet, sicut & Cytisus, & hæc nostra planta quam Fœnogræcum sylvestre no-
minauimus. Eam itaq; Lotum sylvestrem esse iudicamus lib. iij. cap. cvij. a
Dioscoride descriptam, quam & Trifolium minus, & Lybicam nuncu-
pat. Quod uero ad id caput referri debeat, non solum forma ipsa & descri-
ptio, sed & facultates ac vires huius herbæ satis conuincunt. Huc uero & il-
la pertinet planta quam quinto loco sub Melilotis descripsimus.

VIRESCAC TEMPERAMENTVM.

Trifolij flores & semina, Lini semen, & Fœnogræcum tam satium
q̃ sylvestre dolores finiendi & mitigandi, tumores discutiendi, deprimendi &
emolliendi utrum obtinent, ita ut si unum desit, altero uti possis. Quam obrem
non est operæ pretium ut hic repetamus quæ iam pridem a nobis dicta sunt.

De Cytiso. Cap. VI.

YTISVS, AD QVEM NOS LOTORVM MENTIO
C. deducit, nihil aliud est quam procerus & nodosus caulis, multis
adnascensq; hincq; geniculatis brachiatus, folijs uestitus Trifo-
lij, Fœnogræco quadantenus similibus, at maioribus, firmioribus, acutio-
ribus & prolixioribus per ambitum leuiter serratis, incanis, gustu Trifolio-
rum referentibus. Hanc plantam Marcus Platearius Morinus natione, ari-
dam ad me transmisit, unde & semen propediem me accepturum spero. Cy-
tisus agro sterco rato minime opus habet, ut qui macri terra foeliciter pro-
ueniat. Non ætus, non frigor, non grandinum aut niuis expauescit in-
iuriam. Mirum autem uideri potest, quod & in Italia, præsertim in ijs locis
ubi pecuarius questus uel maxime uiget, hoc papuli genus ignotum sit. Cy-
tisus duplex Columellæ, satius scilicet & alter suæ spontis, cuius generis
hunc qui ad me peruenit Cytisum esse opinor, nam inuentus dicebatur in
agris sponte sua enatus.

NOMENCLATVRÆ.

Propterea quod Cytisus caprinū pecus optime pascat, quodq; illo capre
plurimū gaudeat, ideo Germanica lingua ad differentiā aliorū Trifoliorū
Grossen geißflee/id est Caprinum Trifolium maius uocare libuit. Dio-
scorides Teline, Lotum magnum, Triphyllon, Trifolium maius cognos-
minari tradit. Huius & Vergilius meminit Ægloga 1.

Elorentem Cytisum, & Salices carpetis amaras.

VIRESCAC

Cytisus.

Grosser Geißlee.



VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Dioscoridi folia refrigerant, id quod fortasse de recentibus intelligit. Ægine-
tæ uero Cytisus tempera-
tura sua cum Malua com-
municat. Potestq; utrinque
corpori utiliter adhiberi.

INTRINSECVS.

Decoctum potu urinam
ciat, ut inquit Dioscorides.

Inter omnes uero herbas
quæ lactis copiam pariunt,
tam pecoribus quam mu-
lieribus, uix præstantiorem
reperias ipso Cytiso. Siqui-
dem mulieres si lactis ino-
pia premuntur, Cytisum
aridum in aqua per nocte
macerare, posteaq; expresso *Vide Columel.*
succo modicum uini admi-
scere debet, & bibere, quod *Plinium lib.*
si fecerint, lactis copiam illi
cohabebunt.

Cytisus, gallinis, apibus,
capris, bubus quoque &
omni pecudum generi uti-
lissimus pabulo.

EXTRINSECVS.

Folia & semen Cytisi trita & illita tumores inter initia discutunt,
quemadmodum & alia Lotorum genera.

De Chamæspartio. Cap. VII.

Erdspymmen.



Tinctorius flos
exiguus.

cant. Sunt qui Erdspymmen/hoc est, terrestrem, seu humilem Genistam nun-

cupent.

MAIO MENSE CVM
Genistæ florent, in aridioribus & incultis campis quæ plerunque ouibus pascua præbent, fruticulus quidam reperitur, tota sua substantia haud temere do-
drantem excedens, radice lignosa, coliculis multis herbaceis, angulosis, folijs Lenticulæ, seu Genistæ, flore luteo, stipato, spiceo, Orobo simili conspicuus, semine atro, tereti, instar exigui Orobi, in siliquisnigris rotundis (quæ Iulio mense apparent, & Genistæ modo rumpuntur ubi ad maturitatem peruenerint) contento præditus. Cæterum coliculi ipsi usq; ad sequentem annum illæsi frigora hyemis sustinēt, tum enim noui regerminant. Planta tota omni prorsus odore destituitur.

NOMENCLATURAE

Pauci sunt quibus hæc planta cognita sit. Nonnullæ tamen mulierculæ, Flein Streichblumen/ hoc est, paruos tinctorios flores uo-

cupent. Græce forte licebit *χαμαίριον* dicere, quemadmodum & Chamædrym, & Chamæcyparissum dicimus. Si quis ad Lotos sylvestres hanc herbam referendam putet, cum eo non magnopere contenderim, nam & seminis odor, & floris forma Lotis satis respondent.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Hi flores puerorum quoque crepundijs & lusibus inseruiunt. Et quantum mihi quidem uidetur, temperamentum Orobi & Fœnogræci obtinent. Præter hæc quæ adduximus, nihil de hac herba mihi constat.

De Ferula. Cap. VIII.

HEC HERBA E' LIGNOSA RADICE QVINQVA-
H ginta fere, interim et plures tenuissimas emittit uirgas, cubitales, nigricantibus ab imo ad summum usque uestitas folijs, ad Hyssopi fere formam accedentibus. Florem fert in fastigijs uirgarum luteum, compositum & frequentem, Genistæ similem, sed minorem, semen in siliquis rotundis & nigris Orobo haud dissimile, idque Augusto mense Iulio namque floret. Nascitur in aridis & incultis agris, ouiumque pascuis, nonnullisque agrorum limitibus. Hoc flore lineæ uestes simul & laneæ optime tinguntur, quo nomine Tinctorius flos quibusdam dicitur.

NOMENCLATURAE.

Veteres Romani multas herbas quotannis sale conditas in usum quotidianum reponebant, ad quæ salsamenta & Ferulæ herbæ asparagi usurpati semper fuere. An uero præsens hæc herba (quam Germani Gälserblümen, & Heideneschmuck uocant) Ferula ueterum sit, in præsentia quidē nec asserere neque negare conabor. Certum tamen est duas plantas ueteribus hoc nomine insignitas, quarum altera libro tercio cap. lxxxij. a Dioscoride descripta est: altera uero cuius & Nicander in Theriacis meminit, Ferula, lib. iij. cap. cli. de qua uide Plinium lib. xij. cap. xxij. & Onomasticon Brunfelsij. Thapsiam Dioscorides Hypopion, Pancranon, Scammonion, Thelyterin, Ferulaginem, Ferulam syluestrem, & Bæden. Arabes Thesific cognominant. Iacobus Manlius Piperiam nuncupauit. Sed ut ad nostram Ferulam reuertamur, uidetur illam significasse Columella lib. x. cum scribit, *Capparis, et tristes inula, ferulaque minaces.* *Elantantur.*

Etuc

Ferula.

Gälsedblümen/Seidenschmuck.



Erutica sentiam forma memouet, sin aliter statuendum sit, dicant nobis herbarij qui omnia se scire putant, quamnam herbam intellexerit Columella. Nos nostram hanc herbam Ferulam nuncupabimus, Ferulae doctorum ut uulgo dicitur nos subiicientes, quoad certiores aliquam appellationem cognoscamus, tamen si non male ad *σάπριν* referri posse uidetur. De illo tamen lib. iij. cap. viij. plura dicemus.

VIRE AC TEMPERAMENTUM.

Quod si herba hæc sub Ferula Dioscoridis descripta sit, certe utriusque corporis partibus adhiberi potest.

INTRINSECVS.

Ferula recēs uino & aqua decocta & pota, ad cruentas excreationes, & coeliacos affectus utilis est, contra etiam viperarum morsus eodem modo conducit. Semen tusum & potū torminosi prodest, ac ad acidus ructus certo experimēto unice conducit.

EXTRINSECVS.

Semen naribus inditum erumpentem sanguinem sistit.
Semen in farinam redactum oleoq; mixtum, si ex eo corpus inungas sudores ciēt.

De

De Cicere arietino, quod uulgo Pisum nominant.

CAP. IX.

Erweyssen.



ABSOLVIMVS VT

cunque Trifoliorum & Lotorum historiam, superest ut ad culinarias herbas nos recipiamus, quæ ueteres Legumina nuncupant; utraq; dicta a legendo, quod ea non secantur, sed uellendo legantur, quemadmodum testatum reliquit Marcus Varro. Cæterum uaria leguminum sunt genera, pauci tamen inueniuntur, qui ea discernere queant; quantum uis plurimis saepe uerbis rem tractent; aut potius obscurent. Nos distincte singulorum genera proponemus, nostræ quidem Germaniæ cognita, a' Pisorū (sic enim uulgo uocant, sed perperam, ut docebimus) cognitione auspiciaturi. Eorum in Germania tria satiuæ extant genera; quæ nos selde erweyssen/ Blos erweyssen/ vnd psal/ oder groß garten erweyssen patria lingua uocitare solemus. Quæ Blos erweyssen nobis dicuntur prima maturescunt, caule primario uiri proceritatem attingente, striato, digicum crasso, fistuloso, folijs magnis.

M. Varro de re rust. lib. 2. ca. 32.

1.
Primum Pisorū
genus.

gnis ipsum rotatim ambientibus, e cuius alis prætenues surculi prodeunt, Triphylli folijs tenerrimis pinguiusculis, & rotundis utrinque uestiti, in fastigijs uero capreolos habentes quibus se palis alligat. Inter has adnascētijs e caule primario nudi & perexigui prorumpunt pediculi, floribus albis, ad Genistā fere accedentibus, ijsq; binis emicantes, qui in binas quoque & oblongas desinunt siliquas, pisīs inter cetera genera præstantioribus, Iulioq; mense maturefcentibus refertas.

2. Quæ uero gross garten Erweyssen nuncupantur, caulibus, folijs, strijs, *Alterum Pisori* uenisq; clauiculis, floribus, & siliquis superiori generi respondēt, nisi quod *genus.* caules habent proceriores, magisq; tenues & rotundiores, geniculis deniq; longioribus interuallo distantibus, e quibus haud temere plures duabus siliquis prorepunt, interstinctos. Hæc Augusto mense maturefcent, inter quæ nonnulla ex cæsiō uiriditatem quandam præ se ferunt, coctū ut multis placet faciliora. Illis caduca est natura, nisi enim fulciantur, foeliciter prouenire non possunt.

3. Pisa agrestia Germanis feldt Erweyssen dicta, ea nimirum quæ in ar- *Agrestia Pisa.* uis citra præsidium palorum crescunt, tota sua substantia magis sunt exigua hortensibus, & breuiora, flore prædita candido, qui in gemellas ut plurimum siliquas abit, clauiculis & filamentis mutuo sese complectentia. Ex his nonnulla reperiuntur, quæ subrubicant ubi decocta fuerint, floribus diluti rosei coloris, comantia. Inter omnia leguminum genera uix ullum uulgo uisitatius est Pisis, præsertim uero agrestibus, quæ ut dixi nullo adminiculo fulcita humi serpunt, nam reliqua palis quibus incumbant, uenti tempestatumq; secuta, coniungere oportet. Cæterum omnia Pisorum genera allosa sunt, hyemiscq; impatientissima.

4. *Agrestis Pisi al-*
terum genus.

NOMENCLATYRAE.

Quanquam nihil Pisis ut diximus uspiam locorum magis in usu sit, tamen quo nomine ueteribus appellata fuerint, uel doctissimi quicq; pronunciare dubitant, quin post longa certamina, multasq; contentiones, uulgare Pisi nomen huic legumini tandem uno consensu imponunt omnes. Manardus Ferrariensis Medicus, ætatis nostræ excellentissimus inter cetera & Pisorum meminit, statuens ea Phasiolum & Dolichum esse Theophrasti & Dioclis, aliorumq; ueterum rei herbariæ scriptorum, Latinis Eruilia dicta, seu Rouilia, quibusdam Rodionos, Veneris uero Pisarelos. His addit Phasiolum Galeni de alio legumine, nempe eo quod Theophrastus Siliquam nuncupat intelligendum. Proinde censet Hermolaus Phaseolum Galeni, seu Siliquam Theophrasti, Lobum esse Arabum, Græcis Smilaca appellatum. Atq; hoc pacto tres plantas Phaseoli nomine nuncupatas audimus, nimirum

nimirum Lobum Arabum, Pifa vulgaria, necnon id legumen cuius altero abhinc capite mentionem faciemus. Atque hæc est Manardi, & Barbari sententia, a qua nos longe diffidemus, non quod auctoritatem doctissimorum uirorū (qui, quod in grariam studioforū tot, tantosq; labores suscipere non grauari sunt, laudē suā & memoriā nunq̃ intermoriturā apud omnes bonos habebunt semper) imminuere cupiamus, sed ut & nos pro uirili nostra herbariā cognitionem iuueamus. Hęc inquam est causa cur nostrā tam in hac quam alijs plantis sententiā proponamus. Ac sentiant alijs qd̃ lubet, nos nostra in medium adferimus doctioribus, ueritatisq; studiosis dñjudicanda. Si cui uero hæc non satisfecerint, eum rogamus ne in malam capiat partem, quod a nobis bono animo scribitur, ipseq; si potest meliora & certiora proferat, nec enim suam cuiquam laudem inuidebimus. Sed ut tādē quod entio aperiam, quod uulgo Pisum appellant, ego Cicer arietinū Diosc. esse iudico, quod ille libro secundo cap. lix. sub Erebintho describit, quæ uox cum Germanica appellatione *Erweissen* siue *Erbsen* satis conuenit. Tamen etsi uero huic Dioscoridis de Cicere capiti ab initio nonnihil deesse uideatur, tamen nihil impedit, quominus Pisum, Cicer arietinum certis de causis nuncupem. Si namq; Pifa, siue hortensia, siue agrestia inspexeris, deprehendes valuulas illorum effigiem cornu arietini exprimere. Cum itaq; natura hoc legumen eiusmodi inscriptionem repræsentare uoluerit, amabo te quam commodiore appellatione nominabitur, præsertim cum Dioscorides Ciceris duplicis, adeo manifestam differentiam proponat, inquires. Est & alterum Cicer arietinum appellatum. Hæc fere sunt quæ de appellatione huius uulgatissimi leguminis breuibus dicere uolui. Quid uero de appellatione Pisi sentiam suo quoque dicetur loco. Hebræi (ut & hoc annotemus) seu Thalmudistæ potius, Pisum פיקדן *Parkedan* uocant, teste Aruch Monstéri.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

In Germania nullum in culinis frequentius legumen habetur Pisis, tam diuitibus quam pauperibus familiare. Hæc magna saturandi, alendi, nutritiendiq; ui pollent, si Galeno credimus. Habent & in medicina laudem suam. *Galenus in libro de cibis boni & malisucci.*

INTRINSECVS.

Coqui uarijs modis Cicer arietinum decoquere & præparare norunt, quam artem ipsis relinquemus.

Cicer arietinum cum radice Petroselini decoctum, in cibo puerperis utilissimum est, nam eo iure per urinam superflua multa purgantur, præsertim si

tim si decoctioni Macis & Rosmarinus adijciatur. Adfert ea quoque lacti copiam, unde facile colligi potest Pisa boni ut uocant nutrimenti esse.

Iusculum Ciceris arietini regio morbo laborantibus, & incipientibus hydropicis subuenit, per aliquot dies usurpatum.

Breuitè citra periculum in omnibus fere morbis iure Ciceris arietini decocti uti possumus, neque hic curo quid alijs assuerent, uel negent.

EXTRINSECVS.

Cicer arietinum aqua & lixiuio decocto, manantia capitis ulcera sanat, singulari experimento.

Idem decoctū maculas faciei, & cutis uicia emendat collutu.

Hoc decocto si & mel & farina ordeacea miscatur putrida & manantia ulcera cicatrici alioquin repugnantia, curantur.

Cicer arietinum cum Orobo in aqua decoctum, ac emplastri ritu impositum, locorum tumores detumescere facit, doloremq; sedat. Eadem posunt & Fabæ.

In uerrucarum formicantium pensiliumq; genere, prima luna singulis granis singulas tangunt, eaq; grana linteolo deligata abijci post se præcipiunt, ita decidere eas arbitrantur.

Diosco. lib. 2.
cap. 95.

De altera Ciceris specie. Cap. X.


CICER MEDICINAE POTIVS QVAM CVLINAE Apud nos inferuit. Eius tria existunt genera, album, nigrum, & ruffum. Cicer Phasiolis simile est, sed acutius, flore aliud comans purpureo seu roseo, aliud candido, nam hoc potissimum differunt uniuerfa Ciceris genera, odore & forma alioquin cōsimilia. Etenim iisdem caulibus & folijs prædita sunt, nec clauiculas quibus palis se alligare possent, ut cætera legumina obtinent. Vsitatius nobis ruffum. Cicer legumen surculosum est arbusculæ instar, folijs pinnatis, Orobo maioribus, Glycyrrhizæ haud absimilibus, nigricantibus, uestitum. Siliquas gerit rotundas, quemadmodum & Theophrastus & Plinius testati sunt, articulum longas, inflatas quasi, terno ut plurimum seminio prægnantes. Radix ei brevis, utpote quæ diginum non excedat, quod & in reliquis æstiuis frugibus uideri est. Cicer delicatissima est planta, raro foeliciter prouenit, præsertim ubi annus fuerit humidior. Præterea tum alba in ruffa Cicera transire consue-

Theoph. lib. 9.
cap. 5.

Plin. li. 18, ca. 12.

Cicer.

Zyser Erweiffen.



NOMENCLATURAÆ

Cicer Græcis *ῥαβδον*, Germanis Zyser Erweiffen dicitur. Differt colore ut diximus, unde & uarium illi nomen, nam aliud ruffum Germanice *Koh Zyser* / aliud nigrum, hoc est, *schwarz Zyser* / aliud postremo album, Germanis *weiß Zyser* nuncupatur. Auicenna lib. ij. cap. cxxxij. nigri meminit Ciceris, quod e Norimberga ad me transmissum uidi. Cæterum omnes Ciceris species ad Pisa referenda nobis uidentur, a ueteribus tametsi suis differentiis notata, nihilominus tamē sub una & eadem Erbinthi appellatione (meo iudicio) a Dioscoride comprehensa lib. ij. ca. xcv. Cicer a colore & forma alias atq; alias in scriptis ueterum appellationes sortitum est, ut dicatur, Arietinum, Columbinum, Venerium, Punicum, album & nigrum, ruffum. Est & quæ Cicercula, nuucupatur, sicut & Orobe, & Crii, hoc est, Arietini mentio apud Aeginetam extat, Sera

Plinius. lib. 18.

cap. 12.

Galen. lib. 6. de

simp. & lib. 1. de

alimentis.

Aegin. lib. 7.

Serap. cap. 80.

pio Cicera, Chemps, alba Karfennæ, nigra uero Chubcs nominat.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Cicera coquis non perinde atq; Seplastarijs familiaria, hodie aduersus calculum fere usurpantur. Quamobrem ut calidæ & siccæ sint temperaturæ necesse est.

INTRINSECVS.

Ciceris in aqua decocti ius secundum, nam quo primum decoquitur effundi debet, à ieiuno potum, urinam ciet, calculum pellit, incipientibus hydropicis utile est.

Qui continuum cum dolore ex renibus profluuium patiuntur, aut exulceratam habent uescicam, ij Ciceribus non crebro utantur, propterea quod ob insignem pellendi uim hoc pacto affectos facile lædant.

Cicere ad pulmonem sustentandum uix quicquam commodius reperias teste Auicenna lib. ij.

EXTRINSECVS.

Vi res Ciceris, quas in externis corporis partibus medendis obtinet precedenti capite, cum de Pisis ageremus explicatæ sunt. Obseruandum tamen Cicera Pisis in omnibus efficaciora esse.

De Phasiolis. Cap. XI.

P HASIOLI ROTVNDIS, LONGIS, FISTVLOSIS SVIS & genicularis caulibus, necnon folijs, surculis, capreolis & siliquis per omnia maiori hortensi Piso, quo de altero ab hinc capite egimus, respondent, nisi quod proceriores ac grandiores euadunt. Differentia utrorumq; in geniculis, qui inter folia et ramulos uisuntur, maxime consistit, nã in Phasiolis quidẽ plane purpurei aut punicei apparent, qd in nullo Pisorũ genere deprehendas. His adde quod & flores Phasiolorum non albi sunt, ut in Pisis uidere est, sed in anteriore quidem sui parte rosei coloris, in posteriore uero purpuræ saturatæ. Phasioli cum maturitatem suam affecti fuerint, id quod eodem sit tempore, quo & Cicer arietinum maturescit, non rotundam figuram, sed rotundos angulos præ se ferunt, alij quidem spadicei (nam plura eorum sunt genera) per omnia Pisis, siue ut nos uocauimus Cicere arietino maiores. Atque hoc primum est Phasiolorũ genus.

2. Alteri in nostris regionibus, nulla fere cultura adhibetur, proflit autem illud sponte sua inter Pisa agrestia, quibus, caule, herba, & siliquis similis existit. Rursus flore purpureo ad Phasiolos maiores, quos in hordis plantamus accedit.

Phasioli.

Phasoli.
Säfelen.



Phasoli uero peregrini ^{9.} *Tertium Phasio*
 albi sunt, nigris punctulis, *lorum genus.*
 uti uulgares Fabæ notati.

NOMENCLATURÆ.

Paulus Aegineta libro primo ca. lxxxix. Phaselos Dolichos cognominat. Rursus quæ de Dolichis dicuntur Pīso magis cōgrue re censet Marcellus Vergilius, conaturq; ex Theophrasti libro octauo cap. iij. sententiæ suæ patrocinari. Is enim scribit Dolichos si ligna lōga affixeris, ascendere, & frugiferos fieri, sin aliter, uitiosos & eruginosos. Iam cum Pīsa nostra sine presidio palorum uix in altum sese attollere, & ad frugem peruenire possint, putat Marcellus ea Dolichi appellatione insignienda, præsertim cum Dolichon longum Græcis dicatur. Hæc fere Marcellus, cui duplici ratione responderi posse intelligo. Primum ut dicamus, & Phasiolos, qui in hortis plantantur, palorum quibus nitantur usu indigere, cum proceritate Pīsa superent. Deinde uero manifestum est, non tantū

Pīsa, sed & Phasiolos quibus agri conferuntur, nullo adminiculo egere, sed mutuo sibi incumbere, quod nemo negabit, qui uel Pīsa uel Phasiolos in aruis uiderit. Quamobrem nos de Phasiolis simpliciter id sentiemus, quod

Dioscorides, qui de illis libro secundo capite xcix. ita scriptum reliquit
 „ Phasioli inflant, spiritus cient, ægre coquuntur, uirides cibo aluum
 „ emollunt, ad uomitiones idonei. Hæc ille. Quod si Dioscorides
 cognouisset Phasiolos, Dolichos quoque Græcis cognominari, ex Theo-
 phrasto utique & alijs id indicare potuisset. Hæc uero eo nobis dicuntur, ut
 quæ hætenus obscuræ fuerunt plantæ, rursus in posterum cognitæ fieri in-
 cipiant. Existimamus ergo Phasiolos, esse eos, quos Germani *fäseln* aut
Germanis fäse-
len seu Bonen. certe quos *Bonen* uocant, hoc est, Fabas. Nam si quis *fäseln* Germano-
len seu Bonen. rû, ad *Cicera*, *Bonen* uero hoc est fabas, ad Phasiolos Dioscoridis referat,
 cum eo minime contenderim. Dolichos autem qui Galenus & *Æginetæ*
Phasioli cognominantur, Siliquam Theophrasti, & Smilacem hortensem
 Dioscoridis esse reor. Equidem uidetur mihi Galenus ipse de Dolichis du-
 bitasse, tametsi primo de alimentis libro, Phaselum tribus syllabis pronun-
 tiat, Lathyrum esse, aut aliam quandam eius speciem, Phasiolos uero quos
 quatuor proferunt syllabis Dolychos, seu Siliquam Theophrasti, statuatur.
 Ab hac sententia nos nō longe absumus, nam Phasiolos Dioscoridis, Ger-
 manis *fäseln*/seu *Bonen*/hoc est, Fabas dictas intelligimus. Phasiolos ue-
 ro Galeni, Siliquam Theophrasti, & Smilacem hortensem Dioscoridis pro-
 nunciamus. Arabes quod sciam Phasiolorû haud meminere, nisi forte Mes-
 ipsorum ad eos pertineat. De illo tamen paulo post, nolumus enim quen-
 quam in nostram sententiam pertrahere. Nos quid sentiamus scribimus,
 sequatur quisque quod ipsi maxime arriserit.

Peregrinos Phasiolos postremo loco a nobis descriptos Mes Arabum
 seu Rouillas esse iudicamus.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Fabæ & Phasioli, sicut & *Cicera arietinum* Sinapi perfusum, tempore
 quadragesimali pauperibus in cibo usurpantur, legumina passim in Rheni
 tractu usitatissima. Naturam obtinent calidam & humidam.

INTRINSECVS.

Phasioli & fabæ inflant, ægre coquuntur, ad laborantes & operarios
 maxime pertinēt. Nam qui in ocio degunt, aut alioquin imbecilliores sunt,
 eiusmodi cibos uitent. Virides tamen Fabæ & Phasioli æstate commedi-
 possunt, emolliunt enim aluum.

Phasioli uirides ad uomitiones excitandas idonei sunt.


EXTRINSECVS.

Phasioli, Fabæ, Orobi, *Cicera arietina*, ipsi dem fere pollent facultatibus,
 sedandi.

Sedandi nimirum dolores & tumores, locorum præcipue, possuntq; inã
differenter usurpari ad prædictos affectus. Sed de his supra cap. x. plura.

De Pífo Græcorum. Cap. XII.

Bechern.



MAGNO SANE LA-
bore Phasioli, Orobi, &
Písa, necnon Cícera arietini
na maxime agrestia secer-
nuntur. Atqui hodie ea est
agricolarum socordia, ea
negligentia, ut quævis le-
gumina mixtim serant, id
quod ab illis fieri consue-
uit, propterea quod diffe-
rentiam Ciceris arietini,
Phasiolorum, & Píforum,
parum aut nihil atten-
dant. Cæterum ut relictis
his ad Písa nostra nos con-
feramus, solent ea nō ubiq; ^{Písum Græcorum}
locorum plantari, licet in-
ter legumina haud postre-
mum occupet locum, nam
& optimi saporis et coloris
iuscula decoctorum sunt,
longeq; præstantiora ipso
Cícere arietino. In agro
Vangionum inter Spiram
& Vormatiã magnus eo-
rum & frequens usus, ita
quidem ut proverbio illis
hominibus vulgatissimo
occasionem dederint, quod
dicitur, Wir haben stehes
Bechern vñ Lemmerteschẽ.
Hoc legumen longe alijs so-
lijs & caulibus præditum
Qq iij

est, quam uel Cícera arietina uel Phasioli. Habet namque oblonga & mucronata folia, capreolos etiam quibus sese ad proxima quæq; alligat, caules uero tenues, angulosos, & humi procumbentes, non aliter atque Cicer arietinum agreste. Floribus comat candidis instar Ciceris iam dicti, qui ferè singuli singulis nituntur petiolis. Siliquas gerit incuruas, pisiferas, non rotundis, sed cōpressis simulq; triangularibus, aut quadrangularibus.

2. Syluestre eius genus in quibusdam dumetis reperitur, folio prælongo, acuto, clauiculis tenuissimis, quibus more ceterorum leguminum hinc inde reptat, flore quandoque luteo, semine pullo.

Pisum Græcorū syluestre.

NOMENCLATURA.

In nostris regionibus satium legumen quod primo loco posuimus, *Fichern*/siue *Fichern* nominant. Sunt qui Cicer arietinum, sunt & qui Colubinum uocatum uelint. Sed utcumque hi quidem appellauerint præsens legumen, nos *nios*, Græcorum esse affirmamus Plinij uerbis adducti, qui scribit Cicerulam esse minuti Ciceris, inæqualis angulosi, ueluti *Pisum*. Quis uero non uidet hoc nostrum legumen angulis reliqua superare? Non desunt autem qui Arabum Mes, siue Almes, aut ut Auicenna habet *Meisce*, *Pisum* esse contendat. Serapio quidem Mes, & fructum eius *Robillas* nigras habere maculas scribit, uideturq; mihi aut exiguum illud agreste & fuscum Ciceris arietini genus, aut certe quod & uerisimilius mihi fit, Fabas nostras Germanicas intellexisse. Ex namq; nigris magisq; conspicuis maculis notati sunt, quam uel dictum Ciceris arietini, uel Phasiolorum tertium & peregrinum, quod non ita pridem ad nos Germanos uenit, genus.

Syluestre presentis nostri leguminis genus Germani *Wild Fichern*/et *Dogelwischen*/ propterea quod non perinde sit cognitum uocant. Recentiores hoc legumen quod nos *Pisum Græcorum* interpretati sumus, *Eruum* & *Orobum* non sine errore nuncupant. De *Eruis* suo quoque dicitur loco.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Pisum Græcorum in medicina & cibis non aliter atque Cicer arietinum usurpari potest. Vrin à cetero efficacius Cicere arietino, in cibo gratius, per omnia uero ei quod uulgo Cicer uocant, quo de altero ab hinc capite egimus, respondens, natura quippe calidum & ficcum.

De

De Smilace hortensī, seu Siliqua Theophrasti.
CAP. XIII.

Smilax hortensis.
Welsch Bonen.



SCRIPSIT MARCEL-
lus Vergilius, parū sibi ue-
risimile uideri, ad eam alti-
tudinē & frondium copiam
posse legumen aliquod au-
geri, ut scenas & tabernacu-
la uestiens in umbret. Quod
si is Smilacem hortensem
uiridem uidisset, dubio pro-
cul longe aliter pronuncia-
turus erat. Sed imperitia
rerum eo nos quandoque
deducit, ut incognita no-
bis aut negemus prorsus,
aut damnemus. Eadem cer-
te ratione nemo inter Ger-
manos, antequam ad nos
commigraret Smilax hor-
tensis, facile credidisset, legu-
men aliquod in tantum ex-
crescere posse. Qui sit ut ue-
nia mihi dignus uideatur
Vergilius, qui & ipse cum
plerarumq; plantarum ui-
uas imagines haudquaquam
uiderit, facile dubitare de
nonnullis potuit. Manife-
stum est ergo Smilacē hor-
tensianam proceritatem pe-
damenti prelogi, ad quod
Lupulus in altum scandere
solet, cultura nimirum in-
uitatus, quod in Saxonia

alijsq; locis uidere est, ubi non aliter atque uineæ palis & ridicis Lupulus ad-
iungitur. Germani etiam *hopffen stangen* uocant, æquare, & non raro etiam
superare, clauiculis ac flagellis uicinis fruticibus parietibus & palis affixis
circumuolutam. Folijs uestitur ab imo usq; ad summum asperis, Hederae
similibus, sed latoribus & tenerioribus, hsc ut plurimum ternis, crucis &
Trifolij, aut vitis albæ de qua infra cap. xciiij. formam imitantibus, unicoq;
pediculo nitentibus. Inter hæc flos crumpit petiolis tenerimis suffultus,
alius candidulus, alius pallidus, postremus denique rubicans, formam in
uniuersum Ciceris aut Phasiolorum æmulans. Flosculi in prælongas fili-
quas latitudine & longitudine quæuis legumina excedentes abeunt, in qui-
bus fructus diuersi colores, renunculisq; similimi reperiuntur. Sunt enim
nonnulli rubri, alij ex albo purpurascunt, orbibus atris uariiegati, quidam
spadicei, simulq; nigris maculis aspersi, alij candidi, nonnulli incani, atro co-
lore, uel partim, uel utrinque notati, plerique etiam protinus fului. Smilax
hortensiana semina sua in filiquis Augusto mense & circiter Autumnum
ad maturitatem perducit. Estq; aliosum plane legumen, ut quod nec prui-
nam ferre queat. Nam in frigidis regionibus, si primo uere ante debitum su-
um tempus terræ committitur, pruina aliquantulum durior superuenien-
tes facillime encatur. Similiter ubi Autumno præsentē, filiquæ maturitatē
suam haud dū consecutæ fuerint, frigoribus non possunt resistere, quin to-
ta sua substantia protinus decidunt, ac quasi semicoctæ apparent. Hinc mihi
uerisimile sit hoc leguminis genus e' calidissimis regionibus ad nos perue-
nisse. Opus habet pingui solo, & aprico, aliter nunquam felices progressus
faciet.

NOMENCLATURAÆ.

Leonard. Fuch. Germani Smilacis hortensianæ semina *Welsch Bonen* & *Welsche Fäse-*
1. Paradox. cap. 38. len/hoc est, Italicas Fabas, seu Phasiolos Italicos uocant. Siue uero Fabæ si-
ue Phasioli dicantur parum refert, modo non intelligantur hsc Phasiolis con-
generes esse, de quibus altero ab hinc capite diximus. Omnibus namq; con-
stat eos diu Germaniæ cognitos fuisse, hanc uero plantam, quæ nobis *quintia*
Diosco. lib. 2. *nordia* dicitur, non ita pridem Germanis innotuisse. Fructus huius *Nolia* Gre-
cap. 135. cis, Lubia Arabibus appellatur, a' magnis nimirum et longis filiquis quas
obtinēt. Dicuntur autem & reliquorum leguminum filiquæ Lobi, ut sunt
Fabarum, Pisorum, Phasiolorum, Lentis & Oroborum. Quid de Lobis
senserint Barbarus, Manardus, & alij, ex commentarijs ipsorum patet. Ego
peregrinas istas Fabas haud aliter nuncupabo, quam Smilacem hortensia-
nam, quemadmodum & ante annos aliquot piæ memoriæ uiro D. Otho-
ni Brunfelsio, a' me in Dioscoride indicatæ fuere. Neque puto quenquam,
qui mentis suæ compos exiterit, sententiæ meæ reclamaturum. Hic uero
uideant

uideant docti nunquid non hæc planta Theophrasti Dolichus, seu Siliqua *Theoph. lib. 8:*
 fit, quam Galenus Phasiolum, seu Phaselum nominauit, quæ uerba magne *Galenus lib. 1,*
 inter doctos contentionis occasio fuere. De Phaseolis Auicenna libro se- *de aliment.*
 cundo cap. cclij. Serapio cap. lxxxij. scripsere. Auerrhoes eorum sub uoce *Plinius lib. 18,*
 Leuquibi meminit. cap. xxxix. Plinius Lobas frugibus accenset, omniumq; *cap. 7.*
 fertilissimum ait esse, ex uno enim grano ternos sextarios gigni, cuius qui-
 dem sententia nostre minime detrahet, præsertim cum uix fertilis legumen
 hac nostra Smilace horrensi norim. Siquidem uno in anno ex una rubra
 Italica Faba, modium, quem nostra lingua cin Stimmer euocat, legi.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Fabæ Italianæ nostris quoque coquis familiares esse coeperunt, nam eas
 uarijs modis decoquunt, præsertim uero niueas, nam illas in iure galli-
 naceo coquere solent. Sunt qui recentes cum siliquis præparent, non aliter
 atque Cicer arietinum cum siliquis decoquitur, urinam cient. In cibo me-
 lancoliam augent, sanguinem atrum faciunt, & tumultuosa somnia, præser-
 tim recentes adhuc, quemadmodum Dioscorides restatum reliquit. Gale-
 nus diligenter & exacte siccitas ac repositas, tustoris esse usus tradit, & ut
 Pisa usurpari posse.

De Faba Germanica, necnon ea quam Inuersam
 uocant. CAP. XIII.

IN GERMANIA NOSTRA DIVERSA FABARVM GE-
 nera proueniunt, magnitudine, & colore differentia. Sunt enim *Faba vulgaris.*
 quæ magnæ, sunt quæ exiguæ nuncupantur, & ex his quidem
 aliæ ruffæ, aliæ candidæ existunt. Vulgares agrestes fabæ tres, aut quatuor,
 quæ uero maiores sunt maxime ruffæ plerunque binæ, drachmæ pondus
 æquant. Fabæ nostrates omnes eandem herbâ, eosdem caules, flores & fol-
 liculos habent. Faba scapum obtinet unicum, minime surculosum, erectû,
 quadratum & concuum, capreolis uiduum, quod in nullo alio legumine
 uideas, folijs uestitum rotundis, pinguibus, per æqualia interualla ex ordi-
 ne collocatis. Inter folia uero & scapum, flores palliduli prorepunt, maculis
 intus atris notati, in modum pene urticæ candidæ, nempe eius quam Gali-
 opsin uocant. Folliculi eius seu siliquæ teretes, cum ad maturitatem iustam
 peruenerint, nigri euadunt, quinque aut sex ad summum Fabis referti. Por-
 ro omnes Fabæ cuiuscunque tandem sint generis, nigram quandam & ob-
 longam maculam ostendunt, uerniculi rudimentum satis exprimêtes. Cæ-

Faba Germanica.

Tetrischboneu.

2.
Faba inuversa.

Plinius lib. 18.

cap. 7.

Theoph. lib. 9.

cap. 1.

πύραυλος δὲ, ὡς δὲ

αὐτὸν οὐκ ἔστιν

αὐτὸν ὡς δὲ ὡς

πύραυλος δὲ ὡς

ἐν δὲ ὡς ὡς

num diem erumpere, contra quam alia soleant legumina, quæ quarto exe-
unt. Deinde omnia legumina singulas habere radices præter Fabam, aut or-
est Plinius lib. xvij. cap. vij. qui & decimo eiusdem libri capite miram Fabæ

terum fabæ ipsæ non sunt
teretes, sed oblongæ, latæq;
& videntur quasi compres-
sæ. Seruntur cum Cicere arie-
tino verno tempore, intra
sex dies in folia exeunt. Ra-
dix Fabæ recta, breuiuscu-
la, paucisq; capillamentis
fibrata.


Fabæ quas Latini Inuer-
sas, Germani uero Baum-
bonen, siue Gewantbonen/
nominant, ferulaceos ac li-
gnosos caules obtinent,
qui ab imo ad summum us-
que Triphylli foliis uestiuntur,
altero demum anno
frutificantes.

NOMENCLATURAÆ.

Fabas Germani Bonen
dicunt. Quam uero Fabæ
appellatio nostratibus re-
spondeat, ex sequentibus
quas subiiciemus rationi-
bus facile colligent uerita-
tis studiosi. Nam descriptio
nostræ Fabæ, ei minime
competit cuius ueteres rei
herbariæ scriptores memi-
nere. Primum etenim testa-
tur non solum Theophras-
tus, sed & Plinius, Fabam
tardissime, nempe a decima
mo quinto, usque ad uicesi-
mum diem erumpere, contra quam alia soleant legumina, quæ quarto exe-
unt. Deinde omnia legumina singulas habere radices præter Fabam, aut or-
est Plinius lib. xvij. cap. vij. qui & decimo eiusdem libri capite miram Fabæ
fertilita-

Faba inuersa

Baumbonen.



fertilitatem prædicans, scapum inuentū esse tradit centum Fabis onustum. Iam uero nostras Fabas conferamus his de quibus ueteres scripsere. Eæ namque quinto ut diximus aut sexto die erumpunt, radices habens rectas & breuiores cæteris leguminibus, ac uno denique folliculo rarissime sex fabæ reperiuntur, ita ut nihil ex his quæ fabis ab antiquis adscribuntur, in nostris reperias. Præterea scripsit Cornelius Celsus pustulam eam, quæ, quod noctu oriatur, Græcis *ιριουρις* dicitur, Faba non esse maiorem. Quisquis igitur epinyctidas unquam uiderit, uel in se uel in alijs ortas, is iudicabit proculdubio, illas cū Cicere arietino, aut Orobo plus affinitatis habere, quam cum Faba, maxime quod ad figuram attinet. Adhæc dicuntur Galeno teste *νωπευ* (quod nomen Fabis quoque commune est) aselli, animalcula in hydris nata (quæ Germani *Weselu* uocant) id quod a Fabæ similitudine, quam præ se ferunt, cum læsa globuli uel Orobi instar, conuoluuntur,

Cornelius Celsus
lib. 5. cap. 28.

Quid uero hæc ad nostras Fabas momēti habent? His adde, quod idem Galenus cum de ponderibus ageret, Fabam Ægyptiam (quæ magnitudine reliquas

Marcellus Ver-
gilius eo capite
numquam pronus
legendum cen-
set, Serapionem
secutus, qui Iuni-
perum ait repe-
riri, cuius fru-
ctus sit parvus
sicut Faba, nisi
quia ipse est ro-
tundus. Sed hæc
posteriora uerba
fortasse Mar-
celli sententiæ
aduersari uideri
possunt. Alij ta-
men aliter senti-
unt. Vide trans-
lationē Ruellij.
Diosco. lib. 2.
cap. 99.
Auicē. lib. 2.
cap. 245.

quas superat) dimidium obolum æquare scribit. Nouem autem oboli Ga
 leni, drachmæ respondent. Quod cum ita se habeat, facile colligere est, quot
 Fabæ ueterum drachmæ pondus obtineant, nimirum duodeuiginti. Rur-
 sus nostratum Fabarum binæ aut ad summum ternæ, ut supra diximus
 drachmam constituunt. Nonne uel hinc, quid in historia Fabarum desidere
 mus, nimirum nominis cognitionem apparet? Sed et alteram ex Iuniperis
 fructum ferre Fabæ similem, testatur Dioscorides lib. primo cap. lxxxviii.
 ut interim taceam. Xyrin, (de qua Dioscorides lib. iiii. cap. xxiii.) & nos in-
 fra cap. xlix. huius secundinostrorum commentariorum libri) cui semen in
 folliculis simile Fabæ, & rotundum attribuitur. Quid igitur dubitamus
 nostras diuersas esse a ueterum fabis? Qui sit ut mirari satis non possim,
 quod doctissimi uiri Barbarus inquam & Manardus & alij plerique, a Fabis
 quod prouerbio uulgari dicitur adeo abstinerint. Sed ut a Fabis tandem
 nos expediamus, nullum sane (Cicere arietino excepto) in nostris regionibus,
 præsertim uero Colonix, Metis, Spiræ & Argentorati, usitatius extat
 legumen, nam & hominibus & pecoribus in cibo & medicina usurpari fre-
 quenter solet. Quapropter nos quidem Pythagorico prouerbio, quo dici-
 tur, Abstine a Fabis, minime obtemperabimus, siquidem nostræ (quas ego
 Phasiolos potius quam Fabas siue Cyamos apud Dioscoridem uoca-
 tas sentio) ueterum Fabis, nihil respondere uideantur. Fabæ apud Auicē,
 nam Nabathio, Serapioni uero Hachille dicuntur, Hebræis פול Pol.
 Ezech. iiii. Hæc fere habui, quæ de Fabis dicerem, quæ si arridere possint rei
 herbariæ studiosis, utantur his mecum, sin cui certior & probabilior con-
 stet sententiæ, candidus eam nobis impertiat.

VIRESCAC TEMPERAMENTVM.

Temperamentum, necnon facultates Fabarum, supra, cum Phasiolorum
 historiam tractarem, exposuimus. Possunt autem Fabæ & Medico & co-
 quo inferuire, & utrinque corpori humano adhiberi, naturam enim obti-
 nent calidam & humidam:

INTRINSECVS.

Fabæ recentes (ut mea fert opinio) innoxie sunt in cibo, si ergo utemur,
 siccas operarijs relinquentes.

Sunt qui ex farina Fabarum placentas mellitas conficiant. Alij ut Alsa-
 tæ ea in saginandis porcis utuntur, ad quam rem accommodatissima est, si-
 quidem breui tempore ea saginantur porci, non aliter atqueamenta Cytho.

EXTRIN-

EXTRINSECVS.

Chirurgi collectiones & tumores locorum, fabacea farina in aceto, & uappa decocta, oleoq; admixto discutere ac sanare consueverunt.

Breuiter ea farina uino decocta ac calida imposta omnibus tumoribus, imprimis conducit, siue ij in mammis mulierum, siue in locis genitalibus, aut quibuscunque alijs oriantur.

De Lupino. Cap. XV.

EGVMINIBVS CVLINARIISQVE PLANTIS, ET

L Lupinus tristis accensetur, cuius in nostris quidē regionibus in Medicina q̄ cibo frequentior usus est, licet Apicij nostri qui delicias in omnibus sequuntur, Lupinos ut dulcescant, palatoq; grati fiant, præparare norint. Lupini albi sunt, lati, & compressi instar Ciceris arietini conquassati. Hi verno tempore cum cæteris æstiuis frugibus terræ committuntur, e qua sexto die erumpunt, folijs primo exortu Triphylo similibus, ubi uero adoluerint rotatim seu stellatim in quinas, senas, aut septenas partes dissectis. Circumaguntur illa cum sole, tempestateq; imminente haudquam ut alias eriguntur, sed demissa & quasi marcida pendent. Lupinus uniuersalis euadit, uiri proceritatem quandoque attingens, surculosus, multisq; in summitate ramis (qui omnes stellatis ornantur folijs) brachiatus. Radicem habet breuem sicut & aliæ Fabæ, quæ siue ferro succisa est, seu uulnerata, totus emoritur frutex, quemadmodum Columella scripsit, quod & ego ita se habere re ipsa comperi. Flores candidos instar Ciceris arietini profert Lupinus, copiosos, & frequentes, qui in teretes & hirsutas siliquas abeunt. Ter in anno Lupinum florere Plinius testis est, id quod ego hoc pacto deprehendi. Nam Iunio mense flores aliq; e medio caule prorumpunt, atq; ij Augusto plerunque mense maturantur. Hos cum maturari inciperint, excipiunt aliq; e surculis & ad nascentijs exeuntes, qui raro maturitatem consequuntur. Postremus flos Augusto mense apparet in fastigijs plantæ, qui frigoribus occupatus nunquam maturatur. Inter omnia namq; legumina primum feritur, nouissimum tollitur. Gaudet fabulosa & calidiore terræ

Aucenna lib. 2.

cap. 451.

Plinius lib. 18.

cap. 7. & 14.

Columella lib. 3.

cap. 12.

NOMENCLATURA.

Aucenna Lupinos (qui Germanica lingua Feigbonen dicuntur) eleganter depinxit, nisi quod falso illos fabam esse Ægyptiam affirmauit, id quam ueritate absit nemini obscurum esse potest, Serapio tria Lupini genera *Serap. cap. 74.*
commen

Lupinus.

Feigbonen.

Apul. cap. 110.
Diosco. lib. 2.
cap. 101.



commemorat, unum scilicet sativum, & duo sylvestria, vocatq; Tarinus, & primum genus Regales. Auerrhoes Tormos vocat. Apuleio Lupinus Thermos orinos, Lupinus montanus, Dioscoridi uero *μυσθινος*, & Brechon appellatur. De Lupino scripsere Theophrastus libro nono cap. ult. Platina libro septimo, Galenus libro sexto Simpl. & libro primo de alimentis: ubi *μολιχηνος* dicitur, ob varias quibus pollet utilitates. Lupinus apud Hebræos *תלת תחת* Taltan uocatur, uide Aruch Monstetri.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Vtut amari sint Lupini, nihilominus tamē mitescere illos docuit solers luxuria, aqua dulci infusa, ac sub inde renouara. Sunt autem Lupini calidi, & siccit temperamenti, habentq; uim aperiendi, discutiendiq; quo nomine utrisque corporis partibus mire commodant.

INTRINSECVS.

Lupinus aqua maceratus quoad amaritudinem agnatam exuat, deinde uero siccatus, & in puluerem redactus, ac ex aceto potus, fastidium detrahit & cibi auiditatem facit.

Potest

Potest uero Lupinus more aliorum leguminum cibo præparari.

Lupini in puluerem redacti, & ex melle siue aceto esitati, uentris animalia pellunt, non aliter atq; Lumbricorum (ut uulgo uocant) semen. Idem efficit aqua, in qua Lupini decocti fuerint, pota.

Decoctum eorum idem munus præstat, sed efficacius, cum Ruta & pipere potum, at pro ratione affecti, medicamentum id exhibendum erit. Hoc decoctum obstructions iocinoris aperit, nec non lienis.

Lupinus cum melle & myrrha temperatus, urinam cit, menses & partus extrahit.

EXTRINSECVS.

Aqua in qua Lupini decocta fuerint, omnis generis scabies, gangræna, eruptiones pustularum, papulæ maculæq; faciei, nec non manantia capitis ulcera, sanantur mirifice, si ex illa aliquoties affectæ partes abluantur.

Eodem modo cutis nitida redditur, liuores corriguntur, in primis uero facies abstergitur Lupinis coelesti aqua decoctis.

Farina lupini in aceto decocta & imposita, strumas dissipat, tubercula, collectiones & duritias discutit, coxendicum cruciatus lenit, & inflammationes mitigat.

Lupini cum radice nigri Chamæleonis in uappa, aut aqua decocti, scabiei pecorum, præsertim ouium medentur, ita ut tepente decocto per aliquot dies abluantur.

De Orobo, seu Vicia. Cap. XVI.

VICIA IN GENERE LEGVMINVM HABETVR, licet culinis repudiata, ut quæ pabulis duntaxat, præcipue autem equorum, & columbarum nata sit. Eius uaria reperiuntur genera, quædam enim maiores, aliæ mediocres, nonnullæ exiguæ censentur.

Maiores satius estimatur. Hæc bicubitalis fere assurgit, folijs utrinque pinatis, & æquis interuallis a semutuo positis (quæ in sedecim plerumq; foliola Rutæ similia dissecantur) uestita, capreolis tenuissimis more cæterorū leguminum, sursum uersus serpens, flore purpureo Terrestri glandi (cuius historiam tertio abhinc capite prosequemur) per omnia simili, comans. Porro bini singulis fere folijs adherēt flosculi, qui in fili quas abeunt rotundas, digitum longas, senis aut septenis seminibus, quorum alia nigricant, alia cinereum obtinent colorem, prægnantes.

Alterum maioris Viciæ genus, sponte sua in syluis & dumetis profilit, *Vicia maior*
semine *bluestris.*

Vicia.
Wicken.

semine magis atro, & grandiori quam sativa profertur, cætera superiori generi similis. Cæterum singulari ac minime fallaci experimento, terna, aut quaterna huius Viciæ semina esitata, acidis stomachi ructus sedant.

In frugibus uero Viciæ genus reperitur prædictis multo magis exigua, folijs item acutioribus & longioribus. Hoc clauiculis suis fruges cõprehendens nonnunquam deprimit.

Omnium uero minima Vicia, capreolorum uehementiore reptatu fruges grauius stringit, cæteris generibus. Siliquas gerit breuissimas, multisq; incanis, ac subalbidis seminibus repletas. Hoc genus Viciæ ubi superius numero & copia euaserit, hordeū & auenam, necnon alias fruges strangulat.

In dumetis postremo, alia quædam Vicia inuenitur, quæ admodum proceram in altum sese attollit, collisculis tenuissimis, pinnatis folijs, capreolis quibus se uicinis fruticibus alligat, floribus, forma Melilotum


maiores referentibus, sed cœruleis, purpura modica admixta. Quotannis noui caules ex radice oblonga regerminant, nec enim hyemis frigoris læditur hæc posterior Vicia. Porro siliquæ tam huius quam reliquarum Viciarum

Experimentum.

3.
Vicia minor.

4.
Vicia minima.

5.
Vicia syluestris
altera.



Viciarum atræ fiunt, & postquam maturatæ fuerint, dissiliunt, semine in terram proiecto, quod & in Genistis contingere solet.

NOMENCLATURAE.

Vicia Latine, Germanice *Wicken*/Hebraice *סנין* Sanin, Arabice, *Herbū*, *Heisene*, *Kesne*. Græce *ῥπλος*, dicitur. Huic nostræ sententiæ aduersari uidetur Manardus libro nono epist. iij. cum scribit se Florentiæ Orobos albos & rufos uidisse. Sed nos putamus illum de Cicere arietino agresti, quod alias rufum, alias nigrū esse supra docuimus, scribere itaq; ut hæc missa faciamus, nostro iudicio Orobos Græcorum, Eruum Latinorum, *Almelic* Arabum, nulla alia planta fuerit, quam ea quæ Vicia uulgo dicitur.

Proinde primum genus Viciæ a nobis descriptum, quod pabulis pecorum & columbarum seritur, Orobos satiuus, Germanice uero *Koswicken*/ *Groszwicken*/ *Zam/oder*. *feldwicken*/nuncupatur, alterum uero Orobos syluestris, Germanis *waldwicken*.

Tertium & quartum, neque apud Latinos, neque Germanos peculiariter habent nomina, nisi quod Viciæ, hoc est *Wicken* dicuntur, tamen sub Orobanchis Dioscoridis & Theophrasti comprehendi possint. Non autem ignoro Orobancham Dioscoridis & Plinii aliam esse, cum alijs quoque sit prædita apud illos nominibus, sed de illo suo loco dicemus. At postrema Vicia quæ in dumetis nascitur *ῥπλος* est Dioscoridis, Latinis Osmundi, Germanis uero *S. Cristoffels fraut*/alias *Schwarz linsen* nuncupata.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Quamquam plerique Orobos pecorum duntaxat pabulis serant, tamen ad medendi usus utrinque conuenientes sunt; præsertim uero farina ipsorū, quæ hoc pacto parari consuevit. Vberiora grana, candidaq; deliguntur, permiscendoq; aqua resperguntur, donec sufficienter combibant, postea torrentur, usque dum hians cortex disrumpatur, molitaq; farinario cribro incernuntur, postremo farina reconditur. Est autem hæc farina qualitatis mediocriter calidæ & siccæ.

INTRINSECVS.

Farina Orobi urinam ciēt, aluo utilis est, at si immoderate aut continuo usurpetur, uesicæ & intestinis officit, ob insignem quam in expellendo obtinet facultatem.

Orobos rabidis, qui alimentum non sentiunt, tostus, & ad nucis magnitudinem melle exceptus, ieiunorū stomacho sumptus conuenit.

Rr

E X T R I N S E C V S.

Farina Orobi cum uino subacta illitu uel imposito, morfibz uiperarū, canum, hominumq; medetur, ita tamen ut priusquam imponatur, loca affecta purgentur.

Melle & uino temperata mammarum duritias emollit, ulcera manantia purgat, maculas quasuis extergit, quemadmodum & de Lupino proditum est, ideoque Lupinus & Orobus uicissim sibi succedere possunt.

Orobus urinæ difficultates, tenesmosq; ex aceto mitigat.

Orobus quem Aphacā, seu Os mundi appellari diximus, alui profluvia sistit, ructuiq; acido prodest, si quemadmodum lenticula decoquatur.

Reliqua Orobi genera pecorum pabulis, & columbarum escis nascuntur.

*De Candido Eruo, quod nos Fabam ueterum esse conijcimus. CAP:
XVII.*

INTER CICERIS ARIETINI ALIQVOT GENERA, RE-
I peritur Eruum quoddam, uulgari Piso tota sua substantia altquantulum minus, omni uero alio Orobo maius, coloris pallidi, non teres plane, sed compressum nonnihil, deniq; nec maculis nigris, nec cornibus arietinis præditum. Sapor huic idem qui & Pisis. Vbi decoctus fuerit, Phasioli uulgaris colorem repræsentat.

N O M E N C L A T V R A E.

Hoc genus Erui (quod Germani Weiß wicken uocant) Pisum esse procului errore quis iudicare posset, nisi diligenter formam ipsius attendat. Vbi uero exactius examinauerit singula, facile deprehendet hoc genus Erui, neque ad Pisa, neq; ad Orobos commodè referri posse. Ego ut & hoc loco cogitationes meas aperiam, suspicor. (nolo enim quicquam statuere, ne rursus nos mordaces illi Zoili temeritatis insimulent) hoc Eruum fabas esse eas quarum ueteres seorsim sub Cyami appellatione mentionem fecere. Nam ut supra quoque docuimus, Fabæ Iuniperi baccas magnitudine ueteribus haud excedunt. Præterea quia & rotunda sint, id quod inde patet, quod Galenus semina Aphacæ & Viciæ non perinde rotunda atque Fabæ esse restatur. Ex quibus sane rationibus rursus colligere possumus nostrates, à ueterum fabis diuersas esse. Sed cum citra præsidium doctorum uirorū, quorum maxime interreat in his laborare, in hanc arenam descendimus. nolimus.

mus in præsentia quicquam decernere, posteris hæc & alia discutienda relinquentes, ut & ipsi habeant quod inuestigent. Itaque prædictæ plantæ fructum *Weyß wicken*/hoc est, candidum Eruum appellare uoluimus, tantisper dum alij certiora proferant. Deplorandum sane est, quod studio peregrinarum rerum adeo excæcati sumus, ut præ illis domestica nobis sordiant, qui sit ut etiam uulgatissimorum simplicium cognitionem aspernemur, estq; hic non minimus in medicina abusus.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Quod si hoc Eruum, Faba ueterum fuerit, uarijs equidem usibus in medicina scatet. Utilius tamen externis quam internis corporis partibus adhibetur.

INTRINSECVS.

Hæc Erua in cibo usurpata, crassum generant sanguinem, multosq; uapores & inflationem excitant, tum multa faciunt somnia. Ideoq; haud temere in cibo assumi debent, nisi necessitas id expostulare uideatur, hoc est, ubi dysenteriae & coeliacorum profluvia urgent. His enim & qui uomitiones continuas patiuntur, uino rubro uel aceto, aut alio acido uino decocta exhiberi debent.

EXTRINSECVS.

Aliæ huius leguminis, siue Orobi facultates supra sub Lupinis & uulgaribus Vicia commemoratæ sunt, cutis namq; uitia emendat, furunculos, sugillata & turpes maculas discutit, necnon parotidas, & strumas, turgentes grumoso lacte mammas, quæ & inflammatione tenentur, adiuuat, tumores, & collectiones locorum genitalium dissipat, uino decoctum et impositum. Farina illius cum rosa, thure & oui candido, procidentes oculos, eorumq; fluxiones reprimat, si emplastri modo fronti adalligetur.

Emplastrum ex cortice huius Erui, admixto melle confectum, capillos generat.

Eruum dempro cortice in illas partes diuisum, in quas suapte natura scinditur, uenæ adalligari solet, ad sanguinis defluxiones, præsertim ad hîrudines excitatas, reprimenda. Hoc pacto & Fabæ Germanicæ ad prædictas defluxiones usurpantur.

De Lente. Cap. XVIII.

LENS INTER LEGVMINA FERE MINIMVM EXISTIT, sed & omnium fertilissimum teste Theophrasto, qui libro
Rr ij

*Lens.**Linsen.*

nono. cap. ij. in hunc modum de Lente scribit, ὁ δὲ πολὺν καρπὸν ἔχει, καὶ πολὺν χρόνον τὰ χυλὸν παύει. τὸ δὲ τῶν διὰ τὴν μάστιγιν τὰ θηρία, καὶ χυλὸν καὶ οἶον αὐτοῦ, ἀντὶ δὲ τὸ χυλὸν παύει μάστιγιν φανέει. hoc est, In totum uero genus leguminum fructu copiosius, fecundiusq; profecto sentitur. Sed his feraciora sunt æstiuæ, ut Miliū, Sesamum. Leguminum uero maxime fertilis est Lens. Hæc ille. Hoc tamen cum alijs Leguminibus, utpote Pisco, & Cicere arietino, uiti commune habent Lentescerent, ut coctu pertinaces sint, Inuenias enim qui mollescerent ueniant, nisi aqua cœlesti discoquantur. Huius rei rationem reddit lib. ix. cap. ix Theophrastus, affirmans Lentem & Fabam maxime coctu difficiles, idq; efficere cœli conditionem, quæ in his duobus leguminibus maiorem mutationem parere possit. Quo loco si uerba attendimus, rursus uidere est Fabas ueterum diuersas à nostratibus esse. Sed cum de Lentibus sermo nobis institutus sit, missa hæc faciemus. Lentem in præsentia in duobus generibus, aliūq;

vulgarem, aliū maiorem & satiuū appellabimus. . . Lens vulgaris seu agrestis solo gaudet mediocriter pingui, soletq; in nostris regionibus appe-

tent.

Lente verno tempore feri. Erumpit uero e terra instar *Viciæ*, sed caule magis exiguo, cubitali, utrinque pinnatis foliolis uestito. Est & capreolis suis donatus hic frutex, quibus uicina quæq; apprehendit, non aliter atque *Cicer arietinum*, quod uulgo *Pisum* nominant. Florem fert in candido purpurascentem, flosculis *Glycyrrhizæ* similem, & qui frequens ab imis coliculi partibus ex alis foliorum ad summum usque prorepat, ita quidem ut cum imi flores siliquas maturauerint, superiores uix dum in siliquas abierint, id quod cæteris pene omnibus leguminibus usu uenire solet, præsertim si nouilunij tempore terræ committantur. Siliquas gerit exiguas, & quæ haud temere supra quatuor granula contineant, quorum alia subruffa, alia ex luteo pallida, nonnulla ex cano nigricantia apparent. Vbi uero postrema quæ diximus *Lenticulæ* grana humida coeli tempestate in agris diutius relicta fuerint, prorsus nigra euadunt. Lentes non sunt rotundi uti *Cicer arietinum*, sed lati, ac si conquassati forent, constantq; singuli binis partibus, in quas cortice dempto suapte natura scinduntur, id quod multis alijs fructibus & seminibus familiare est, nimirum *Amygdalis*, glandibus & auellanis, alijsq; id genus innumeris.

Satius *Lens* non ita pridem e *Lotharingia* ad me allatus fuit, uulgari per omnia similis, sed formosior, maior & latior. Nam unum ex eo genere granum, ternis uulgaribus lentibus respondet. Plantatur hodie in hortis ueluti *Cicer arietinum*. 2.
*Lenticula alie-
rum genus.*

Quæ *Lenticulis*, *Orobis*, *Ciceri arietino*, necnon *Fabæ* plerumq; nocere *Leguminibus* consueuerunt, hæc apud autores rei herbariæ fere leguntur. Primum quidem infestat illa vermiculus *vermiculus* Græcis dictus, qui in ipsis gignitur, cum secutis imbribus calor repentinus humorem incluserit. Vide *Theoph.* lib. ix. cap. x. Deinde uero *Phalangion* illis molestum est, cuius loco iam citato meminit *Theophrastus*. Sed & non uulgare *Lentium* uitium, hoc est, quod in *Viciam* nonnunquam degenerant, sicut *hordeum* & *Triticum* in *Lolium* mutari consueuit. Huius rei testis est *Galenus* lib. primo de alimentis in fine cum de peregrinis ageret seminibus. Cæterum lentem strangulari, appa, testatur *Theophrastus* libro ix. cap. viij. Sunt autem hæc fere cum lentis, tum aliorum quoque leguminum & frumentorum impedimenta, *Lappæ*, *Cardui* sylvestres, lentes, *Orobi*, *Triticum vaccinum*, *Argemone*, *Cyanus*, *Pseudomelanthion* ut uulgo uocant, Germanice *Raden*, & *Cotula foetida*. Atque hæc quidem alias copiosiora, alias rariora frugibus adsunt, pro cultura agrorum, seminisq; & anni ratione. Quæ cum ita se habeant, prudens agricola facile aliqua ex his impedire poterit impedimenta, nam omnia in uniuersum arcere impossibile. Frugum impedi-
menta.

NOMENCLATURÆ.

Germanice *Linsen* / Latine *Lens* & *Lenticula* (unde *Lentulorum* apud *Diosco.* lib. 2.

Rr iij cap. 98.

Serap. cap. 9.

Romanos cognomen) Græce *πανδης*, *ι πανδης* dicitur. Serapioni Hades. Hebræis *אדאש* Adasch, quod Chaldæi *אדאש* Iamma, alias *תלשחא* Theluscha dicunt. Vide Gen. xxv. & Ezechielis iij.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Quemadmodum Fabæ & Orobi, ita & Lenticula crassum generat sanguinem, tumultuosa facit somnia, & inflationes uentriculi parit. Præterea frequenticibo aciem oculorum obtundit, ægre concoquitur. Nihilominus tamen in medicina usum suum habent Lentes, si necessitati duntaxat inserviant. Media enim natura præditi sunt, nec manifestæ calidi, nec abundanter frigidi, magis tamen ad siccitatem uergit illorum temperatura.

INTRINSECVS.

Lens decoctus prima aqua, si cum ea sumatur aluum resoluit, ubi uero illa effunditur, ac in altera decoctus esitetur fluxiones uentris cohibebit. Atq; ea de causa permittitur Lentis usus, nimirum si aluus sistenda sit. Sunt qui aceto perfundant decoctum illud. Veteres Portulacam, Cotonetum aut fructum Mespili, & id genus alia, una cum Lenticula decoquebant, quo efficacius uentrem astringerent. Primum decocti lentis ius potum lumbricos puerorum (hoc enim per Rodlen uocem Germanicam authorem intelligere putō, Cum enim Bipontini & Vualgoienses in plerisque uocibus ab Argentinenſium lingua dissideant, ut cum hæc æderentur, autor à nobis longius abesset, quam ut super hac uoce consuli posset, oportuit Germanicam adscribere, boni consulat æquus lector) expellit, ut cito conualescant. Estq; hoc singulare experimentum,

EXTRINSECVS.

Lentes sicut & Orobi, Fabæ, & omnia pene legumina, ulceribus manantibus, & scabiei fluenti profunt, tumores, collectiones, duritiasq; colli, & mammarum lacte concreto turgentium, parotidasq; discutiunt, dolorem sedant cocti in muria aut aqua marina & illitu.

Lentis grana in aqua decocta & illita, podagras leniunt.

Reliquæ uires Lentis sub Orobis & Lupinis explicatæ sunt.

*De herba, quæ Græcis *Ανις* nuncupatur.*

CAP. XIX.

VM PRAESENS ISTA PLANTA FOLIIS, CAULE
C flore, & capreolis à leguminibus nihil differre uideatur, uoluit, mus historiam leguminum illa concludere. Tamen si radices spectes, quas habet mediocriter crassas, & instar Rapi exigui, aut Pyri syluestris



uestris oblongas, foris pullas, intus uero candidas, gustu denique castaneas æmulantes, inter bulbosas forse plantas connumerari queat. Sed ut descriptionem persequamur, dependent eiusmodi radiculae, siue nuces, quæ per omnia oblongos ficos representant, ternæ aut quaternæ filo tenuissi,

mo, intra humum profundissime latentes, quæ si vomeris iniuriam illæ effugerint, nouos quotannis fructus ædunt, primo anno teneros & prorsus candidos, quos sues magna ipsorum cupiditate ductæ, agros etiam totos euertendo inquirere consueuerunt. Iunio mense flosculi punicei, odoratissimi, aspectuq; iucundissimi, gratissimiq; erumpunt, Phasiolis haud multum ab similes, nisi quod illis, & odoris & formæ gratia antecellunt. Folia (quæ syluestri Vicæ consimilia esse deprehenduntur) capreolis non aliter atque cætera legumina, cespiti adhaerent. Prouenit in frumentarijs agris, hordeaceis, potissimum uero tritici & zææ, Cæteri ex una radice terni aut quaterni quandoq; rotundi, & prope radicem purpurei coliculi prosiiliunt, foliolis angustis, non aliter atq; Hyperici altera species uestiti.

NOMENCLATURA.

Agricolæ hanc plantam Germanice *Erduß*, hoc est, nucem terrestrem, & *Scwbror* id est, panem porcinum, uocant. Posset & *Ficus terræ*, Germanice uero *Erdtseigen* seu *Erdemandelen* dici. Sunt qui Harthanitam Auicennæ, Buchormarien Serapionis, & Cyclaminum Dioscoridis, ad hunc nostrum panem porcinum referant. At qui quis panem porcinum unquam uiderit, cumq; Cyclami in historia cõtulerit, is facile intelliget, quam recte ista affirmantur, uidebitq; nihil ad panem porcinum, Cyclamini historiam quadrare, sed errare, eos quotquot ita senserint, id quod non una sed pluribus rationibus confirmare licet. Primum enim & Dioscorides, & post hunc Serapio Cyclaminum folia Hederæ obtinere ait, deinde uero tanta illum purgandi uis prædita esse, ut multi tradant, si prægnans radicem transgrediatur, abortum fieri. Ad hæc in umbrosis, maxime sub arboribus illum nasci. Quæ omnia cum in pane porcino non sit reperire, manifestus error eorum sit, qui duas has plantas confundunt. Nos potius panem porcinum esse plantam dicimus, quæ Theophrasto *ιωχας*, alijs Raphanus syluestris, & Dioscoridi *ἀπιον* dicitur. Quod uero ita uocare uoluerimus præsentem plantam, non tolum Dioscoridis, sed & ipsius Theophrasti descriptio, quam subiiciemus nos monet, quæ ita huic plantæ respondet, ut nulla penitus nota reclamare uideatur. Neque hic curamus quod nonnulli clamant Apion hodie ignotum esse, id quod nos facile credimus, nam plerisq; uel nouissimæ plantæ ignoræ sunt, quæ dubio procul paulatim notiores euaderent, si id studium ornandæ rei herbariæ impenderent Medici, quod sane requireretur. Sed ut relinquamus ista, nunc istas, quas Chama balanos, hoc est, Terrestres glandes, Germanice *Acker oder Grundt eichelen* dicere possemus, *πῶπις* appellatio ne donabimus. Theophrasti descriptio ita se habet:

ἡ δ' ἰωχας, ἢ ἀπιον, ὅτι ἄλλοι αὖθις ἔχουσιν αὐτὴν διὰ τὸν αὐτὸν δ' ὡς τὴν τριπλῆν, ἢ τὴν τετραπλῆν, ἢ πῶπιον, ἢ διον, ἢ ἀπιον.

Auicenn. lib. 2.

cap. 62.

Serap. cap. 249.

Diosco. lib. 2.

cap. 133.

Theoph. lib. 10.

cap. 10.

Diosco. lib. 4.

cap. 170.

χάμα βαλανος.

ἐν φάσιν, πλὴν λεπυγυῖδ' ἢ φίλ' αἰ δὲ ὄρεσιν ἢ χωρίοις, καὶ ποταμοῖς ἢ τίλλεται δὲ πρὸς τὸν ὄρεα. Hactenus Theophrastus, cuius uerba adducere idco uolui, ut uel ex illis pateat Panem porcinum recte Apion dici.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Nuces *καὶ ἀπὸ* sicut & glandes suisbus medicinam præbent, natura sua calidæ & siccæ, uim per inferna & superiora purgandi obtinentes.

INTRINSECVS.

Dioscorides succum eximere docet, nimirum ut radix tusa fîctili merga *Diosco. lib. 9.* tur, & agitata aqua quod supernatat pinna selectum exiccetur, hunc utraque *cap. ut supra.* partes citra periculum purgare tradit, scilicet quibolopotum.

Pastores quandoque his nucibus uescuntur, cæterum experientia didici nauscas & uomitiones illas ciere, alias meo iudicio plane innoxia sunt.

De Tritico. Cap. XX.

XPOS VIMVS HACTENVS QVAE DE LEGVMINVM generibus dicenda uidebantur: nunc ad frumenta quæ Cerealia Latini uocant transibimus, auspicaturi a spiciferis cuiusmodi sunt, Triticum, Zea, Hordeum, & Siligo, quæ decimo quinto die posteaquam desloruere maturantur, quemadmodum Marcus Varro obseruauit. Spiciferas fruges multas ac uarias Germania nostra gignit, non minus atque exteræ terræ. Sophoclem, Italiam a frugum præstantia & copia celebrasse ac beatam pronunciasse legimus. Quod si quis Germaniam a fertili tate et rerum copia cõmendare cuperet, cum materia laudis minime deficeret. Non est .n. obscurum Germaniæ præcipua egentes, Alfaras inquam, & qui Rheni tractum incolunt, Thuringos, Pannonas, & Mediomartices, frumētis nō minus claros esse ceteris nationibus, quæ ex terræ dūtaxat prouētibus uicunt. Quid enim a morraibus ad usum quotidianum, & uitæ sustentationem, necnon uoluptatem, expetitur, quod non & in Germania reperiatur? Frumenta scilicet, uina, aromata, radices, herbæ, animalia; tam syluestria, quam domestica, vestitus, gemmæ, & multa alia, quorum historiam peculiari libro aliquando persequemur. An non de his Germani quoque gloriari possunt, haud aliter quam Italia, India, aut Arabia? Deinde quæ apud exterarum nationes reperiuntur, quibus Germania destituitur, eiusmodi fere sunt, ut illis citra damnum facile carere possimus. Ad hæc adeo obsequiosa est humus Germanica, ut iam plurimas peregrinas plantas proferat, quæ

Plini. 18. ca. 76.


Et fortunatam

Italiam frumētis

canere candido.

Triticum.
Weysen.

Tritici primum
genus



ante paucos annos in nostris terris, ne uisæ quidem, aut auditiæ fuerant. Manifestum est namque intra paucissimos annos quamplurimas exterarum stirpes, ita nostro solo cicuratas, ut non solum cultura ipsarum plebisque constet, sed etiam non infeliciter proueniant, Quin & quotidie nouæ & incognitæ ab exteris deferuntur stirpes, quas singulari studio conquirimus, domesticarum interim, quarum usus proculdubio nobis longe commodissimus erat, obliiti. Quot enim putas in Germania reperiuntur, qui Triticum, à Zea, Hordeo, et Trimefari discernere queant, cum tamen peregrina multa frumenta, legumina, uina, & aromata, perfecta habeant. Sed ut redeamus eo, unde sermo noster digressus est, Tritici in Germania tria extant genera, quorum primum & præcipuum quidem hybernium censetur, eo quod, ante hyemem satum, frigora postquam à terra erupit sustinere possit. Exit autem granum quoddam à satione gramine unico tenenore

multo quam Siligo, quod postea processu temporis instar graminis supra terram multiplicatur, augeturque. Aprili mense appetente, conspiciendam se præbet uiridis sementis, cum enim in culmum & spicam assurgit. Quisque autem

autē culmus ternis distinguitur geniculis, stipulisq; seu folijs angustissimis uestitur, ita ut per graminas stipulas concavius calamus in spicatu se extol-
lat. Cæterum spicæ, circa festum Diui Ioannis Baptistæ florent, postquam
uero defloruere, ex omni parte luteis seminibus, ijsq; sexaginta, aut septua-
ginta, interdum paucioribus sæpe frequentioribus, & ex ordine positis, re-
fertē cōspiciuntur. Exeritur hoc frumenti genus in area ut Siligo, nec opus
habet decorticatione, quemadmodum Spelta.

Aterum Triticū genys æstiuum dicitur, herba, stipulis, geniculis, cul-
mis & semine uulgari iam descripto consimile, nisi quod aristas ha-
bet multo longiores, ita ut ad Hordeum catenus accedat. Huius singulæ spi-
cæ duos obtinent granorum ordines. Semen folliculis quibusdam includi-
tur, uti & in Spelta uidere est, quamobrem decorticationem requirit, non
minus quam Spelta.

Tertium Triticum, non quidem uulgare, nec ubique notum est, tamen
culturae nostri soli non omnino repugnat, sed in nostris quoque regionibus
prouenit, præsertim uero in montanis Alsatiæ. Nam cum ijs in locis pro-
pter uicinos saltus & montes, ab apris æstate fruges fere uastentur & per-
dantur, solent agricolæ hoc Triticū genus serere. Aprī namq; syluestres, li-
cet a nullis fere frugibus abstineant, raro tamen hoc Triticum degustant,
idq; propter prælongas quas habet, & asperas aristas, quibus si immodera-
tius Triticum hoc deuorare uelint, facillime læduntur, ita quidem ut non-
nunquam strangulentur. Spicæ huius generis rotundiores, & pleniores
apparent, cæteris. Estq; sane hoc Triticum, frumentum longe pulcherri-
mum.

NOMENCLATURAÆ.

Hæc itaque Triticū genera nostræ Germaniæ cognita & usitata sunt, his
contenti uiuimus. Reliquæ gentes suas habent fruges, apud quas aliud ab
alio bonitate superatur Triticum, quod uino quoq; contingit & metallis.
Sed ut paucissimis rem absoluamus, constat Triticū omnium frugum ferti-
lissimum esse, siquidē cultura sua minime destituatur. Legimus, n. uno ex
grano Triticū trigintra aut quadraginta quandoq; spicatos culmos exiuisse.
Sed hanc feracitatem terræ bonitati & culturae diligenti ego ascripserim.
Huc nimirum respexit Seruator noster IESVS CHRISTVS, cum in pa-
rabola ad populum, sementem quæ in bonam terram cecidisset, aliam, qui-
dem centuplum, aliam uero sexagecuplum, aliam denique trigecuplum se-
cisse fructum dicit. Triticū genera Theoph. multa indicauit lib. ix. cap. iij.
cum scribit Triticū genera plura esse, cognomina ex locis sortita ut. A-
phricum, Pōticum, Thraciū, Assyrium, Ægyptium, Siculum, Chachyri-
dias, Scleggys, & Alexandrinum. De Thracio Tritico Plinius peculiariter
meminit,

24
Secundum Tri-
tici genus.

30
Tertium Triticū
genus.

Matth. 13.
Lucæ. 8.
Mar. 4.

meminit, quod illud a satione quadragesimo die maturetur. Hæc Plinius ipse non uidit, sed legit potius in ueterum scriptis, tum aliorum, cum uero Theophrasti, qui libro nono. hist. plantarum cap. iij. in Mela fata intra triginta, aut quadraginta dies meti, rursus uero in Chalcia Rhodiorum Insula locum quendam esse adeo præcoquem & fertilem, ut hordeum satiuumin eo, cum in alijs sereretur locis, metere, rursusq; serere, qui iam pridem seminauerat, identidem metere. Hæc uero quæ tam a Plinio quam Theophrasto prædicantur, credere, quam experiri malumus. Nostrium certe triticum hybernium, nouem mensibus in agris moratur, quod non solum omnes norunt agricolæ, sed & Plinius & Varro testati sunt. Aegyptij septimo a satione mense fruges suas horreis committunt, unde frumenta illorum iure Septimestria dici possent, atqui talis fertilitas nostro solo negata est. Idẽ de Sitanio quod nostri Ammelforn nuncupantiudicium est. Hoc quia tertio postquam satum fuerat mense, horreis apud alias nationes recondi fertur Trimestre Dioscoridi nominatur. Apud nos quinto demum mense maturatur, ut omnes norunt. Tanto interuallo fruges alio atque alio solo procreatæ inter se distant, ut uel hinc appareat, suum cuique frumento tempus in singulis regionibus deputatum, frugesq; pro diuersitate terræ alio atq; alio gaudere coelo. Sed missa hæc facientes, nomenclaturas explicemus.

Dioscor. lib. 2.
cap. 77.

Dioscor. lib. 2.
cap. 92.

Triticum igitur, Hebrejs חִטָּה Chittah Psal. lxxxi. uel חִינְתָּה Chintah, ut habetur Eisdre. vi. Græcis *τῖττος*, Columellæ Robus. Germanis Weissen/Alsatia Born/apud quos uisitatissimum est & præstantissimū frumentum. Deinde quod Germani Ammelforn dicunt, Latinam proculdubio seu Græcam uocem secuti, ex quo amyllum confici solet optimum, Dioscorides Sitanon, & Trimestre nuncupat.

Porro Triticum id, quod aristas longiores & asperiores profert, quidam Germani Weissenfolben/quasi Triticum paniculatum, si italiceret dicere uocant, alij Welschenweissen/hoc est, Italicum Triticum, uulgata phrasi Germanorum, qua peregrina, & minus nota Italica cognominare solent, posset & Tiphacognominari, hoc Tritici genus, sed de hac appellatione suo dicitur loco.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Inter omnia frumenta Triticum tanquam præstantissimum celebratur, non solum propter insignem qua præditum est, alendi nutriendiq; uim, sed & quia aduersus multos morbos utrinque utiliter usurpatur. Triticum mediocriter calefacit, & resiccit.

INTRINESCVS.

An nostris regionibus præstantissimus, delicatissimusq; panis e Triticopinfatur.

pinfitur. Ex pane Triticeo & farina gratissimi infantibus cibi parantur, cum lacte temperati, aut sine illo parati, prout usus exposulare uidetur.

Quid uero passim in omnibus culinis Tritico et Amylo usitatus: nemo sane facile usus eorum coquinis duntaxat notos exposuerit arbitror. Notum est enim ægros, omnisq; ætatis homines, iussulis in quibus uel Triticum, uel Amylum decoctum fuerint, refici & sustentari.

Nec obscurum est Sepiasarios confectiones, ut uulgo uocant non contemnendæ utilitatis ex Amylo parare, præterquam quod illo ad exprimendas effigies uti consueuerunt. Sed quis omnes Tritici facultates enumerare poterit. Quid enim in medicina possit ex sequentibus quæ obiter referemus satis patebit.

Farina Triticea in aqua uel lacte cum butyro probe decocta, contra tussim, & exasperatas arterias, cruentas excreationes & pectoris uitia, efficax est.

Eadem ex aqua mulsa decocta omnem discutit inflammationem.

Verus panis Triticeus in cibo ab illis qui citam habent aluum, usurpari debent.

Hoc unum in Tritico parum laudabile est, quod crudum commestum, tinea teretes gignit, quod Dioscorides & post hunc Serapio cap. xxix testantur.

EXTRINSECVS.

Sextum Pompeium Podagram in Tritico ad genua usque sedendo curasse legimus.

Furfures Triticei in externis corporis partibus medendis frequentius usurpantur, ad multa & ipsi efficacissimi.

Primum namq; decocti in aqua cum melle, exulcerationes colli mirifice sanant, tonsillas discutunt gargarisati.

Deinde in aceto decoctis his furfuribus utilissimum fomentum præbent membris neruisq; luxatis. Nostri Chirurghi ad eas affectiones Agrimoniam uulgo uocatam adhibent.


Hoc decocto serpignes, papulæ, inflammationes tumentium, præsertim locorum & mammarum perlanantur. Quod si huic decocto Ruta adijciatur, eo efficacius euadet.

Hoc idem decoctum iustibus viperarum efficaciter mederi traditur, si ex eo colluantur.

Fermentum ex farina Tritici factum calfaciendi extrahendiq; uim habet, & maturandi, priuatim callos pedum clauosq; extenuat, & cætera tubercula furunculosq; ex sale concoquit & aperit.

De Hordeo. Cap. XXI.

Hordeum maius, & minus.
Groß vnd klein Gersten.



QVIS VERO HOR-
dei multiplicem & uariam
utilitatem sermone explica-
re satis poterit, cum ad alen-
dum nutriendumq; corpus
præcipui usus sit, cæterisq;
præferatur frugibus? Ac si
ihs quidem in uniuersum de-
stitueremur, certe Hordeo
contentos nos esse doceret.
Panis namq; hordeaceus,
cibus commodissimus, tri-
stico fere nihil cedit, ita qui-
dem ut uel Hippocrate tes-
te, post illum proximum
occupet locum. Hinc fa-
ctum est ut ueteres uarijs
modis, præsertim uero in
ferculis, qui mos Germa-
nis hodie etiamnum obser-
uatur, usurparint Hordeũ.
Et ut paucis multa dicam,
uel hinc Hordei præstantia
colligi potest, quod ex illo
ad conuiuium opiparum
instruendum, nõ solum pa-
nes, & fercula, atq; ea qui-
dem non unius generis, sed
& potum quem Ceruist-
am uulgo dicunt (Germa-
nice Byer) conficere possu-
mus. Huiusmodi sane con-
uiuium neminem, qui sal-
tem homo sit, uilipendere
posse existimo, siquidem &
Christo

Christo Seruatori nostro panes hordeacei miraculi materiam præbuerūt. Quis enim donorum Dei tam iniquus, impius & ingratus æstimator uspiam locorum reperiri poterit, qui eiusmodi Frumentum, ex quo & cibus & porus confici possit, nihili faciat? Hordei (ut ad rem accedamus) duo Germanis sunt genera, quæ in hunc modum discernere oportet. Vnum maius scilicet, dicitur Polystichum, quia in multos uersus spicatur. Sunt enim ex hoc genere, quæ spicam tribus, interdum quatuor, nunc sex, nunc octo uersibus distinctam proferunt. Alterum, exiguum scilicet, & uulgare, & quo alendis pecoribus fere utuntur nostrates, Distichum appellabitur, quod scilicet in duos duntaxat uersus spicetur. Cæterum primo exortu, gramine, stipulisq; & asperis illis ac acutissimis aristis, fere nihil differunt, ita quidem ut nisi spicarum uersus obserues haud facile duo illa genera discernere queas. Hordeum septimo plerumq; die a satione exit, mirabili sane ratione, altera grani parte deorsum germinans ac radicem agens, altera uero sursum tendens ac in culmum sese erigens, ita ut utroque capite, eo quo diximus modo prorumpat, & ex illo quidem radicem, ex hoc uero culmum emittat, Proinde stipula quæ hordei culmum ambit latifolia, & latiores Tritico proflit. Rursus Triticea fortior & procerior euadit. Obseruatum est etiam Hordeum inter omnes fruges in spicam primum ex crescere, nullumq; præcedente flore quamprimum semen tenerimum asperis glumis siue in uolucris proferre, quod primum quidem molle, candidumq; ac lacteum quasi apparet, mox uero maturitatē quā celeriter assequitur, durefcit. Itaq; bis aut ter in anno antequam hyemis frigora irruant, hordeum serere ac demetere possumus, Martio nimirum & Maio mensibus, qui in nostris regionibus hordei sationi fere deputati sunt. Hordeum terram requirit optimā, & stercoratā, qua si destituatur, facile in Lolium degenerat, præsertim si accesserit tempestas pluuiosa, id quod multi una mecum obseruauerunt. Causam huius rei assignat aliquam Galenus libro primo de alimentis, cum de peregrinis ageret seminibus, cum ait, a patre suo usu longo obseruatum semina Tritici, cum infirmiora, ac imperfectiora fuerint, diutiusq; intra humum delituerint, non facile fructum bonum ædere posse, sed potius in Lolium conuerti. Hoc ita patrem suum diligentissimum agricolam obseruasse tradit. Cumq; Tritico & Hordeo id uicij familiare sit, Tritico tamen frequentius euenire, Quanquam addit Ægilopa (quod genus est Lolij) annis pluuiosis longe plurimum incommodare. Theophrastus aliter statuit, dicit enim hordeum primum in Triticum, in hordeum uero Triticum mutari, atq; ita deinceps ex utroque Lolium generari. Sed id fortasse in agro Asiatico, aut Atheniensi, ubi maximum & firmissimum, autore prædicto attestante hordeum reperitur, fieri solet. Nobis de Germanico hordeo sermo est.

NOMEN.

1.
*Hordeum maius*2.
*Hordeum exiguum.**Marcus Varro
de rer. rust. lib. 1.
cap. 45.**Plinius lib. 18. ca.
7. Ex hordeo alterum
caput grani in radicem**exit, alterum in
herbam, quæ
prior floret.**Radicem crassior
pars grani fundit,
tenuior flo-**rem. Cæteris eadem
pars & radicem et florem.**Theoph. lib. 9.
cap. 8.*

NOMENCLATVRÆ.

Crediderim equidem ueteres ualetudine prosperiore usos fuisse, cum ex frumentis duntaxat uiscitarent, quam hodie Apicij illi utantur, qui quotidie noua fercula sine ullo sine excogitant, qua ratione humana corpora corrumpuntur, prauisq; humoribus, unde omne genus morborum deriuatur, obnoxia redduntur. Sapienter igitur gladiatores illi & Athletæ ueteees, qui ab hordei tanquam oprimi cibi & ad nutriendum accommodatissimi usu deterreri senon passi sunt, licet a plerisque contumeliose Hordearij appellarentur. Hordeum itaque pauperibus cum gratiarum actione ut in cibo potuq; hactenus semper, ita in posterum usurpabitur. Hordeum (ut ad alia pergamus, Hebræis *אֵינֶז* Schorah, Exodi ix, Græcis *κριθή*, Germanis Gersten dicitur, Serapioni, Xahaer. Si in species suas Hordeum distrahas, prius Polystichon, Germanice Groß Gersten/alterum Distichon, Germanice Klein Gersten dicitur.

Gerstenfresser

Diosco. lib. 2.

cap. 78.

Serapio ca. 131.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Post Triticum commendari solet Hordeum, tertio uero loco Spelta habetur. Hæ enim omnes fruges, cibus, panis, & potus, Ceruista inquam conficiendis, apud multas gentes frequenti in usu sunt. In medicina quoque duæ posteriores, Hordeum, scilicet & Spelta, suas habent utilitates, ipsædem pene cum Tritico & Amylo facultatibus donatæ. Sunt autem temperamento calidæ & siccæ.

INTRINSECVS.

Hordeum cum Fœniculi semine decoctum lactis copiam auget, amissamq; restituit.

Farina hordeacea in butyro tosta, ita ut in pulstem redigatur, aluum cohibet.

EXTRINSECVS.

Facultates hordei, sub Tritico fere omnes comprehensæ sunt, possuntq; bina hæc frumenta in omni usumutuo sibi succedere.

Farina Hordei (ut interim idem de furfuribus eius tibi pollicearis) plerumq; luxatis membris medetur, butyro uel aceto probe decocta & imposita.

Eadem tumoribus mammarum & pudendorum, necnon ramici, podagricis inflammationibus, strumis deniq; & quibusunque tandem tumoribus opitulatur. Vt uero hæc foelicius exequatur, solent eam quidam cum

Ficis,

Ficis, simocolumbino, melle, terebinthina, aut oleo oliuæ, decoquere. Cum Meliloto autem & calycibus papaueris, Ruta, & Fœnogræco, æquis portionibus in aqua decocta, ita ut oleo admixto emplastrum fiat calidum quod sæpe imponatur locis affectis, dolores eos qui latus excruciant, finire, pleuriticamq; collectionem discutere traditur.

De Speltæ uarijs generibus. Cap. XXII

PELTAE APVD GERMANOS TRIA EXTANT GENERA, quorum prius de quo & primo loco agemus, simpliciter *Spelta prima* *Germanis* *Speltz*.
Speltz/id est, Spelta dicitur. Ea, primo exortu, herba, culmo, geniculis & Spica, Tritico similis est, nisi quod flagellis (ut uulgo uocant) exterius se non patitur, quin potius instar hordei in mola excorticari uult & delubi. Nam in unaquaq; gluma duo plerumq; includuntur grana, ueluti gemelli. Hæc cum Tritico maturatur. Requirit autem solum bonum & diligenter cultum.

At ea quam Germani *Dincfel* nuncupant, licet culmo & spica, breuior, angustior, & magis tenuis priore Spelta existat, tamen rursus cum eadem magnam habet affinitatem, quod uti illius, ita huius grana purpurea & exiguua glumis quibusdam, sed singula singulis includantur. Porro spicæ huius duplici uersu seu ordine, non aliter atque Hordeum distinguuntur, aristis insuper admodum horridis & asperis accedentibus. Hoc quoque genus in molendino, non in area, cortice exiit, culmo, glumis & aristis, totaq; fere substantia punicans. Tardissime omnium maturescit, licet Septembri mense cum Spelta terræ mandetur. Nec uero peculiariter stercoratam terrā expetis, qui sit ut à nostris agricolis in asperrimis montibus, qui longo tempore uomerem nequaquam sensere, feri consueuerit.

Posterior uero Speltæ species quæ in quibusdam locis admodum usitata est, ut quæ non minus panibus & cibis parandis quam hordeum adhibeatur, eodem plane modo quo & Spelta prima prosilit, nisi quod nō perinde atque illa utriculis inuoluatur, quam obrem non in molendino, sed area potius tribulis seu flagellis exteri facile potest, sicut alia quoq; frumenta. Semen huius subluteum est instar Tritici.


Hoc loco obseruandum est, omnia frumenta quorum mentionem hactenus fecimus (excepto hordeo quod minime florer) eiusdem formæ, florem ferre, circa festum D. Ioannis, Plantagine, cui alias satis respondet, magis exiguum. Cæterum quot à spica flosculi qui se instar fibrarum minutissimarum habent, dependere uidebis, tot grana ex ea proditura colliges.

Spelta trium generum.
Spelz / Dinkel / vnd Kern.

NOMENCLATURAE.

Diosco. lib. 2.
 cap. 80.

Plinius lib. 8.
 cap. 8.



Spelta, Græcis *σπῆλτα*, Latinis *Zea*, Germanis *Spelz* / appellatur. Prior eius species Dioscoridi *σινκερ*, a binis putaminibus in quibus bina quoque grana gerit, Germanis quibusdam *Dinkel Korn* / & generali ut diximus nomine *Spelz* dicitur, Hebrei *קנה* *Kuntha* Exod. ix. Romani olim semen uocabant, forma & uiribus *Triticum* par. Italiae maxime uero Campaniae usitatissimum quemadmodum testatur Plinius. Frumentum Germaniae notissimum.

Altera species Germanis *Dinkel* / quibusdam *S. Peters Korn*, alijs *Blicke* / agro uero Vormatiensi *Einkorn* nuncupatur, Hebraeis *קנה* *Kussam* Exod. ix. Dioscoridi *σπῆλτα* dicta, quod simplicis sit grani. Hoc semen Mediomatrici loco *Siliginis* (quæ Germanis *Born* dicitur) *Spelz* admiscet. Præcipue uero saginandis pecoribus eo utuntur. Nam panis qui ex hac simplici *Spelta* conficitur plane puniceus, insipidus & coctui difficilis euadit.

Tertia postremo *Spelta* quam Germani *Kern* uocant, nobis *χλῆρα* hoc est, *Halica*, & *Far adorem Columellæ* esse uidetur. Licet autem *Halicam* ex *Zea*

Diosco. lib. 2.

cap. 80.

Colum. lib. 2. cap. 6.

ex Zea fieri dicat Dioscorides, quod & Plinius affirmat lib. xviij. cap. xi. tamen eodem in capite, Alicam frumentum esse, & id maxime quod Far uocant, dicere uidetur, posteaquam Alicam esse addit, quæ ex Zea, deinde & Tritico olim confecta fuerit, ad multos usus adibita. Præterea in Columella Faris quatuor describuntur genera, Venuculum scilicet rutilum, *Faris quatuor genera.* Germanis (ut nostra fert sententia) Bern/ Venuculum album, Germanis Teütsch Keyß/hoc est, Germanica Oryza, de qua proximo ab hic capite, clusinum, Germanis Speltz/oder Dincfel, semen deniq; Trimestre alias Halicastrum appellatum, Germanice Amelforn. Apud Paulum etiam Æginetam *Paulus Aegin. lib. 6. cap. 78.* Tritico similis esse perhibetur, quo loco non Alicæ, sed Aliæ legitur. Ex his itaque ueterum testimonijs facile licet colligere, Far ad oreum Halicam, & Chondron, idem significare, & nunc quidem pro frumento peculiari, nunc uero pro mola ex Zea confecta accipi. Cæterum cum de Halica scriberet Dioscorides, non frumenti ipsius, quod Far appellari diximus, historiam texere, sed potius utilitates eius farinæ quæ ex Fare siue Halica fit, & quid in medicina possit recensere uoluit. Faris plura alia nomina extant, Galeno siquidem Brance, Italæ Sandala nuncupatur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Nos Triticum, Hordeum, Speltam, necnon uniuersa huius genera si idē facultatibus pollere iudicamus, ita quidem ut mutuo sibi succedere possint. Hoc est (si similitudinibus docere oporteat) quemadmodū dicere possem⁹, quisquis uinum nō habuerit, Ceruisiam, quā uero & hac destituitur, aquam bibat, ita cuiusque per rationem uitæ suæ, Triticum, Amylum, aut Speltam usurpare non conceditur, is Siliginem & eam quam Germanis Dincfel appellari diximus, necnon Auenam usurpet. Non minus enim his, quam Tritico natura hominis contenta esse potest. Præterea non cuius contingit ea fortuna, ut possit uel Tritico, uel Spelta familiam suam sustentare. Reperiuntur tamen nonnulli Gastres coenobitæ, cuiusmodi sunt ij qui in Vuasgoia coenobium Eüssersthal incolunt, qui necessitate quadam inuitabili, modo regulæ suæ (ut uulgo uocant) obliuisci nolint, Triticeum & speltaceū panem esitare coguntur. Rursus qui in Eissalia (uulgo die Eißel) & syluis illis quas Germani den Eberstwaldt/Weisterwald/& Odenwald uocant, asperis, alijsq; incultis locis degunt, Avena & Ocymo de quo altero ab hinc capite dicitur, uiscitant, qui sane non solum prosperiore ualitudine sunt præditi, sed & diutius uiuunt, quam ij qui uel in Italia, uel Alsatia, Tritici & uini copiis habent. Notum est autē non tantū ad omnia scelera incitari, quibus panis copia suppetit, quemadmodū de Sodoma scripturę sanctæ loquuntur, sed & innumeris fere morbis prauisq; humoribus obnoxii.

os esse. Proinde tria quæ commemorauimus Speltæ genera unum & idem fere temperamentum obtinent, nimirum medium quoddam inter Triticum & hordeum.

INRINSECVS, ET EXTRINSECVS.

Omnes Speltæ facultates superioribus capitibus, cum de Tritico & hordeo ageremus explicatæ sunt, cum his enim apud ueteres pari laude commendatur Spelta.

Furfures omnium Speltæ generum, clysteribus utiliter adijciuntur, quibusuis tumoribus prosunt, præsertim uero oculorum abscessui qui inter maiorem oculi angulum & nasum fit (Græcis *ἀγρίων*, Germanis *der Werner* dicitur) medentur, aceto & uino decocti ac illiti, uel impositi.

De Germanica Oryza, seu Trago frumentaceo.

Dioscoridis, necnon Oryza peregrina.

CAP. XXIII.

Candidum Far.

C

VM. TRAGVS FRUMENTACEVS QVI A' COLV.

mella Candidum Far nuncupatur, apud nos quoque proueniat, uolui illius post Speltam mentionem facere. Est autem ut paucis historiam eius absoluamus, hic Tragus, cerealis, frumenti æstiuæ genus, nam apud Mediomatrices inter reliquas æstiuas fruges in optimis agris seritur, quod ad culmos, geniculos, stipulam, aristas (quas habet admodum acutas & asperas) necnon spicā & grana ipsa attinet hordei genus, sed fortius & candidius. In molis sicut hordeum, cortice exuitur, et ad usus culinariorum reservatur, in cibo optimi saporis, maioris uero nutrimenti si cum lacte discoquatur.

NOMENCLATURAÆ.

Collu. li. 2. ca. 6.

Diosco. lib. 2.

cap. 84.

Trag. 9.

Opus.

Dioscor. lib. 2.

cap. 86.

Nostri agricolæ & ipsi ignorant, quodnam huic frumento proprium sit nomen, affirmant tamen Oryzæ saluberrime genus esse, quorum sententiam ego secutus, Germanicam Oryzam hoc est *Teütsch Reiß* / hoc frumentum appellauit. Proinde meo quidem iudicio nihil aliud est, quam id quod Columella Far candidum, & Dioscorides Tragum frumentaceum appellauit.

DE ORYZA PEREGRINA.

Cæterum quam uulgo *Reiß* / hoc est, Oryzam Germani nominant, longe aliud est frumenti genus, tota substantia Germanica Oryza minus, graminis.

Siligo.

Rocken Korn/de quo sequenti capite.

Candidum Far.

Teütscher Reiß/Amme Korn.



nis oblongis, latis, & multo tenuioribus. Quo pacto uero, in quibus locis, qua denique cum superstitione feratur, metatur & recondatur, cum alibi passim apud autores, tum uero in Itinerario seu libello Aloysij quæ de nauigatione sua scripsit, quo loco de moribus, necnō frumētis urbis, uulgo Chalesfurten appellatæ, mentionem facit, non iniucunda cognitu extant. Dioscor. ut supra annotatū est Oryzam nominat, Germani Reiß/ nonnulli ex Latinis Rizum nuncupant. Hebræi ~~רִיז~~ teste R. Leui in Danielis capite primo dicūt. Quidam dicunt Tiphē esse Plinij, nam ita scribit Plinius. *Pli. lib. 18. ca. 10.* Tiphē et ipsa eiusdem generis, ex qua fit in nostro orbe Oryza. Ex his uidere est duas inter cereales fruges Tiphas nobis cōstare, nimirum Trititum alterum, & Oryzam Plinij. De Tiphā tertia suo loco dicemus.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Oryza Germanica temperamento & facultatibus

S s iij

Triticū & Speltæ respondet. Tradunt eam in cibo usurpatam aluum emol-
lire. Rursus Oryzam illam peregrinam, aluum suppressere.

De Siligine. Cap. XXIII.

Q

UENIAMODVM ALSATÆ TRITICVM, MEDIO-
matrices uero Speltam, ita & rura inter Spiram & Vormatiam
sita Siliginem, generali uocabulo Korn / hoc est, frumentum

uocare consueuerunt. Et proculdubio non postremum inter frumenta lo-
cum occupat Siligo, ut quæ uulgo & pauperibus ad arcendam famem uti-
lissima sit. Eius duo apud nos reperiuntur genera. Horum primum idemq;
præstantissimum Siligo hyberna dicitur, quam solent nostri agricolæ Se-
ptembri nonnunquam & Octobri, & Decembri mensibus, præse-
tim si cœli constitutio respondeat votis, terræ qualicunq;, nec tamen nimi-
um forti, committere, e qua primo exortu, herba pene punicante erumpit.
Hæc ubi ante hyemem, à pluuiosa tempestate illæsa, radices egerit, &
in cespitem quasi euaserit, magni prouentus spem facere solet, quæ ple-
runque adeo non fallit, ut ex unico etiam grano, duodeni & plures
quandoque spicati culmi exeant. Culmo est triticeo, uagina aspera, grami-
nea, seu potius arundinea, geniculis ut plurimum quatuor (nam omnes fru-
ges proceritate superat Siligo) spica recta, aspera, aristis haudquaquam inno-
centibus horrida, flore luteo, sicut & alia pleraque frumenta. Cæterum in-
tra quinque septimanas postquam defloruit, maturatur, quemadmodum
& reliquæ fruges. Siligo nempe, Triticum, & Spelta, si cœli temperies re-
sponderit, nono plerunque à satione mense in horrea conuehuntur.

Æstiuæ Siligo uere seritur, cum hordeo, per omnia hybernæ similis. Iu-
lio mense in nostris regionibus metitur. Siliginis effigiem præcedenti ha-
bes capite.

NOMENCLATURÆ.

De hoc frumenti genere multum dubitatur, magnæ etiam de illo inter-
doctos controuersix hodie existunt, nec quisquam illorum quo pacto uete-
ribus appellatum fuerit hætenus demonstrauit, nisi quod nonnulli in hoc
consentire uidentur, quod Siliginem ueterum esse affirmant, quod Germa-
ni Kocken appellant. Iam uero si hoc frumenti genus ueterum Siligo sit,
quemadmodum isti sentiunt, certe à ueteribus longe magis commendatur
quam Triticum. Scribunt enim in quibusdam partibus Siliginem biennio
in Triticum transire, uocantq; eam delicias Triticæ. Theophrastus etiam

Olyram

Siligo hyberna.

Æstiuæ Siligo.

Plinius lib. 18.
cap. 8.

Olyram hoc est, Siliginem, Homiopyron, hoc est, Triticum similem esse dicit. Dioscorides etiam Speltæ generi eam adscribit. Ex his testimonijs ueterum satis liquere arbitror, Siliginem, Speltam & Triticum congeneres esse fruges, quod & Columellam intellexisse hoc pacto uerisimile est, cum Siliginem secundum Triticum genus facit, quod nisi ita se haberet, quomodo Siligo in Triticum abire posset. Quam ergo Germani Rothen uocant, eam nos Siliginem ueterum, & Secalen, necnon Triticum secundum Columellæ esse existimamus, Olyram Dioscoridi nuncupatam. Si qui erunt quibus hæc nostra sententia minime satisfecerit, ipsam nobis demonstrent Siliginem.

quintus.
Diosco. lib. 2.
cap. 82.

Columella lib. 2.
cap. 6.
in uia.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Siligo non minus quam Triticum laudanda est. Multos reperias qui Siliginum panem, præsertim ubi farina pollinario cribro exacte fuerit cribrata, furfuribusq; purgata, triticeo anteposant, & id quidem non sine ratione. Huiusmodi namque panis, optime nutrit, satiatq; nec adeo facile aëre exuccus & aridus redditur, atque qui ex Spelta conficitur. Quibusdam in locis solent industrij coqui Siliginem antequam induruerit, & dum quasi lactea est, demetere, ac igne ustulare, posteaq; spicas manibus terere, quoad grana glumis exciderint, quæ demum repurgata iure carniū decoquuntur. Sunt qui Anethi herbam adijciant. Alij grana extrita siccant, & ad usus culinarios conseruant. Reliquæ Siliginis uires ex capitibus de Triticum & Hordeo colligendæ. Ex uagina graminea Siliginis, coqui tempore quadragesimali embammata optima conficiunt, quæ sale & aceto temperant. Nec defunt qui ex illo gramine aquam distillant, ad calculos renū facientem, necnon aduersus calorem & inflammationes præsertim oculorum. Idem de aqua ex gramine hordei distillata affirmant.


Percurri utcumque præcipuas cerealium frugum, quibus humana uita sustentatur, superest, ut reliquas deinceps persequamur. Sed antequam ad illas accedamus, explicabimus coronidis uice partium in his frugibus nomenclaturas, quæ ita se habent. Ex herba quadam seu gramine concauo omnium frugum culmi prorepunt, tanquam e uagina, unde ea herba Varro ni vagina dicitur, Germanis Grass. Spica ea dicitur in qua ex ordine grana collocantur, Germanis Ähern/quæ aristis uacua est spica mutica, quæ illas habet Spica cornuta appellatur.

Aristæ quasi cornua sunt spicarum, & ut acus tenuis longæ eminentiæ gluma, Germanice Gähnen. Folliculus in quo granum latet Theca & gluma, Germanice Spiewer nuncupatur. Acus, acris, id dicitur quod inter purgandum a frumentis decedit, suntq; minutissimæ quædam palcæ, Germanice

nis Helwen. Atque hæc hæc tenus, nam qui exactiorem de his rebus doctrinam desiderat, is legat M. Varronem de re rustica libro primo cap. xlvij.

De Ocymo veterum, Germanis Heyden Korn.

CAP. XXV.



IN ASPERIS, ARENOSIS et montosis regionibus, cuiusmodi est ea quæ Germanis der Odenwaldt dicitur, & Vualgoia, Ocymum, quod huiusmodi solo gaudet, in quo etiam celerissime provenit, feri consuevit pabulis pecorum. Nam haud uulgariter nutrit pecora, ut breui tempore hoc pastum mirum in modum saginentur. Quam pauperes ad arcendam famem panes ex eo semine faciunt, præsertim uero qui den Odenwaldt uulgo uocatas partes incolunt, qui mos apud alios quoque iam pridem obtinuit, nimirum in oppido Cæsareo Luthra, & in agro Hagenoensi. Cæterum appetente Maio mense terræ committitur semen, e qua quam primum erumpit, sed longe aliter quam commemoratæ fruges, nam bina primum folia lata emittit, Rapo aut Brassicæ similia. Radicem habet unicam, paucis capillamentis fibratam, & breuem. Celeriter in caulem.

caulem se attollit rotundum, tenerum, læuē, concauum, minime geniculatum, sed ex alis quibusdā surculofum, folijs Hederæ, sed tenuioribus, mollioribus, & acutioribus uestitum. Florem fert Iunio mense per exiguum, candidum, confectum compactum & stipatum, qualem fere Sambucus profert. Hic in triangulare & nigrum semen, Acetosæ pene simile, sed maius & plenius abicit. In mola farinam candidam, & gustu reliqua farinæ genera referentem præstat, si diligenter cribratum & fursuribus purgatum fuerit.

NOMENCLATURA.

Si plerique ex doctioribus, ueritati cedere, quam contentionibus omnia turbare mallent, facile deprehendere possent, iam descriptam plantam (quæ Germanis *Beidenfoin* uocantur) ueterum Ocymum esse, quod a Græca dictione unde quod est cito; nomen sortitū est, quemadmodum prodidit Marcus Varro de re Rustica libro primo cap. xxxi. Quo loco idem autor Ocymum bubus dari ut purgentur, & hoc ut foelicius exequatur, uiridem herbam, & in flore secari oportere tradit. Ex hoc Varronis testimonio satis apparet Ocymum ueterum non esse Basilicon nostrum, siquidē illud apud nos haudquaquam pecoribus pascendis exhibetur, sed in magno habetur in hortis pretio. Præterea si Basilicon Ocymum sit, amabo te quomodo illi quadrabit, quod de Ocymo dixit Plinius, cum scribit, *Et Ocymum sub canis ortu pallefcit.* Cum manifestum sit Basilicon nostrum tum temporis florentissimum conspici. Postremo non solum Platina libro tertio sed & Plinius lib. xx. cap. xij. Ocymum inutile stomacho, urinæ, oculorum quoque claritati testatur, idq; a Chrysippo olim animaduersum fuisse. Atqui in nostra Basilica non tantum huiusmodi nocumenta non deprehendi, sed etiam ad eas affectiones curandas utiliter adhiberi posse, manifestius est quam ut demonstrari debeat. Quid igitur dubitamus? quid cunctamur? quin quod res est fateamur, Basilicam nostram diuersissimam esse ab Ocymo ueterum. Carolus Stephanus de re hortensi nuper libellum conscripsit, in quo inter cætera Ocymum partim ad Lenticulam, partim ad Viclam referre uidetur, quam recte, ipse uiderit. Constantinus de gradibus Ocymi citrei meminit, quod in Galeno tristitia corda lætificans, appellari tradit, id quod ego de Basilico præstantiori intelligo.

Plinius. lib. 19.
cap. 10.

lib. 1. cap. 8.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Contrarijs facultatibus præditum est Ocymum, nunc enim oculos hebetat, & spiritus mouet, nunc uero inflammationes discutit, claritatemq; oculorum adiuvat. Cæterum calidum & humidum est Ocymum, nec im-

becillioribus hominibus commodat, quare pecoribus saginandis illud relinquamus.

INTRINSECVS.

Ocymum cibo copiosiore, aut pinsitum & manducatum oculorum aciem hebetat, aluum molliet, spiritum mouet, urinam pellit, lac euocat, ægre tamen conficitur, quare laborantibus duntaxat hominibus, quibus ocium ignotum est, cibus iste conuenit.

Semen tritum, & ex uino potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili urinæ inflatisq̃.

Sunt qui dicant si feriantur a scorpione, qui Ocymum ederint, nullo confictari dolore. Sed aliter sentit Plinius lib. xx. cap. xij. Breuiter, Ocymum in quibusdam partibus (quemadmodum meminimus) tam hominibus quam iumentis in cibo estur.

EXTRINSECVS.

Succus Ocymi, uisus caliginem abstergit, destillationes exsiccat, si per dies aliquot ex ordine instilletur oculis.

Idem naribus haustus, subinde mouet sternutamenta, cerebrumq̃ purgat, sed oculos premi necesse est.

Farina seminis Ocymi rosaceo aceto temperata & calida imposita, pulmonum inflammationibus auxilio est, draconis marini & scorpionis ictibus, oculorumq̃ denique doloribus prodest.

De Turcico frumento.

Cap. XXVI.

GERMANIA NOSTRA PROPEMODVM ARABIA
Gælix appellabitur, posteaquam non solum domesticis ijsq̃ præstantissimis abundat stirpibus, sed et illius solo iam plurimæ peregrinæ plantæ assueuerunt, inter quas Turcicum hoc frumentum connumerandum quoque fuerit, quod proculdubio primum a mercatoribus in nostras terras e' pingui aliquo solo importatum fuit. Nam terram probe stercorata & pinguem expetit, frigoris & pruinarum impatientissimū, non aliter atq̃ Fabæ Italicæ, quarum supra inter legumina historiam exposuimus. Quatuor huius frumenti reperiuntur genera. Quoddam enim grana ruffa, quoddam uero purpurea, aliquod lutea, aliquod candida grana Phasioli agrestis magnitudinem obtinencia profert. Seritur hoc frumentū Aprilī mense, in terram pinguem & apricam, e' qua primo exortu non multo aliter quam Milium erumpit, quem folia excipiunt subinde latiora, haerundinacea

Turcicum frumentum.

Türkisch Korn.



rundinacea, & maiora etiā.
Culmum habet altum, cras-
sum, rotundum instar Ma-
uæ Romanæ, geniculis in-
tersectum, in summitate pa-
niculas, aut spicam muti-
cam & granis uacuam in-
star Siliginis florentē, nunc
luteo, nunc candido, nunc
purpureo præditam colo-
re, prout fructus quem pro-
fert coloratus est. Singula *Miraculum*
re uero naturæ miraculum *naturæ.*
in hac planta uidere est, ni-
mirum quod nō ipsa iuba,
aut spica mutica, uti in alijs
frumentis fit, fructum pro-
fert. Nam singuli culmi e-
lateribus geniculorum lon-
gas, crassas, rotundas & fo-
liaceas uaginas proferunt,
quæ si denudentur grana
apparent frequentia, coar-
ceruata, ac penitissime iun-
cta, inq̃ octo aut decem uer-
sus digesta. E' fastigio uagi-
narum capilli tenues, iam
candido, iam luteo, nunc
purpureo colore macula-
ti dependent, prout fructus
coloratus fuerit, quo scili-
cet ab auium & uermium
iniuria tutæ esse possint.
Hinc uero naturæ, quæ Dei
est famula, in operibus ab-
soluendis, ornandisq̃ soler-

tia elucet, quæ res in admirationem sui nos pertrahere debet, eoq̃ adduce-
re ut Deum ex his miraculis agnoscere discamus. Cæterum culmi huius fru-
menti dum adhuc uirides sunt & succulenti, dulcedine Saccharum etiam
superant.

superant, Augusto demum mense maturatur. Grana in candidissimam farinam teruntur, ex qua panis conficitur, dulcis, sed sapore interim peregrino præditus.

NOMENCLATVRÆ.

Theoph. lib. 9.
cap. 4.

Hoc frumentum quod Germani *Welsch Korn*/hoc est Italicum (ita enim omnia peregrina, & prius nostro orbi incognita appellare solent) uocant, iure equidem *Tipha* magna dici possit. Quia uero è scriptis ueterum nulum nominis huius testimonium habemus, uocabimus; interea Asiaticum frumentum. In Asia siquidem ultra *Bactram* fluuium radeo grande frumentum fieri tradunt, ut nucleos oliuæ sua æquiparet magnitudine, quod mihi uerisimile sit, propterea quod penes circulatorem quendā quina grana uiderim, olim huic nostro frumento similia colore & substantia. Cumq; diligenter de illis percontatus essem, respondit mihi ea ex India uenisse. Sed ut tandem uela contrahamus, quid proprie sit *Tipha* cerealis, *Theophrastus* & *Plinius* docent, & nos supra eius rei meminimus. De *Tipha* altera suo loco. Appellabimus autem in præsentia hoc frumentum, *Tipham* magnā, *Triticum* magnum, seu Asiaticū, Germanice *Türkisch*/oder *Welsch Korn*/quoad alia & magis propria eius nomina cognoscamus.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Quidnam hoc frumentum in medicina possit, nondum satis mihi constat, nisi quod panes ex illo conficere uidi, eosq; elegantissimos. Qui sit ut cum *Tritico* idem temperamentum habere uideatur.

Quidam ex farina pulres parant, adhibito lacte, quod & reliquis frugibus familiare est.

Foliorum recentium succus refrigerandi facultatem obtinet, ad cryspela ac pruritus conducens.

De Avena. Cap. XXVII.

Plinius lib. 6.
cap. 30.

I N INSVLIS QUIBVSDAM SOLA AVENA VICTitant homines, sponte sua proueniente. Scribit etiam *Plinius* lib. xvij, cap. xvij. Germaniæ populos Auenam ferere, nec alia pulte uiuere, id quod forte de *Algoia* & *Thurgoia* admitti poterit, alias enim pabulis equorum nascitur, propter quos etiam hodie præcipue scriitur in Germania. Cæterum haud penitendum frumenti genus, Avena censeri debet, siquidem non solum hominibus & iumentis, sed etiam sanis & ægris utiliss. deprehenditur. Solent enim Medici apud nos ægrotis inter cæteros cibos,

Avena.
Babern.



cibos, haud postremo loco
auenaccos, qui uarij in Ger-
mania parantur, praescribe-
re. Superioribus annis
cum famæ premerentur
Vuasgoia, & a ger Medio-
matricum, pleriq; Auenā
in panes cogere, n̄sq; uelut
didicerunt, ita quidem ut
deinceps etiam, percepta
eius utilitate maiori in pre-
tio apud hos habitata fuerit
Avena, nec quisquam illa
in posterum carere uelit.
Sunt autem duo Auenæ ge-
nera;

Satiua (de qua hoc capi-
te sermonem instituiamus) 1. *Satiua Avena.*
folio, stipula, culmo & ge-
niculis Triticum imitatur
teste Dioscoride. Culmi
enim huius ex graminis
quoque uaginis prorumpunt,
qui in fastigio non ali-
ter atque iubæ harundinis
se se explicant. Semina acu-
ta ex alis spicæ explicatæ,
bina instar gemellorum,
(quanquam alterū semper
grandius existat) dependēt,
ita quidem ut locustas bi-
pedes referant singuli seminū
exortus. Avena plerunque
inter postremas fruges ma-
turatur. Seritur namque in
fine Februarij & principijs
Martij mensis, qua de causa frumentum æstiuum iure appellari potest. Agri-
colæ non optimos agros, sed eos quos com mode stercoreare non possunt,
Avena conferre solent. Sciunt enim probe eiusmodi fruges, ut sunt Avena,
& altera.

Martij mensis, qua de causa frumentum æstiuum iure appellari potest. Agri-
colæ non optimos agros, sed eos quos com mode stercoreare non possunt,
Avena conferre solent. Sciunt enim probe eiusmodi fruges, ut sunt Avena,

& altera.

Theoph. lib. 9.
cap. 9. & 11.

& altera species Speltæ, quam *Spinkel* nominant Germani, terram intra paucos annos extenuare, quod & Theophrastus & Maro prodiderunt. Sic enim in Georgicis scribit Vergilius,

Vrit enim Lini campum seges,urit Auenæ.

Vrunt Letheo perfusa Papauera somno.

De sylvestri inter Vicia frugum dicitur.

2.
Sylvestris
Auenæ.

NOMENCLATURA.

Theophrastus lib. ix. cap. ix. tria frumenti sylvestris genera recenset, Bromon scilicet, Auenam, hoc est, *Ægilopa*, & *Lolium*. Dioscorides vero indifferenter hoc frumenti genus nunc *Ægilopa*, ut li. iij. ca. cxxxv. nunc Bromon nominat, uidelicet lib. ij. cap. lxxxv. ubi de Auenæ frumento peculiari ter agit. Germani *Gabern* uocant, nonnulli alij, uidelicet impostores illi mendici, qui ut foelicius homines decipiant, propriam linguam confinxerunt, quam uocamus *Berlerwelsch*, hoc est, Mendicorum Italicum, *Spitzling* ab acuto semine dixerunt. Serapioni *Daustr* dicitur, cap. xxv. De *Lolio*, *Ægilope*, & *Bromo* herba statim dicemus, cum frugum uicia describemus.

Hebræis שֵׁיטִי
Schifun dicitur,
teste Elia.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Qui *Algoiam*, *Thurgoiam*, & *Sueuiam*, aliâq; id genus loca incolunt, ñ ex auenæ eiusq; farina optimas & uarias pulres conficere norunt, unde Plinius nō iniuria Germaniæ populos nulla alia pulte uiuere tradit. Cæterum salubres cibos præbet Auenæ, si recte paretur. Experientia etiam testatur, eos qui auenaceis, hisq; similibus cibis uescuntur, longe prosperiore uti ualitudine, quam qui splendidissime ac delicatissime quotidie epulantur. Quin constat plures ægritudines et morbos e luxuriosis illis coquinis ac seplasijs quam ulla alia ex causa, quæcunque tandem sit proficisci, ut recte ille dixerit plures crapula quam gladio interire. Quāquam uero manifesta hæc sint omnibus, nemo tamen est qui delicijs his carere uelit. Sed ualeant hæc, nos reliquam absoluamus auenæ historiam. Auenæ ut cibus calidam temperaturam habere, ut medicamentum refrigerare & exiccare dicitur.

INTRINSECVS.

Pulte huius aluus sistitur, mediocriter nutrit, propter calorem quem natura sua habet.

Farina auenæ tosta, cum aqua mulsa pota, tussientibus prodest.


EXTRINSECVS.

Farina auenæ inflammatis & luxatis membris, instar hordeacæ adhibetur, potestq; alterum ex his frumentis alterius loco usurpari.

De

De Sesama, Germanis *Flachsbocker*.

CAP. XXVIII.



*H*AEC PLANTA SUPERIORI LIBRO CAPITULO CXVII. INTER LINARIAS HERBAS IAMPRIDEM DESCRIPTA EST. QUIA UERO SEMEN HOC A UETERIBUS FRUGIBUS ANNUNERATA FUIT, & NOS LOCO MEMORATO NOMEN IPSIUS NON EXPOSUIMUS, OPERAE PRETIUM UIDEBAMUR FACTURI, SI HOC LOCO HISTORIAM IPSIUS REPEREREMUS, & DE NOMENCLATURIS ALIQUID DISSEREREMUS. AC DE PLORADUM SANE EST, QUOD NE DOCTI QUIDEM PLANTAM HANC UTILISSIMAM, COGNITA HABEANT. ET LICET AFFATIM INTER SEGETES LINI UBIQUE LOCORUM, MAXIME UERO IN ALFATIA, & TRACTU RHENI CRUMPAT, AB OMNIBUS TAMEN EUULSA ABIJCIATUR, AC SI INUTILIS PLANE, & UICIS HERBARUM TANTUM ADIUNGENDA FORET. CUMQUE PRAECLARE CUM EA AGITUR, AUCULIS INCLUSIS, & FRINGILLIS, IN ESCA A NONNULLIS EXHIBETUR, NEQUE AD REM ULLAM ALIAM (QUOD SCIAM) A NOSTRIS ILLA USURPATUR. NASCITUR AUTEM UT DIXIMUS INTER SEGETES LINI, CUI TOTA FERE SUBSTANTIA SIMILIS EXISTIT, UT SUPRA DOCUIMUS.

NOMEN

NOMENCLATVRÆ.

Theoph. lib. 9.
cap. 7.

rimus.
Diosco. lib. 2.
cap. 90.
Plinius lib. 18.
cap. 7.
Theoph. lib. 3.
cap. ult.

Hæc planta quandiu uiridis fuerit, a nullo animali manditur, sicut nec
Lupinus. At cum maturuerit semen, uix quicquam aliud adeo ab auiculis
inuaditur, atque hoc ipsum, quod animaduertentes quidam, huiusmodi se-
men colligere, ac alendis auiculis referuare studuerunt. Cæterum ut paucis
sententiam meam aperiam, uidetur sane mihi hæc planta genus esse Sesami,
non tamen Ægyptiaci illius quod efficacius & candidius est, ex quo illi dul-
cissimum oleum facitare soliti sunt. Quod uero ego Sesami genus esse sta-
tuo, ratio ipsa & descriptio herbæ memouet, nam Sesamæ & Papaueris se-
mina includi testatur Plinius Sicetiam Theophrastus Eponymum filiquis
suis similem esse Sesamo tradit. Tamen si autem descriptio Sesamæ quæ apud
Theophrastum libro nono cap. ix. extat huic nostræ plantæ non per omnia
respondeat, ut raro stirpem inuenias, quæ uno, & eodem modo a diuersis
scriptoribus depingatur, hoc tamen ob stare non potest quo minus Sesamã
nostram agnoscamus, quæ inter æstiuos fruges computatur, ut quæ cum
Lino seratur, quod & Columella animaduertisse uidetur, cum decimo capi-
te libri secundi in hunc modum scribit. Sed hoc quidem semen. (Sesamum
intelligit) Ciliciæ, Syriæ & regionibus ipse uidi mense Iunio, Iulioq; conse-
ri, & per Autumnũ cum permaturuerit, tolli. Atq; hæc quidem de Sesamo
nostra in medium adducere uolui, ut rursus innotesceret, ususq; tam saluta-
ris seminis omnibus rei herbariæ studiosis constaret. Sesamus peregrina &
ipsa iam pridem ad nos adportata est, nostrati per omnia fere similis.

VIRE SAC TEMPERAMENTVM.

Sunt qui putent una cum nomine & plantam ipsam interisse. Sed beni-
gnissimus Creator rerumq; omnium conseruator, non uoluit propter ho-
minum negligentiam, herbã tam utilem e rerum natura sublatam. Quam
uero in pretio apud ueteres illa habita fuerit, uel hinc patet quod a Græ-
cis hoc semen panis compinsitum fuit, ob insignem qua præditum est dulce-
dinem. Quamprimum autem Saccharum usurpari coepit, non solum ma-
gni æstinatum, sed nec plantatum fuit in posterum Sesami semen. Ægyptij
ut diximus oleum ex Sesamo, tum ad cibum, tum ad alia conficere, alijsq;
regionibus impertiri olim solebant. Sed ubi primum Italia oleas plantare
coepit, deuenit in contemptum Sesamus, ad Germanos tanquam exul pro-
fecta, apud quos non multo honestius habita inter Linisegetes erumpit, ui-
tium herbarum existimata, licet multis remedijs scateat. Nam semen Se-
samæ emollit, & calefacit mediocriter, herba uero recens seu uiridis refrige-
rat, & dolorem sedat.

INTRIN-

INTRINSECVS.

Semen pani compinitum iucundum & dulcem illi communicat saporem. Per se uero in cibo usurpatum, stomacho non admodum confert, quemadmodum & Lini semen. Oleum uero quod ex hoc semine conficitur, longe præstantissimum est, meoq; iudicio gratius & iucundius oleo oliuæ ut uocant. Semen Sesami introsumi tum debet, cum alius astrictior est, & doloribus tentata, ut tumores deprimantur, & dolor mitigetur.

EXTRINSECVS.

Sesami semen, neruorum crassitiem illitu discutit, hoc idē oleum Sesamini, sed efficacius facit. Medetur & auribus fractis, ambustis, inflammationibusq;. Ad hæc herba uel semen Sesami cataplasmatibus modo imposita, quemadmodum de seminibus Foeni græci & Lini diximus usurpari potest.

Herba uino decocta, inflammationibus, doloribusq; oculorum prodest imposita, inflammationem namque refinguit, & dolorem sedat certo.

De Milio. Cap. XXIX.

INTER OMNES SPICIFERAS FRUGES MILIUM ADuersus iniuriam auicularum indefensum existit, sicut & Avena, & Ocymum. Omnium siquidem frumentorum semina, uel aristas acutis, & asperis armantur, ut Tritici, Siliginis, Hordei, uel gluma & folliculis ac membranis quibusdam includuntur, ut Speltæ eiusq; congenerum. Milium uero Avena & Ocymum semina sua in tenuissimis membranis continent, qui sicut ab aulculis facillime infestari queant. Plinius, multos ad Milij remedia rubetam noctu aruo circumferri iubere, priusquam sarriatur, de fodiq; in medio inclusam uase fictili, ita nec passerem, nec uermem nocere, testatur lib. xvij. naturalis historiæ cap. xvij. Eiusmodi superstitiones plures apud ueteres fuisse, quarum nonnullæ etiam nū hodie inter Christianos usitatæ audiuntur. Sed relictis his ad rem accedamus. Milium quod inter frumenta tertij generis a Theophrasto refertur, æstiuum est. Hoc in uliginosis & arenosis agris seritur, idq; bis in anno, nimirum vere, & in initij Iunij mensis. Hesiodus omnes fruges æstiuas sub exortum Vergiliarum (id quod Maio mense fit) seri foeliciter docet, neque mihi aliter uidetur, maxime quod ad Milium attinet. Quamprimum e terra erumpit Milium, herbam latiore, & magis hirsutam cæteris frugibus offendit. Mox in caulem exilit lanuginosum, septenis aut pluribus geniculis, quæ singula harum.

Theoph. lib. 9.
cap. 2.
Cato de re rub.
cap. 6.

Milium.
Bis.



dinaceis folijs uestiuntur, interstinctum. Spica Milij instar arundinis paniculata, e uagina graminea similiter proripit, semine pendulo, tereti, copioso, inq folliculo tenuissimo concluso profert. Florem purpureum fert, cæterisq frugibus longeminorem.

NOMENCLATVRÆ.

Est & aliud consimile qd Indicum cognominant, in Italiam Neronis principatu conuectum, nigrum colore, amplum grano, arundineum culmo. Adolefcit ad pedes altitudine septem pregrandibus culmis. Hec fere Plinius lib. xviij. cap. vii. Sed cum hoc Milij genus peregrinum sit, nihil ad nos, erimus enim nostro uulgari contenti, quod & ipsum culmo adolefcit ad pedes altitudine quinos. Nos sane licet Milio peregrino seu Indico careamus, multos tamen populos, præsertim uero Æthiopes, qui non aliã frugem quam Milij hordeiq nouere, frugum copia & uarietate superamus. Cæterum non

Pl. lib. 18. cap. 10.

Plinius lib. 14. cap. 6. & lib. 20. cap. 24.

pœnitendum frumentum est Milium, ut quod apud ueteres magno semper in honore fuerit. Non solum enim ex eo uinum olim factum, sed & Theriacæ Antiochi adiectum fuisse legimus. Neq; sane in pulce præcipue insalubre

lubre esse Milium quisquam facile dixerit, cum experientia ipsa testetur, eos qui Milio, Avena & id genus frugibus uictitant, longe melius quod ad ualiditatem & salutem attinet, habere, quam qui delicatissime & splendidissime quoti-
die epulantur. Sed ut ad alia tandem nos conferamus, uocatur Milium *Diosco. lib. 2. cap. 88.*
Græce *μυζ*, Arabice Dochon, Hebraice *מלח* Dochan. Ezech. iij. Ger-
manice *Hirß*. *Serap. cap. 104.*

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Milium in cibo & medicina usurpatur, temperamento suo frigidum & siccum.

INTRINSECVS.

Cum reliqua frumenta desiderantur, Milium in panem cogi potest, sicut & Avena, ut suo loco diximus.

Vulgus Germaniæ nostræ Milium lacte decoquant, tum temporis maxime, cum uel Bachanalia, uel dedicationes templorum (Germanice *Kirchweih* dicuntur) more solito celebrant. Eiusmodi pulcem aluum sistere & urinam ciere tradit Dioscorides.

EXTRINSECVS.

Torretur Milium, feruensq; in sacco ponitur, ut torminibus reliquisq; doloribus, si foueatur, auxilio sit. Sed hoc in medicamento iuuantur quibus aluus non est astricta.

De Milio & Panico hi apud Fieram extant uersiculi.

Sunt ieiuna, aluum durantia, grata dolori,

Si milia ignitis sint prius usta focis.

Lacte incocta fouent molli uel iniusta liquore

Plenius at coena tarda tenacis erunt.

De Panico. Cap. XXX.

ITALIA NVPER NOVVM QVODDAM FRV-

menti genus aduectum est in Germaniam, quod semina habet

Lenticulas nostras referentia quod ad formam & magnitudinem attinet, paululumq; acuminata. Caules profert admodum longos, crassiores & proceriores harundine uuigari, longis & acutis folijs uestitos. Iulio mense e graminea uagina, subæ emergunt maiores et copiosiores Milio uulgari. Florem gerit flauum, uti & alia frumenta, vere feritur, Autumno maturatur. Non aliter atq; Milium e terra primum erumpit, solentq; ex uno grano quaterni, aut quini culmi prodire.

NOMENCLATURA.

Cum peregrinum hoc semen Germanico nomine destituatur, uoluimus

Panicum.

Welscher hirs/Sorgsamen.

Dioscor. libro 2.

cap. 89.

Theop. lib. 9.

cap. 7.


Plinius lib. 18.

cap. 7. & 9.

Platina, lib. 7.

Plinius lib. 22.

cap. 25.



Illud, ut peregrina omnia
Welschen hirszen / hoc est,
Italicum Millum nomina-
tū. Norimbergenses Sorg
samen / appellant. Latine
Panicum, a paniculis qui-
bus semē inest, Græce *ινυλη*
dicitur. Plinius Panici qua-
tuor proponit genera, can-
didum, nigrum, rufum &
purpureum. Nobis nō nisi
rufum cognitū est. Semen
Panici in cibo dulce & ual-
de gratum existit, unde Pon-
ticæ gentes nullum Panico
præferunt cibum. Diodes-
medicus a singulari dulce-
dine qua præditum est Mel-
frugum appellauit.

VIRES AC TEMPE-
ramentum.

Hoc frumentum in cibo
& medicina utrinque usurpa-
tur, cum uulgarī Milio eor-
dem plane effectus sortita,
quibus & illud adiungi de-
bet, quod proximo abhinc
capite describemus. Arsi de
Panico & Milio agresti se-
orsim sermo instituat, hæc
illis a Plinio adscri-
buntur. In uino potum pro-
dest dysentericis. Similiter
ijs que uaporanda sunt ex-
calfactum imponitur. Siftit

aluum in lacte caprino decoctum & bis die haustum. Sic prodest & ad tor-
tina. De Panico ita scripsit Fiera

Panici uberior leuioris mensa superbit
Sapium exiguus cedere magna solent.

De

*De Milio agresti, seu exiguo, quod alij Panicum,*Germani *Sench* dicunt.

CAP. XXXI.

*Milium exiguum.**Sench.*

IN QVIBVSDAM A-
 sperioribus Germaniæ par-
 tibus, ut est Algoia, &
 Hegoia, frumentum hocce
 seri consuevit, Medioma-
 tricibus nunc quoque co-
 gnitum. Cæterum semen
 huius ubi extritum fuerit
 Milio tam simile apparet,
 ut discerni duo illa uix pos-
 sint, nisi exacte quis utrunq;
 inspexerit, tum enim semen
 huius magis exiguum alte-
 ro Milio apparet. Folia
 huius multo sunt asperiora
 & acutiora, harundinaceis
 nō multum dissimilia. Cau-
 lem profert rotundum, de-
 nis nonnunquam genicu-
 lis distinctum. Spicas gerit
 alijs frugibus plane dissimi-
 les, oblongas, teretes, in-
 star Typhæ aquaticæ, præ-
 densis acervatas granis:
 Hoc quoq; semen indefen-
 sum auicularum iniuriæ ob-
 noxium est. Verno tempo-
 re seritur, maturatur Augu-
 sto mense. Proinde duo hu-
 ius frugis sunt genera,
 quoddam enim flauis, alte-
 rum purpureis emicat pa-
 nicularum fastigijs.

T t iij

NOMENCLATVRAE.

Hoc frumentum quod quidā Panicum, Germani *fench* & *Heidel fench* appellant, posset & *Tipha* à paniculata illa iuba nominari. Quia uero *Tiphæ* appellatio iamdudum alijs frugibus nimirum Triticum & Oryzæ attributa fuit, ideo in præsentia Milium exiguum, aut agreste nuncupabimus, Germanice *Kleiner/oder wilden Hirß*. Habet quæq; regio suas fruges sibi peculiares. In Germaniæ quidē partibus, Alsatia nimirum, inferiore Germania, tractu Rheni, Thuringiaq; Triticum, Spelta & Siligo, apud Mediomatrices Spelta, *Ainumer*, apud nonnullos alios Ocymum, deniq; quibusdam hordeum & Milium utrunq; usitata sunt. At si in genere de Germania loquamur, nullum sane erit frugis genus, quod non in omnibus fere eius partibus reperias, excepta Oryza, quam unicam Asiæ, Syriæ & Ciliciæ lubentes relinquimus.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Milium agreste in cibo, pane & medicina, non aliter atque Panicum & Milium vulgare usurpari potest.

De Triticum uaccino, ut uulgo nominant, & Crithas
mo agrestis: CAP. XXXII.

TSI HAEC QVAM MODO PRAE MANIBVS HABEMUS herba potius sit, quam frumenti species, propterea quod neque culmum, neq; stipulam, neq; geniculos habeat, uolui tamen historiam illius post frumenta persequi, cum ex semine eius panes nonnunquam conficiantur, quemadmodum dicemus.

Triticum vaccinum ad altitudinem duorum palmorum assurgit, radice breuiuscula, paucis capillamentis fibrata, caule surculoso, folijs acutis nigricantibus, Verbenæ uulgaris pene similibus, flore in fastigijs, multiplici foliorum ordine stipato, purpureo (quanquam candidum interdum, sed rarissime conspiciendum se præbet) Prunellæ, aut Trifolio pratensi uulgaris, non multum dissimili. Eo decidente, id quod in messe fieri solet, plerumq; bina aut tria grana Triticum similia, singulis folliculis apertis, qui cellulas fauorum pene referunt, contenta reperiuntur, purpureo plane colore tincta. Nascitur hæc planta inter omnes fere Tritici & Speltæ segetes. Huius grana ubi Triticum uel Speltæ admixta fuerint (quod apud Mediomatrices frequenter fieri solet) panem reddunt purpureum. Pari ratione panis cæsi coloris euadit, qui ex granis Tritici cæsi seu nigricantis conficitur.

Sæpenu.

Triticum vacci-
nium.

Triticum uaccinum.

Büweyssen.



Sæpenumero enim Triticum, cum humidioribus agris satum fuerit, frugem reddit nigricantem, quod ex panis colore facillime animaduerti potest, sicut ego non semel obseruaui.

Huc pertinet & ea herba quam Germani Sichelmo ten nominant, quæ in omnibus pene agris frumentarijs prouenit, folijs prorsus asperis, nigricantibus, instar Hellebori nigri (Germanis Christwurzeld i&cti) dissectis, perq; ambitum in modum falcis serratis, caule è medio tenui profiliente, umbellifero, flosculis candidis, multis & cõiunctim (quod & in Branca vrsina uideas) collocatis, semine Petroselini simili. Floret in messe. Radicem habet longam, rotundam Eryngio similem. Odorem spirat uehementissimum, saporem habet ingratum.

NOMENCLATURAB

Nostri agricolæ Germanica lingua priorem plantam Büweyssen/hoc est Triticum uaccinum, siue bouinum nominant, eam pro-

culdubio ob causam, quod semen illius Triticum referat. Quo pacto uero in Dioscoride appelletur mihi nondum constare ingenuè fateor.

Alterum & nigricans Triticum nobis uidetur id esse quod Theophras-

Tc iij

Theoph.lib.9.
cap.8.

στο μὲν δὲ πύρρον ἐπερρὶνὲς dicitur, quod genus in ponto prouenire testatur, sæpenumero uel coeli, uel agri culpa. Semina enim meliora, deteriora uetum cultura, tum terræ natura fieri posse.

Tertia autori Pandectarum Crithamus agrestis dicitur, Germanis Sichelmozen/ uel Sichelkraut.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Agricolæ nostri, Triticum vaccinum, necnon Melampyron, inter uitia frugum connumerant, propterea quod hoc nigrum, illud purpureum reddat panem, Præter hæc de istis Triticæ generibus, nihil compertum habeo.

De Orobancha, siue Cusso altero Serapionis.

CAP. XXXIII.

EXPLICATA FRVGVM HISTORIA, AD VITIA EARUM similiter exponenda accedemus, inter quæ non postremo loco habetur id quod Germani Spyn / seu Windtfraut appellant. Hæc alsiosa est planta, nam quotannis ex semine triangulari & nigro, Ocymo cuius paulo ante meminimus, consimili, sed magis exiguo, nigricantiori, reuiuiscit. Quamprimum è terra prorumpit, capreolis tenuissimis, purpureis & proluxis uicina quæq; comprehendit, comprehensasq; herbas, quod non raro contingit, strangulat, inq; terram deprimit, sese supra illas extollens. Hæc iniuria cum omnibus alijs stirpibus, tum uero Lino præcipue à tyrannica Orobancha infertur. Folia habet nigricantiora, & acutiora Ocymo prædicto, cætera eidem plane consimilis, ni si quod nõ caules sed loco illorum filaprofert rotunda, purpurea, geniculisq; instar Cæturnodix (ut uulgo nominant) intersecta. Flore comatexiguo, copioso, pallente, inodoro, necnon omni sapore destituto. Radix illi recta, rotunda, nec digiti longitudinem excedens. Herba est nullius momenti, ut quæ non nisi ad detrahendas & strangulandas alias stirpes nata uideatur.

NOMENCLATURAE.

Cum de Vicia ageremus, herbæ huius mentionem fecimus, eamq; etiamnum Anginam, seu Orobancham quandam esse iudicantes. Cum uero Orobanchæ descriptio, quæ apud Dioscoridem extat, huic non per omnia quadret, iudicium candido lectori committimus. Nobis enim satis est scire hanc plantam uitij frugum annumerandam, ideoq; ubicunque locorum radices.

Orobancha.
Diosco. lib. 2.
cap. 131.

radices egerit, summo studio eradicandam, id quod nos uelimenta docere possunt, quæ illam in cibo fastidiunt.

Videtur sane mihi quod presens vitium alter Cussus sit Serapionis, de quo cap. xli. ita scriptum reliquit, Et secunda (Cussi scil. species) est nigra, & nominatur sic propter sui nigredinem, & habet semen nigrum, uel coloris croci &c. Nomina hæc ascribit Lebleb, Volubilis minor, Germanice Klein wind/uel Schwarzwind, De alijs Volubilibus, quarum plures sunt species, suo loco dicetur, nunc de ijs tantum loquimur, quæ familiaritatem quandam ac consuetudinem cum frumentis habere uidentur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Quod si hæc planta alter Cussus Serapionis, quemadmodum nos conijcimus fuerit, potest equidem in medicina usurpari, præsertim uero ad tumores lienis, in aceto prius coctus dein tusus, ac cataplasmatibus instar impositus, id quod non semel faciendum, sed sæpius repetendum. Sin uero Orobancha sit Dioscoridis in cibo semen ipsius ob dulcedinem quam præ se fert, estur. Quid uero præter hæc quæ exposuimus efficere ualeat, usus quotidianus forte docebit.

De Vstilagine: Cap. XXXIII.

Q VEMADMODVM VRTICAE HORTENSIBVS PLANTIS peculiariter damnum afferunt, ita Vstilago singularis frugum cerealium pestis est. Ea uero frumentis tum præcipue accidere solet, cum æstate in culmum sese attollunt, & antequam e gramineis uaginis penitus sese explicauerint. Causa eius perditionis est coeli constitutio, quando Aprili mense sol ærdentē improuisæ & subitanæ excipiunt pluuiæ, sole continuo ardentiores radios spargente. Hac igitur subita cœli mutatione teneræ & latentes adhuc spicæ omnium penes frugum facile aduruntur, ita ut nigrescant, quemadmodum experientia ipsa testatur. Atq; tum ubi primum spicæ sese e uaginis deprompserint, nigre apparent, & puluerulentæ, qui sit ut ad frugem peruenire hoc pacto læsæ non possint. Hoc uicij ijs potissimum annis euenire solet, cum crebræ mutationes cœli, quas supra descripsimus, accidunt, Germani Viltaw patriâ uoce nuncupant.

NOMENCLATURAE.

Presentem frumentorum pestem Agricoli nostri den Biant/Latini Vstil.
Tt v.

Vstilago.
Brandi.



Theophr. lib. 9.
 cap. 10.

laginem uocant, nō solum autem frugibus, sed & vitibus saepenumero florentibus eiusmodi uitium obrepit. Vstilaginis Plinius mihi mentionem fecisse uidetur, cum lib. xvij. ca. xvij. ita scribit.

Est & aliud ex uicino auenae uitium, cum amplitudine inchoata granum, sed nondum maturum, priusquam roboretur corpus, afflatu noxio cassum & inane in spica euanescit quodam abortiuo. Hæc ille.

Cæterum ex afflatu illo noxio (ut uerbis Plinianis utamur) aut ut supra diximus, subitis post ardentem solem pluuijs, uicissimque succedente calore repentino, uermiculi quidam in leguminum siliquis nascuntur. Vt interim innumeras alias olerum, frugumque pestes præteream. Theophrastus equidē Rubiginem (quam Germani Daubsucht nominant) frumentaceis plenius præcipue molestant esse testatur, necnon in Tritico, cæterisque id genus frumentis, Cantharida, in le-

guminibus uero Phalangion, non sine pernicie ipsorum gigni. Sunt uero & alij uermiculi qui culmos stipulasque frugum uirides infestent, sicut & pulices terrestres, herbam omnem præsertim uero olera erodunt. Postremo non

non raro Scabies, Salsilago, Vstilago, & alia vitia terræ frugibus nocere solent, quarum exactam cognitionem quisquis desiderat, Plinium & Theophrastum legat, nos ad alia properamus.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Vstilago omnibus spiciferis frugibus incommodat, ad nullam aliam rem utilis, quam ut uice straminis iumentis substernatur.

De Lolio, alijsq; id genus frugum uitijs.

CAP. XXXV.


INTER OMNES FRUGES PRAESERTIM VERO TRITICUM, Speltam & Hordeū in humidioribus agris, necnon cum annus fuerit pluuiosus, Lolium infelix (ut uerbis poetæ utar) dominatur, quod sane nihil aliud est, si omnes eius partes contempleris, quam singulare uitium, & quasi aborsus omnium frumentorum. Cæterū habet quoddam frumenti genus peculiarem suam pestem adiunctam, Cum namq; in satione, & quando in spicam sese attollit, pluuijs continuis obruitur, fieri nō potest quin uel semen prorsus suffocetur, & putrilagine corrumpatur, aut in Lolium ac uitium quoddam degeneret, ita tamen ut singula illa uitia ad suas fruges referri possint, aliudq; Tritici, aliud Speltæ, hoc Siliginis illud Hordei, aliud uero Auenæ adiungatur. Omnium uero uitiorū seu Loliorum fructus nihil aliud est, quam palea inanis. Quod iam diximus animaduerti potest in humidioribus hordeo confitis agris, in quibus frequenter hordeum uel in Lolium transit, uel certe deorsum fertur tota seminis uis, id quod hinc accidere consueuit, quia Hordei caput alterum, & crassius quidem in radicem exit, alterum uero in culmum. Iam cum pluuiosa fuerit anni constitutio, inferior grani pars nimio humore obruta foeliciter luxuriat, attracta ad se omni totius grani ui, ita, ut illa in radicem duntaxat se exerat, uicissim uero in totum spoliatur superior. Atque hoc pacto rardix se longelateq; per terram diffundit, & non solum ex semine nullus fructus expectari potest, sed & agri ipsi peste ea adeo corumpuntur, uitianturq; ut nisi industrius agricola subinde eiusmodi corruptelas agrorū sustulerit, culturaq; diligenti emendauerit, hinc inde sese spargat, ac undiq; culmis suis in altum emergat. Ac licet & culmum (ut dixi) & spicam ostendet, nihil tamen fructus subsequitur, manetq; nil nisi uacua, & inanis palea, quod sane haud immerito male habet agricolas, quare iure Vergilianus ille Mopsus hisce uerbis conqueritur.

*Ipsa Pales agros, atq; ipse reliquit Apollo;
Grandia sepe quibus mandauimus hordea sulcis,
Infelix Lolium, & steriles dominantur Auenæ.*

Ex his

Lolium.

Dort.




Ex his quæ hucusque diximus satis liquet, unde Lolium, & reliqua uitiorum genera ortum suum habent, nimirum ex ipsis frugum seminibus, partim infœlici solo commissis, partim pluuijs & abundantî humiditate infestatis, quæ sane non ita legi uelim, ac si à me hæc conficta essent, non enim solum ego hæc in frugibus animaduerti, sed & ueteres ac probatissimi rei herbariæ scriptores literis mandarunt. Theophrastus siquidem lib. ix. cap. vi. in hunc modum scriptum reliquit, τὸν μὲν ὄνυ ἀλλαν σπεινέτωρ, ὁ δὲν εἰς ἄλλο πύρον μεταβάλλειν σπειρόμενον, πύρον δὲ καὶ ὄνυον εἰς αἰῶνα φασί, καὶ μάλλον τὸ πύρον γίνεσθαι δὲ τὸ ὄνυον πομπόλειον, καὶ μάστιγα οὐ τοῖς ἰνυοῖς, ἀλλὰ οὐκ ὁμοίωται χαλκίαις.

Hoc est, Nullum ex seminibus corruptum in aliud mutari aptum est, præterquam Triticum atque hordeum, quæ mutari in Lolium asserunt, magisque Triticum, idque imbribus frequentantibus fieri, & præcipue locis humidis, & imbre longe dilutis. Hec ille. Galenus etiã libro primo de alimentis patrem suum

hoc idem quod Theophrastus affirmat expertum esse testatur. Quod uero semina in alias species cōverti & degenerari possint, ego quoque experientia didici, nam ex femine Brassicæ ueteris à me fato rapam fieri uidi, didiciq;
tum

Phalaris Dioscoridis.

Quecken grasß das sibende.



tum uere de his rebus scripsisse, & Plinium et Varro-
nem. Quod ergo in oleribus fieri uidemus, idem quemadmodum diximus in frumentis contingit: Quoniam uero multa sunt Lolij & Vitiortu genera, ordine illa una cum suis nomenclaturis per censuimus.

Primum ergo Lolij genus in quibusdam aridioribus pratis, & collibus, nec non stramineis domorum tectis, prouenit cultum, stipula, & spica, Auenae uero multum abstinile, fructus expers, quare Lepidus Plautus in Milite dixit,

*Mirum est Lolio uictitare te-
tam uili Tritico.*

qui senarius in prouerbio tandem abiit, quo notantur lusciosi & caecuti-
tes, uide Erasmus in Chi-
liadibus. Hoc Lolij genus Plinius proculdubio intellexit, cum libro xviij. capite xvij. scribit, Primum omnium frumenti uictum est Auenae. Nam & nos Germani id uictu habere hoc est, Auenam dicimus, sed non simpliciter, ad differen-
tiam enim frumenti Aue-

nae appellamus Gaud habern, uel Mauth habern, hoc est, Cuculi, uel mu-
trium Auenam. Haec Vergilio Sterilis auena nuncupatur, Dioscoridis *pinis*, Diosco. lib. 4. cap. 40.
aliqui Rhon, alij Anchinopa, alij Phanicopteron, alij Rhonstachyos, alij
Osthalen,

Aegilops Plinij.
Basenbrot / Zydern.

2.
 Secundum Lolij
 genus.

Lolium Germanicum. Dort/
 Quecken.
 Diosco. lib. 2.
 cap. 91.

3.
 Tertium uitiorū
 frumenti genus.

4.
 Quartum Lolij
 genus.



Offthalen, Aegyptij Athnō
 nominant. His alij addunt
 Lolium, & Hordeum mu-
 rinum.

Secundum id est cuius
 supra meminimus, Germa-
 nice Quecken appellatum,
 in quod Hordeum & Sili-
 go apud nos transit. Hoc
 culmo proflit longo, geni-
 culato, spicam multiplici, mul-
 tifarumq; diuisa, Auenæ
 quoque quadantenus simi-
 li. Ego istud Lolij genus
 Aegilopa Galeni (nam de
 Aegilope Dioscoridis pau-
 lo post) uerumq; Lolium
 ac *Sisánon* Germanicum, de
 quo hactenus inter magi-
 norū uiros controuersum
 fuit, esse sentio, quod Dio-
 scoridi *ἀγρία, θίαπος* dicitur:

Tertium, binum palino-
 rum altitudinem excedit,
 spicas gerit exiguas, aristis
 asperis admodum & acu-
 tis, horridas, instar hordei,
 cuius quod ad formam atti-
 net pestis & uitium est. Na-
 scitur sponte sua, sine semi-
 ne in aridis pratis, collibus
 et domorum arcis uetustis.

Quartum Lolij genus
 secus uias graminosas, in
 cœmiterijs & domorum
 arcis, nonnunq; & aridiori

bus pratis nascitur, spica albo flore comante, Speltæ & ei frumento qd Ger-
 mani Synchel uocant, consimile, sed multo magis exiguum & angustum.
 Lolium exiguum. Estq; hoc exiguum Lolium, Speltæ, & alteri eius speciei iam commemora-

ta, necnon Tritici pestis. Nam inter has fruges reperitur, præsertim agris humectis. Germani quidam S. Peters Korn / alij Wilden Dinkel uocant.

Quintum Lolij genus primo quod ad spicas attinet simile est, quas si exacte contempleris uideberis tibi exigua & oblonga hordei grana uidere, sed aristis non admodum multis, nec asperis armata. Hoc nos Bromon herbam (est enim & spicae frumenti genus quo deorsum egit Dioscorides) esse existimamus, quod alij Siphonion, alij acrospelon uocant. Sunt qui putent caput de Bromo apud Dioscoridem supposititum esse, quorum sententia nobis impedimento nequaquam erit, præsertim scientibus tria huius Lolij genera descripta esse a Theophrasto, cui nos astipulamur.

Sextum spicas ferrotundas paniculatas sicut & Panicum, culmo, geniculis, & gramineis uaginis cæteris Lolij simile. Nascitur inter Milium & Panicum (quod nos supra Milium paruum seu agreste nominauimus) singulari earundem frugum damno.

Septimum iam descripto aliquantulum forma respondet, sed multo illo grandius, siquidem prima eius folia Milij herbam referunt. Spicas profert longas, asperas, ac lappaceas ut quæ uestibus adhæreant. Nascitur in agris Milio & hordeo consitis, estque peculiare & detestandum uitium, ut quod & fumenta exosum habeant. Cæterum duorum proximorum Lolij generum, alterum Militariam Plinij, alterum syluestrem Phalarem Dioscoridis esse puto.

Octauum nodosi seu geniculati graminis uel Lolij genus in quibusdam pratis prouenit, culmo bicubitali, spica tenerrima, multis dependentibus fibris, iubæ harundinis similima. Hoc Panici uitium esse apparet, cum illi alio modo simile uideatur, quod & Plinius lib. xviij. ca. xviij. significasse uidetur, cum dicit, Nascitur & herba alba, Panico similis, occupans arua, pecori quoque mortifera.

Hæc ille.

Nonum idemque longissimum Lolij genus, uiri proceritatem assequitur, acutis & longis uestitum folijs, geniculatum quoque. Spicam gerit harundinaceæ similimam, colore ex uiridi purpureo. Florem profert Iunio mense candidum, sicut & Spelta. Mihi uero hoc genus, harundinis principium esse uidetur, nascitur enim in litoribus aquarum.

Postremum ac elegantissimum Lolium circa Pentecosten in optimis quibusque pratis inuenitur, iuba expansa, quæ multis rotundis ac lenticulæ aut laminulas illas tenuissimas ac aureas, quæ in ornamentis capitalibus uirginum uisuntur, referentibus granulæ, & tenuissimis ac purpureis pediculis, seu potius capillis racematim dependentibus, constat, quæ quia continuo motu agitantur nec stabilia manent, ideo ruri Germanica uoce Seiden uocatur hæc plâta, alij Jungfrewen haer / hoc est, Capillos uirginum appella-

argem.
 Plinius lib. 18.
 cap. 17.
 Diosco. lib. 4.
 cap. 134.

Tant quod puellę ea delectentur. Accolę ripę Rheni ulterioris *Basen* & *lin*/
 id est, auriculam leporis. *Mediomatrices* *Basen* & *biot* / *Panem* leporinũ uo-
 cant. Estq; hic uerus Plinij, & *Dioscoridis* *Ægilops*. Hęc fere *Loli* ge-
 nera nobis cognita sunt, quorum historiam cum exposuerimus, superest,
 ut & reliqua exequamur.

NOMENCLATURAE.

Germani omnes *Loli* species in genere *Vnfrant* / *Dort* / *Queefengras*
 nominant, Latini *Vitia* frumenti, Græci *zísavos*, *Auicenna* libro secundo
 cap. 756. *Zinzania*, *Serapio* cap. lxx. *Sceilen*, & *Sceuen*. Vt uero singulę ap-
 pellentur, diligenter & ordine supra in descriptione illarum docuimus. Ma-
 gna est autem inter doctos controuersia, quidnam sit *Aëra*, quid *Auena*,
 quid *Bromos*, quid deniq; *Ægilops*. Nos rem ita tractasse nobis uidetur,
 ut in posterũ quę singula sint uitiõrũ genera haud obscure rei herbarię sua
 diõsi scire possint. Qui uero nostra de *Lolijs* sententia contentus esse nolit, is
 perpetuo de *Lolijs* dubitet, quod hactenus multis contigit. Hi enim dicere
 possunt *Bromon*, *Aëram* & *Ægilopa* uicia esse frumentorum, at si petas ab
 illis, ut seorsim unumquodq; definiant, respondent, *Theophrasum*, & *Pli-
 nium* de his agere, illos consulendos. Quod si insites, & roges num uiuas in
 agris imagines *Loliorum* ostendere possint, una cum certis ipsorum appel-
 lationibus respondent se posse, ac statim subiiciunt, *Lolium* uitiũ esse fru-
 menti, in quod *Triticum* & *Hordeum* se conuertere soleat, simile quid de
Bromo & *Ægilope* asserentes, ingentia de his uolumina cõscribunt. Atqui
 si satis sit de rebus uel ignotissimis magna commentaria scribere, cur non
 ueterum scriptis contenti sumus? Iam sunt nonnulli, qui licet *Ægilopa* uitiũ
auenę interpretati sint, eam tamen postea appellationem ad *Aquilegiam* re-
 ferant, ut uel hinc cognosci possit nihil certi istos scriptores habere. Sed quic
 quid isti quidem scribant, uel non scribant, qui ueritatis studiosi sunt, n̄ pro-
 cul dubio nostram diligentiam & conatus facile animaduertent, & in bonã
 interpretabuntur partem, nam cum contentiosis nihil nobis rei, est. In hoc
 enim toti incumbimus, quo suis proprijs appellationibus *Simplicia* (ut uo-
 cant) palam innotescant, ne tam turpiter plerique, qui ex *Pharmacopolijs*
 medicamenta petunt, decipiantur, id quod hactenus, dum non pauca *Sim-
 plicia* incognita forent, usu uenit. Sed relictis his, temperamenta & faculta-
 tes *Loliorum* exponamus.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vniuersa *Loliorum* genera, hodie fere straminis uice iumentis subtere-
 nuntur, pabuloq; exhibentur, licet nonnulla ex his in medicina quoq; usum
 suum habeant.

INTRIN-

INTRINSECVS.

Radix primi Lolij intro sumi utiliter potest, nam manipulus eius in cātha-
ro uini albi decoctus, per q̄ dies aliquot continuos potus, uermes expellit.
Estq; hęc singularis & efficax puerorum & infantium aduersus dictum mor- *Experimentum.*
bum, medela.

Lolium quod *quins* dicitur, caule, herba, & semine, uino rubro decoctum
ac potum, alui profuuiā, & emanantem uulua sanguinem sistit, urinæ impe-
tus infrenat.

At *epi*quos cum siccis rosis rubris coctus in uino, grauem oris halitum
emendat, potu & collutu.

Phalaris tunditur, & in aqua aut uino succus decoctus, ad uesciæ crucia- *phalagis.*
tus utilissime bibitur. Semen tufum & coclearis mensura potum ad eadem
efficax est.

Ægilopis aqua stillatitia, stomachi, iliorum, aliorumq; interaneorum
uitijs auxiliatur potu.

Reliqua Lolij genera pabulis sumentorum nata sunt, quod norunt ome-
nes pecuarij.

EXTRINSECVS.

Lolij semen molitum, & ex sale, aceto, & sulphure uiuo, emplastri instar
illitum, feros lichenas, leprasq; sanat, strumas quoque discutit cum fimo co-
lumbino & lini semine decoctum in uino, rumpit quæ ægrius ad coctionē
perducuntur.

Eiusdem decoctum ex aqua mulsa utilissime Ischiadicis illinitur.

Bromus herba decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri cola-
to par modus mellis adiicitur: rursus incoquitur, dum liquidū mellis crassi-
tudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditum, contra gra-
ueolentiam ulcerum efficax est. Aliqui tritam aloen addunt, & eo modo
utuntur.

Ægilopis herba tusa, & cum farina illita, ægilopis medetur, duritias di-
scutit.

Succus farinæ mixtus siccatur, & eorundem gratia reponitur.

De Harundine. Cap. XXXVI.

C VM NON SOLVM FRUMENTI VITIORVM, SED
& reliquorum graminum, historiam hisce aliquot capitibus
explicare nobis propositum sit, placet inter illa Harundinem

*Iuncus palustris maior.**Harundo.*

Großweißer Bingen.

Rhor.



etiam describere. Ac non erithoc loco nobis sermo de tot & tam uarijs eius generibus, quot a Plinio alijsq; rei herbariæ scriptoribus enumerantur, multo autem minus de ijs agemus, quæ in India hastarum uicem præbent, & in

& in arboream magnitudinem excreſcunt, ea enim tanquam peregrina noſtroꝝ orbi nunquam uifa, Indis relinquemus, noſtris contenti. In Germania ſiquidem in ripa Rheni, alijsqꝫ locis ubi multæ ſunt piſcing, ut in Lotharingia, et inferiore Germania frequens Harundo provenit, binũm nonnũquam uirorum proceritatem excedens, digitum craſſa, uigenis ut plurimũ geniculis diſtincta, ita ut ſingula genicula peculiaria ſua & graminea folia habeant, eaqꝫ longa admodum, & utrinque acuta, inſtar gladij, per quæ harũdineus caulis tranſit, quod & in frugibus uidere eſt. Radices habet candidas, cauas, toroſas, inſtar calami aromatici, e ſingulis nodis quotannis gemmantes. Harundo Iulio menſe paniculas ſuas ſiue iugas profert, aliaquantulum purpureas, quæ a maturitate ſicut & Endiuia & aliorum id genus florum Pappi, in auras euaneſcunt. Et hæc quidem quod ad noſtram Harundinem attinet ſe habent. Cæterum licet ijs harũdinibus careamus quas Italia & Nauarrha admirandæ magnitudinis gignit, tamen ad uaria noſtra nobis uti licet. Sunt enim qui teſta ſua hiſce conſarciant, ut interim textores præteream qui nonnulla pro filis glomerandis inſtrumenta ex illis conficiunt. In medicina quoqꝫ non contemnendũ eſt uſus Harundo, radix enim illius tuſa & impoſita, ſurculos & ſagittas infixas corpori extrahit, quod idem de Xiphio prædicat Dioſcorides.

NOMENCLATURA:

Omnium Harundinum generale nomen apud Græcos eſt, *κάνη*, Hebræis קנא Kanah, Eſaiæ xix. Germanis Rhoi. Latinis Harundo. Dioſcorides libro primo capite xcix. quinque calami ſui (hoc eſt Harundinis) genera recenſet. Primum *καγδὲ*, id eſt, ſarctior dicitur, alterum *Φομίνα* appellatur, id nimirum e quo tibiarũ ligulas efficiunt, quod genus Plinius Auletiæ con dici teſtatur. Tertium *κυρπύνας*, quod nullis interſecatur geniculis, ad librorum coſcriptionem accommodatum. Quartum *διονεῖς* & *κάνη* nuncupatur. Quintum Phragmites & Vallatorium appellatur, uulgo cognitum, Latina præſertim Harundinis uoce.

Plinius lib. 16.
cap. 36.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Neminem eſſe putamus mortalium, cui Harundinis uſus non ſit cognitus, nam & aulitici & textores uictum ſuum hinc quæritant. Præterea conſtat pleroſqꝫ tegulo Harundinis domos ſuas operire. Fuit illi & in medicina ſuus honos.

EXTRINSECVS.

Radix Harundinis trita & illita, ſpícula, aculeosqꝫ corpore extrahit, luxata lumborumqꝫ dolores cum aceto mulcet.

Virentia folia tusa & imposita ignibus sacris medentur, erysipelatis & cæteris inflammationibus. Ex his quibus pollet facultaribus satis constat Harundinem frigidam & siccam obtinere temperaturam.

De Sparganio, & Gramine harundinaceo,
necnon uulgari. CAP.
XXXVII.

1.
Sparganion.

QVAECVNQVE IN AQVA AVT ALIOQVIN VLG-
ginosis tractibus nascuntur gramina, ea utrinq; gladij instar acu-
minata gerunt folia. Quod in his maximum est, folijs uestitur-
acutis, longis, in medio uero sui anguloso nervo distinctis, adeoq; triangu-
laribus, herbacei coloris. E medio horum læues prodeunt & teretes caules
in quorum fastigijs ueluti pilulæ prominent, exiguis & candidis fibris,
uel paniculis florentes. Cæterum hæ ipsæ quas diximus pilulæ Iulio men-
se ubi defloruerint in echinata quædam capitula, nucem Myristicam magni-
tudine æquantia, quæ nihil aliud sunt, quam multorum seminum aculeato-
rum compactio, desinunt. Radix eius intra humum multis fibris & adna-
tis radiculis serpendo longe lateq; se diffundit. Nascitur in marginibus &
littoribus amnium, fluuiorumq; in humectis pratis & uliginosis tractibus.

2.
Calamagrostis
prima.

Exiguum Caricis genus, quod ad acuminata attinet folia, priori consi-
mile est, gustu admodum ingrato præditum, quodq; in pratis minime com-
mendetur.

3.
Calamagrostis
altera.

Tertium folijs primo quoque accedit, caules proferens longos, rotun-
dos & læues, minime nodolos, neq; geniculatos, in quorum uerticibus ele-
gantissimi, & candidi flosculi emicant, forma Cucurbitæ flores referentes,
omni odore destituti.

4.
Gramen.

Quantum Graminis genus Germanis *Riedtgras* proprie appellatum,
in locis arenosis, & aridioribus, nonnunquam & in syluis, nonnullisq; gra-
minosis semitis, folio utrinq; acuminato, radice purpurea, prælonga, hinc
inde serpente, uti & Lolij, gustu mediocriter dulci, prouenit. Hoc graminis
genus nigras quandoque producit spicas, sed infrugiferas.

Cæterum Caricum & Graminum multa extant genera, præter ea quæ
recensuimus, id quod tertia effigies eleganter expressit.

Diosco. lib. 4.
cap. 23.

NOMENCLATURAE.

De uero Xiphi Primum genus quod Germanis *Riedt* appellatur, ego *σπάργανιον* Diosco-
dio paulo post di-
ridis esse iudico, quod ille quosdam *Ξιφιδιον*, & *Βῆρυ* nominare tradit. Plinius
cetur. lib. xxy.

Sparganion: Calamagrostis altera.

Alexander Bo-
nedictus Tormes

lib. xxv. cap. ix. radicis duntaxat meminit his uerbis. **Aduersus serpentillam Sparganion** bibitur & eius radix, quæ Sparganion uocatur, ex uino albo, on nominat, id hæcille. Quæ sequuntur bina genera, hoc est secundum & tertium (quæ quod mirum me Vu in bebet.

Gramen vulgo cognitum.
Gemein Graß.

ἄνθος

Diosco. lib. 4.
cap. 31.



Germani Riede Graß nuncupant) ad Gramen Harundinaceum, & Caricem acutam Vergilij referenda iudico. Quartum uerum est ueterum gramen, Græcis ἄνθος appellatum (Hebræis כֶּשֶׁם Desch) quod nonnulli Dioscoride teste Ægicon, alij Amaxitin, Ægyptij Amphiuocant, aliqui Asuphyllion, alij Sanguinalem, alij Vniolam, Hispani Apariam, Daci Costiatam, Aphri Ie bal nuncupant. Hoc gramen ante annos aliquot D. Othoni Brunfelsio piæ memoriæ a me ostensum fuit, qd in altero Latini herbarij ipsius tomoo uidere est. Plinius illius meminit cum lib. xxiiij. cap. xix. scribit, Gramen ipsum est inter herbas uulgatissimum, &c. Cæterum uidetur mihi sane Plinius, graminis differentiam, quæ a Centumnodia (quæ Germanis Weggraß dicitur, cuius historiam lib. j. cap. cxxviiij. prosecuti sumus) distat, non probe perspectam habuisse, sed potius duo illa confudisse. Gramen enim quod Græcis ἄνθος

medic.

dicitur, semine caret, solaq; radice se propagat. Rursus Polygonon, seu Centumnodia semen profert, in quo etiam omnis ipsius uis est posita. Has uero plantas loco citato confundere uidetur, cum de Gramine scribens nunc

Calamagrostios duæ species.

Klein Kiedt Gras.



medicamentorum quæ ex radice petuntur (quæ de Gramine nostro intelligenda) nunc uero seminis, & eius medicinæ (quæ uerba de Poligono recte intelliguntur) mentionem facit. Sed quis est qui in tanta uarietate & copia rerum non aliquando hallucinetur, cum & bonus quandoque dormitet Homerus: Multa sane graminum genera passim exstant, est enim Lolium, & tot eius fere genera quot frumenta, est Sparganium, est Centumnodia, & hoc nostrum GRAMEN, ut interim, Babylonicum, Harundinaceum, Cilicium, & quod Parnaso monte gignitur, præteream. Serapio Gramen suum cap. cxi. Vegem, Thelnegil appellat, quem puto Centumnodiâ uoluisse significare, cum uerisimile sit Dioscoridis Gramen illi incognitum fuisse sicut & alijs plerisque.

Graminis multa genera.

Proinde licet Gramen ut antea ex Plinio docuimus inter herbas uulgarissimum sit, fuit tamen nihilominus apud ueteres magno in honore. Siquidem

Romani Imperatores, cum uictoria potiti essent, non gemmea aut aurea, sed graminea corona ornabantur, quod equidem signum erat pacis ab illis factæ, & seruati exercitus. Dabatur hæc uiridi e germine decerpro inde

ubi, obfessos feruaffet aliquis. Hanc confuetudinem a maioribus fuis acceptam diligentiffime femper obseruauerunt Romani, ut fuere in maiorum fuorum moribus, ceremonijs, & ritibus obseruandis tantum non fuperftitiofi. Ab his gramineis coronis prouerbiũ defumptum in Fefto Pompeio extat, quo dicitur Herbam dare, quod nos Germani *das helmlin geben* dicimus, quoties fignificare uolumus, cum nos cui herbam damus, uictorem, dominum, & magiftrum noſtrum agnoſcere. Licet autem in Germania is quoque mos etiamnum duret, ut ijs qui strenui aliquid geſſerint, aut alios, in requapiam ſuperarint induſtria & fortitudine, coronam ex floribus & herbis uarijs contextam exhibere ſoleamus, non tamen eum morem ex prædicto prouerbio originem ſuam ſumpſiſſe certum eſt, cum plerique noſtri temporis, quæ uera ſit huius inſtituti ratio ignorent. De graminea corona Plinius lib. xxi. cap. ii. iiij. v. & vi.

VIREs AC TEMPERAMENTVM.

Sparganij radix & ſemen uino decocta & pota, morſibus uenenatorum animalium auxiliatur, præſertim ſi affectæ partes ex illo decocto colluantur.

Gramen una cum radice ſua, uino decoctum & potum, non tantum torminibus medetur, ſed etiam urinæ difficultatibus, calculoſa etiam ueſicæ excrementa comminuit, expellitq̃.

Radix recens trita illitu uulnera conglutinat. Cæterum eſt hæc planta frigida & ſiccæ temperaturæ, ideoque alui profluuijs ſiſtendis adhiberi poteſt.

De Typha. Cap. XXXVIII.

ELANOSA FLOCCORVM DENSITATE, QUAE INFESTIGIJS caulium Typhæ conſpicitur, præſertim ubi matura nigreſcere & in auras abire cœperit, id quod Auguſto menſe ſit, in quibuſdam locis puluinararia & lecti conſciuntur. Nalcitur Typha in paludibus, & ſtagnantibus aquis, folio Cyperidis, anguſtiori, longiori, & acuminatori, ſuperioribus graminum & Sparganiorum generibus, caule enodi & ſolido, non concauo, radice geniculata & nodola, intus candida ac minime ſolida, ſed fungoſa, nouis quotannis oculis gemmante, e quibus alia ſubinde & Cyperidi ſimilia folia prodeunt. Porro dulcis eſt plane hæc radix, maxime autem recens nata gemmæ.

NOMENCLATURA.

Plinius lib. xvi. cap. xxxvi. inter aquaticos calamos Typhæ mentionem

Typha aquatica.
Narzenfolben.



nem fecissem mihi uidetur cū
 in hunc modum scribit.

Cætero 'gracilitas no-
 dis distincta, leui fa-
 stigio tenuatur in cacu-
 mina, crassiore panicu-
 læ coma, neque hac su-
 peruacua. Aut enim
 pro pluma strata caupo-
 narum replet; aut ubi
 limosiore callo induru-
 it, sicut in Belgis, contu-
 sa & interiecta naulum
 commissuris ferrumi-
 nat textus, glutino tena-
 cior, rimisq; explendis
 fidelior pice. Hæcille.

Iam & vietores nostri do-
 liorum commissuris fideliter
 & tenaciter coniungens
 dis adhibent Typhæ folia,
 maxime eius, quæ in caulē
 haud dum exiuit, nam quæ
 iam densum illum ac claua-
 tum (ut ita dicam) florem
 proferunt, folia plerunque
 habent crassiora, & asperio-
 ra, quam iuncicaræ doliorū
 expetere uideantur. Germa-
 ni vietores, ea folia Liesen
 & Knospen uocant, nonnul-
 li alij Narzenfolben/ hoc
 est, clauam stultri. Planta ipsa
 Typha aquatica Latinis di-

citur, Græcis *typha* appellata, teste Diosco. qui lib. iij. cap. cxxiij. florem huius
 paniculam dici testatur, quod in pappos a maturitate euanescat. Sunt qui
 Spatulam foetidam nominatam uelint, sed quam recte ipsi uiderint.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Huius herbæ flos fuillo adipe doto exceptus, ambustis medetur, teste Dioscoride, unde facile colligitur eam moderatum quoddam temperamentum sortitam. Vsum foliorum supra exposuimus.

De Gramine anatum. Cap. XXXIX.

RAESENS HOC GRAMINIS GENVS QVOD ANGV
 P sta admodum habet folia, & semper uiuet, reliquis supra à nobis
 descriptis graminibus coniungendū fuerat. Cum uero in aquis
 nascatur, uolui hoc loco post aquaticas plantas illius historiam persequi.
 Reperitur uero plerunque in stagnantibus aquis, urbiumq; fossis. Sub initia
 Martij mensis folia eius supra aquas procumbunt, singula seorsim posita,
 quæ si appetente Iulio mense terram forte attigerint, caules proferunt te-
 nues, iunceos & geniculatos, iubamq; aut paniculam in fastigijs illorum ha-
 rundinaceam, quæ nullo post se relicto fructu euanesceit. Porro hoc grami-
 ne anates syluestres, aliq; aquatici uolucres hyeme uiscitant.

NOMENCLATURAE.

Germani hoc gramen *Entengraß* / hoc est, Anatum gramen, quod eo
 hyeme ut diximus uiscitent anates, cæteræq; aues, appellant, nec aliud ab
 illis hominibus nomen extorquere potui. Latine Gramen aquaticum, non
 inepte dicetur, poteritq; graminis harundinaceo accenseri.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Gramen hoc aquaticarum auum, præsertim uero anatum syluestrium
 hyemalis uictus est. Poterit uero meo iudicio inflammationibus & calidis
 affectionibus adhiberi, non secus atque Lenticula palustris.

De Gnaphalio. Cap. XL.

LIVD PORRO IVNCEI GRAMINIS GENVS, IN HV
 A mectis pratis & uliginosis uallibus gignitur, caule terete & eno-
 di, inq; cacumine molli tenero, & candido tomento, Gossipio
 ipso, tenuiori, & molliori emicante. Atq; hic est huius plantæ flos, hoc eius
 semen & fructus.

NOMEN.

*Gnaphalion.**Mattenflachs.*

NOMENCLAT VRAE.

Licet huius pl̄at̄e sane elegans sit lanugo, si in magna posset haberi copia, textorio operi non incommoda sit futura, si quid iudico, tamen contemnitur uulgo, & nihili fit. Ea enim hominum est peruersitas ut sibi natis rebus non sint contenti, sed illas aspernentur, peregrinis & magno sumptu lōge petitis magis gaudentes. Germani hanc plantam *Mattenflachs* uocant, Latini *Linum pratense*, seu *Linum pratense*. In Dioscoride meo iudicio *Gnaphalion* fuerit, quod alij *Hires*, alij *Ampetocon*, alij *Anaxiton*, alij *Anaphalin*, Aegyptij *Semeon*, Galli *Geialonen*, Latini *Centunculum* appellant, quidam *Tucularem*, alij *Albinum* (ab albo nimirū tomento) De *Gnaphalio*, & *Gnaphalo*, uide *Hermolaum Barbarum* in *Corol. lib. iiij. cap. 360.* & *Galenum lib. vi. simpl.*

γναφάλιον
Dioscor. lib. 2^o
cap. 23^o

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Quod si hæc planta *Gnaphalion* *Dioscoridis* sit (quemadmodum existimo) locum in medicina habebit, facientēq; teste *Dioscoride*, folia illius uino decocta, & pota ad dysenteriam.

De

De Scirpo. Cap. XLI

Schmelen/oder Bingen helmer.

1.
Scirpi primum
genus.



2.
Alterum Scirpi
genus.

IN ALTISSIMIS, ASPERIS, & humectis syluis, nec non sub funiperorum frutibus apud Mediomatrices gramen quoddam nascitur, folijs uestitum angustioribus & tenerioribus uulgaris Harundine. Hoc Iunio mense coles multos enodes laeues, cauos, culmum uulgarem crassos, uiriq; proceritatem attingentes emittit, paniculam uero lanuginosam, teneram & mollē. Harundinis uulgaris iubar non dissimile. Proinde cum Augusto mense hi culmi, seu enodes caules flauescere coeperint, firmi plane ac rigosi euadunt, quae de causa a rusticis mulierculis leguntur, quibus caseos recentes & praehumidos in aere siccan- dos imponunt.

Alterum eius genus multo tenuius, breuius, & magis exiguum existit.

NOMENCLATURA AE.

Hic uero enodes illos & laeues scirpos habemus, qui prouerbio apud Plautum occasionē dedere, *Nondum in scirpo quaeris, quod in homines plus aequo anxios & curiosos torquetur.*

quetur, qui illic scrupulum mouent ubi nihil est dubitandum. Nostri hoc genus Scirpi Bingen helmer uocant, & recte quidem. Mihi uidetur eū *Scirpus hic non a ueritate non multum aberraturum, qui Waldtroz, hoc est, Harundinem syluestrem uocaret. Græce fortasse νάρκυσσος ad quæ dici posset. Aut forte Syringia Plinij lib. xvi. cap. xxxvi.* *Scirpus hic non sit a quibusdam Oxyfchanos dicitur.*

Scirpos proin illos tenues, & duriusculos qui in campetribus nascuntur, Germani Schmelen uocant.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

E Scirpis nassæ piscatorum conficiuntur.

Mediomatrices mulierculæ; ut diximus, caseos recentes hisce imponunt siccandos.

E minimis uero Scirpis nonnulli pileos quibus æstate aduersus solis radios & calorem utantur, conficere solent, quos serico postea obducunt.

De Iuncu palustri maiore. Cap. XLII.

IN QVIBVS DAM PISCINIS, STAGNIS, PALVDIBVS,
I & fossis Iuncus iste maior e radice geniculata, purpurea, capilla *Effigiem*
ta ac intra terram hinc inde non secus atque Lolium reptante na *butus Iunci*
scitur. Quemadmodum enim e geniculis radicum noui subinde Harundi *quære sus*
nis caules prorumpunt, ita & Iuncus iste e gemmantibus radicis oculis pro *pra capite*
ducitur. Est autem hoc Iunci genus enode, sicut Scirpus, & in fastigijs e pur *XXXVI.*
purea iuba quam spicæ loco obtinet, semen profert quemadmodū & alia
Iuncorum genera. Planta est minime firma; siquidem cum fungosam intus
& foraminulentam habeat medullam, leuissimaq; sit, uento facile hinc inde
agitatur, non aliter quam Harundo uulgaris: quo nomine & ab adolescen
tibus natandi artem addiscere uolentibus ob insignem suam leuitatem, &
quod non facile mergi se patiatur, usurpari consuevit.

NOMENCLATURAE.

Nos hunc Iuncum maiorem & palustrem, Germanis Groß weiber Bingen dictum (nam de uulgari sequenti capite seorsim dicitur) Harundinis potius genus quam Iunci esse existimamus. Itaque uel piscatoria Abaritana nobis dicitur, uel certe sex Iunci generibus Plinij adiungetur, de quibus paulo post. Proinde siue Harundinis, siue Iunci sit genus magna apud nos in copia habetur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Pauperes tegulo huius Iunci domos suas operiunt, & iuvenes ad nati-
di artem adhibent, ut diximus. In medicina de usu eius nihil constat.

De Iunco uulgari. Cap. XLIII.

exiv. 9.
Diosco. lib. 4.
cap. 50.

PLINIVS LIB. XXICAP. XVIII SEX IVNCI GENE-
ra describit, Dioscorides uero quatuor, Germanis tria duntaxat
nota sunt, quorum unum proximo capite descripsimus, reliqua
duo uulgaria hoc loco exposituri. Vterque ex his Iuncus radicem obtinet
numerolam, & capillatam, nasciturq; in aquosis locis humectisq; & irri-
guis pratis.

1.
Iunci uulgaris
genus alterum.

2.
Iuncus uulgaris
alter.

Alter eorum carnosior est, candida refertus medulla, uiridis, calamo
crasso & tenero, fracido, quare ad uitalia & alias res inutilis censetur.

At alter licet tenuior, & cineracei sit coloris, tamen lentior & ad omnis
generis uitalia accommodatior est. Bina hæc Iunci uulgaris genera in cacu-
mine fructum ferunt, in tenuissimis quibusdam paniculis ac iubis, quæ bar-
bam fuscam forma sua referunt. In ijs namque folliculi spadicei coloris de-
pendent, in quibus, cum maturuerint Augusto mense, admodum exigui,
copiosum & luteum semen reperitur. Quanquam reperias ex his calamos
non paucos fructu & semine uiduos.

3.
Iuncus exiguus
pratensis.

Cæterum aliud quoddam Iunci admodum exigui genus in quibusdam
humectis pratis inuenitur, dodrantalis altitudinis, calamis ex una stirpe su-
pra uiginti erumpentibus, lato frequenti & stipato in fastigijs semine depen-
dente. De hoc genere cum ad graminis genera pertinere uideatur, plura su-
pra cap. xxxvij.

NOMENCLATURAÆ.

Germani Iuncum *Bingen*, Mediomatrices *Sympsen* appellant, Græci
Schoenon, Hebræi *גומא* Gomæ, & *אגמון* Agmon, Exodi ij. Esaiæ xxxv.
uocant. Sed cum Plinius sex, ut diximus, Iunci genera describat, recensēbi-
mus ordine quo pacto illa uocet.

Primum ē quo regetes & flores texuntur, *Mariscōn* appellat:

Secundum *marinum*, & *Oxyshænon* nuncupat, quod in bina secatur ge-
nera, marem scilicet quem *Oxyn* uocant, & foeminam, quam *Melancranin*
quod nigrum ferat semen.

Tertium *Holoschænos* dicitur, cuius usus ad nassas marinas, sirpeas, &
alia id generis. Atque hoc genus apud nos usitatissimum est, ad omnia
textoria

textoria opera, sequax & accommodatum. Vergilius Iuncum hunc, Molem & limosum uocat.

Quartum, Plinius Cyperon, Iuncum odoratum, & angulosum uocat, *De Iūco odorato*
Cornelius Celsus, quadratum. Annotat hoc loco Plinius differentiam quæ *Diosco. lib. 3.*
est inter Cyperum & Cypirum, statuenda, nimirum ut hoc gladioli herbæ, *cap. 120*
quæ bulbosam habet radicem, nomen sit, illud uero Iunci odorati. Est &
per se (inquit Plinius) indica herbæ, quæ Cyperis uocatur, gingiberis effi-
gie: commanducata croci uim reddit.

Quintum genus Euripicen, et sextum denique Teuchiten nominat. Sunt autem tria posteriora Iunci genera, a Plinio commemorata Germanis igno-
ta.

VIRE SACTEMPERAMENTVM.

Quanquam Iunci uniuersa genera uarium extra medicinā usum habēt, tamen a medicis non prorsus repudiatos fuisse Iuncos, præsertim eum qui odoratus cognominatur, ueteres rei herbariæ scriptores testantur. Apud nos hodie in medicina non usurpantur. De Iunci medicinis ita perscripsit Dioscorides. Semen utriusque tostum, ex uino diluto potum, sistit aluum, & rubra foeminarum profluvia, urinam cit, capitisq; dolores facit. Hæc ille. Cum uero capitis dolores faciat moderate illo utendum fuerit,

EXTRINSECVS.

Vfus Iunci ut diximus ad nassas piscatorum, sirpilla, tegetes & floreas, medulla ad lucernarum elychnios facit,

De Phycō marino, & Potamogeto.

CAP. XLIII.

MVLTA ALGAE GENERA PASSIM IN AQVIS NASCUNTUR, quorum quatuor, & nobis quidem usitatiores in præsentia describemus.

Primum genus nostræ Algæ, herba est geniculata, & prælonga, Cennodix uulgo uocatur non ab similibus, folijs admodum incis. Hæc Iunio mense elegantissimos, candidos, herbæ Fragariæ similes flores profert, quibus decedentibus capitula rotunda, echinata, instar Ranunculi succedunt. Herba est uiridis, & quæ aquis fluentibus gaudeat.

Alga prima.


Secunda ex nostris Algis, quanquam in fluentibus quoque aquis nascatur,

2.

Alga secunda.

Potamogeton.
Samraut.

3.
Alga Vergilij.



4.
Potamogeton.

nascatur, piscinis tamen & stagnatibus familiarior est. Herba prælonga, nodosa, colore nigricante prædita, folio crispo, longo, at angustiori Salice exigua, sed teneriori. In quibusdam locis suis decoquitur deo randa.

Tertia uero cuius Vergilius meminit, eo hemistichio, *Proiecta uulior Alga.* Ea inquam calamus profert iunceum, qui per æqualia interualla, pinnatis & incisis folijs stellæ instar circumdatur, non aliter atq; Matrisylua, quæ Germanis Waldmeister dicitur. Iulio mense purpureum & spicatum gerit florem, qui in rotunda quædam Coriandroq; similia, nigra, & prædura, ac plerumq; quaternaria aut quinta, rotatim fastigia calami ambientia desinit. Atque hoc illius est semen. Nascitur in piscinis & aquis stagnantibus, ex humo limosa & forti. Planta meo iudicio terreæ substantiæ & Saturnina plane.

Quarta autem, eademq; elegantissima Alga, in stagnantibus quoque prouenit, caule oblongo, terete,

& geniculato, e cuius geniculis alij profiliunt furculi, folijs uestiti uiridibus, Plantagini similibus, sed firmiter ac solidioribus, ac per omnia, ea quæ Seplastiarj uulgo uocant Folia Indi referentibus. Iulio mense flore emicat roleo,

roſeo, ſpicato, Plantaginis rubiæ, aut Colubrinæ inſtar, qui cum deſloruiſt ſemen poſt ſe copioſum, durum, & ſolliculis quibuſdā incluſum relinquit.

NOMENCLATURAÆ.

Algam omnem Germani generali uocabulo Samfraut appellāt. Proſeindetria priora genera ſub Fuco marino Dioſcoridis cōprehenſa iudico. *p̄m. & laſciatop.*
De ijs egit Theophrastus lib. iij. capite. vij. ubi inter cætera aquaticas *Dioſco. lib. 4.*
plantas uulgaſiſſimas gramini ſimiles eſſe calamis & caulibus, aſſerit. De *cap. 95.*
Brio, cuius Theophrastus loco citato mentionem fecit, Dioſcorides capite
xciij. lib. iij. Quarta noſtratum Algarum quæ folia Plantagini aut Be
tæ ſimilia obtinet, uerum eſt *πταγουρίτρυ* Dioſcoridis, quam aliqui *γαχόνυ*, *Dioſcor. lib. 4.*
ſpicatam, & Fontinalem herbam appellant. *cap. 96.*

VIRE AC TEMPERAMENTVM:

Omnes herbæ, quas Germani Samfreutter uocant, frigidiæ ſunt natu
ræ, ſicut Lenticula paluſtris, ideoq̃ non introſumuntur, ſed podagricis ac
calidis affectibus foris adhibentur. At enim uerus Phycus marinus qui
noſtris regionibus incognitus eſt, frigidam & ſiccam Dioſcoridi obtinet
temperaturam.

*Potamogetonis
nomen Limonio
& Tripolio quo
que à Dioſcoride
tribuitur lib. 4.*

EXTRINSECVS.

Phycus marinus cum oleo & aceto toſtus, in cataplaſmaticis calidis po
dagricis inflammationibus & doloribus efficaciter illinitur.

Potamogeton per ſe pruriginibus & ueterum ulcerum nomis utiliter
imponitur, refrigerat enim & inſpiſſat.

De Lenticla paluſtri. Cap. XLV.

LENTICVLA PALVSTRIS PERPETVO VIRORE VI
gens, nihil aliud eſt quam pinguedo quædam ſtagnantium & re
ſiduum aquarum, umbræ & ſolis per uices patiens. Ex illa tan
quam ſeminio Algæ cæteræq̃ aquaticæ plantæ naſcuntur. Nam ubi e ſtag
nantibus aquis in fluentes Lens paluſtris deducta fuerit, id quod inunda
tionibus contingere ſolet, littoribusq̃ & ripis inhæſerit, dilatatur, aliæq̃
plura ſubinde ex ſe procreat foliola, inferne etiam ſubnatis capillamentis
quibuſdam candidis, & exiguis radiculis terræ ſeſe committit. Atq̃ hoc pa
cto Lens paluſtris in planras quaſdam Naſturtio aquatico non multum
abſimiles degenerat, quod ego non ſemel cum admiratione naturæ haud
uulgari obſeruauī.

Lenticula palustris.

Neerlinscn.



NOMENCLATYRAE.

Lenticula palustris anatum cibus est, & muscus quidam palustris uti tee-
statu Dioscorides, collectionibus & igni sacro perutilis, Cæterum hæc illi
apud.

apud Dioscoridē sunt nomina, *παντὶ ὁ καὶ τῶν τελευτῶν, παντὶ ἄγριος ἰσιν ἴσῃ*, Lens *Diosco. lib. 4. cap. 24.*
 palustris, Lens agrestis seu sylvestris (ad differentiam scilicet Lenticulæ sa-
 tiuæ) Epipteron, Viperalis, Icosmigdonos. Serapioni cap. cccxxv. Taaha-
 leb, Germanis Meerlinsen appellatur.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Quæ de Alga diximus, ea & de Lenticula aquæ intelligenda sunt, nam
 refrigeratoriæ est naturæ, & efficax (ut uulgo uocant) reperculsiuum, quare
 moderate & cum iudicio illa utendum censeo.

INTRINSECVS.

Aduersus internas inflammationes & incensiones, maxime pestilentia-
 les, bis teruē in die aqua distillata Lenticulæ palustris mensura cyathi me-
 diocris exhibenda est.

EXTRINSECVS.

Eadem aqua ad iecoris inflammationes unice facit, si stupra cannabina,
 aut linteola in ea madefiant, partibusq; affectis utrinq; calida imponantur.

Quod ad reliqua attinet, conuenit Lenticula palustris cum Alga, & uul-
 gari Solano. Potest enim Lens palustris emplastri instar ramici eiusq; in-
 flammationibus imponi.

De Hippuri maiore. Cap. XLVI.



IN FOSSIS AQVA RESIDE REPLETIS LOCISQVE

I riguis & tenebrosis, paludibus & piscinis Hippuris maior
 duorum generum prouenit. Quoddam enim nudo calamo, om-
 niq; folio carente, instar lunci profilit. Alterum uero caulem habet e' geni-
 culis (nam utriusque Hippuris coles geniculati sunt) æquo interuallo a se
 mutuo distantibus, capillamentis potius quam folijs uestitum. Sub initia
 Maij mensis nigros alparagos, bina hæc Hippuris maioris genera mittunt,
 in quibus flos plantæ constitutus est, nam in altum ita feruntur hi caules, ut
 nihilominus fastigia eorum primos illos flores ostentent. Radix utriq; ni-
 gra, lignosa, & plane insipida. Præstantissima ex his ea est, quæ fractu con-
 tumax, aspera, & scabra fuerit. Quo nomine materiarijs fabris usurpatur,
 qui ligneam pectinum & aliorum minorum operum rudratem huius her-
 bæ scabritia in nitorem expoliunt. In mundandis etiam utensilibus & culi-
 narijs uasis, magnus huius herbæ usus passim existit.

*Hippuris maior**2.**Hippuris maior**altera.**Ruellius lib. 3.**cap. 97.*

Hippuris.
Schaffhew.

Hippuris altera.
Kosßchwanz.



NOMENCLATURAE.

Dioscor. lib. 4.
cap. 44.

Quam Germani Schaffhew & Kosßchwanz appellamus, ea Dioscoridi *ἵππυρις*, quod *ἵππος* & *ῥις* dicitur, Equisetum, Equinalis salix, alijs Asprella dicitur. Reliquas appellationes prudentes omittimus.

VIRE.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Hippuris ea quę capillamento potius quam folio articulatur, magni in medicina & maxime probandi est usus, propter miram sanandi vim, quam obtinet, spissandi facultate prædita, & utrisq; corporis partibus utilissima.

INTRINSECVS.

Hippuris cuius sam meminimus, sistendi sanguinem mira facultate pollet. Succus namque eius bibitus profluvia sanguinis tam uiris quam mulieribus cohibet, necnon sanguinem mingentibus, & excreantibus. Eadem potest aqua stillatitia per diem bis aut ter, mensura trium coclearium sumpta.

Succus in uino potus tormina uentris sedat, tussim, orthopnoeam, ruptaq; adiuvat, necnon dissectiones uesicę & intestinorum, enterocelasq;.

Adeadem herba uino decocta & calida pota facit. Potest uero uel herba uel radix, uino aquaue ad omnes istas affectiones decoqui, pro ratione morbi.

EXTRINSECVS.


Succus herbę expressus, naribusq; inditus, & ceruici simul impositus, sanguinem e naribus erumpentem sistit. Idem aqua stillatitia efficit.

Herba tusa, ac cum succo suo imposita cruorem e uulneribus manantem supprimit, ipsaq; intra paucos dies glutinat, teste Galeno, qui Hippurim ad sanguinis reiectionem, ad fluxū muliebrem potissimum, ad dysenterias, & ad alia uentris profluvia generosum esse medicamentum asserit.

De Hippuri altera. Cap. XLVII.

IPPVRIS SECVNDÆ DVO IN RIGVIS PRÆTIS
 H inueniuntur genera, plantæ scenifecis diræ & inuisæ, ut quæ Plinius lib. 28. cap. 28.
 falces scabritie sua obtundant, ipsosq; scenifecas mirum in modum remorentur. Alterum ex his quod & grandius existit, tenuissimos capillos pro folijs gerit, e singulis caulis geniculis frequentes prodeuntes, ita Hippuris minor altera.
 quidem ut euulsus caulis caudam equinam eleganter exprimat. Hoc Hippuris genus non ubiq; occurrit, plerunque tamen in tenebrosis & humectis uallibus & pratis, maxime ijs in quas piscinarum aquæ dimissæ decurrunt. Hippuris minima.
 Alterum uero & exiguum Hippuris genus, quod & usitatissimum est, in solo macri & arenosis pratis, necnon sabulosis & humectis quibusdā agris inter fruges enascitur. Aprili mense quotannis, nudos quosdam emitit.

Hippuris minor.
 Klein Schaaffheew.



asparagos, qui ubi progressu temporis auctiores evaserint, in altum instar Plantaginis florentis attolluntur. Maio deinde mense caules subsequuntur scabri, perq[ue] ambitum, æqualibus distantijs, capillamentis quibusdam tenuissimis rotatim seu stellatim uestiti, decidentibus interim cacuminibus (qui floris aut seminis spem quandam facere uidebantur) nullo relicto post se semine. Planta est doctantalis, & quæ frequentibus coliculis è nigra & serpente radice erumpat, praetorum & aruorum singularis pestis, ea namq[ue] scenum, necnon frumenta impediuntur, non minus atque Fillice, Harundine, Lolijsq[ue], et alijs vitijs. Quapropter qui hanc Hippurim Zizanijs adiungeret, is mihi non inepte facere uideretur.

NOMENCLATURAE.

Hac exigua & posteriore Hippurici ancillæ coquinariae, culinarijs uasis extergendis, praesertim uero stanneis, æreisq[ue] & ferreis utun-

tur, eamq[ue] a forma Katzen schwanz, oder Katzenwedel, hoc est, Caudam felinam, & Klein Schaaffheew/hoc est, Hippurim minorem uocant. Dioscoridi ~~in arboribus~~ Hippuris altera, Equitium, Salix equina, Equisetum alteru.

Quæ

Quæ uero primo loco à nobis descripta est, Germanis *Pferdeschwanz*/
Rosßschwanz, *Rosßwadel* Latinis *Cauda equina* dicitur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Quæ de *Equiseto* maiori ueteres prædicant, ea recentiores *Hippuri* mi-
nori (quam quidam Germani *Katzenagel* quoq; nominant) tribuunt, ni-
mirum quod uulneribus internis & externis sanandis efficax sit,

INTRINSECVS.

Hippuris altera aqua, uinouë decocta, omnis generis sanguinis proflu-
uia sistit, intestinorum uulnera sanat, & renum ulcera fluentia, stranguriæ au-
xiliatur, & calculo. Ad eadem facit aqua distillata, in primis uero calculis
conducit, per diem ter aut quater singulis uicibus binis uncijis pota.

EXTRINSECVS.

Lintheolis in aqua stillatitia mediocriter calida madefactis ac impositis,
erysipelata iuuantur, & pustulæ rubræ. Hoc medicamentum inflammatio-
nibus sedis, dysenterijs, tumoribus genitalium opitulatur. Reliquas cum
maiori *Equiseto* uires obtinet.

De *Nymphæa*. Cap. XLVIII.

VO NYMPHAEÆ FASTIGIA REI HERBARIAE SCRIB

D ptoribus unanimi consensu statuuntur. Altera candido, altera lu-
teo emicat flore, utraq; in piscinis, aquis stagnantibus, & residu-

bus, aut pigro lapsu repentibus, nascitur. Candida frequentior. Ea Iunio *Nymphæa can-*
mense, flore prodit instar *Lilij* candidi aut *Rosæ*, multiplici foliorum stipatu dida.
contexto, ita quidem ut unius flos duodeciginta folijs interim & paucio-
ribus nonnunquam constare uideatur, quæ singula per se considerata for-
ma pollicem, aut *Sedi* maioris folium referunt. E' medio florū crocei quid,
solis figuræ non multum absimile elucet. Antequam uero in florem erum-
pat, oblonga quædam cernuntur capitula, *Amygdalis* maturis pene simi-
lia, folijs contexta ex uiridi purpurascens, quibus maturitate rupis flos
emicat frequentibus ut dixi foliolis stipatus, croceisq; multis fibris stamini-
bus seu radijs quibusdam solis instar fulgens, nullo odore præditus.
Cumq; folia floris deciderint, caput *Papauerinum* aut malum rotundum,

Nymphaea candida.

Weiß Seebäumen.


femine nigro refertum pro-
ruberat. Caulem profert-
hæc *Nymphaea* teretem, læ-
uem, Iunci palustris maio-
ris inftar, folia uero lata, in
oblongum rotunda, firmā
ac folida ueluti coriū quod-
dam, leuibus itidem iuncen-
tis, & fungofis stylis nitentia.
Radix eius brachiū hu-
mani crassitudinem quan-
doque assequitur, nodosa,
capillamentis multis fibra-
ta, nigra forinsecus, intus
candida existens, inodora-
ta prorsus, & nullius insu-
per saporis.

Alterā *Nymphaea*, fo-
lijs, caulibus, radicibusq-
iam descriptæ aliquantum
cognata est, nisi quod flo-
rem habet totum luteum,
nec adeo magnum utilla.
Huius cōclusa capitula, an-
tequam florere incipiat, ro-
tunda apparent globi in-
star, folijs obducta uiridi-
bus, non aliter atque eius
quæ *Dortterblüm*/ seu *Rü-
dortter* dicitur, de qua supra
lib. primo, cap. xliiij.

NOMENCLATURA


Candidam *Nymphaea*
Germani weiß Seebäumen /

Luteam uero Gäl Seebäumen uocant, utranque alias Seebäumen / Wasser-
gilgen / quasi dicas florem lacustrē, & *Lilium aquaticum*: a capillata uero ra-
dice *Harwurtz* / *Harstrang* / a colore radicis *Bollerwurtz* appellantes. Offi-
cinalis

21. *Nymphaea lutea*1. *Nymphaea*2. *Nymphaea*

Nymphaea lutea.

Gel Seeblumen.



imposita, sanguinem sistere traditur, utilis & ad difficultates intestinorum epota.

Hæc ille.

cinis Barbara uoce Nel
nuphar dicitur, alijs Cla-
uus veneris, Digitus vene-
ris, Alga palustris, Papauer
palustre. Dioscoridi libro
tertio cap. cxxxix. Nym-
pha uocatur, uel quoniam
aquosa amet, uel quod (re-
serente Plinio) Nympha
nata, Nympha Zelotypia Pli. lib. 25. cap. 7.
erga Herculem mortua, &
in florem nominis sui con-
uersa sit, quare Heracleon
uocant aliqui, alijs Rhopa-
lon, a radice clauæ simili.
De Nymphaea ita perscri-
ptum reliquit Theophra-
stus lib. x. cap. xii.

Γλυκύανδρον ἄνθη νυμφαία καλεῖται
ἐν φόντασι δὲ ὅς τ' αἶς λιμνῆς, καὶ ὅς
τῆς ἰκθυῶν διερῶν τῇ ὀρχομενίᾳ
καὶ μαραθῶν, καὶ περὶ κρητῶν, καλῶ-
σι δ' αὐτὴν οἱ βοιωτὸν μαδωναίαν, καὶ
τὴν κατὰ ἰαδίαν. ἔχει δὲ τὸ φύλλον
μήλα ὡς τοῦ δατῶ, ὕψος δ' ὅσον
ἰσχυρὸν, καὶ περιέχει τὸ ὡς τὴν πύλην
γὰρ ἰσχυρὴ, χρυσίον δ' καὶ πρὸς τὸν
δυσεντερίαν πικρὸν. Hoc est.

Dulcis (radix scilicet) &
Nymphaeae uocatæ, quæ
nasci in lacustribus solet, ut
in Orchomeniensi agro, &
Marathone, & in Creta In-
sula. Boeoti Madonaim hæc
appellant, fructumque eius
esitant. Gerit folia super
aquam ampla. Plagæ trita

VIRES AC TEMPERAMENTVM

Nymphæa utraq; refrigerantis & siccantis est naturæ, potestq; citra periculum utrinque aduersus quosuis calidos affectus usurpari.

INTRINSECVS.

Aqua è floribus Nymphææ candidæ distillata, binis q; aut ternis uncisq; pota medicamentum est optimum ardentibus febribus tempore pestis, aut Ethica in morbo pleuritico laborantibus. Eadem ad siccam tussim, & sitim maximam, ad inflammationes etiam lienis & epatis unice facit. Qui enim his malis afficiuntur, ijs pro ratione morbi, & temperaturæ ipsorum aqua ista uel in potu exhiberi, uel in linteolis mediocriter calida, cordi uelepati foris imponi potest.

Aqua stillatitia, per diē aliquoties pota diurnas alui fluxiones cohibet.

Quidam ex his floribus conseruas, & olea ad commemoratos morbos conficiunt.

Cæterum nec aqua stillatitia, nec conseruæ, neque olea ex his floribus confecta a sanis, usurpanda sunt, præterquam ijs qui in cœnobijs castitatem uouerunt, nam huiusmodi medicamenta genituram extinguunt.

Radix Nymphææ candidæ uino nigro decocta & pota, mensium mulierum abundantiam sistit efficaci remedio, etiam ijs qui de omni auxilio desperarunt. Hoc idem de semine huius Nymphææ pari ratione usurpato intelligi uolumus.

EXTRINSECVS.

Aqua Nymphææ candidæ distillata, calidis capitis affectibus, inflammationibus item lienis & epatis medetur, necnon ardentibus pustulis.

Eadem phreneticos dolores sedat, quæ omnia oleum Nenupharis (ut Seplasiæ loquuntur) præstat.

Aqua florum Nymphææ candidæ stupa cannabina, aut lineis linteolis foris imposita, inflammatum epar refrigerat, Morpheam alias uel utiliginis, & maculas faciei è calida causa ortas exterit emendatq;.

Oleum Nymphææ candidæ Anthraci, alijsq; calidis corporis abscessibus ulceribusq; leniendis & sanandis mire commodat.


*De Acoro officinarum, Germanis Gäl vnd
blaw Schwertel dicto:*

CAP. XLIX.

INTER OMNES GLADIOLOS (QVOS ET NOS GERMANI Schwertel a foliorum forma appellamus) nullus in nostris

Acorum adulterinum.

Gál Schwertel.



stris regionibus semen pro-
 fert, excepto eo, qui luteo
 emicat flore, & plerunq; in
 aquis, aut his coniunctis
 acuinis locis, cuiusmodi
 sunt rigua prata, & fluui-
 rum margines nascitur. Ra-
 dicem habet complicatam,
 non in rectum sed obliquū
 actam instar Bistortæ, mul-
 tis capillamentis fibratam, in-
 tens subrubrā, gustu astrin-
 gente ueluti glans prædi-
 tam, nouis quotannis oculo-
 lis instar Typhæ aquaticæ
 gemmantem. Ex hac longa
 prodeunt & mucronata fo-
 lia, quorum ea quidem quæ
 prope radicem sitæ sunt sub
 rufa nonnunquam appa-
 rent. Maio mense caulis
 proflit læuis, teres & ca-
 uus, luteo emicans flore,
 qui quidem ita se habet, ut
 tria priora eius foliola de-
 orsum inflectantur, aliaq;
 tria prioribus magis exi-
 gua deinceps sursum feren-
 tur. Flore decidente siliquæ
 subsequuntur crassæ & tri-
 angulares, luteo, latoq; se-
 mine, & quod forma Vici-
 am compressam referat,
 saporis ingrati plane, refer-
 tæ.

Cæruleus uero Gladio-
 lus, radice, foliorum forma, caule denique ad Acorum iam descriptum fere
 accedit, nisi quod flores huius (qui & ipsi tria folia sursum, tria alia deor-
 sum uergentia, & in orbem pulchre circumacta, obtinent) ex cæruleo colo-
 re pur.

repurpurant, & nullo post se relicto semine decidunt. Hoc gladioli genus in hortis hodie, & in muris quandoque ac culminibus. tectorum ab aniculis plantari consuevit.

NOMENCLATURAÆ.

Nostri Seplastarij & magistri illorum contendunt Gladiolum luteum qui in aquis provenit, Acorum esse à Dioscoride libro primo cap. ij. descriptum. Cum uero descriptio Acori ad Gladiolum cœruleum magis facere uideatur, miror sane cur non potius illum quam alterum Acorum uocatum uelint. Sed non multum nos solliciti sumus, quid quisque sentiat, hoc tamen certum est, descriptionem Acori nulli nostrorum Gladiolorum conuenire, maxime quod ad folia, quæ angustiora Iridis folijs Acoro à Dioscoride tribuuntur, necnon odorem radicis attinet, cum constet nostrorum Gladiolorum, maxime uero lutei seu aquatici radices inodoratas esse. Qui sit ut cum doctissimo uiro Manardo Ferrariensi Acorum, eam esse radicem sentiamus, quæ Germanis Calmus, Latinis & officinis hætenus Calamus aromaticus dictus fuit, sed perperam. Nam uerus Calamus aromaticus cuius Dioscorides lib. primo. cap. xvij. meminit, non radix sed calamus est preciosissimus, & qui hætenus ad nos non fuit apportatus. Cæterum nolumus quicquam alijs præiudicare, quin sentiat statuaturque quisque quod uolet. Cum itaque ostenderimus descriptas hoc capite plantas Acorum non esse, superest, ut quid tandem nobis sint aperiamus.

Manardus lib. 6.
epist. 3.

Quam ergo Germani Gäl wasser gilgen, hoc est. Liliū aquaticum luteum, & Drackenwurz, & Gäl schwertel, hoc est, luteum Gladiolum uocant, necnon eam quæ iisdem Blaw gilgen, oder schwertel dicitur, congeneres esse plantas iudicamus, propterea quod eiusdem formæ & saporis radices, caules, folia & flores (licet illi quod ad colorem attinet discrepent) obtineant. Dicimus insuper utranque in caput xxiiij. libri quarti apud Dioscoridem collocandas, quo loco *swelt*, quā nonnulli *ipw* *ayelav*, Irin syluestrem, Cacos, & Gladiolum uocant, descripta est. Quod si cui uideatur Gladiolum cœruleum *epios* (de quo nos statim sequenti capite) uocandum, cum eo minime contendendum existimamus. Quæ superstitione in hac radice effodienda ueteres usi fuerint, partim ipse Plinius lib. xxi. cap. xx. descripsit.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Acorus officinarum raro intra corpus assumitur. Sunt qui e floribus eius aquam distillent, ad inflammationem oculorum. Alij Eclegma e radice aduersus calculum faciunt. Sed is Gladiolus qui cœruleos fert flores hoc tempore utrisque corporis partibus adhibetur, calidæ temperaturæ herba

Herba, & expellentis ac resiccantis facultatis. Radix lutei Gladioli astringit.

INTRINSECVS.

Aqua cœrulei Gladioli stillatitia pota aduersus omne genus ueneni, ad febres ardentes tempore pestis facit, necnon ad incensum epar, & pleuriticū morbum.

Radix eiusdem uino decocta & pota hydropem expellit, menses trahit, et calculum renum, stillicidio urinæ auxiliatur.

Aqua eius radice distillata trium aut quatuor cochlearium mensura, aliquoties per diem pota usu gratior est, sed in expellendo ea mala quæ recensimus non perinde efficax. Eadem tamen continuo & frequenter pota, obstructions iocinoris soluit, uitia thoracis & pulmonis expellit, expurgatq; doloribus lienis & matricis ac torminibus opitulatur, aluumq; soluit.

Radix lutei Gladioli uino decocta & pota, continuas alui fluxiones sistit, dolores uesicæ & coxendicum mitigat, & ad omnis generis sanguinis profusua facit.

EXTRINSECVS.

Aqua distillata e floribus & radicibus Gladiolorum, mane & uespere instillata, quibuscunque maculis oculorum conducit.

Lincola in ea aqua madefacta ac imposita, tumoribus & inflammationibus profunt, imprimis uero ulceribus mammarum muliebrium & genitalium, necnon cancro, et eo morbo quē uulgo uocant, NOLI ME TANGERE. Eadem aqua serpentium ictibus collutione, & in lincolis impositu opitulatur.

Aqua stillatitia omnis generis maculas exterius, ulceribus malignis genitalium (quæ Germani den Schlier uocant) prodest, & papulas ac serpiginem maxime sub oculis emendat, illita.

Radix Gladioli cœrulei tusa cum thure admixto uino illita, spicula & aculos e corpore extrahit, necnon ossa confecta, menses impeditos euocat.


Has uires Dioscorides superiori Xiphii, siue Gladioli cœrulei radici ascribit, reliqua enim quæ addit tanquam superstitiosa prætereo.

De Xiphio, seu Gladiolo cœruleo minore.

CAP. L.

N. QVIBVS DAM HVMECTIS PRATIS ET CAMPIS
I. quæ Rheno & prope Vormatiam, & Oppenheimsum oppida
adiacent,

Ξιφιον, seu *Gladiolus coeruleus minor*.
 Kleinblaw Schwertel.



Ξιφιον
Gladiolus.
 Diosco. lib. 4.
 cap. 22.

adiacent, *Gladioli coerulei* quoddam genus inueni, cuius flores aequi pene coloris, sed cum coeruleo mixti uidebantur esse, ternis uersus terram infl exis foliolis singuli praediti. Caeterum quod ad reliqua attinet, hoc est, folia, caulem, & radicē, *Iridi* de qua sequenti agemus capite, per omnia accedit hic *Gladiolus*, nisi quod tota sua substantia magis exiguus & angustioribus folijs & acutioribus illa esse deprehenditur. Semen fert in oblongis ac triangularibus siliquis, non aliter atq; *Gladiolus luteus*, de quo superiori proximo capite egimus.

NOMENCLATVR AE.

Inter omnes *Gladiolos* nullus sane extat, qui mihi quidem aptius ad *Xiphion* seu *Gladiolum* *Dioscoridis* referri posse uideatur, quā hic ipse *Gladiolus coeruleus* exiguus, quem Germani Kleinblaw Schwertel uocant.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Quod de *Gladiolo coeruleo* maiore diximus, idem & de *Xiphio* intelligi uolumus. Inprimis uero radix eius cum thure & uino trita & illita extrahendi ui pollet haud uulgari.

De

De Iride Germanica.

Cap. LI.

Teütsch Violwurz.



IRIS QVAE *GLADI-*
olorum omnium præstan-
tissima censetur, radicem
habet serpentem ac contor-
tam, quæ suprà terram po-
tius quam intra humum
conspiciendam se præbet,
nam primaria radix nuda
iacet, nec humo cõtegitur,
at radiculae illi adnatæ in-
tra humum latent, a quib-
us candida & primaria ra-
dix nutrimentum recipit.
Majo mense inter folia quæ
gladij formam imitantur,
caulis exit rotundus, flori
uasculis seu calycibus obli-
quis & acutis conspicuus.
His oblongis quos dixi-
mus calycibus maturitate
ruptis, flos exit diuersico-
lor. Nam tria illius præci-
pua folia, ea parte qua uer-
sus terram inflectuntur, ex
uiridi & pallente colore di-
luta purpura, purpureis si-
mul lineis, seu uenis per
hos ipsos colores ductis, in-
tus uero purpureo colore
admixtis candidis, & puni-
ceis lineis, media deniq; su-
per regione lutea lanugine su-
percilliorum formam re-
præsentante, emicant. His
contraria tria alia in altum
globi instar coacta sese ae-
tollunt, aequi coloris ex purpura simul albicantis & lutei, non aliter atq;
reflexus.

reflexus splendoris auri fulgentis, aut cuiusdam admodum exuarijs coloribus intertextis splendētis telæ, Germani ein widerſchein uocant. In medio integri floris tria alia foliola breuia, angusta arcus coelestis inſtar coloribus uarijs tincta apparent. Ex his quæ de floribus Iridis Germanicæ diximus, colligimus illos nouem folijs, totidemq; coloribus conſtare. Hi ipſi flores odoratiſſimi cum marceſcere ac decidere coeperint, nullum poſſe uel ſemen uel fructum (quod ego ſciam) relinquunt, neque etiam paſſim hæc Iris, niſi plantata fuerit reperitur. Ego namque omnes fere Germaniæ regiones crebris herbarum gratia profectionibus ſuſceptis, perluſtraui, nec uſquam locorum eam ſponte naſcentem inueni, niſi in altiffimo quodam & graminoſo monte non procul a Valentia arce ſito, unde euulſam in hortulos meos illam tranſtuli. Radix illius non perinde dura ac ſolida eſt, atq; illius quam Genuenſem dicunt, neque etiam adeo odorata, licet feruentis ſit ſaporis, & quæ linguam guſtata adurat, non minus quam peregrina, qui ſicut in plantis diuerſitas regionum magnam conſtituat diuerſitatem. Quemadmodū enim frumenta & uina pro ſitu & locis natalibus ab inuicem differunt, ita herbæ & radices pro ratione terræ in qua naſcuntur, & cœli temperie, uel de teriores, uel meliores fieri conſueuerunt.

NOMENCLATURAÆ.

Quamquam hæc noſtra Iris, ea qua quotidie utimur longe ſit inferior, multum tamen affinitatis cum eadem habet, ſi formam & temperamentū conſideres. Quapropter uocabimus illam Iridem, non quidem Illyricam, ſed Germanicam, Germanice Teüſſchviolwurcz, & Himmelſchwertel/hoc eſt, Vraniam. Cæterum Iridis apud Dioſcoridem, hæc ſunt nomina, *ἰρις, ἰριδὴ, ἰριαν, ἰριανός, ἰριανός, &c.*

Dioſco. lib. 1.
cap. 2.

VIRESCAC TEMPERAMENTVM.

Iris omnium Gladioli generum præſtantiffima cenſetur, ad quamplurimas corporis tam internas quam externas affectiones. utiliſſima. Vis illi excaſfactoria exiccans, & extenuans.

INTRINSECVS.

Quæ de cœruleis gladiolis dicta ſunt, plenius de Iride intelligenda ſunt. Radix illius in puluerem redacta, & cum melle uſurpata, aut minutim conciſa, inq; uino decocta & pota, thoracis pulmonisq; uitia expurgat, humorum qui ægre eñciuntur crassiſſiem digerit, ad tuſſim efficax eſt.

Eadem in puluerem redacta, & ex hydromelite drachmis ſeptem epotæ, bilem

bilem crassamq; pituitam purgant, a quibus non raro febres & morbus re-
gius oriuntur.

Eadem ex uino decocta, & calida pota, torminibus medetur, & his qui-
bus genitura effluit auxiliatur. Eadem perfrictionibus & horroribus febri-
um in accessione epota opitulatur.

Idem decoctum somnum potu conciliat, obstructione lien liberat, men-
ses pellit.

Radix Iridis aceto decocta & pota, serpentium ictibus auxiliatur, eo-
namq; decocto uenenum a corde arcetur.

EXTRINSECVS.

Iridis radix in puluerem redacta, quibusuis externis corporis uitijis ulce-
ribusq; utiliter inspergitur, uulnera enim purgat & carnem generat, præ-
sertim si melle temperetur. Hoc pacto usurpata, cancro, fistulis, herpetæ,
alijsq; & genitalium quidem uitijis cum primis conducit.

Radix hæc cocta ac illita duritias ueteres, & strumas emollit.

Eadem cum albo ueratro & duabus mellis partibus admota, lentigines
& uitia cutis in facie a sole contracta emaculat.

Decoctum eius foëminarum fortibus utiliter imponitur ad emolliendos
locos.

Pessis, malagmatis, & acopis, nec non clysteribus inseritur.

In uniuersum magni ad omnia usus, nam non solum in uinum, & Cere-
uisiâ suspensa, hanc dulcem conseruat, illud uero iucundo cum odore, tum
sapore commendat, sed & pistoribus ad parandum fermentum triticeï pa-
nis magnopere usitata.

De Limonio pratensi. Cap. LII.

LIMONIVM PRATENSE IN NONNYLLIS HVME-
ctis pratis, & pascuis nascitur, folijs tenerrimis, Betæ satius qua-
damtenus similibus, ternis plerunq; instar Trifolij, laui, ac ro-
tundo stylo adnatis. Maio mense caulem emittit, in cuius uertice candidi,
lanuginosi, & coacti flosculi ita apparent, ut singuli coliculi cum floribus
suis Prunellam, uel eam quam Gulden gunsel uocant Germani, florentem
repræsentet. Cæterum nullo post se relicto fructu plantula isthæc paulo post
euanescit.

NOMENCLATURAE.

Hæc planta, quam Germani Wîsen Mangolt/ hoc est, Betam pratens-

sem, palustrem, seu lacustrem uocare possumus, nihil aliud esse censeo, quam Limonium pratense (nam de syluestri sequenti dicitur capite) cuius lib. vii. ca. vii. Theophrastus meminit, vernis illud adnumerans floribus.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Pauca de hoc Limonio in ueterum scriptis leguntur, nimirum hæc quæ subñciemus.

INTRINSECVS.

Semen uino decoctum ac potum, dyfentericis, & coeliacis prodest, rubra foeminarum profluuiâ sistit. Idem de herbæ decocto intelligas uelim.

EXTRINSECVS.

Folia eius externarum corporis partium inflammationibus, & his quæ refrigerationem desiderant imponi possunt sicut Solatrum.

De Limonio syluestri. Cap. LIII.

LIMONIUM SYLVESTRE NIHIL ALIUD EST QVAM Betæ syluestris quædam species. Eius folia firma sunt & solida, instar pene foliorum Pyri se habentia, per hyemem illæsa durât, & uiridia manent. Nascitur hæc planta in uliginosis & humectis locis, maxime sub arbutis quibusdam terra admodum muscosa, radice hinc inde instar Lili serpente. Porro singulæ Limoni syluestris plantulæ quina aut sexna fundunt folia, e quorum medio Iulio mense tenues profiliunt coliculi, elegatissimis, niueisq; ac forma sua flores Lili cōualli Germanis Meienblümlein repræsentantibus, emicantes. Hæc herba hodie magna experientia vulnerarij medici, seu Chirurgici, qui ramices & uellicas incidunt, ad glutinanda recentia uulnera utuntur.

NOMENCLATURAÆ.

Germani proprijsime Wintergrün / quasi dicas etiam hyeme uiuentem herbam appellant. Nonnulli alij Solz mangolt / Waldmangolt / hoc est, phraasi arbor est Betam sylvestrem nominant. Gariopontus medicus lib. primo cap. xvi. herbam quandam describit nomine Betulam, quam ait in saxosis & petrosis progigni locis, decoctamq; oleo doloribus aurium mirifice prodesse, quæ omnia.

Limonium sylvestre.

Winter grün.



omnia nos de nostro hoc
 Limonio intelligimus, qđ
 nonnulli Pyrolam uocant;
 nec male quidem, tametsi il-
 lis magis accedam qui ^{aque}
~~um~~ appellāt, nam descriptio
 Limoniĭ apud Dioscoridē
 magis huic Betæ sylvestri,
 quam Bistortæ de qua su-
 pra libro primo egimus
 conuenit.

VIRES AC TEMPE-
 ramentum.

Ad recentia uulnera per-
 sananda uix aliam reper-
 as herbam accommodatio-
 rem hoc ipso Limonio.
 Vis illi astringens, exiccās,
 & perfanans, id quod ne-
 mini non manifestum esse
 putamus.

INTRINSECVS:

Vulnerarij quos dixim⁹
 uulnerarias potiones ex
 hac herba faciunt præ-
 stantissimas, quibus non-
 nulli alij Alchimillam, Sa-
 niculam, Eupatorium &
 Nūmulariam adiungunt.

Aqua distillata ex ea her-
 ba usu gravior est ad eadē.

Limonion, maxime sen-

men eius, ad dysenterias, & mulierum rubras fluxiones facere autor est Di-
 oscorides, quod idem Plinius affirmauit.

E X T R I N S E C V S .

Herba recens tusa ac imposita externa uulnera sanat. Quidam ex herba hac in oleo decocta adiecto uiridi ære unguentum conficiunt ad eadem.

Alij herbam exiccatam, ac in puluerem redactam in ueteratis ac fluentibus ulceribus, quæ exiccare intendunt, aspergere solent; prout cuiq; uidetur consultum.

De Beta. Cap. LIIII.

^{1.}
Beta agrestis.

^{2.}
Beta candida.

^{3.}
Beta rubra.

BETA VT VVLGATISSIMVM, ITA ET MAXIME IN
 B sipidum est olus, & quot ut palato arrideat, sine uino & aromatis decoqui non potest. Proinde uaria sunt Bêtæ genera, alia enim nigra, alia candida, alia rubea censetur. Sed describamus singulas ordine. Beta alia nigricantibus, alia candidis seu pallefcentibus uestitur folijs, alia tota sua substantia rubra est. Quæ nigricantia profert folia, omnium est uulgatissima, eam nos agrestem seu erraticam Betam censemus. At altera cultura tenerior, cibisq; accommodatior euadit. Quam uero rubram diximus, secundò generi quod ad plantationem attinet similis existit. Folia omnibus satis lata instar Plantaginis latifoliæ. Radices quidem omnium rotundæ, & quemadmodum Fœniculi oblongæ, & lignosæ quadantenus, quod ad colorem attinet, binarum priorum, candidæ sunt, nam tertia purpuream habet radicē. Cæterū altero demum anno, & Maio quidem mense in caulem assurgunt uniuersa hæc Bêtæ genera, eumq; striatum & procerū. Iunio deinde mense caulis quem diximus, ab imis usq; ad summas partes floribus pallefcentibus & stellatis. Vitium florī non multum dissimilibus, (nam eo tempore & uites florere solent) emicat. Nec caulis solum, sed & adnati ramuli, quos frequentes habet, flore copioso comant. A flore semen subsequitur aculeatum, rotundum, durum, forma sua Coriandro Saccharo obducto respondens. Inter olera nullum reperias quod tam facile adeoq; sine ullo negotio e' terra erumpat, nam ubi uel seminium unum in terram deciderit tibi non facile postea extirpari se patitur. Plantulæ e' semine nuper natæ, nisi radices earum à muribus deuorentur, hyemis iniuriam ut cunq; ferunt.

N O M E N C L A T V R A E .

Germani hoc olus Mangolt/ & nonnulli aliq; Rungulsen/ & Römische Fôl uocant. Latinis Beta hortensis, Græcis *βήτα*, Hebræis *תרדנא* Tera-din dicitur. Serapioni Decka appellatur cap. cxlvij. Dioscorides lib. ij. cap. cxij. duo Bêtæ genera commemorat, nigrum alterum, hoc est rubrum, quod quidam.

*Beta.**Mangolt.*

quidam agreste Betę genus
esse asseuerant, sed perpe-
ram, (nam quam nos agre-
stem Betam esse cęseamus,
supra diximus) alterum cę-
didum, quam quidam Si-
cilicam, & Siculam Betam
nominant. De Beta scripse-
re inter alios Theophra-
stus lib. vii. de plantarum
historia cap. iij. Plinius
lib. xix. cap. viij. & lib. xx.
cap. viij. Columella lib. x.
Ægineta lib. j. & vii. Athe-
neus lib. iij. Dipsosophist.
Galenus de simpl. facult.
lib. viij. & de aliment. li. ij.

**VIRE AC TEMPE-
ramentum.**

Nihil in culinis nostris
Beta hortensi frequentius,
nam in cibo usurpatur, &
in medicina suum quoque
usum habet. Temperamen-
to calida est Beta, maxime
quod ad radicem attinet, id
quod hinc manifestum fit,
cum enim succus naribus
excipitur, adurit, & sternu-
tamenta proritat.

INTRINSECVS.

Beta in cibo sicut Spina-
chia parata facilimę est concoctionis, ĩs q̃ in primis conducit qui stomachi
imbecillitate laborant.

Betę hortensis plantulę recentes cum radicibus leuiter bullitę, & ex
Yy iij

aceto postea deuoratz cibi appetentiam adferunt, sitim compescunt, choleram in uentriculo reprimūt. Debet uero eiusmodi cibus æstate potissimū usurpari. De Beta, Baptista Fiera ita cecinit.

*Beta mala est stomacho, uiridis uel nigra, niuali
Rore caput mundat, naribus hausta tuum.
Compareat Maluis, Clysteri immixta dolores.
Quos tibi mansa facit, perdere Beta potest.*

EXTRINSECVS.

Herba Betæ inueteratis & malis ulceribus ac inflammationibus imposita conducit, tumores enim deprimi, & calorem restringit.

Radix Betæ nigræ uel rubræ tusa, ita quidem ut succus per linteum exprimatur, naribusq; indatur capitis lentos & frigidos humores mirifice purgat.

Radix Betæ in cineres redacta cumq; melle temperata illitu alopeciarum inanitates explet, reliquosq; crines firmos & quo minus defluant, continet. Hoc remedio eos qui caluere incipiunt uti conuenit si Simconi Sethi credimus.

De Atriplice. Cap. LV.

G ALENVS ALTERO DE ALIMENTIS LIBRO SATI-
uas & agrestes Maluas ac Lactucas sibi cognitās esse tradit, ac syluestrem Beram non itē se perspectam habere, id quod credit facile potest. Nam nec ulli ex ueteribus de ea scripsere, præter Plinium, qui Betæ syluestris commemorat, quæ non olus sed uulneraria potius est herba, & Limonium, seu Pyrola, Germanis Wintergrün appellatur, quemadmodum supra docuimus. Proinde nostra quidem sententia in id incumbendum omnibus rei herbariæ studiosis fuerit, ut non tantum satiuas, uerum etiam syluestres plantas cognoscant, quæ res certa sua utilitate non uacabit. Constat etenim syluestres plantas facultatibus & efficacia satiuas antecedere. Quamobrem & nos satiuas hortenses & domesticas stirpes ita quidem describemus, ut syluestrium interea, maxime quæ nobis notæ sunt, minime obliuiscamur. Hoc certe studio non tantum satiuæ, sed & syluestris Atriplicis historiam deinceps persequemur, a satiuæ exordium sumentes.

Plinius lib. 20.
cap. 8.

9.
Atriplex satiuæ
trium generum.

Hortensis itaque seu satiuæ Atriplex, quæ uerno tempore ante omnia reliqua olera in hortis a mulierculis seri consueuit, in tria secernitur fastigia, quædam enim folium profert rubicundum, alia in luteum languescens,

Atriplex.

Milten.



scens, postrema nigricans. Omnium uero horum generum folia farinae quid aspersum habere uidentur, maxime cum pubescunt, huiusq; caule uidua procumbunt, quæ sane aliquo modo Volubili candidæ similia apparent, nisi quod latiora sunt & longiora. Caules fundit surculosos, lignosos, teretesq;. Augusto mense semen copiosum, foliaceum, racematim coactum, instar Bursæ pastoris maioris. Cæterum admiratione dignum in hoc oleris id censeo, quod duplici prægnat semine, altero lato & foliaceo, ut diximus, altero uero nudo, nullisq; foliaceis inuolucris tecto, Circeæ (quæ ab alijs Amaranthus purpureus, seu flos amoris dicitur) semine nequaquam maiori. Radix Atriplicis satius brevis est & recta, uelut & Anetho, qui sit ut per hyemem durare non possit Atriplex, sed necesse habeat seminari quotannis. Satius Atriplicis genera sola coloris uarietate differunt, quorundam, n. folia & caules nigricant, nonnullorū Xerampelinum aut rube-

um obtinent colorem, aliorum in luteum pallidum languescunt, quæ discrimina in Beta quoque animaduerti possunt.

Agrestis uero & exigua Atriplex uitijs hortensium herbarum accenseri

Yy iiij

2.
Atriplex agrestis.

commode poterat. Quo d' ad caules quos profert, necnon ramulos, folia & radices attinet, satiuæ similis est, nisi quod tota sua substantia magis exigua est, & folia habet copiosiore farina aspersa. Herba est alsiola, frigorisq; impatientissima. Nascitur sponte sua in hortis, & aruis quibusdam, in quibus a verno inde tempore usq; in Autumnum semine copioso racematim compacto, exiguo, nigro, Portulacæq; semini simili prægnans reperitur.

NOMENCLATURAÆ.

Diosco. lib. 2.
cap. 110.

Dioscorides Atriplicis duo statuit genera, sylvestre nimirum, id quod postremo loco descripsimus, & satiuum quod trium generum esse primo loco docuimus. Atriplex Germanis *Milt*/Græcis *ἀτρίπλις*, & *χρυσόδακτυλος*. hoc est, Aureum olus dicitur. Columella huius quoque oleris quantumuis vulgaris meminit, rationemq; plantandi tradidit, idq; lib. xi. cap. iij. In nostris regionibus primo vere ut diximus cum cæteris oleribus feritur.

Sunt qui ad Atriplicem (quam & Atreplexum, & Treplexum cognominatam uolunt) Spinaciam referant, quod per nos quidem illis licebit, diximus tamen de oleris, ut uocant, Hispanico seu Spinachia, suo quoque loco, nunc enim de Atriplice agimus, quam Serapio frigidis & humidis adnumerat medicinis, asserens morbo regio expellendo utilissimam esse. Cæterum uocat illam Arabica lingua *Catacap*, cxlv.

Altera agrestis seu exigua Atriplex, Germanis *Klein acker milt*/ & a' uil. subducendi aluum *Scheißmilt* dicitur.

VIRESC. TEMPERAMENTVM.

Atriplex culinæ potius quam medicinæ nata uidetur, quanquam suas quoque in medicina habeat laudes, temperamento nimirum frigido & humido prædita.

INTRINSECVS.

Hippo. de victus
ratione lib. 2.

Atriplex cocta ut olus esitata aluum mollit Dioscoride teste, quod ego de sylvestri seu agresti intelligo. Hippocrates enim cum de satiuâ Atriplice (ut mihi uidetur) scriberet, dixit illam humidam quidem esse, sed aluum nequaquam ciere.

Semen Atriplicis rufum, & cum aqua mulsa potum, regium morbum sanat.

Atriplex oleris instar esitatum cholericis, calidis et macris hominibus maxime conducit.

EXTRINSECVS.

Atriplicis recentia folia tusa ac imposita, panos & parotidas discutunt. Alia si qua desiderantur, usus quotidianus docebit.

De

De reliquis *Atriplicis* generibus.
CAP. LVI.

Blitum.

Maier.



SVNT ET ALIA NON
paucasyluestris *Atriplicis*
genera, quæ æstate in omni
bus pene hortis inter cæte-
ra herbarum vitia succre-
scunt. Inter illa præcipuum
id est quod rubeo tota sua
substantia colore apparet,
ita quidem ut succo eius ex-
presso minij uice in scriptio-
ne uti possis, quod genus
coloris me in puerili ætate
quæ uarietate colorum gau-
det, sæpe usurpatum memi-
ni. Forma foliorum, radi-
cis, & caulis in hac planta
uulgari *Solato* satis re-
spondet, solo excepto semi-
ne, quod habet copiosum,
ac instar *Atriplicis* agrestis
de quo superiori capite, co-
actum.

^{1.}
Blitum nigrum.

Alterum huius plantæ ge-
nus præcedenti per omnia
quod ad formã attinet con-
simile est. Caulem habet
purpureum, folia uero ex
uiridi nigricantia. Sunt hi-
næ iam descriptæ plantæ
plane congeneres, & simul
in hortis inter vitia (ut di-
ximus) herbarum enascun-
tur.

^{2.}
Blitum secundum.

Tertium duriusculum est,
habet enim firmiora & so-

^{3.}
Blitum tertium.

diora folia. Quod ad illa necnon caulem & radicem atinet maiori Bassico simile apparet, sed florem habet multo minutissimum (nam nulli magnitudinem non superat) ex luteo uiridem. Semine prægnat nigro, nec Portulacæ semine maiori. Est & hæc Atriplicis sylvestris, seu Bliti species utrumque hortensianarum stirpium.

4. Cæterum eius, quod primo libro sub Solanis descriptimus, folia acutiora sunt his quibus Atriplex uestitur, in lateribus serrata. Quod ad semen atinet Atriplices prorsus æmulatur. Herba est plane lethalis & pestifera, maxime si a suis deuretur, ut loco citato meminimus.

5. Præterea aliud quoddam iam descripto simile Atriplicis sylvestris genus in antiquis areis, & fossis simi, ac pagis inuenitur, a proximo, ut diximus fere nihil differt, nisi quod folia habet acutiora, & magis nigricantia.

NOMENCLATURAE.

Quinque iam commemorata Atriplicis sylvestris genera una uoce Germanice *Wist milten*/hoc est, Atriplices simarias, propterea quod his maxime locis gaudeant, in quibus simus pecorum aliquandiu seruatus fuerit, appellare possumus. Sunt tamen qui primum genus Soldanæ & Soldanellæ appellare uelint, quibus repugnat Leoniceus, asserens Brassicam marinam hoc pacto uocari. Sed nihil ad nos controuersia ista, scimus enim quod hoc ipsum primum genus Hieronymo Braunschueig teste. Germani nonnulli *Kot fül*/hoc est, rubeam Brassicam uocent, & Sanguinariam herbam passim haberi, & recte quidem meo iudicio, nam id non solum color plantæ innuere uidetur, sed & experientia, qua ad dysenterias usurpari consuevit, idem confirmat. Mulieres & hanc sagminibus suis adijciunt. Cæterum cum Sanguinariæ herbe, Germanis *Blutkraut* mentio inciderit, notandum est pro diuersitate regionum uarias esse Sanguinariæ herbas quas obiter hoc loco commemorabimus.

Soldana
Soldanella.

Huius herbe historia
Ruellius
scribit de nat.
stirpium lib. 2.
cap. 51.

Sanguinaria	{ Verâ Germanica Quorundam aliorum Nonnullorum Comitum de Neuenare }	est	{ Blitum nigrum hoc capite primo loco descriptum. Tormentilla. Bursa pastoralis Centumnodia. Crus galli, Germani <i>Banem</i> <i>bein.</i>
-------------	--	-----	--

Ex his uidere est unamquaque fere regionem sibi peculiarem habere Sanguinariam.

Tertia

Tertia Atriplicis sylvestris species, quam folia Basilici habere diximus, mulierculæ nostræ apud Mediomatrices *Mater* appellant. Herba est innoxia, & quæ inter cætera olera non raro legitur, potestq; fieri ut Bliti sit species.

Quantum vitium, cuius in Solani historia descriptionem habes, Germani *Sew tod/Schweinstod*, & in agro Vangionum *Genßfuß* appellant.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Blitum nigrum, seu Sanguinaria illa, quæ quod ad formam attinet ad Atriplices sylvestres referenda uidetur, a mulierculis nonnullis in dysenterijs & sanguine sistendo usurpatur.

Reliqua Atriplicis sylvestris genera frigida sunt temperaturæ, & in his quæ foris refrigerationem desiderant adhiberi possunt, quemadmodum & Solanum. Hippocrates menstrua mulierum illis sisti credidit, si in cibo assumerentur.

De Atriplice caninc, seu Bono Henricho.

CAP. LVII.

QUAM VVLGO GERMANI *Stolz Beinrich* VOCANT, ea nobis Atriplex foetida esse uidetur, aut saltē species illius. Folia habet Atriplici agresti (de qua supra cap. lv. egimus) similia, sed minora, farina quadā aspersa, cineracea. Semen profert admodum exiguum multoq; Atriplicis agrestis semine minus, odoris grauissimi, ac putrilaginem foetidam spirantis. Nascitur hæc planta ad muros, & sæpes, quæ loca canes plerunque commingere solent. Crediderim equidem illam sponte sua e foetida terræ exhalatione progigni. Maio mense cum ceteris Atriplicibus e terra proflit, Augusto mense rursus euanescit, frigoris impatientissima herba.

NOMENCLATURAÆ.

Germani hanc plantā a foetido odore *güt/oder stolz Beinrich* uocant, neq; aliud eius nomen cognoscere unq; potui. Vitium Atriplicis potius est quam quiduis aliud, potestq; *Sundt smilten*/hoc est, Atriplex foetida, seu canina appellari. Licet non inepte Blitum illud foetidum esse dicemus, a quo apud Plautum in Truculento Blitea meretrix, hoc est, foetida cognominatur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Bonus iste Henrichus uermes in ulceribus putridis animantium quadru-
pedum natos excutit certissimo experimento, si herba rufa ulceribus im-
natur, id quod non semel ipse uidi.

Sunt qui uermes ejici dicant si herba solum adalligetur iumento:


De altero Bono Henricho qui folijs uestitur latis, supra primo libro ca-
pite, ciij. egimus.

De Caule capitulato. Cap. LVIII.

HOC OLERE IN GERMANIA NOSTRA IN CIBO, ET
hominibus & iumentis nihil frequentius est. Quin ira usus eius
inualuit in plerisque locis, ut uulgius hominum maxime eorum
qui amplam familiam alere necesse habent, uino potius quam hoc cibi ge-
nere carere uelit. Non solum enim stomacho satisfacit, ac famentes probe
alit, meliores sui & interna parte, præsertim eos qui eiusmodi cibo assueue-
runt, sed & exteriora eius folia, cæteræque partes pabulo bubus exhibentur
non ingrato. Quamobrem quod ad me quidem attinet, quidquid alij di-
cant, nolim sane hoc genus oleris plane contemni, neque etiam facile om-
nibus indifferenter eum cibum interdicare consultus uelim, maxime is
qui illo assueuerunt (ut diximus supra) neque alio per inopiam uicissitare pos-
sunt. Consuetudo enim quæ in naturam sæpenumero transit, repentinas
mutationes omnino non potest ferre, teste Hippocrate. Hæc tenuioris for-
tunæ hominibus scribimus, quibus per uitæ rationes splendidioribus epu-
lis uesci non licet. Meo certe iudicio Caulis capitulatus bene paratus, condi-
tus & coctus, multo salubrior est, cōdimētis illis peregrinis, & sumptuosis,
oliuæ inquam, Capparis, & Citrorum, quæ omnia ad eos potius pertinere
uidentur, quibus nihil nisi peregrinum placet, aspernantibus domestica,
quæ ut passim obuia sunt, ita dubio procul magis salutaria. Sed utut pala-
to suo isti blandiantur, certum tamen est apud plerosque Caulem capita-
tum ita in cibo expeti, & usurpari, ut ab eo se diuelli non patiantur, ut qui
utilitates eius, quarum supra mentionem fecimus, haud obscure deprehen-
derint. Sed hæc quidem obiter de hoc oleris genere præfata sunt, in eum præ-
cipue finem ne immerito olus saluberrimum conuicijs proscindatur, usque
penitus, quod multi facit solent, abdicetur. Nunc ad historiam illius
nos conuertemus, de plantatione eius non nihil dicturi, quæ sic se habent.
Semen Caulis capitulati teres & fuscum, quod nō perueritum sit, tempore
quadrage-

Caulis capitulatus.

Cappes.



quadragessimæ Martio mense terræ mediocriter pingui committitur, è qua non aliter atq; Brassica (de qua statim sequenti capite) sexto aut septimo die erumpit, ac nisi frigoribus aut pulcibus terrestribus opprimatur, breui tempore

tempore augetur noua illa eruptio. Quamprimum uero recentes illæ & teneræ plantulæ (Germani *Serling* appellant) quatuor aut quinque produxerint folia, id quod in Solstitio æstuali circa Festum D. Medardi fieri solet, tum euelluntur, ac in fasciculis certo numero colligatæ alijs regionibus, in quibus semen haud perinde prouenire solet, communicantur. Deinceps uero rursus plantantur eæ plantulæ, in terra pingui & probe stercoreata. Apud nos Mediomatrices pratensi & graminosa terra eaq; arata inprimis gaudet teneri quos diximus caules, in eaq; satis foeliciter proueniunt. Cumq; illi hoc pacto terræ inserti fuerint, quamprimum augescere incipiunt (nisi iniuriâ cœli impediuntur) folijs in orbem glomeratis, ac in capitis formâ extuberantibus. Hæc capita cum omnis generis carnibus decoqui apud nos solent.

Iam semen huius oleris peculiari quoque arte hortulani elicere solent. Nam capita seu caules capitatos una cum radicibus euellunt, inq; cellis uinarijs summa cura conseruant in Martium usq; mensem, quo tempore capitularum olus ad collum usque, hoc est, crassum illum ac callosum caulem, humo rursus inseritur. Hoc ubi æstatis uim & calorem senserit, nouos emit rit coliculos per capita superne erumpentes, uiridibus & angustis folijs uestitos, Aprilisq; mense cum & arbores florent, copioso, luteo, & violis similibus flore comantes. Porro flos in longas tandem abit filiquas, rotundo & fusco semine refertas. Sed ut naturæ miraculum, quod in hac quoque planta ostendit paucis aperiam, sciat optimus Lector, me post hyemem in abscissis callofis capitulatæ Brassicæ caulibus semen perfectum & maturum inuenisse, in medulla maxime quorundam, non omnium caulium, ac uehementer miratus sum quid in ea re natura portenderet.

NOMENCLATURÆ.

Auicenna lib. 2. cap. 172. *Serapio ca. 32.* *Cumanum sessile Plinius lib. 19. cap. 8.* *Caulium capitatum* (quem Germani *Bappes* uocant) ego satiuæ Brassicæ genus esse existimo. Quibusdam *Caulis imperialis* dicitur. Alij *Capitulum capitatum*, *Caulium capitatum*, & simpliciter *CAULEM* uocant. *Auicenna Cannabiri* (quam uocem ego ad *Betam* pertinere suspicor) *Serapio Cormub* uocat. *Petrus de Crescentijs*, *Sanbustum*, *Stephanus de Coruo*, *Carnebum* appellat. Hæc sane nomina quantumuis peregrina sint, & *Cauli* nostro attribuantur, nō tamen poterūt illum a *Brassica* seiu gere quin sit species eius. *Hippocrates de uictus ratione lib. ij.* scribit *Brassicam* calidi esse temperamenti, bilemq; seu choleram expellere, quæ omnia *Caulium* hunc nostrum posse manifestum est. Sed de *Brassica* eiusq; facultati bus paulo post. Vnum hoc loco adijciemus, uideri nimirum nobis *Plinium* huius nostri *Caulis* capitulati mentionē fecisse, cum de *Cumano sessili* scriberet in hunc modum, *Cumanum sessili folio, capite patulum, &c.*

VIRE S A C T E M P E R A M E N T V M.

Nemo non nouit Caulem capitulatum coctum maxime cum pingui-
bus
carnibus & suillis stomachum latrantem compescere, quanquam & in me-
dicina usum suum non contemnendum habeat.

I N T R I N S E C V S.

Brassica capitulata condita (utrimoris est Germanis) in cibo stomacho
æstuanti prodest, quare illa qui operas exercent uesci conuenit. Vtilis est
& spleniticis, cibi appetentiam inducit, sitim sedat.

E X T R I N S E C V S.

Folia huius inflammationibus & tumoribus utiliter imponuntur, non
aliter atque Betæ.

Ius conditæ Brassicæ sacris ignibus singulari experimento illitum me-
detur.

Quod ad reliqua attinet, uiribus Brassicæ satiuæ accedit Capitulata hæc,
quare ad satiuam Cramben transeamus?

De Crambe, seu Brassica satiuæ.

CAP. LIX.

NTEQVAV MEDICI A POPVLO ROMANO RECP

A perentur, Brassica sexcentis annis Romani ita usi sunt, ut nullus *Plinius lib. 20.*

in eo populo morbus oriretur, quem non hocolere curarent, *cap. 9. et lib.*

quemadmodum in scriptis Marci Catonis uidere est. Apud Græcos etiam *29. cap. 1.*

adeo frequentis fuit in cibo usus Brassica, maxime quæ *κράμβη* dicitur, ut
bis cocta fastidiri cœperit, & apud Apicios (quibus nihil nisi nouum pere-
grinum & sumptuosum arridet) in prouerbum abierit, *δὲ κράμβη λάρων*, quo
etiamnum hodie utimur quoties rem iterum atq; iterum repetitam non si-
ne molestia significare uolumus. Hac sane ratione, hoc est, Apiciorum inso-
lentia & luxuria multi nobis utilissimi cibi, & nobilissimæ medicinae perie-
runt. Qui sicut hodie remedia ea, cibosq; quos natura nobis in nostra ter-
ra dedit, fastidientes, rerumq; externarum cupidi, non solum medicinas, sed
et cibos nostros ex India alijsq; remotioribus locis petamus. Inuenias enim
uulgares etiam homines, qui si amicum unum & alterum conuiuio excipe-
re uelint, statim ad seplasia concurrant, ac inde nescio quæ exotica & pere-
grina.

Brassica.

Böl frant.



In horto suo habet, materiam medicinæ longe præstantissimam domi suæ inter olera habere se dubitare non debeat.

Cæterum (ut ad Brassicæ historiam accedamus) plantatur illa sicut &
Caulis

grina petant, cibis adiungenda. Et meo sane iudicio si qua alia poena in mores nostros corruptos & dissolutos, certe uel hac maxime animaduertit Deus, ut, cum nostra fastidiamus, & cibo & medicinæ nobis nata, externas insalubres, & maximo damno nobis futuras merces magno ære, maiori uero ualeudinis periculo redimamus. Hæc eo mihi differuntur, non quod externa rite, ut suo modo usurpata prorsus damnare uelim, sed ut nostros homines commonefaciam, quo presentibus fruantur, Deique beneficia quæ nostræ quoque Germaniæ contulit agnoscant, cumque gratiarum actione ad tuendam, conseruandamque bonam ualeudinem usurpent. Proinde cum ad multa alia tū uero ad Brassicam noster hic sermo pertinet, quam in usum reuocari cupimus, olus nimirum non tantum ueteribus, Plinio inquam & Marco Catoni, miris laudibus celebratum, sed etiam reuera saluberrimum, ut quisque paterfamilias, qui Brassicam

Brassica crispa, seu Apiana.

Krauß Köle.



Caulis capitulatus, sunt enim eiusdem generis hę plantę. Deinde non agimus hoc loco de marina illa Brassica, sed de sativa duntaxat, ac uulgo nota, cuius quatuor apud nos extant præcipua genera.

1. Primum Brassicę sativę *Brassica sativa* genus, caule proflit purpureo, procero (ut qui uiri proceritatem attingat, folio lato, cæsis, multoq; maiori Brassica capitulata, neq; in caput ut illa extuberante. Florem fert altero demum anno sicut & Caulis capitulatus. Planta hæc hyemis frigorebus rarissime læditur, gustu aliquantulū amara, ac salsa, maxime ubi adoleuerit hyememq; attigerit.

2. Alterum huic affine, for *Brassica sativa* ma foliorum candidorum *maioris species* ad caulem accedit capitulum, sed quę in caput minime extuberent. Hoc quoq; genus hyemem contemnit. Caulem fundit admodum procerum, ut qui unicus tot folia suppeditare queat quot ad ferculum requiruntur.

3. Tertia Brassicę sativę *Brassica crispa*, species, licet radice, caule, flore, semine & sapore superioribus generibus similis sit, ramen folia gerit plane illis dissimilia, hoc est, crispa, & per ambitū *frauser Köle* incisa, uelut crispa Lactuę. Quamquam in hoc genere quędam fre-

quentioribus, & profundioribus, aliæ rarioribus & magis exiguis incisuris dissectæ apparent, ita ut plura eius fastigia constituere liceat.

4.
Brassica capitata.

Quartum Brassicæ sativæ genus, id est, quod superiori proximo capite descripsimus. Quod uero ad Brassicas pertineat id genus, nemo inficiabitur qui formam eius ad Brassicas contulerit.

5.
Brassica sylvestris.

Sylvestris Brassica folijs uulgarī sativæ pene consimilibus uestitur, sed magis exiguis & asperioribus, gustuq; amarioribus. Huius non frequens in culinis nostris usus existit.

Hactenus ergo laudatissimi oleris summa genera perstrinximus, quæ omnia non tam cibo (ut supra meminimus) quam medicinae nata sunt. Quid uero adhuc podagrici illi, qui perpetuo clamant, nullum neruis, & articularum morbis adhiberi posse remedium? Quod si hi quidem noris, ac uulgaribus, sed & utilissimis, herbarum inquam remedijs uti uellent, proculdubio auxilium sentirent. Cûr non illi (paralyticos ac podagricos aliorum) & que prompta aure id excipiunt, quod de Brassicæ utilitate Erasistrati scola testatur, nimirum nihil illa utilius esse stomacho, neruisq; ideo paralyticis & tremulis dandam, quem admodum annotauit Plinius; atq; audiunt eos qui pillulas de Hermodactylis, & Aggregatiuas assumere consulant? Sed ut sæpe diximus eo dementiæ peruenimus, ut nihil nisi externum & pretiosum expetamus. Proinde qui Brassicas amant, nesciant, illas tanto in honore apud ueteres semper habitas fuisse, ut peculiare illis libros dicauerint, propterea quod nullus fere sit morbus ad quem curandum Brassica non unice faciat. Vide Marcum Catonem de re rustica, capitibus clvi. & clvij, necnon Plinium lib. ij. cap. ix.

NOMENCLATURAÆ.

Diosco. lib. 2.
cap. iii.

Brassica sativa quæ Germanis *Böl* / Dioscoridi *καρπὸς ἀγρῶν*, Hebræis *תרבות* Tarbethur (licet id nominis nonnulli alij ad Capitulatam Brassicam priuatim referant) dicitur. Iam ut secundum genera, nomenclaturæ quoque distribuuntur, sentimus nos maiorem satiuam Brassicam, quæ Germanis *Groß zam Böl* dicitur, Cramben esse Catonis. Crispam Plinius Appianam dixit, Capitulatam uero Cauloden & Sessilem appellauit. Quæ quinto loco à nobis descripta est, eam nos uulgarem, seu sylvestrem censemus.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Brassicæ sativæ omnes cibo & medicinae accommodatæ sunt, et utrinque assumi possunt, resiccante facultate pollentes.

INTRIN.

INTRINSECVS.

Inter omnes Brassicas, maior sativa, necnon crispa, præsertim in Vuethphalia, quæ regio magnam & nigram fert Brassicam magna in copia, plurimum commendantur, magnam etenim utilitatem adferunt, si à coquo probeparentur. Post has etæ mihi probantur Brassicæ quæ Verzi appellantur.

Brassica in cibo esitata, imbecillo stomacho convenit, concoctionem adiuuat, aluum durari non patitur, urinam promouet, bilem & phlegma, unde caligo oculorum oriri solet, sensim educit.

Qui a serpente ictus fuerit, Brassicam cum uino decoquat, & calidam bibat eam decoctionem, quod si fecerit, nullum periculum ueneni sustinebit. Idem iudicium esto de semine Brassicæ in uino decocto.

Ad purgandam bilem cyma Brassicæ in aqua donec feruescat decoquitur, postea tunditur, succusq; per pannum percolatur. Hæc potio mane calefacta mensura cyathi mediocris ieiuno stomacho sumitur, cum salis mica, & Romani cymini momento, sumpta portione tribus aut quatuor horis ieiunandum. Hæc purgatio auctore Catone cap. clvi. tantum bilis & pituitæ deijcit, ut quis miretur.

Dioscorides crudum succum cum nitro & Iri deuoratum, aluum emolliere tradit.

Brassica cum gallo gallinaceo uetere cocta, colicam & uentris tormina sedat, si iusculum sorbeatur, qua ratione & calculo renum, necnon hepaticis, & splenicis commodat.

Aduersus temulentiam bina aut terna Brassicæ folia, cruda cum sale & aceto ante & post cibum magno experimento eduntur. Nam qui hoc pacto quemadmodum nunc docuimus Brassicam sumperit, is tutus erit à uini noxa, hoc est, crapula & temulentia, licet largius aliquanto potauerit.

Qui morbo articulari & podagra uexantur, hi non tantum in cibo Brassicam usurpent, sed & illa aluum subducant, ea ratione, quam ex præscripto Catonis exposuimus. Quod si his Ruta & Coriani semen adijciatur, eo efficacius purgabit. Reliqua in Plinio & Catone.

Hippocrates Cramben bis coctam dysenteria laborantibus & coeliacis exhibere in cibo præcipit.

De Brassica Baptista Fiera sic cecinit.

Iam ueniat folio Chrysippi Brassica crispo,
Vel patulo & leni, uel glomerata comas.
Prima salutifera, & uentrem lenire parata,
Bulliet modico si tamen, igne placet.

Omnibus ardor inest, grauior tumet esca secundis,
 Ne capiti noceant uina superba premunt.
 Extumidam referant uesticam, ægrumq; lienem.
 Hepar & obstructum, scæmineumq; scæmur.
 Arida Socraticam pareret ni Brassica bilem,
 Iure erat in morbis omnibus illa satis.

EXTRINSECVS.

Folia Brassicæ inflammationes & dolores quosuis mitigant impositu, deinde & omnis generis depascentia, & serpentina ulcera scabiesq; sanant, præsertim addito melle.

Folia capiti imposita fluentes capillos retinent.

Vrina hominis qui per aliquot dies Brassica uictitauit, ad prædictos morbos utilissima est.

Eadem illita, fistulas, carcinomata, gangrænas, nomas & papulas, nec non cutis uitia sanat.

Cato pueros eo lotio sæpe abluere præcipit, sic enim illos a multis morbos præseruari posse tradit.

Caulis Brassicæ tum huius tum Capitulatæ in cinerem redactus, cum adipe suillo temperatus, omnia fluentia cutis uitia emendat.

Lixiuum ex hoc cinere paratum miro & certissimo experimento sacris ignibus & id genus malis illinitur.

De Rapunculo. Cap. LX.

^{2.}
 Rapunculum
 vulgare.

R APVNCVLVM NIHIL ALIVD EST QVAM RAPVM exiguum, nascitur passim ad sepes, & in quibusdam graminosis hortis, potestq; fieri ut olim apud diligentes & industrios hortulanos magno in pretio fuerit. Folia eius primo vere è terra prorumpunt folijs Primulæ veris per omnia similia, humi sparsa. Iunio mense appetente exiguæ hæ rapæ singulæ, singulos ex se emittunt coliculos, eosq; teretes, longos & lignosos, ac nonnullos bicubitales, exiguis ramulis brachiatos, folijsq; ab imis partibus usque ad summas exiguis & nigricantibus uestitos, flore emicantes ex purpura cœruleo, & quod ad formam attinet Cam panulam seu Cimbalum imitante. Flore pereunte capitula subsequuntur conclusa, uiridia, Nigellæ seminum conceptaculis similia, sed minora, quibus acuminibus seu aculeis horrida, in quibus semen minutissimum & copiosum continetur.

Rapunculum uulgare.

Gemein Rapunzel.



At *Rapunculum* masus ^{2.}
non ita cognitum est mul. *Rapunculum*
tis, alioquin sane propter *syluestre.*
magnam & gratam dulce-
dinem radicis nequaquam
tutum foret. Nascitur hoc
genus Maio mense in altissi-
mis syluis, caule cubitali,
flore in cacumine cœruleo
coactō *Stoechadis* aut *Tri-*
folij uulgaris instar, folio
per initia, humi sparso, vio-
læ *Martiae* folijs simili, sed
magis acuminato, nigri-
cante, radice candida, for-
ma & sapore uulgari *Ra-*
punculo respondente. Pati-
ci sunt quibus hæc herba
nota sit.

NOMENCLATURAE.

Rapunculum uulgare
Germani *Rapunzel*, *sylue-*
stre uero waldt *Rapunzel*
nuncupant. Quod in *Dio-*
scoride nomen habeat hæc
planta, apud multos dubi-
tatur, & controuertitur.
Ego citra præiudicium ali-
orum sententiam meam ex-
ponam. *Rapunculum* igitur
Sisaron in *Dioscoride* ^{*siccepop*}
appello, quod ueteres an- ^{*Diosco. lib. 2.*}
tequam carniū usus inua- ^{*cap. 5.*}

luisse, inter oleracea retulerunt. Huius meminit *Columella* lib. xi. cap. iij.
cum de ijs scribit quæ duobus temporibus feri possunt, id est, Autumno &
vere. Sed ascribamus uerba auctoris. Et primum de his generibus lo-

Rapunculum sylvestre.
Waldt Rapungel.



Manardus lib.
epist. 9. epist. 3.
Plinius lib. 19.
cap. 5.

quendum est, quæ pos-
sunt duobus feri tempo-
ribus, id est, Autumno,
& Vere. Sunt autem se-
mina Brassicæ, & Lactu-
cæ, Cinaræ, Erucae, Na-
sturtij, Coriandri, Chæ-
rephylli, Anethi, Pasti-
nacæ, Sisericis, Papaue-
ris: hæcenim uel circa
calendas Septembres,
uel melius ante calēdas
Martias Februario se-
runtur. Hæcille.

Iam de Sisere non una
apud autores rei herbariæ
est sententia. Sunt enim qui
per Sisere luteam illam Pas-
tinacam satiuam, de qua
nos lib. 1. cap. cxlvij. intelli-
gant, autoritate nimirum
Manardi Ferrariensis et Pli-
nij ducti, quæ sententia mi-
hi non improbat. Ac cre-
do quidem Plinium Pasti-
nacæ iam dictæ mentio-
nem fecisse cum scribit, Si-
ser Tiberium omnibus an-
nis à Germania flagitasse.
Quanquam uerisimile mi-
hi sit de Pastinaca minore,
cuius historiam in hoc li-
bro cap. cccxvi. prosequen-
tur, locutum fuisse. Qui-

dam Ericam Sisaram cognominant, testis est Plinius lib. xi. cap. xvi. Ex his
uidemus Sisari appellationē tribus plantis attribui. Nos simpliciter quæ
alias

alias Latini Rapuncula uocant, ad Sifaron Dioscoridis referenda censemus. Iacobus Manlius super Tiri. Auicenna de Rapunculo scribit, asserens illum minimum Naporum genus esse, cuius sententiam nequaquam improbandam puto.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTUM.

Rapunculi herba & radix verno tempore cibo gratissima sunt & utilissima, si prius aqua quis bullierit.

Sifer cibo manducatum cum sale & aceto, cibi appetentiam parit, stomacho prodest, urinam ciet, ociosis sane gratissimum olus.

De Rapo. Cap. LXI

RAPUM, RAPHANUS ET SINAPI, PRIMA ERUPTIO.

Rapum uel discerni possunt, adeo consimilia proferunt folia, quæ si auctiora & numero plura euaserint, tum demum ad quod genus singula pertineant cognosci poterit. Sinapis enim folia asperrima & dissecta sunt, & maxime nigricant. Raphani uero itidem aspera, sed cinerea, ac perpetuo humis parsa. Sed Rapum (de quo hoc capite peculiariter agimus) folijs gaudet teneris, & uiridibus, ac in altum sese attollentibus, nihil illo in Germania uulgarius. Hoc in tria particimur fastigia, in uulgare scilicet in Napos & syluestre Rapum.

Vulgare Rapum plerumque instar globi rotundum fit, ac pro maiori parte supra terram nudum, atque aliud quidem uiridi colore, aliud candido, aliud puniceo præditum apparet. Sunt tamen in hoc genere, quæ in oblongam figuram extenduntur, quæ nos ad masculinum genus referimus, nam rotunda ad foemininum pertinere arbitramur. Bina isthæc uulgaris Rapi genera, ex uno & eodem semine gignuntur, sed in serendi modo differentia constituitur. Nam densiore satum mascullescunt, hoc est in oblongam excrescunt figuram, rariore uero in amplitudinem magnam ac rotunditatem glomerantur, præsertim in terra humecta, agrisque in umbrosis & nebulosis uallibus sitis. Plinius lib. xiiij. cap. xviij. Rapum uidisse testatur xl. libras excedentia, id quod facile credi potest, cum & nos tanti ponderis Rapas uiderimus.

Alterum satui Rapi genus, planius uulgari diuersum est, quanquam cum eodem quod ad folia attinet satis conueniat. Radices habet prælongas, nam tres fere palmos in terram descendunt, crassitudine Staphylino luteo pares, cibo propter insignem qua præditæ sunt dulcedinem gratissimæ, ac præstantissimæ. Semen altero demum anno colligitur, nam primum

Rapum.
Büben.

Rapum sylvestre.



seritur, deinde ex una in aliam terram transfertur, atque tum semen profert, non aliter atque Brassica capitulata, cui caules huius generis, flores, siliquæ, & semina adamussim respondent.

Tertium Rapum vulgare sativi sylvestris est species, quæ cibo non usurpatur. Seritur illa quibusdam in locis, maxime apud Medio matrices (his enim nuges e quibus nostris regionibus oleum conficitur, non in magna copia nascuntur) seminis e quo oleum isti conficiunt, gratia. Quod ad formam attinet, æquat hoc Rapi genus sylvestriû pyrorum magnitudinem, gustu amarum. Hortulani nostri in Autumno serunt, Aprili deinde mense veluti & sativum Raporum genus caules illius longi profiliunt, flore comantes violis simili, luteo, copioso Sinapis instar. Folia eius antequam excaulescit satis mollia sunt; imo molliora sativo genere, & uiridiora, qui fit ut Martio mense inter cætera olera decoquantur. Semen habet nigro Sinapi persimile.

NOMENCLATURÆ.

Plinius lib. xvij. cap. xij. plurimum commendat Rapa, & iure quidem. Non

Vulgare Rapum alterum.

Ander gemcin Rüben.



Non solum enim illa omnis generis hominibus, cibo & alimento, sed & quadrupedibus & cunctis animalibus pabulo nascuntur. Quid, quod & anseres anatesque fronde eorum gaudent. Breuiter uarię sunt & multę Raporum commo-
ditates, quas, quia uulgo notę sunt multis uerbis enumerare hoc loco nihil attinet. Ager Argentoratensis Raporum feracissimus est, qua dote passim cognitus & laudatus est, nam circa festum Diui Urbani maturat Rapas, cum alibi locorum post festum S. Ioannis primum serantur, tum enim nisi humoris destituantur, sine negotio etiam quamprimum crescunt. Terra hæc est pauperum messis, cum namque per inopiam laetioribus uictitare non possint, Rapis & Brassicis præsertim capitulatis cõtenti sint necesse est. Rapum satiuum uulgare Hebræis רפא Læphæ (teste Nomenclatura Elię Leuitę) dicitur, Dioscoridi ραπυνη ή ραπυνη ήραρος, cap. 102. Latini Rapum satiuum, seu rotundum. Germani Ander gemcin Rüben uocant.

Diosco. lib. cap. 102.

Syluestre eius genus, quod tertio a nobis loco est positum, wild Rüben / & feldt Rüben / hoc est, Rapum syluestre, seu agreste dicitur. Nam syluestre & fruticosum Rapi genus, quod a Dioscoride describitur, nobis haudcognitum est.

*Napus.**Steck Rüben/Baumholder Rüben.*

Duo posteriora
nomina à locis
in quibus optimi
proueniunt Napa-
pi, huic plantæ
attributa sunt.



Rapum satium alterum,
oblongum scilicet, Germa-
ni Steckrüben/Strickelrü-
ben/Brotfeldischrüben/&
Baumholderrüben uocāt.
Hic nimirum uerus est uete-
rum. Napus ~~serius~~ Græcis
dictus uide Diosco. lib.ij.
cap. ciij. Serapioni capite
cxci. Selen Napus dicitur.

Qui de Rapis plura scire
laborat, is legat Columel-
lam lib. xij. cap. liij. & Plini-
um cum alibi, tum uero
p̄cipue lib. xviij. cap. xij.
& lib. xix. cap. vi. & lib. xx.
capite tertio.

**VIRES AC TEMPE-
rumentum.**

Omnia Raporum gene-
ra satia, apud nos cibi gra-
tia seruntur, licet in medici-
na quoque usum suum ha-
beant. Sunt enim tempera-
mento calido & humido
prædita.

INTRINSECVS.

—Rapa ut diximus ali-
mentum præbent laboran-
tibus & pauperibus, quo
nomine magna in copia
ubiq; plantantur.

Decocta per se Rapi radix satiat, inflationem parit, flatuq; humẽtem
affluxam carnem creat, modicumq; alit. Quamobrem ut id uitij emende-
tur, solent nonnulli eam cum lacte decoquere, ut palato magis arrideant, &
effica-

efficacius nutriant. Nec defunt qui Rapa condiant, sicut & Brassicæ capitulas.

Semen Rapi genituram auget, ideoque castis illis cœnobitis minus commodum est.

Rapa continuo in cibo usurpata teste Simeone Sethi venerem stimulant, instant, & crassum generant humorem.

Semen in medicina efficacius est, maxime Naporum, nam tustum ac potum omni ueneno resistit, quare non immerito Theriacæ compositionem intrat.

EXTRINSECVS.

Rapa decocta, ac calidæ podagræ imposita, dolorem sedant.

Aqua e putrefactis Rapis distillata, ac frequenter calida imposita, frigus pellit e pedibus.

Baptista Fiera de Rapis, & Napis ita cecinit.

Sunt calida, & rigido gaudentia frigore Rapa,

Humidus hinc illis turgidulusq; liquor.

Gloria Nursinis, sitientes cedite Napi

Educet ipse licet nos Amiternus ager.

Cum sapiant Veneri magis hæc si crassa & obesa

Cœna ea postremo lenta sub orbe ferat.


De Raphano. Cap. LXII.

QVO PACTO RAPHANVS NASCATUR, ET CVIVS modi folia gerat, præcedenti diximus capite. Nunc reliquam eius historiam persequemur. Raphanus humecta gaudet terra, quemadmodum & Rapum. Eius tria a Græcis traduntur genera folijs solum differentia. Theophrastus quatuor commemorat, in plantarum historia. In Germania nostra tria Raphani nascuntur genera, rotundum nimirum & vulgare, quod Argentoratensi & Spirensi agris familiare cernitur. Est & prælongum quoddam Raphani genus figura Napis simile, gustu dulcius & mitius vulgari Raphano. Hoc in Lotharingia, & in agro Metensi ubertim provenit. De tertio genere sequenti agemus capite. Sed bina hoc capite descripta Raphani genera, folijs, caulibus, flore, siliquis, & semine inuicem consimilia sunt. Vterque Raphanus surculosos appetente Maiomense caules profert, flore comantes candido, qui in siliquas concauas, rotundas, ac in oblongum mucronatas, semine ex luteo colore fusco reſertas

abire

^{1.} Raphanus vulgaris.

^{2.} Raphanus longus.

*Raphanus.**Rhettich.*

abire consuevit. Semen Raphani satum intra quaternos aut quinos dies erūpit. Ac licet Raphanus terrā non morose eligat, tamen in uniuerso Rhēni tractu, nullum reperias agrum, in quo foelicus Rapum et Raphanus proueniant Argentonensi. Nam & tempestiue tantaq; copia in eo loco profilit, ut plerisque alijs regionibus cōmunicari quoque possint. Raphanus a plerisque concoctionē adiuuare affirmatur, quibus reclamatione ipse Galenus lib. de alimentis ij. qui maiore, præsertim in hñcerebus si dem meretur.

NOMENCLATVRÆ.

Scripsit Mörchio Græcus unum de Raphano uolumen, uniuersam eius laudem cōplexus. Cum namque magnarum sit uirium, merito ab eo autore commendatur. Vulgare & rotundum Raphani genus nobis id uidetur esse quod Theophrastus Corinthiū Plinius libro xix. capite v. Syriacum uocauit. Quamquam & Boerotius Rapha-

De Raphano syl.

uestri, hoc est,

Apio supra cap.

19.

nus rotundus est teste Theophrasto, gustuq; dulcior. Ac Raphanus prælongus quem Metensis (ut diximus) ager fundit, Theophrasti nostra sententia radix est Cleonea, Plinio Algidēsis appellata. De Thracio siue Liothialasio

Raphano.

Raphano statim sequenti capite agemus. Mirum autem mihi uidetur quid sibi Plinij & Theophrasti in Raphanorum historia, uelit discordia. Nam quæ de Raphano Theophrastus scripsit, ea Napis suis attribuit Plinius.

Præter ea quæ de nomenclaturis Raphani nunc diximus, hoc quoque obseruandum est, nimirum quod Raphani uox apud ueteres Brassicæ attributa fuit (teste Theophrasto libro secundo de plantarum historia, & interprete Nicandri super Alexiphar.) quodque uulgo hodie Raphanum uocant, ueteres Radicem nominabant, omnia Raphani genera sub ea uoce complexi. Neoterici uero Raphanum, de quo sequenti capite, radicis nomine insigniunt, quod ipsum multis alijs plantis coniungitur, de qua re uide Leoniceum Radix Pontica, & Hermolaum Barbarum. Serapioni Raphantis, Fugel dicitur ca. ccxcvij. radix dulcis, ram Auerrhoi Alphagel. Hebreis זנן Zenon, Rabinis et Thalmudistis רודיא dix Rhodia &c. Fugla, & conuersis literis רודיא Pilga nominatur, teste Aruch Monstertii.

V I R E S A C T E M P E R A M E N T V M.

Omnia Raphani genera excalfaciunt, & expellendi uim obtinent, tam cibis quam medicinæ nata.

I N T R I N S E C V S.

Raphanus flatus gignit. Quidam illo ante cibum, alij post cibum uesuntur. Quodcumque uero comedatur, certe ructus ciet, cerebrum, rationem, & oculos turbat.

His qui operas exercent minus nocet. Præterea urinam ciet Raphanus, aluumque emollit, sed concoctum difficilis est, hydropicis, & Iplenicis, nec non mensibus impeditis exhiberi potest.

Raphanus aqua decoctus addito melle contra ueterem tussim, & pituitæ in pectore crassitiem aliquot diebus potus efficax est, uitiaque pectoris excreabilia facit.

Cortex Raphani tusus, cumque aceto & melle sumptus uomitiones mouet. Idem semen in calida aqua potum efficit.


Semen maxima uim expellendi pollet, contra strangulationes fungorum utilissimum.

E X T R I N S E C V S.

Raphanus cum melle tusus ac illitus, sugillata rapit, maculas & lentiginis faciei emendat, alopecias ad pilum reducit, ictibus araneorum, scorpionum, & serpentium medetur.

Raphanus umbilico impositus mulieribus tormina uentris sedat, autor est Hippocrates.

De Raphano maiore. Cap. LXIII.

*Raphanus maior seu Armoracia radix.**Meerrettich.*

RAPHANVS MAIOR
 (ut uulgo uocant) radicem
 habet fertilissimam, & quæ
 facile humo hæreat, ac bre-
 ui tempore maxime auge-
 scat. Flore decidente nullū
 uel semen, uel fructum pro-
 fert, quod idem Petasites fa-
 cit. In fine Februarij folia
 profiliunt exigua, crispa,
 ac instar exiguorum Filicis
 foliorum dissecta, quæ ta-
 men progressu temporis,
 longa lataq; euadunt, pere-
 untibus, ac euanescentibus
 incisoris illis quibus primo
 exortu diffecabantur. E me-
 dio foliorum, deinde cau-
 les exeunt crassi & rotundi
 dum aut trium quandoq;
 cubitorum altitudinem æ-
 quantes: in quorū fastigijs
 flosculi emicant copiosi ac
 frequentes, candidi, qui an-
 tequam aperiuntur Milij
 formam repræsentant. A
 flore admodum exiguæ le-
 quuntur siliquæ, non mul-
 to maiores Bursa pastoria
 minore, in quibus tamen
 nullum unquam me semē
 reperisse memini. Folia
 cum iustam suam amplitu-
 dinem adsequuntur, Lapa-
 tium

rum uulgare (Germanis *Merwelmurtz*) referunt. At radix multifida intra humum hinc inde sese undequaque spargit. Estq; facilis huius Raphani plantatio, nam ubi superiores radicis partes folijs pinnatis proximas rescaueris, terræq; inserueris, longe lateq; sese diffundunt, progressuq; temporis mirum in modum augmentantur. At secus alterum Raphani genus nempe id quod superiori proximo capite descripsimus sese habet, nam posteaquam euulsum semel fuerit, nihil ex se deinceps gignit nisi semen, quod in caulibus altero demum anno terræ rursus inserti profert. Raphanus maior, hoc ipso, cuius nunc meminimus, sapore & odore acrior & fortior est, ita quidem ut gustatus & odoratus lachrymas eliciat. Gaudet rigua maxime terra, quare non raro sponte sua in pratis quibusdam humidioribus prouenire solet.

NOMENCLATVRÆ.

Cum Raphanus iste forma, odore & sapore a satiuo uulgari quamplurimum distet, uoluimus eius historiam seorsim prosequi. Hunc nos Armoraciam radicem Plinij esse statuimus, propterea quod omnia quæ de Armoracia prædicat Plinius, huic nostro Raphano maiori plane conueniant. Ac nisi me omnia fallant hæc est Thracia radix & *Liothallium* Theophrasti, quod ad Napos reuoluit Plinius, ut supra diximus. Serapioni *Armorachion* dicitur. Germani *Merwelmurtz* uocant.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Raphanus maior calidus est in ordine tertio, quemadmodum *Ægiheta* & *Orobasis* testati sunt. Radix præcipue feruens est, & in omnibus efficacior tam culinæ quam officinæ usitata.

INTRINESCVS.

Radix Raphani maioris minutim concisa, tusa, & cum sale ac aceto condita, ad embammata quæ carnibus ac piscibus adiunguntur, maxime idonea est, quod norunt omnes Apicij.

Sunt qui ex hac radice tusa Eclegma conficiant, quod exhibent calculosis ad prouocandam urinam, nec non mulieribus quibus menses suppressi sunt.

Confectio sic se habet. Sumunt radicem tusam, acetum & mel, hæc omnia simul decoquunt, donec crassescant, & fuscum exprimant colorem, tum ad usum quos diximus adhibent.

Succus.

Succus radicis Armoracæ per aliquot dies sumptus, pulmonis vitij medetur, & aduersus phthisin uel maxime facit.

De Raphano & Armoracia, sic cecinit
Fiera in cœna sua.

Hinc eat, aut Raphanus postremo accumbat in orbe
Mensa magis sapida si sit onusta dape.
In caput & dentes, limosq; igne in ocellos
Seiuit, & hinc stomachus nauseat assidue.
Morchio eum colat, & fungi cui cura Nicander
Queq; amat æternas semina pulchra comat.

De Cæpæ. Cap. LXIII.

Æ GYPTII MAGNUM PIACVLVM ESSE DVCVNT,
siquis Cæpæ aut Allio uescatur, propterea quod hæc illorum
sint numina, quæ de re extant in xv. apud Iuuenalem Satyra ele-
gantissimi uersiculi, quos annotabimus.

Oppida tota canem uenerantur, nemo Dianam.
Porrum & Cæpe nefas uiolare ac frangere morsu.
O sanctas gentes quibus hæc nascuntur in hortis
Numina:

Causam huius superstitionis ex sequentibus uerbis Ruellij, quæ adscri-
bemus, facile quiuis intelliget. Sic ergo Ruellius in historia Cæpæ, quæ ex-
tat in illius de natura stirpium commentariorum lib. ij. cap. lxxxij.

Id mirandum occurrit, quod apud Plutarchum quarto in Hesiodum commentario legitur. Cæpe enim reuirescit & congerminat, decedente luna: contra autem marcescit adolescente. Eam causam dicunt sacerdotes Aegyptij, cur Pelusiorum Cæpe non edant, quia solum olerum omnium contra syderis incrementa, damnaq; uices minuendi & augendi habeat contrarias. Siquidem omnia quæ crescente luna gliscunt, eadem senescente tabescunt: quod in ostreis aperte cognoscitur, quas syderis iuuenta complet, & uberiores facit, senium deplet, macrasq; reddit, echinos alit, eadem muribus fibras adijcit. Aelurorum oculi has syderis uires sentiunt, qui aut ampliores aut minores fiant. Cum ergo fruges, herbar, arbores ipsæ lunæ damnis sint obnoxia, solum Cæpe uicissitudines non uit aduersas.

Hæc ille.

Germani

Cepa.

Zwybelen.

Bulbus agrestis.

Feld Zwybelen.



Germani his acerbis Ægyptiorum dijs carere non possunt, utuntur enim ijs in omni pene cibo, nec crudis etiamnum parcunt. Multi in ea sunt opinione, ut credant, si mane ieiuno stomacho Cēpe aut Allium deuorare

uerine, se eo die a pestifera lue & aëris corrupti intemperie undictos ac rutos fore, subscriberentes breuissimo Hieronymi Braunschuuicig versiculo, quo dixit, *Allium & Cēpa, sunt rusticorum Theriaca.*

Hic nempe is est cultus, quem Germani Ægyptiacis dijs exhibent, nimirum ut ijs in cibo usurpatis a peste & ueneno conferuentur. Sed ad historiam Cēpæ accedamus.

Cēpa optima in nostra Germania ea censetur, quæ rotunda & ruffa existit. Ea per hyemem in loco fumo peruito conseruatur, posteaq; verno tempore circa Festum Petri, ut uocant Cathedrati, in terram temperatam ac mediocrem panguntur, e qua intra paucos dies folia erumpunt porracea, ac concava. Postea caulis subsequitur, iidem concavi, fistulaceus tubæ non dissimilis, in medio foliorum enatus, in cuius fastigio caput protuberat, multis torulis seu globulis refertum, ijsq; tenuissima membrana inuolutis, que firumpitur, flos prodit stellatus, expallido & candido mixtus, frequens & copiosus, Satyrj non absimilis. Hicubi defloruit in globulos rursus transformatur, binis aut ternis nigris & angulosis seminibus refertos. Semen Cēpæ Martio dimidia parte exacto in terra mediocriter pingui seritur, quod ideo fieri solet, ne eruptiones eius tenebrimæ forti & lenta terra confringantur. Nam Cēpe duplici eruptione e terra prodit, ualuulis seu folliculis semini in superiori parte eius suspensis. Quod si in prima qua diximus eruptione nihil patitur Cēpe, deinceps citra periculum facile adolefcere potest. Cēparum alia grandis, alia exigua, alia rufa, quædam candida, alia rotunda, quædam oblonga, omnes uero ut plurimum duplici aut triplici prætenui & rufa membrana uestitæ. Radices earum nihil aliud sunt, quam exiguæ quædam & candidæ fibræ. Cēpæ maturæ circa Festum plerumq; D. Bartholomei euelluntur, purgantur, ac partim adulum quotidianum, partim uero ut deinceps pangi possint, conseruantur. Sunt nonnulli prudentiores hortulani, qui Cēpam serunt ante Autumnum, quo verno tempore terram illam & recentem usurpare possint. Extat porro in officinis magnum quoddam Cēpe genus, quod quia nostris hortis non familiare, sed peregrinum est, de illo alias dicemus.

NOMENCLATURAÆ.

Diosco. lib. 2.
cap. 140.

Cēpam quibusdam Polyidos, magis Calabro tim dici testatur

Diosco.

Cēpa uel Cēpe Latinis, Græcis *αψευρα*, Hebræis *בזל* Bazel, Num. xi. *זיבל* bel/aut *זיבל* Germanis dicitur. Theophrastus li. vii. ca. iij. uaria Cēpæ genera commemorat, eaq; a locis nomina sortita esse, ita ut alia Cēpa garadia, alia Cnidia, alia Samothracia, alia Setanica, alia Fissilis, & Ascalonia nominetur. Iam ut & nos nostra Cēparum genera discernamus, uidentur mihi Ascaloniæ esse, quæ apud nos grandi caule proliunt, & semen fe-

runz.

sunt, Germanis Großsam Zwýbel hoc genus appellatur. At Fissiles, quæ & Steriles Theophrasto nuncupantur, nobis eæ sunt exiguæ, quæ semine carent, & primo vere inter primos & vernos fructus proueniunt. Germani fleine seßling uocant. Setanicam eamq; dulcem Cepam nunquam uidi, forte in Creta illa nascitur, sicut candida apud Isum. Quanquam in nostris quoque regionibus Cepam reperiās candidis obductam membranis. Postremam eamq; longam Cepam Gethyum Theophrasto uocatam, nostri Nari/ hoc est stultam uocant, eo quod in folia potius quam radicem augmentum omne mittat.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

In culinīs Germanicis nihil usitatius Cepa. Nemo præterea illa carere uult. Nonnulli enim ad cibos, alij ad delicias, quidam ad Medicos usus adhibent Cepam. Est autem Cepa salutaris simul & noxia, sed diuerso respectu. Ad multas tam internas quam externas affectiones usurpari consuevit. Natura calidæ sunt Cepæ & flatuosæ, teste Galeno.

INTRINSECVS.

Qui operas exercent, mane Cepam crudam cum sale & pane Theriacæ loco esitare solent aduersus aërem infectum, persuadentes sibi, eo die tutos a pestifera lue fore, qui hoc remedio usi fuerint, nec illos spes fallit, siquidē experientia constat aduersus intemperiem aëris ut nihil uulgatius, ita neq; efficacius quicquam hac Theriaca reperiri. At qui laboribus ac eiusmodi cibo minus assueti fuerint, nihil illo iuuantur, sed leduntur potius, ut qui insaniam, dolores capitis, caliginem oculorum, mentis alienationem, ac turbationem, necnon Lethargicum morbum gignat. At quod ad hæc quidē attinet, Medicum sui ipsius unumquemq; esse conuenit, ac obseruare iuuatur nean offendatur usu Ceparum, ac tum demum ab illis abstinere, aut usurpare eas.

Cepæ continuo usurpatæ in cibo aluum emolliunt, urinam cient, peluntq;

Aniculæ nostræ crudam Cepam conscindunt, ac in aquam fontanam iniiciunt, perq; noctem in ea macerant, postea eam aquam pueris & infantibus potandam exhibent, ad eijciendos uentris lumbricos, sane haud infœlici successu.

Continuo Cepæ usu genitale semen augetur. Ad eam uero rem uel maxime semen facit.

E X T R I N S E C V S.

Succus Cepæ expressus, cum melle oculorum hebetudinibus, instillatur medetur.

Idem auribus inditus, sonitus earum tollit, & dolorem sedat. Naribus exceptus cerebrum purgat. Illitus alopecias replet.

Succus Cæpe cum aceto temperatus, ac calidus illitus, faciei maculas, maxime quæ oculis subsunt exterit.

Canis moribus, succus Cepæ, cum Ruta, aceto & melle efficacissime ilinitur, uel emplastri instar imponitur.

Cepa cum Ficu tusa & illita emollit apostemata & ulcera, eaq; rumpit, maxime ea quæ in sede oriuntur.

Hæmorrhoidas purgat Cepa balani instar subdita, & menses elicit.

Cepa magna excauata, Theriaca deinde repleta & testa, ac postea in calidissimo cinere assata, demum detractis exterioribus tunicis tusa, ac cataplasmatitis ritu imposita, pestes ac uenenosa ulcera, reliquasq; collectiones malignas & duritias efficacissime emollit, ac aperit.

De Bulbo, seu Cepa agresti, cuius effigiem cum:

vulgari Cepa coniunctam superiori

proximo capite proposuimus.

CAP. LXV.

ETERES REI HERBARIÆ SCRIPTORES QVAM

V plurima Ceparum genera commemorant, quæ omnia Bulbos generali uoce appellant. Cum uero non tantum apud nos plerique Bulbi ueterum in usu non sint, sed nec etiam cogniti, difficile sane est historiam illorum conscribere. Conabimur tamen pro uiribus aliquid hac in parte præstare. Ac nascitur quidem syluestre quoddam Cepæ genus in arenosis campis, Auellanam nucem magnitudine nequaquam excedens. Hoc appetente Martio mense folia fundit. Porro fere similia, sed multo minora, ita ut ad Crocum satiuum magis accedant. Cæterum singuli Bulbi bina proferunt folia, & raro plura, eaq; angusta, dodrantem longa, & quorū medio coliculus prosilit breuissimus, atq; rotundus, sex aut octo stellatis & luteis flosculis in fastigio emicans, hsq; coniunctim positus, stellæq; instar in flexis ac recuruis, in rotunda tandem abeuntibus capitula, ueluti Nigella. Odor & sapor huic plantæ idem, qui & Cæpe uulgari, sed multo remissior. Maio mense euanescit, nec unquam ab eo postea tempore apparet.

NOMEN.

NOMENCLATURAÆ.

Pauci inter Germanos sunt, quibus hoc Cephæ stellatæ genus cognitum sit. Nonnulli tamen qui plantam hanc norunt Germanica lingua *Zwiber* / *feldzwiber*, & *Wilder zwiber* / hoc est, Cepam sylvestrem uocant. Quia uero de Cephæ sylvestri nihil apud ueteres herbarios legimus, uocabimus interea *Bulbū agrestem*, dum commodiorem addiscamus appellationē. Quid enim *Bulbus* aliud est quam multiplex quædam compacta & ceparia radix? Sunt enim *Bulbi* Plinio teste radices rotundæ, & tunicatæ, quales sunt *Hyacinthi*, *Asphodeli*, *Colchici*, *Lilij*, *Ceparum* & *Allij* & c. Breuiter quæcunque radix quorundam nouos oculos, alias uero nouas adnatas radices ex se mittit *Bulbosa* dici potest.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTVM.

Sylvestris hæc Cephæ apud nos in cibo non usurpatur. At in medicina non contemnendi est usus. Si quidem in calido cinere torrefacta, ac cum melle tusa, inq; linteo imposta, ulcera depascentia, & manantia sanandi, duosq; tumores emolliendi uim habet.

De Cephæ sterili.

Cap. LXVI.


CEPHÆ STERILIS QVAM MODO PRÆ MANIBVS habemus, nihil aliud est quam exiguum quoddam Cephæ genus, Argentoratensibus hodie admodum familiare. Eo enim cum huiusmodi alij ad intinctus duntaxat cum aceto adhibent. Ac licet hæc quoque Cephæ acris sit, lachrymasq; eliciat, mitior tamen multo existit uulgari Cephæ. Ceterum uerno tempore & maxime quadragesimali singuli *Bulbi* separatim panguntur, qui deinde folia emittunt fistulosa, sed prætenuia, ac iuncea quasi. Fructum nullum fert hoc Cephæ genus, sicut neq; flore aliquo comat, nec semine prægnat. Nam sola radice quam subinde multiplicem profert, ita quidem ut ex una decem alie nonnunquam procreentur, quæ & ipsæ postea pangi possint, propagatur. Mirumq; sane mihi uidetur, quo pacto primum quidem ortum fuerit hoc Cephæ genus, cum ut diximus nullum producat semen.

NOMENCLATURAÆ.

Hæc Cephæ in *Assatia*, *Euchel* & *Escheuchel* appellatur, estq; ea quæ *Apicio* *Cepulla* uocata fuit, *Theophrasto* uero *Sterilis*, uel *Fissilis*. De reli-

Cepa sterilis.
Eschleuchel.

Porrum sectinum.
Schnidlauch.



quis *Cepæ* generibus, ut est *Pompeia*, *Marfica*, simplex seu unio *Hermolaus Barbarus* cap. cccxxxiiiij. copiose descripsit, nos de nostratibus nunc plantis agimus, maxime de ijs quæ generali nomine *Bulbi* appellari possunt, inter quas & hoc capite descripta connumeranda uenit. Quæcunque enim leues & molles sunt radices, *Bulbi* recte uocantur, teste *Cornelio Celso*. li. ij. cap. xxij. De *Bulbis* eorumque generibus et differentijs diligenter in *Onomastico* suo uir doctissimus piæ memoriæ *D. Otto Brunfelsius* annotauit, nec non *Dioscorides* lib. ij. cap. clx. & clxi. & *Platina* lib. iij. ac *Cato* etiam & *Columella*.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Quæ de satua *Cepa* diximus, de hac sterili quoque intelligenda sunt, ut quæcum illa uiribus conueniat, licet illa sapore & odore sit remissior & infirmior, quo nomine capiti non perinde nocet. Potest uero hæc

Cepa sterili usurpari, ubi satua desideratur & contra.

De

De Porro sectiuo, cuius effigiem dedimus capite superiori proximo. CAP. LXVII.

PORRUM SECTIVUM QVOD GERMANI *Byslaud* seu *Schridlauch* uocant, minimum est *Cepæ* genus. Quod uero illi in magnitudine deest, hoc numero refarcit. Siquidem una planta ducentis nonnunquam compactis cepulis constat, ita tamen ut a se mutuo diuelli possint, & singulæ pangi, aut certe plures coniuuctim plantari possunt, & foeliciori quidem successu, plures namq; coniunctæ, terræq; insertæ, hyemis frigora facile ferunt. Eæ appetente *Februario* rotunda, fistulosa, exigua, & uiridia proferunt foliola, minimis luncis similia, eademq; copiosa & frequentia, quæ *Mai*o mense aduentante, capitulatis, & purpureis floribus instar *Cepæ satiuæ* in cacumine emicant. In nostris regionibus folijs huius Porri verno tempore, dum aliæ culinariæ herbæ adolefcant, ad placentas quas *Pfannfüßen* uocant condiendas utuntur. Porrum sectiuum gustu *Cepam* refert, sed remissiore sapore præditum

NOMENCLATURAE.

Veteres in plantando & secando Porrum peculiare suas rationes secuti sunt, quæ quia nostro tempore, non solum non in usu sunt, sed nec etiam cognitæ, missas illas facimus. Nostri enim homines Porro sectiuo, quod apud nos non magna aut peculiari cura indiget ad placentas, quas *Pfannfüßen* uocant, duntaxat usurpant, de Porro præterea nihil expertum habentes. Sunt qui hanc plantam uerum Porrum sectile esse existimant, quorum iudicio nos subscribimus. *Serapio* Porrum Curat uocat, eiusq; diuersa proponit genera, nimirum domesticum, Hispanum, Nabati, Montanum & Porrum uinæ. Hebræi quidam Porrum *כרש* *Keresch* appellare uidentur. *Serap. cap. 351.*

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Omnia Porri genera *Cepis* quam *Allio* magis affinia sunt, tam quoad saporem quam odorem, Olim maioris erant in medicina usus quam hodie.

INTRINSECVS.

Porrum sectile ad intinctus, qui cibis adiunguntur, admodum utile est, si cum aceto folia eius tusa temperentur. Assiduus eius & nimius usus capi-

tis dolores excitat, stomacho, renibus, & uesticæ non satis conueniunt.

Porrum sectile aluum emollit, exulcerationibus pulmonis cum melle prodest, uicia thoracis educit, semenq; genitale calefacit, & auget.

Hinc Baptista Fiera ita cecinit.

*Tabida cui curæ pulmonis membra & anhelum
Pectus, cum Porri torrida cœna uocat.*

*Curamibi est stomachus, placidissima somnia, dentes,
Bis licet elixum non tamen illud edam.*

Hoc edat nigrata cui foemina cura colenda

Quiq; nec astrictis renibus esse uelit.

Munera non tanti Veneris pensantur ut aluo

Postposita irati tormina uentris amem.

EXTRINSECVS.

Porrum sectile ad omnis generis ulcera & apostemata adhiberi potest sicut Cæpa.

De Allio. Cap. LXVIII.

I EX SEMINE ALLIUM PLANTARE NECESSE EST.

Sed, non solum tardius, sed etiam admodum exiguum prouenit, ita quidem ut Theophrasto teste tertio demum anno perfectum

redderetur, quod ipse ita se habere deprehendi, maxime quod ad Ampeloprason attinet. Satiuum igitur seu hortensianum Allium hoc pacto seritur. Primo namq; vere, quo tempore Ciconiæ ad nos redire solent, Allium in nostris regionibus, in terram mediocriter cultam, aut natura sua alioquin bonam, nec nimis fortem aut lentam, deponitur, eo quo dicemus ritu. Si quidem nucleorum aut spicarum, quas non raro unus Allij bulbus numero triginta obtinet, easq; recuruas, & tenuissimis uestitis membranis, Græci *ἀλλια* uocant, diuortia sunt, singulaq; tum spicæ liratim depanguntur, in teruacante digitum longa mensura, quod & in Pisorum hortensium satio ne obseruatur. Hæ uero spicæ intra paucos dies erumpunt, quæ eruptio progressu temporis in Loliacea longa & graminea, ac utrinque acuta folia desinunt. Allium altero a satumense antequam nouis nucleis conglomeretur bulbus, dulcescit, maxime si luna sub terris posita uellatur. Vbi uero ad iustam maturitatem peruenerit, et perfectionem adeptum fuerit, ac quo plures in eo spicæ coaluerint, hoc asperius ac acrius sentitur. Alfatæ Allio, Cæpis, Rapis & Raphanis nihil prius habent, ex his enim multi quæstum

haud.

Scordoprason.

Allium.

Aber Knoblauch.

Knoblauch.



haud uulgarem faciunt, ut
interim taceam, quod nihil
his ipsis oleribus in cibo
apud hos frequentius exi-
stit, maxime Allio. Nam
apud vinitores & agrico-
las Alsatiae prima simul &
ultima fercula sunt Allium
& Ceba, id cum alias seme-
per, tum uero in messe præ-
cipue obseruari potest, quæ *Testylis & rapi*
morem & Vergilius *Æglo do festis messori-*
ga secunda attigit. Sed ut *bus æstu*
historiam. Allij absolua- *Allia, Serpyllūq;*
mus, cum iam maturitate *herbas contun-*
suam consecutum est, id qd *dit olentes.*
plerumq; circa Festum D.
Iacobi fieri consuevit, Alli-
um euellitur, ac una cum ce-
pitia sua fronde in locis fu-
mo peruijs suspensum, ad
insequentem usq; annum
conseruatur. Quod si per
hyemem in campis relictū
fuerit, sequenti anno teretē
profert caulem, inanem, læ-
uem, & qui iunceam præ se
ferat formam, in cuius ca-
cumine flores in globum
circumaguntur (ueluti &
in Ceba) in quo semen emi-
cat. Præstat autē antequam
caules faciat Allium, uiridē
comam intorquere ac hu-
mi prosternere, quod Iulio

menſe faciendum erit, hoc enim pacto cauetur ne in frondem luxuriet, &
uaſtiora ſient capita. Didymus aſſerit Allium ſi luna ſub terris poſita ſera-
tur, & item ſub terris luna latente uellatur, odoris ſœditate carere, & dulce-
ſcere.

NOMENCLATURAE.

Diosco. lib. 2. Allium Hebrei שום Schum: Num. xi. Chaldaei תרם Tefam, Rabini et
capite 141. quos Thal mudistæ שם לב סם Samlak. Græci *ἐνὶ πόδι*, nonnulli alij Scordion, Sebe-
dam Elapho- stū, Arabes Chaom teste Serap. ca. 321. Germani Knoblauch vocant. Allii
boscon, alios Hippocrates defectionem uentris moliri, urinam ciere, oculorum hebetu
Geboscon uoca- dinem gignere, pectus exaescere, caputq; grauare, Cepā uero oculis pro-
re ait. desse perhibet. Contra nostri medici Cepam oculos ledere non aliter atque
ἐνὶ πόδι, ὅτι ἐνὶ πό- Allium testantur.

ADMONITIO DAVIDIS KYBERI

ad Lectorem.

Aliter ex sententia Hippocratis scripsit Ruellius lib. ij. cap. lxxxv. quæ
uero diuersitatis sit ratio nobis non constat, præsertim exemplaribus Hip-
pocratis uarijs destitutis, uoluimus tamen huius admonitum lectorem, ne
uel negligentia, uel quod parum fideliter autoris sensum reddiderimus, ac-
cusare nos posset.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Allium natura sua calidum & siccum est, ad multa utrisq; corporis par-
tibus utilissimum.

Vnum est in illo detestandum, nimirū foetidus ille ac fortissimus odor,
nam cerebro officit, caliginem oculorum facit, iram commouet, sitim exci-
tat, somnumq; inducit, quæ omnia in gallo gallinaceo uidere est, qui Allii
deuorauerit. Hanc fuisse opinor causam, ob quam Horatius in Epodon
ode tertia tantis dijs excretur Allium, cum scribit:

Parentis olim si quis impia manu

Senile guttur fregerit.

Edat cicutis Allium nocentius,

O dura messorum ilia.

INTRINSECVS.

Si quis postquam Allium escitauit, nō possit odoris tetri foeditatem sus-
ferre, is folia Rutæ recentia supermanducet, qua ratione odor ille foetidus
maiori ex parte delebitur.

Didymus, edentibus halitus tædium asserit aboleri, si crudam fabam su-
permanducarint.

Verum ad emolliendam odoris tetri foeditatem, betæ radicem in prunis
tostam superedisse satis est. Eo siquidem remedio uirus extingui Menander
ē Græcis pollicetur.

Allium

Allium in cibo usurpatum omni ueneno aduersatur, quàm obrem fessis messoribus hic cibis maxime conuenit, qui nonnunquam aquam insalubrem, quæ non paucos sæpenumero gignit morbos, bibere coguntur: Hoc enim pacto uitia quæ ex mala illa aqua oriuntur deprimi possunt.

Allio latæ uentris tinea, necnon hirudines, aliæque id generis uenenosæ excutiuntur teste Galeno.

Aduersus ictus serpentium, uiperarum, & canis rabiosi morsus, Allium utilititer editur, quo facto uinū superbibere, ac cataplasmatis instar, locis affectis Allium imponere conuenit. Hoc remedio uenenum domatur, ictusque ac morsus sanantur.

Allium esitatum claram reddit uocem, inueteratam tollit tussim, hydropicis conducit, urinam cit, aluum soluit, tormina sedat, pediculos & lentes enecat, præsertim si succus cum Origani decocto mixtus bibatur.

Sunt qui pulmentarijs Allium adhibeant, necnon armis assandis nucleos eius insigant. Sed quicquid id est, Apicianum est inuentum.

EXTRINSECVS.

Mulierculæ, quæ in fontes lac suspendere æstate solent, ut dulce maneat, ollarum superiores partes circumcirca succo Allij inungere debent, hac enim ratione a serpentium iniuriâ assèrentur, qui alioquin lac admodum expetunt, ita quidem ut in ollas ipsas non raro incidant.

Quod si per somnum, ut sit aliquando, serpens corpus alicuius intrauerit, huic non facile succurri potest nisi continuo Allij esu, hoc enim remedio serpens ejicitur, teste Erasmo in Colloquijs de amicitia.

Allij succus illitu cutis scabiosæ ac quasi leprosæ uitia emendat.

Idem succus furfures capitis, omnisque generis faciei maculas eximit, si illo confricentur partes affectæ.

Cremati Allij cinis cum melle ad prædicta cutis uitia efficacior est, idemque alopecijs medetur illitu.

Allium tota sua substantia ad extrahendos menses, & secundos partus sufficit.

Estque hoc etiam singulare morborum in pecoribus remedium, quibus non tantum sufficit, sed in cibo Allium adhiberi debet, teste Columella lib. vi. cap. iiii.

De Syluestri, seu Colubrino Allio.

CAP. LXIX.

C VM PRAESENS PLANTA, ET FORMA ET ODORE,
ad peculiare quoddam genus referendum uideatur, uolumus
seorsim

Allium caninū. Allū sylvestre. Allium caninū alterū.
 Hundts Knoblauch. Walde Knoblauch. Hundts Knoblauch der ander.



seorsim mentionem eius facere. Nascitur autem illa non quidem ubique
 locorum sed potissimum in tenebrosis & uliginosis syluis, in quibus appe-
 xente Vere cum Aro e terra prosilit. Herba est unico saepe folio, nonnunq̃
 binis

Minis conspicua, nŕsq; Lilio conuallio, de quo ſupra lib. i. cap. cxcvii) ſimilibus. Quæ duo habent folia in hoc genere plantæ, eæ in fine Aprilis menſis candidos proferunt flores, Lilio conuallio eidem conſimiles, niſi quod nŕ ſunt concaui, ſed aperti, ſtellati; ac foliolis radiatim a ſe mutuo ſeiunctis or nati. Radices huius generis candidæ ſunt & oblongæ, inſtar hortenſis alliij, eiſq; a ſatu menſtrui. Hoc Alliij genus foetidum ac deteſtandum eſt cum odoris, tum ſaporis, adeo quidem ut lac, caſeum, & butirum eorum pecorum, quæ Allium hoc in initijs æveris inter reliquas pullulantes herbas forte deguſta uerint, inficiat prorfus, ut nemo niſi ualde aſſuetus huiusmodi cibis, illis ue ſci poſſit, quod ego non ſemel animaduerti, ac certo ita ſe habere uidi.

NOMENCLATURAÆ.

Germani hoc Allium ſylueſtre, Waldrſnoblach, alij teſte D. Othone *Quidam Verſi* Brunſelfio Ramſeren. & Gerinſel uocant, quod lac coagulari faciat. Cæte *num Allium uo cant.* rum in Dioſcoride quidem *apponit ad op.* ipſiſmodum, hoc eſt, Allium colubrinum uocatur, Serapioni Scordium, & poteſt fieri ut ſit Aphroſcorodon. Columellæ lib. *apponit ad op.* xi. cap. iij.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Hoc ſylueſtre Allium ſœditate odoris ſatiuum ſuperat, ac forte aduerſus uenenum illo quoque efficacius fuerit. Dioſcorides cum ſatiuo compre hendit, ac utriuſq; vires uno exequitur capite, quem & nos ſequemur, nihil in præſentia de Alliorum ui acturi cum præcedenti id præſtiterimus capite.

De Allijs ita ſcripſit Fiera.

Si quod cœna ſapis, minimum eſt inſulſa quid optas.

Horrida cum exuſtis Allia uerticibus?

Hæc graue olens, capiti, nec conuenientia ocellis

Pulmoni, & rauca ſint licet apta gula.

Hæc ut noris edas, quantas prorumpet in iras

Veſica, & uenter deſignaturus onus.

De Scorodopraſo, cuius effigiem cum Allio

uulgari coniunximus. CAP.

LXX.

EDIOMATRICES MULIERCVLAE IN HORTIS AL
lij genus quoddam plantare conſueuerunt, quod radice, folijs,
& caule.

& caulē per omnia uulgare Allium, nisi quod radix huius nequaquam utriusque multiplici nucleo coagmentatur. Quanquam autem lachrymas eliciat, non tamen tam feruentis & acris est saporis atque Allium, quin potius ad Cepam quod ad odorem attinet accedere uidetur. Quo uero facilius a uulgari Allio Scorodoprason discerni queat, notandum est hoc latiora folia & grandiores caules fundere, deinde quotannis nigro pregnare semine, quod in cacumine fistulosi caulis profert, non aliter atque Ceba.

NOMENCLATURA E.

Radix, necnon herba huius plantae Allio respondent, sed odor ac semen Cepam representant, quare illi natura inest promiscua, Allij inquam & Cepas, quo nomine a Dioscoride *σκωροδωρον*, hoc est, Allioporum (si ita liceat dicere) uocauit. Germani *Aberknoblauch* dicunt. Posset & *Großlauch* hoc est, Porrum grande dici. Ego sane hoc Allij genus id esse existimo, quod ueteres Vlpicum, Gallicum, Cyprium, Biticum, Antiscorodon, Aphroscorodon, & Punicum uocauere, uide Theophrastum lib. viij. cap. iij. Plinium lib. xx. cap. vi. Colum. lib. vi. cap. iij. & lib. xi. cap. iij. Palla. lib. ij. cap. xiiij.

Dioscor. lib. 2.
cap. 142.
Plinius lib. 19.
cap. 6.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTVM.

Quemadmodum huic plantae promiscua est cum Ceba & Allio natura, ita temperantur in ea utriusque parentis proprietates & facultates, quae causa pro utrolibet genere si desit, hoc Allium sumi potest.

De Allio canino, cuius bina genera, agreste scilicet & Ampeloprason, cum Allio syluestri depicta exhibuimus.
CAP. LXXI.

1.
Allium caninum

IN VINEIS, NECNON FRUMENTARIIS QUIBUSDAM agris rotundum quoddam Allij genus nascitur, Allio satiuo pene consimile, nisi quod folia profert minimelata, nec graminea, sed potius tenuia, fistulosa, ac Cepitij minora, ac Porro sectiuo grandiora, & longiora. Hoc in cacumine medijs coliculi fistulosi, capite hirsuto, & purpurante, in quo semen clauditur, conspicuum est. Hoc Allij genus admodum foetet, quo nomine uinitoribus exosum est, qui illud subinde e uincis eiciunt.

2.
Allium caninum exiguum;

Aliud porro Allij genus, agro Vormatiensi ualde familiare reperitur, huius radice bulbosa & fistuloso folio consimile, flosculo, quem in initio Aprilis

Aprilis mensis profert, emicans cœruleo elegantissimo, sed inodorato, & quod ad formam attinet Lilio conuallio (de quo supra libro primo cap. cxcvii) haud dissimili.

NOMENCLATURAE.

Primum Allij hoc capite descripti genus a foetido odore *Bundstnobl* uocant, hoc est, Allium caninum. Plinius lib. xix. ca. vi. syluestre Allium *ursinum* uocauit, id uero qd in aruis sponte nascitur, Alum. Quod in uineis nascitur *apud Germanos* Dioscoridi uocatur, apud Paulum Aeginetam *Diosco. lib. 2. cap. 139.*

Porrum agreste (Germanice *Wilderlauch*) nuncupatur.

Alterum genus quod hoc capite descripsimus, qui ad Rhenum habitât, *Bundstzwibel* & *Bundstnobl* / hoc est, Caninam Cepam, seu Allium caninum uocât, poteritq; ad discrimen alterius *Blein bundstnobl* hoc est, Allium caninum exiguum uocari. Est autem hæc Cepula, seu Allium caninum exiguum Hyacinthus meus vernus, sed de Hyacinthis suo loco plura. *Huius generis effigiem infra habes cap. 79.*

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Omnia Allij genera, tam satiaua quam syluestria ueneno aduersantur. Syluestria in cibo non usurpantur, nihilominus tamen, ubi id necessitas postulat, ad expellendum uenenum utrinque adhiberi possunt.

INTRINSECVS.

Allium caninum tufum, ac in uino potum, tineas uentris excutit, ueneno resistit, interno quidem, potum, externo uero, utpote ictibus & moribus, emplastri ritu impositum. De Hyacintho alias.

EXTRINSECVS.

Allium caninum, urinam cit, & menses elicit potenter, foris aut infusus.

De Viola alba Theophrasti, & Narcissoues
serum. CAP. LXXII.

VIOLA ALBA THEOPHRASTI CIRCA DIEM DIVO

V Valentino sacrum apparet. Eius folia & radices satiuo Allio satis respondent. Licet autem folia teneriora, ac molliora Allio fundat hæc viola, tamen primo aspectu Allium plane repræsentat. Flores fert binos quandoque, aut ternos coliculo seu potius pediculo, tenui ac fere iunco.


Viola alba Theophrasti.

Weiß Hornungs blümlin.



iunceo, tereti, & dodrantali
 insidētes, cādidos, cōcauos
 cymbalis similes, per ambi-
 tū senis distinctos apicib⁹,
 n̄sq; foris ex luteo uiridi co-
 lore tinctis, intus stamini-
 bus itidem senis ac croce-
 is ē medio illorum sinu pro-
 rumpentibus, quod in Li-
 lio quoque uideas. Caterū
 hi ipsi quos delineauimus
 flores violarum purpurea-
 rum odorem referunt, qui-
 bus decidentibus capitula
 Papauerinis similia Nucleis
 Auellanae quantitate erum-
 punt, semine referta luteo,
 rotundo, laui, Sinapi qua-
 dantenus simili. In Aprili
 ubi iam appropinquare coe-
 perit Maius euanescit tota
 sua substantia, dempta radi-
 ce bulbosa, quę intra humū
 usq; ad sequentis anni au-
 spicia illæsa delitescit. Pro-
 uenit Viola alba in umbro-
 sis quibusdam uallibus et
 syluis, quales sunt eæ quas
 Germani den Odenwalde/
 den Speßart / das Leber-
 tal / auff der Fürst uocant,
 in his enim syluis iam pri-
 dem hoc Violæ genus in-
 ueni.

2. *Narcissus uerm.* rum, quem Dioscorides lib. iij. ca. clv. descripsit, non ita pridem uisus mi-
 hi fuit. Primum namq; ē Burgundia in Germaniam deuenit, deinde uero
 Biponti in horto quodam plantata. Ea quod ad folia & bulbosam attinet
 radicem,

*Narcissus ueterum.**Narcissen rößlin.*

radicem, ad herbam quam paulo post describemus, Germanis, Gäl. *Homungs blüm* uocatam, accedit maxime, ac descriptioni etiam Dioscoridis & Serapionis pulchre respondet. Ceterum plures in hoc genere bulbosæ radices coniunctim reperiuntur, & quorū singulis rotundus, læuis, uacuus & sine folijs supra dodrantem attollitur, caulibus per medium quatuor oblongorum & Porraceorum foliorum ascendens. Flores in initijs Maij mensis in uertice caulium emicant nives, senis lacteis, ac firmis folijs radiatim distincti, ita ut stellatam rosam referant, in quorum medio teres, luteus, ac eleuatus apparet circulus, lutea quadam flammæ coloris circumdatus. Porro e medio quem diximus orbiculi terni effulgent lutei coloris apices, quemadmodum & in flore pomiferarum arborum. Flores Narcissi satis grato commendantur odore, quibus deciduibus, oblonga sequuntur feminum receptacula, Acoro officinarum adulteri-

no (de quo supra cap. xlix. huius secundi libri) similia. Folia & radices Narcissi gustu dulcem obtinent saporem, tactu nonnihil lentoris uidentur habere. In humectis hortis scilicet plantata prouenit. Quotannis radice

quam multiplicat sese propagare consuevit. Proinde uniuersam huius Narcissæ formam effigita quam descriptioni adiunximus, affabre ob oculos ponit,

NOMENCLATURAÆ.

Quam nonnulli Germani *Bornungsblumen*, a^o Februario mense, quo in hortis plantata apparere consuevit, eam alij, maxime qui syluam Germanis der *Odenwaldt* dictam incolunt, *Mertzenblumen*, hoc est, Martium florem uocant, propterea quod in syluis sub initia Martij mensis in perfectione sua uisatur. In hortis (ut diximus) in medio Februario herba & caulibus simul emergentibus prouenit. Otho Brunfelsius doctissimus uir pie memorix hanc plantam duabus sequentibus Narcissis adiunxit. Nec refert multum, siue Narcissus, siue Ligustrum (ut multis placere uideo) uocetur, qua ratione Germani *Weiß Mertzen violen* & *Weiß zeitlosen* / aut *Weiß Bornungsblumen* deinceps uocare poterunt. Quod nonnulli hanc plantam bis in anno, hoc est, Vere & Autumno florere tradunt, purum est mendacium, quod nos in hortulis nostris diligenter animaduertimus. Iam uero ut & hoc loco sententiam nostram in gratiam studioforum rei herbariæ adferamus, censemus illam *Hemerocallida* esse *Dioscoridis*, quam alij *Hemerocatalacton*, alij *Crinonagrion*, alij *Crinanthemon*, alij *Porphyranthes*, alij *Bulbum Hematicon*, alij *Anticatharon*, Ægyptij *Iocri*, Romani *Bulbum* aut *Lilium syluestre*, aut *marinum*. Aphri *Abiblabon* uocant. Quod si cui hæc nostra sententia minus arrideat, is meliorem adferat, nos quod potuimus, fecimus. Cæterum hanc plantam *Leucoion Theophrasti* esse constanter credimus. De *Leucoio* suo ita scripsit Theophrastus li. vi. cap. vii. *Τὸν δ' ἀνθὺν τὸ μὲν πρῶτον ἰσχυαίνεσθαι τὸ λευκόν, ἔπειτα μὲν ὁ αὐτὸς μαλακνόντες, οὐδὲν το χαμῶν. ὅπου δὲ σκληρύνει, ὅστις ὅρος. Et paulo post. Οὐ γὰρ χροία γὰρ καὶ τὸν ἀγγέλου τὰ λοιπὰ, ὅλιν δ' ἀκρίνον, καὶ δ' ἀγρίαις καὶ δ' σκαρτῆς, αὐτὰ δὲ διαμίνεσθαι, καὶ τὸ λευκόν.* Hæc ille.

Quam uero postremo loco in hoc capite plantam descripsimus, eam ueterum *Narcissum* esse iudico, quem nonnulli teste *Dioscoride* *Narcisson anydron*, alij *Autogenes*, alij *Bulbon emeticon*, alij *Lirion*, Romani *Bulbum morbitarium*, uel (ut alia legunt exemplaria) *Vomitorium* uocant.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Quod si prior in hoc capite descripta planta *Hemerocallis* sit & *Leucoion Theophrasti*, certe in medicina usu repudiari non debet. Sed ut de *Narcisson* nunc peculiariter loquamur, testantur *Galenus* ipse & *Paulus*, hunc calidum & siccum esse, adeoque desiccare, ut maximis uulneribus sit glutinans, imo etiam tendinum præcisionibus conferre. Quæ quidem posse *Narcissum*

Narcissum lentus ille & glutinosus eius testatur succus. Cæterum raro introsumitur.

INTRINSECVS.

Veteres intra corpus nunquam hanc plantam assumere solebant, nisi cum uomitiones ciere uellent; tunc enim radicem coctam uel edebant, uel bibebant. Hoc enim pacto usurpata uomitoria est.

EXTRINSECVS.

Radix cum folijs tusa ac imposita tumentibus puerperarum mammis, necnon inflammationibus cunctis prodest.

Radix recens tusa, ac cum succo suo calida imposita, non solum quæuis uulnera, sed etiam præcisos nervos glutinat, sanatq;

Luxatis malleolis, diuturnisq; articulorum doloribus, trita ex melle & imposita subuenit, quo nomine podagrici hoc medicamentum usurpare debent.

Ambustis igni prodest hæc radix, cum exiguo melle trita.

Vitia cutis in facie, utiliginesq; cum semine vrticæ & aceto tusa hæc radix emaculat.

Cum eruo & melle, ulcerum sordes purgat, abscessus rumpit concoctioni repugnantes.

Infixa corpori extrahit illita cum Lolij farina & melle.

*De Narcisso cœruleo, Germanis Blawhou
nung's blümen.* CAP. LXXIII.

QUÆM MODO DESCRIBEMVS NARCISSVM, IS IN quibusdam umbrosis syluis, & montibus, maxime uero in terra quæ calcem lapidem producit, sub finem Februarij mensis, herba, flore & caule simul è bulbosa, terete, ac nuce Myristica haud quamquam maiore, prorumpentibus apparet. Folia gerit bina, angusta, & oblonga, Alij folijs pene similia, sed breuiora, inter quæ exiguus, tenuis, ac linceus assurgit coliculus, exiguis ac stellatis flosculis, ijsq; in nonnullis cœruleis, in alijs candidis emicans. Cæterum his decidentibus rotunda subséquuntur capitula Ciceri arietino paria magnitudine, fuluo semine Milio similiter ferata. Maio mense cum Aristolochia rotunda uulgari hæc planta euanescit.

Narcissus coeruleus.
Blaw Hoinungs blümen.

NOMENCLATURAÆ.

Germani illam Blaw Mergen/ oder Hoinungs blümen/ hoc est, Martium seu Februarij coeruleum florem nuncupant, neq; enim unquam aliud nomen cognoscere potui. Proinde an Bulbo uomitorio, aut Narcisso, uel Hyacintho adnumeranda sit, hoc tempore nihil affirmare ausim. Volui tamen inter bulbosas radices mentionem eius facere, ac quæ mihi de illius nomenclaturis comperta essent indicare, quoad certa eius nomina cognoscere liceret. Nascitur uero illa in lapidosis locis, ac syluis, cuiusmodi est ea quam Germani den Ydar uocant, nã in illa prope arcem Valentiam hũc bulbum primum effodi.

VIRE AC TEMPERAMENTUM.

Quod si hæc planta Bulbus sit vomitorius, uomitiones ciat, quanquam nihil affirmare possim, ut quib; nunquam illam gustarim.



De *Narcisso luteo*, Germanis *Gäl Hou*
nungsblumen. CAP. LXXIIII.



QVOD BENE VER-
 tat, tertiam nunc aggredi-
 mur a' Februario nomen
 fortitam plantam, quam
 Germani *Gäl Hönungs*
blumen uocant. hoc est, Fe-
 bruarij luteum florem. Ea
 radices habet Allio simi-
 les, sed magis exiguas, co-
 piosas, ita quidem ut non
 raro triginta aut plures cō-
 pactæ simul coniungan-
 tur, quod in Porro quoque
 sectiuo uidere est. Ex his Fe-
 bruario mense folia prode-
 unt Allio quoque similia,
 sed breuiora, & molliora, &
 quorū medio rotūdi, lutei,
 ac forma sua ad Cymbalū
 accedentes flores prorum-
 punt, non aliter atq; Violæ
 albæ, licet hī maiores sint,
 ac duplici foliolorum tex-
 tura stipati, sed omnis cum
 odoris tum saporis expe-
 tes. Hæc planta quam no-
 stri uoluptatis potius q̃
 utilitatis gratia in hortis
 plātare cōsueuerunt, Mai-
 mense nullo post se relicto
 semine tota sua substantia
 interit, sola radice super-
 sita.

NOMENCLATURÆ.

Hunc florem D. Otho Brunfelsius *Narcissis* adiunxit. De *Narcissis* uide

Mefuen, & Serapionem cap. clxxxviii. Nos quoque de Narcissis paulo post plura dicemus.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Mulierculæ hanc plantam in hortis suis serunt, propterea quod inter vernos flores prima floreat. De temperamento ac facultatibus illius tum differemus, cum quodnam nomen habeat perceperimus.

De Hermodactylo quorundam, Germanis

Waldr zeitlosen. CAP. LXXV.

De hac planta
vide infra cap.
134.

IN HELVETIA, NON PROCVLA CVRIA OPPIDO, nec non prope Veltcurium, in planitiæ inter quædam densa, ac uliginosis locis sita arbuta planta quædam nascitur elegantissima, folijs rotundis prorsus cõsimilis Asaro, ita quidẽut primo intuitu Asarum esse crederem. Cæterum cum illam effodere instituissem, radicem eius deprehendi rotundam, rufam, magnitudine radicis Croci, gustu aliquantulum amaram. Vbi uero diligentius eas plantas inquirerem, uidi quasdam flores ferre odoratissimas, Bersilici colore tinctas, odore & forma Violæ Martiæ cœruleam, seu purpuream referentes. Hanc plantam cum flore suo circa diem D. Bartholomæo sacrum reperi.

NOMENCLATVRÆ.


Quancquam de memoratæ plantæ nomenclaturis, ac facultatibus diligenter eius loci incolæ sciscitatus fuerim, nihil tamen certi cognoscere potui, nisi quod Sacerdos quidam mihi referebat, uerum eam esse Hermodactylum. Quo cognito cœpi ueterum scripta, maxime Dioscoridis penitus considerare, sicubi plantam istam descriptam reperire possem, sed frustra sine labore cum impendi. Nam in uniuerso Dioscoridis opere nullam inueni stirpem Hermodactyli appellatione insignitam, excepta sola Pentaphyllo, quod Magos Hermodactylū uocare tradit Dioscorides. Sed cum historia Pentaphylli huic nostræ plantæ nullo pacto conueniat, in dubio etiamnum uersor quonam referenda sit. Ne uero apud Germanos nullum haberet nomen, uolui eam Waldr zeitlosen appellare.

De Hermodactylo officinarum, Germanis

Wysen zeitlosen. CAP. LXXVI.

IN VDVVS ISTE FLOS, QVEM COLCHICON, SEV VT
officinæ

Colchicon, officinis Hermodactylus,
Wyfen zeitlofen.



officinæ uocant, Hermodactylus Autumni tempore fundit, hyemis aduentatis nos admonet. Quamquam uero exitu Autumni plerunque appareat, tamen non raro quoque circa Festum D. Iacobi primum in detonsis pratis, ac ab eo inde tempore usque ad finem Septembris mensis spectatur. Cæterum ut descriptione eius persequamur, solet is nudus omnique folio uiduus, è bulbacea ac rotunda radice forinsecus è nigro rufescente, quæ delibata intus albicet, prorumpere, alius quidem lactei, alius uero roseicoloris, senis plerumque constans folijs, è quorum medio lutea prodeunt uti & in Lilijs, stamina. Forma sua Crocinum imitatur florem, sed non solum color, uerum etiam odor & sapor, inter utrunque discerni luculentum constituunt. Vere appropinquante folia Colchici exeunt, quandoque terna, interim et quaterna, uiridia, ac Lilio conuallio (cuius supra lib. I. cap. cxcvii. mentionem fecimus) aut Lilio albo similia, inter

que fructus erumpit oblongus, ueteri, nigro, & hyemali uestitu uelatus. Hic uero fructus nihil aliud est, quam coliculus marcidus, binos aut ternos testiculos, eosque oblongos, ac Amygdalis non dissimiles, ex ordine coniungunt.

etiam positos, semine rotundo, Raphani seminio simili, in perfectione sua, quam Iulio mense adipiscitur rufus, refertos sustinens.

Miraculum
nature.

Porro quis non in hac quoque planta naturæ miracula uidet? Siquidem vere folia fundit, æstate semen & fructus maturantur, Autumno flos emicat, hyeme uero radices bulbosæ augmentantur, ac subinde alias ex se procreant, sicut & Satyrion.

NOMENCLATVRÆ.

Germani hunc florem *Wysenzeitlosen* / alij *Wchtblumen* / & *Nackterbûren*, hoc est, nudas meretrices uocant, propterea quod sine folijs Autumno compareat. Sunt qui putent Narcissum esse Theophrasti, & Vergilij, inter quos est Philippus Melanchthon sæculi nostri unicum decus, qui in Syntaxi sua scripsit, Narcissum postremum esse florem, Septembri mense apparentem, Germanis *Zeitlosen* dictum. Huic sententiæ ego quoque subscribo, quod ad florem attinet, cum namq; Narcissum Theophrasti esse iudico. At radix nec non folia huius plantæ, nobis à Dioscoride sub Colchico, Ephemero, siue Bulbo agresti comprehenduntur, quod non solum descriptio, ac uniuersa Colchici historia, quæ apud Dioscoridem legitur, uerum etiam ea quam Arabs Serapio ponit, abunde confirmat. Nam ut missam alterâ faciamus, quid magis propriè de hac nostra planta dici posset, quam quod habet Serapio cap. cxciiij de Surugent? Eo enim in loco Hermodactylum, & ex Albatarich cuiusdam translatione, Liliū syluestre, & Achimeron, quod meo iudicio Ephemeron legi debebat, uocat. Ac facile quantis in tenebris res herbaria, simpliciumq; cognitio uersetur, cum ex deprauatione nominum quæ retulimus, tum uero inde uel maxime liquet, quod Seplassarij nostræ ætatis hanc radicem pilulis adiungunt, quas Arthriticis & podagricis exhibent, cum tamen ipse Serapio Hermodactylū uenenum esse clamet, hominesq; strangulando occidere, sicut occidunt fungi. Mesue quidem tres Hermodactylos proponit, candidum scilicet, nigrū & rufum, quorum duos posteriores damnat, candidum solum recipiens. Iam si Seplassarij huius autoritate nituntur in confectione pilularum iam dictarum, manifestum est illos decipi. Siquidem luce clarius est, hunc ipsorum Hermodactyli non candidum, sed nigrum esse, ac in humectis & pinguibus pratis prouenire, quo nomine a plerisque etiam damnatur. Sed occinent illi nobis Hermodactylum suum intus non nigrum, sed candidum esse. Et recte quidem hæc illi, neq; nos quod dicunt negamus, scimus enim & aureum malum intrinsecus quoq; candidum esse, nec obstare nigræ dinem exteriorem, quo minus candidum lac nigra vacca (ut uulgato Germanico dictorio iactatur) reddat, sed cum de colore radicis alicuius sic sermo de-

Theoph. lib. 6
cap. 6.

Napueos.

Nec sera coman-
tem Narcissum.

Verg. Georgicis
lib. 4.

Dioscor. lib. 4.
cap. 82.

καρχνίδις

mo de exteriori primum apud autores sit mentio, deinde de interno, quam formam loquendi & nos obseruamus. Itaque cum hæc radix foris nigra, & Hermodactylus Arabum, ac ut antea ex testimonio Serapionis & Mesue probauimus, uenenum sit, quis miretur, si non tantum ægri, sed & firma ualitudine præditi huiusmodi medicamenti non iuuentur, sed lædantur potius, nec podagra, articularioq; morbo liberentur, sed corripiantur ac frangantur. Sed hoc mereretur peccata nostra, ut nimirum hoc pacto & morbis incurabilibus, & tam noxijs ac uenenosis pharmacis pereamus. Quisquis ergo bene sibi consultum uelit, is nostram admonitionem accipiat, ac sciat ab hisce medicamenti abstinentum. Hæc uero non ea scribimus, ut cuiusquam uel famæ, uel rei quicquam detractum cupiamus, sed ut publicæ omnium salutis consulatur, quod tum fiet, cum accurato iudicio, & diligenti studio ueras herbarum tum nomenclationes, tum facultates cognoscere annisi fuerimus. Equidem quod mei officij esse sentio, quibuscunque lib. Vide Aeginetam. lib. 3. cap. 78. et lib. 5. cap. 48. et lib. 7. de Simpl. bene præstabo, qua ratione rursus cum Serapione, Mesua, & Paulo Aegina- nera ingemino, ac constanter affirmo Colchicon, quod Arabes & officinæ Hermodactylum dicunt, uenenum, ideoq; ab usu eius omnibus abstinentum esse. Cæterum articulario morbo & podagra laborantibus utilem esse radicem Colchici Arabes scripsere, quod & nos aliqua ex parte experti sumus, uerum tum, cum forinsecus imponitur. Quare ut ad nomenclaturas tandem redeamus, sciendum est foris tantum humano corpori imponendam radicem Colchici, nunquam intro sumendam, uti hactenus magno errore factitatum scimus. Atq; hæc hactenus. Dioscorides nullius meminit in scriptis suis Hermodactyli, præterquam in Pentaphyllo (quam alias Tormentillam uocant) ut superiori proximo capite diximus. Qui sit ut Hermodactylum Serapionis, & Colchicon Dioscoridis unam & eandem esse plantam, necesse sit, aut certe descriptionem Colchici apud Dioscoridē ab ea quam Serapio tradit dissentire, quod affirmare nefas merito iudicari debet, præsertim cum nihil in Dioscoride quod ad Colchicon attinet, non diligentissime in Hermodactylis Serapionis annotatum legamus. Quam obrem ita nos quidem cum bona herbariorum omnium uenia statuimus, radicem hanc bulbosam Dioscoridis esse *ουζον*, Serapionis Surugen, Mesuæ Hermodactylum, Homeris Moly, ac Germanis Pfaffenboden dicitur: sus florē quē Germani Zeitelosen / & nos *Nacktblumen* / hoc est, Nudū florē nuncupauimus Narcissum esse ueterum, quem Fabulę quoque Poëtarum celebrant. Ac potest (mea opinione) fieri ut Dioscorides duobus in locis separatim hanc plantam explicauerit, ac sub Colchico quidem radicem & folia eius, sub Narcisso uero florem depinxerit, in quo sane capite uires herbarum exponit, quarum mentionem in Colchici historia nullam fecit. Exposui

quid sentiam, iudicent æqui & candidi Lectores, probentq; quod ueritati magis consentire intellexerint.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Quanquam radix & flos huius plantæ ad abigendos & enecandos pediculos satis conferant, tamen usus earum præsertim si intro sumantur, minus metutus existit, ut quæ plus detrimenti quam utilitatis allatura sint.

Admonendi ergo mihi hoc loco sunt hi quorum interest pilulas pro podagricis præscribere & conficere, ne suis confectionibus Colchicon, seu Hermodactylum adhibere uelint, quod hætenus magno cum errore commissum fuit. Quo uero æquiore animo admonitionem hanc nostram accipiant, audiant hi quid de Colchico dicat Dioscorides, cum quarto libro capite lxxxij. in hunc modum scribit. Ea comesa, fungorum more, strangulando enecat. Et de Narcissi quoque radice prodidit, eam in cibo aut potu usurpatam uomitiones ciere. Hæ sunt huius plantæ facultates, ut minime bonæ ita maxime fugiendæ.

EXTRINSECVS.

Radix tusa ac foris imposita, dolores maximos sedandi ac repellendi uim obtinet.

Cum melle & farina hordeacea tusa ac imposita, furculos, sagittas, & quæcunq; corpori infixæ fuerint, breui tempore refigit.

Quæ de Narcisso, præter ea quæ diximus, Dioscorides cap. clv. libri quarti tradidit, ad eum proprie Narcissum pertinent, cuius supra capite lxxij. meminimus.

De Croco. Cap. LXXVII.

OS QVOQUE GERMANI NON MINVS ATQVE
N alia nationes Aromata nostra habemus, iactent alij Cinnamonum, nucem Myristicam, & Masticham, nos Gentianam Iuniperi grana, & Crocum celebramus, ut interim plantas plurimas facultatibus miris præditas, radices omnigenas, seminum denique & fructuum infinita genera taceam, quæ quidem uniuersa suis facultatibus, ad tuendam & recuperandam ualitudinem faciunt, atq; eæ (ut uulgo uocant) species, quæ ex Insulis illis Zalon, Meluza, & Chaleschutta, magnis ad nos sumptibus deportantur. Hoc sane unum in nobis desideratur, quod præsentibus uti & contenti

*Crocus.**Saffran.*

contenti esse nolumus, & quod pro donis Dei quæ nostra terra fundit, Deo quas debemus grates non persoluimus: Sed ut ad Croci historiam accedamus, illius plantationem Germani quoque didicerunt, licet Orientales illas rerras, Ciliciam, Lyciam, Ætoliam, Olimpum, & Turolum montes, nunquam ne uiderint quidē. In Pannonia namque superiore, ac præcipue in agro Viennensi Crocus hodie nascitur, qui omni alij præponitur. Nec tractus Rheni eius aromatis expers est, cum multi ex eo lucrum & quæstum quærant. Nam ad arcenti Newcastel (quæ haud procul a Landoia oppido distat) in pago Ilfussheim dicto, præterea & in agro Vormatiensi, & ad Fluvium die Pfrim dictum magna in copia Crocus plantatur. Est autem Crocus & ipse serotinus fructus, nam Septembre mense appetente, flos eius nudus ac purpureus primum apparet, mensis uero fere spatio durans, intra quod tempus quotidie obseruari uult, ac cura-

ri ne scilicet flaccescat. Cōstat is senis quoque folijs ueluti Narcissus Theophrasti, in cuius medio aurea prorumpunt stamina, inter quæ Crocum tripartitæ lingule simile, rubro colore tinctum conspiciendum se præbet.

Flos

Flos plane in odoratus existit, solum Crocum quod in medio eius inter stamina elucet, odorem spirat gratissimum. Flore pereunte, folia subsequuntur, angustissima, longa, graminisq; similima, quæ tota uirent bruma, in Maium usque mensem durantiâ, tum enim flaccida euanescent tandem, ita ut tota æstate nullum Croci supra terram uestigium appareat. Hic mihi mirabilem naturæ uim contemplare, quæ cum in alijs tum in hac potissimum se exerit planta. Autumno enim ut diximus, flos ipse prodit, brumali tempore, & per totum ver folia uirent, æstate radices bulbosæ intra humi augmentum capiunt, ex uno siquidem Croci bulbo sæpenumero quinæ aliæ aut senæ exeunt radices, uno in anno. Tertiò uero aut quarto anno postquam adoleuerint, effodiuntur radices circa Festum Diui Ioannis Baptistæ, tumq; in aërè siccantur, neque solo committuntur. Atque hoc fit ab eo quo diximus tempore usque ad Augustum mensens, in quo panguntur rursus pedis altitudine. Terra eligitur bona ac mediocriter pinguis, aprica, & quæ ab humidis nebulis aliena sit.

Antequam uero Croci nomenclaturas exponamus, miraculū aliud na-
turæ in Croco demonstrabimus. Radices namq; ut diximus effossæ, si uel ita
pangantur, ut humo sufficienti destituantur, uel negligentia prorsus non de-
ponantur in terram, nihilominus flores suos ferunt, nō aliter atq; si in terra
laterent. Hoc autem semel tantum fieri consuevit, ubi enim florem procrea-
uerint, emarcescunt, & putrilagine pereunt, ut quæ alimento almæ terræ
destitutæ sint. Qui uero hoc fiat satis explicari non potest, possumus enim
in his & alijs naturam admirari potius quam peruestigare. Mirum quoq;
est quod scribit Plinius lib. xxi. cap. xx. Crocum melle non solui, nullosq;
dulci.

NOMENCLATURAE.

Smilax uirgo, ut fabulatur antiquitas, ob amorem iuuenis mutata est in fruticem: sic & *Crocus* puer in florem sui nominis uersus est, quod Ouidius hoc uersiculo testatur, Et Crocon in paruos uersum cum *Smilace* flores: Huius fabulae & Plinius meminit lib. xv. cap. xxxv.

Crocus Hebræis uulgo כרכום Karkom (teste Elia Leuita) & מוריָקא Morika Cant. iiii. in Targum appellatur: Græcis κρόκος, & κάρκος, & κάρκος, & κάρκος, nuncupatur. Germani Saffran uocant, Arabum imitati uocē, qua Crocum Sahataram uocant, teste Scrapione cap. clxxxiiij. Proinde habet Crocus, passim apud scriptores rei herbariæ, a locis natalibus sua cognomina, alius namq; Coryceus, a Coryco Ciliciæ, alius Lycius appellatur, & monte Olimpio, quidam Centuripinius, & Sicilicus, in his enim locis olim optimus nascebatur. Hodie Viennensis Crocus, ut diximus, omni alio præponitur, quemadmodum doctissimus uir Manardus Ferrariensis testatur

testatur lib viij. epist. j. Cæterum meminit Plinius cuiusdam Croci, quod medio sit candidum, quamobrem Dialeucon uocatur. Est & Crocus Sarracenicus, Cnicum alias uocant, de quo suo dicemus loco.

Plinius. lib. 21. cap. 6.

VIRESC. AC TEMPERAMENTVM.

Nisi Crocus adulteretur, ut sunt imposturæ millemodi, non solum quod ad colorem & odorem attinet, in culinis, uerum etiam in medicina laudem haud uulgarem obtinet, ut qui utrinque commode usurpari possit. Temperamento suo calidus est in secundo, & siccus in primo ordine.

INTRINSECVS.

Crocus cordi conducit, ideoque quibusuis eius affectionibus auxiliatur, sanguinem purgat, ueneno aduersatur, quamobrem haud immerito aduersus pestem usurpatur.

Quidam Crocum in oculis ointenta cum Theriaca & Sinapi, alijsque speciebus igne coquunt, & ex illis demum hoc pacto tostis electuarium conficiunt, quod ad internam faciat pestem, uenenumque per sudorem exigit.

Crocus in cibo aut potionibus usurpatus, urinam cit, & morbum regium, ac menses mulierum educit, trahitque. Hæc radix croci cum uino Apianum, aut alio quouis dulci efficacius præstat.

Crocus (Plinio asserente) ad stomachi exulcerationes, pectoris, & renis, fecinorum, pulmonum, uescicarumque, peculiariter inflammationi earum uehementer utilis est.

Croci lethalem dicit Dioscorides, si trium drachmarum pōdere cum aqua bibatur. Sed hoc radicis nonnulli ascribunt. Alij tradunt eos qui Crocum prius in passo biberint, crapulam non sentire.

EXTRINSECVS.

Crocus paralyticis membris, ac induratis neruis apprime confert, quare Oxycroceum cataplasma ex Croco conficitur, ad emolliendam duritiem neruorum accommodatissimum.

Fluxiones oculorum cum lacte muliebri inunctus sistit.

Reliqua ex iam commemoratis Croci iuuamenta colligi facile poterunt.

Croci eiusque facultatum, sequentibus uersiculis meminifera in cœna sua.

Tama uetus taceat, cedant pulmenta Luculli.

Cœna coronata est plenior ista Croco.

Nic.

Hic Cilices redolent ignita cacumina florum.
 Rubra ferunt, cordi gaudia summa tuo.
 Si mala sunt capiti, segnes ducentia somnos
 Illa decor, stomachus, tristesq; pectus amant,
 Si bibit ista uorax poterit torpere palatum,
 Ieiuna hæc uerita est, sedula causa famis,
 At uentrem oblectant, uulua reſerantiq; tumentem,
 Hæcede, si risus expetis aſſiduos.

De Aristolochia rotunda. Cap. LXXVIII.

Aristolochia ro-
 tunda vulgaris.

DE ARISTOLOCHIA LONGA EIVSQUE NOMEN
 claturis ac facultatibus primo libro egimus, nunc rotundæ
 historiam subtexemus. Eius duo reperiuntur genera, quo-
 rum aliud radicem habet rotundam ac plane, semperq; siue uetus, siue tene-
 ra extiterit solidam, alterius uero minime solida est, sed concava. Porro
 utriusq; generis radix lutei, seu subcrocei est coloris, ueluti mala quæ uo-
 cant Cydonia, saporis uero amari instar Absinthij. Ambæ hæ radices ueris
 nunciæ sunt, quamprimum enim Februarii mense glaciæ geluq; dissolu-
 tur, e terra asparagos suos protrudit, qui ubi Martio mense appropinquan-
 te adoleuerint, singulæ radices suos emittunt coliculos, eosq; rotundos, læ-
 ues & dodrantales, ac in uertice floribus stipatis, Galiopsi quæ Germanis
 Bynsaug dicitur, aut certe Fumariæ quam similibus emicantes. In initij
 Aprilis mensis flores quos diximus in perfectione sua spectantur, alij qui-
 dem Bersilici, alij niueo colore tincti, quos, ubi deciderint, consequuntur si-
 liquæ exiguæ in quibus semina nigra, lentibus haud dissimilia, ac singula
 candidis quasi uersiculis e siliqua pendentia, clauduntur. Maio mense se-
 men maturum exilit, actum una cum folijs quæ herbacei sunt coloris, &
 cum Rutæ hortensis folijs comparari possint, nisi maiora & laxiora forent,
 cum his inquam caules pereunt ac euanescent, sola radice superſtite, quæ us-
 que ad ver proximum intra humum incolumis delitescit. Gaudet hæc Ari-
 stolochia terra forti, dumetis quæ secus itinera sita sunt, syluis etiam altissi-
 mis, locisq; earum desertis & umbrosis.

Miraculum
 nature.

Antipathia.

Rursus uero hoc loco nature miraculum prædicandum mihi uidetur. Si-
 quidem nunquam simul uno & eodem in loco bina Aristolochiæ rotun-
 dæ uulgaris genera reperiuntur. Quemadmodum enim Allio cum Magne-
 te lapide perpetua intercedit inimicitia, ita quidem ut si Allij succo Magnes
 oblinatur, omnem amittat uim, & non solum ferrum non attrahat, sed
 abigat


Aristolochia rotunda vulgaris:
 Rund Holwurtz die gemein.



abigat potius, quemadmodum prodidit Plutarchus: ita uno & eodem loco bing Aristolochiæ rotundæ uulgaris radices morari, et mutuo se ferre nolunt.

Porro nascitur quædam² herbula uix dodrantalis, plerunque in collibus inter Aristolochias rotundas quas dixim⁹, folijs rutaceis, Aristolochiæ rotundæ concauæ adeo similis, ut plane cum effoderem eam, me deceperit, quippe qui mihi persuaseram Aristolochiæ esse rotundam. Sed rem aliter se habere radix, quæ illi est candida, articuli longitudine prædita, multis spicis, seu nucleis e quibus subinde repullulat, coagmērata, gustu dulcis & aspera ueluti Castanea ostendit. Florē gerit Martio & Aprilii mensibus exiguum, rotundum, ad uiridem uergentem colorem. Locus illi ut diximus plerunque inter Aristolochiam rotundam maiorem. Hactenus historiam Aristolochiæ rotundæ uulgaris descripsimus, quam a uera ueterum Aristolochia rotundā abesse

existimamus, quantum a nigro ut uulgo dicitur candidus distat color. Neque enim illam (ueram inquam) in nostris regionibus provenire crediderim, aut si provenit, sane nobis ignota existit. Hanc nostram sententiam minime

*Aristolochia rotunda uera.**Rund Holwurz die rechte.*Diosco. lib. 3.
cap. 4.

nime temerariam ueterum
rei herbariae scriptorum te-
stimonia confirmât. Nican-
der etenim in Theriaca sua
Aristolochiam rotundam
folia Hederæ habere asse-
rit, quod idem Dioscori-
des non solum in descri-
ptione Aristolochiæ testa-
tur, uerum etiam lib. ij. cap.
cxi. cum de Brassica marina
loqueretur, innuere uide-
tur. Huc accedit Theophra-
sti quoque cælculus qui lib.
x. de plantarum historia ca.
xij. in hunc modum de Ari-
stolochia scribit. *ἡ δὲ ἀριστο-
λοχία τῇ ἰσχυρίᾳ μὴ διέδμετο, τῇ
διήνσει πικρὰ σφόδρα τὴ χροίᾳ δὲ
μυδαία γίνεται διὰ τοῦτο δρῶσι ἅλα
τὶς κ. φύλλον ἀρίχον προσωριῖς τῇ
ἀλσίῳ πλὴν σφογγώτερον. Postea
capite ultimo eiusdem li-
bri Aristolochiæ rursus cō-
meminit his uerbis. *ἡ δὲ
ἀριστολοχία, πικρὰ καὶ ἰσχυρὴ πικ-
ρὰ, τῇ χροίᾳ μυδαία καὶ διέδ-
μετο, τὸ δὲ φύλλον σφογγώτερον, ἢ πλεον
διὰ τοῦτο τὸ γένος.**

Ex his a nobis adductis
testimonijs satis liquet, quæ
in Europa hætenus Aristo-
lochia rotunda habita &
uendita fuit, a doctoribus
& seplasiarijs nostris, a ue-
terum Aristolochia proa-

lus alienam esse. Sed prohi dolor eorum res nostræ redactæ sunt, ut quidquid ab
istis dicatur præstigiatoribus (indoctos illos inquam ac Barbaros, tam Me-
dicos quam Seplasiarios, qui postposita ueterum & probatorum lectione

receptos

receptos sequuntur errores) tanquam oraculum adoretur. Quid quod eo progreditur hominum dementia, ut quorumcumq; consilia sequantur, etiā imperitissimorum, ita ut Iudæos, agyrtas, anículas, & nescio quod genus hominum ad perniciem aliorum natum, Medicos expectant. Sicenim uulgo factatur prouerbum, ægros magno teneri sanitatis desiderio, ideoque necesse habere quosunque consultores audire. Atque ita suos quisq; sequitur deos, in quibus salutis spem ponit, quod sane peruersum studium singulari in nobis Dei ira excitari crediderim. Faxit Deus ut animorum istam peruersitatem aliquando exuamus, & recta non tantum probemus, sed & sequamur consilia.

Cæterum cum Aristolochiæ rotundæ uulgaris historiam absoluissem, *Aristolochia rotunda uera.*
perueit ad manus meas uera Aristolochia rotunda, quæ omni ex parte Dioscoridis descriptioni respondet. Radix namq; eius rotunda est, rugata, pulla, ac undique impressiones quasdam referens, in superiori parte quæ caulem ex se mittit, in acumen quoddam turbinata, ita ut rapulam marcidam repræsentet, gustu amara sicut & longa Aristolochia, intus subcrocea. Hæc in montanis Montis pessulani prouenire, ac, ut refert D. Conradus Gesnerus, Lugduni hodie uenundari dicitur.

NOMENCLATURÆ:

Nomenclaturæ Aristolochiæ rotundæ supra primo libro in descriptione longæ enumeratæ sunt. Repetemus tamen hoc loco præcipuas, quæ sunt *ἀριστολόχια*, Malum terræ. Apuleius cap. xix. plura addit nomina, quæ sunt Adrarhyza, Melo carpon, Ephesia, Clematidis, Pyxionos, Dardanos, Iōctis, Tocites, Teuxinos, Chamæmelon, Opetis, Sopoep, Absinthium rusticum. Serapio Aristolochiam cap. clxxi. Zaraund (sicut & Auerrhoes) & Masmochra uocat. Proinde ne quis putet nostram uulgarem Aristolochiā nos repudiare, ac peregrinam in locum eius substituere uelle, is sciat, nos uulgarem Aristolochiam rotundam magni quoque facere, sed suo quod debeo in medicina habere loco, nec genuinæ quod nec possum, præponere. Quod si quis roget ubi ergo uulgarem illam Aristolochiam in Dioscoride descriptam sentiam, huic sententiam meam candide impertiar, dicamq; quam nos Germani *Golwurz*el, id est, radicem concauam dicimus, nobis sub Hyacintho, quem ille Heloniam, Porphyranthes, Vaccinium & Vlcium cognominat, Sed de Hyacintho plura paulo post.

VIRES AC TEMPERAMENTVM:

Aristolochia rotunda uulgaris ad uarios utrinque morbos usurpatur.

INTRINSECVS.

Vulgaris Aristolochia rotunda ad internas quamplurimas affectiones adhibetur. Sunt enim qui radicem eius in puluerem redactam aduersus uenenum & pestem e uino bibendam exhibeant. Cum uino calefacto pota, si postea in lectum te componas, probe contactum, sudores potenter elicit.

Eadem urinam trahit, & ad morbum facit regium e uino pota.
Semen tusum ac sumptum quotidianis alui profluuijs auxiliatur.

EXTRINSECVS.

Chirurgi ad quæuis ulcera fluuenta hac radice utuntur, ad quam rem sane quam utilissima est, cum sanandi & exiccandi ui sit prædita.

FACULTATES ARISTOLOCHIAE
rotundæ ueræ.

Hanc Galenus & Macer calidam & siccam esse testantur, sic enim carmina Macri de Aristolochia sonant.

*Omnes uim calidam, siccamq; leguntur habere,
In primo uis sicca gradu, seruensq; secundo est.
Pestiferos morsus cum uino sumpta rotunda
Curat, & assumptis prodest sic hausta uenenis.*

INTRINSECVS.

Radix in puluerem redacta, ac drachmæ pondere cum Pipere & Myrrha pota, menses, partus, & omnia uuluarum onera ejicit, teste Dioscoride.

Ea drachmæ pondere ex uino pota, uenenum per sudores expellit.

Hoc pacto usurpata ad pestem & laterum dolores, suspiria, & concretos sanguinis grumos unice conducit. Reliqua sub Aristolochia longa require.

EXTRINSECVS.

Radix Aristolochiæ rotundæ ueræ in puluerem redacta ulceribus fluentibus insperfu prodest, nam ea siccatur & purgat.

Radix recens tusa ac imposita, aculeos & spicula extrahit. Estq; omnibus modis saluberrima, & ad medicationes utilissima.

De Aristolochiæ facultatibus ita scribit Theophrastus lib. x. de plantarum historia cap. xij. & ultimo.

Ἡ ρίζη αὐτῆς πρὸς πολλὰ, καὶ ὀλίγα πρὸς κερὰν, ἡ γὰρ ἢ καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ἴσται, καὶ πρὸς ἴσται τὰ καὶ.

τὰ καὶ πρὸς ὑπὸν, καὶ πρὸς ἰστέρα. τὰ μὲν οὖν προέχοντα καὶ ὡς οὖν οὐκ ἔστιν ἀναίσχυντα καὶ αὐτὰ
 πλαστότητα, τὰ δὲ ἄλλα ἐν μὲν οὐκ ἔστιν ἀναίσχυντα, καὶ ἴσως. πρὸς δὲ τὰ τῶν ἰσπερὶ οὐκ ἔστιν ὡς οὖν
 καὶ ἐπὶ τὸ δῆγμα ἐπὶ πλάττω, ἐν ὑπὸν δὲ, οὐκ ἔστιν μὲν αὐτὸ καὶ ὡς οὖν καὶ ὡς οὖν. ἴσως δὲ αὐτὸ καὶ πρὸς ἰστέρα
 ἐν, τὸ οὐκ ἔστιν ἀναίσχυντα. Hæcille.

De Hyacintho.

Cap. LXXIX.

V LGARIS ILLA ACROTVNDA ARISTOLOCHIA,
 cuius præcedenti meminimus capite, nos admonet, ut ad Hyacinthū accedamus, eiusq; historiam exponamus. Supra ca. lxxi.

1.
Hyacinthus
primus.

Hyacinthi cuiusdā uerni exigui meminimus, cuius hoc capite effigiem exhibemus. Deinde cap. lxxii. aliū Hyacinthum proposuimus. Tertio loco uulgarem Aristolochiam rotundam in numerum Hyacinthorum retulimus. Hoc itaque capite quartum describemus Hyacinthum, cuius radix bulbosa, quæ uulgari sativæ Cepæ satis respondet, nisi quod multo est minor, ab optimo uiro D. Georgio Ollingero ciui Norimbergenfi ad me sampridem missa fuit. Ea cum appetente Autumno in terram à me deposita fuisset, sub initia Martij mensis bina produxit angusta folia, Satyrionum medio generi similia, nec multo post bina alia subsecuta sunt. E' medio uero foliorum teres tandem & læuis assurgebat coliculus, dodrantalis, in cacumine uiridibus & exiguis globulis prominentibus emicans. Horum infimi in initijs Iunij mensis hiantes florem reddebant purpureum, forma Lilij conuallij flores imitantem, sed omni odore destitutum. Cumq; inferiores flosculi marcescerent, proximi quiq; ex ordine florere occipiebant. Tandem ubi omnes defloruissent, semen apparuit nigrū, Pseudomelanthy (de quo supra lib. i. cap. xl. egimus) semini simile. Et radix quoque per hyemem intra terram incolumis durabat, ac vere accedente, aliū ex se bulbū procreabat, unde rursus adolefcebat, quemadmodum & Crocus, & Lilium iuuenescere solent.

2.
Hyacinthus
secundus.

3.
Hyacinthus
tertius.

4.
Hyacinthus
quartus.

Postremo non desunt qui eam plantam quam capite lxxiiij. infra describemus, uerum esse Hyacinthum Poëtarum sentiant, propterea qd sanguineis notis sint maculati flores eius. Atq; hæcenus quinq; Hyacinthi genera exposuimus, ex his quisq; qd sibi maxime arriserit pro Hyacintho deligat.

5.
Hyacinthus
quintus.

NOMENCLATURA.

Primum Hyacinthum in tractu Rheni Germanica uoce *Bundtszwibel* / 1. uel *Bundtsfnoblauch* / hoc est, Cepam caninam, uel Allium caninum uocant. Meo iudicio Vaccinium nigrum Vergilij fuerit.

*Hyacinthus Vernus exiguus.*Klein frülentzen Hyacinctlin/
oder Klein hundstknoblauch.*Hyacinthus maior.*

Groß Hyacinct.



Alter Hyacinthus cum nullum habeat nomen a tempore quo primum apparet Hoinungsblüm, hoc est Februarij flos dicitur. Forte & hic Vaccinium appellari posset;

Tertium..

Tertius, isq; bipartitus, candidus scilicet, & purpureus Hyacinthus, Germanis *Holwurz*/Latinis uulgo *Aristolochia* rotunda nuncupatur.

Quartum Bauari *Sew zwibel*/hoc est, Cepam suillam uocant, teste Ol. 4. lingo. Is etiam asserit hoc Hyacinthi genus in auentacis provenire agris, & magnopere a suisbus quæri expeti, unde illi nomenclatura. Hic Hyacinthus una cum eo, cuius historiam capite lxxiij. persequemur, nostra sententia rubens est Vergilij Hyacinthus *in uirg.*, teste Dioscoride, Helonias, Porphyranes, Romanis Vaccinium dicitur, quod nomen ex recetioribus quidam Myrtillis, de quibus tertio agemus libro, attribuerunt, sicut nonnulli uocem Hyacinthi *Consolidæ* regali adscribere.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Omnium Hyacinthorum radices frigidae & siccae esse traduntur, sed temperate, in medicina omnes usum suum habent.

INTRINSECVS.

Dioscorides de Hyacintho suo in hunc modum scribit. Radicem intro sumptam urinam impellere, phalangiorumq; moribus auxiliari. Semen uero cum uino potum regium morbum discutere: quas facultates, maxime quod ad posteriorem attinet semini *Aristolochia* rotundae uulgaris inesse experientia certa didici.


EXTRINSECVS.

Radix cum uino albo pueris illita pubertatem coercet, & non patitur erumpere, Galeno & Dioscoride testibus. Huius radices in Theriaca Nicander quoque meminit.

De Aro. Cap. LXXX.

IN FEBRUARIO QVOQUE MENSE PROSILIT, maxime in apricis locis. Folia habet pulchra, uiridia, Betaceis pene similia, eaq; ut plurimum quaterna aut quina, inter quae do drantalisi fere & acutus assurgit caulis, uaginae frumentaceae in qua spica inclusa latitare solet, persimilis, qui ubi Aprilis mense hiare coeperit, purpureum ostendit pistillum, quem non aliter complectitur a lucerna lumen. Atq; hic Ari est flos, nam sub hoc pistillo capillitij instar fibrae quaedam enascuntur, ac postea ubi temporis progressu auctius euaserit pistillum, acinis quibusda uiridi colore praeditis in modum botri undiquaque circumdatur, qui Au-
1.
Ari primum
et uulgare genus

Aron.
Aron.



2.
Ari secundum
genus.

9.
Tertium Ari ge-
nus.

tumno appropinquante ru-
 bei euadūt sicut corallium
 pulchre rubens. Herba in fi-
 ne Maij mensis euanescit, so-
 lo usq; ad Autumnum re-
 manente quē diximus fru-
 ctu. Radix oblongæ capu-
 læ, aut oliuæ potius confer-
 ri potest, multis capillamen-
 tis fibrata, quæ & singulis
 annis instar Satyrionum de-
 cedit, altera succedente, hoc
 pacto namq; reuiuiscit A-
 ron;

Cæterum in ijs montib;
 qui non procul a Taber-
 nis montanis absunt in ui-
 nea quadam inueni Arum
 in magna copia, quod in-
 uolucrum, & pistillum ha-
 bebat ex albo luteolum, cæ-
 tera uulgari consimile.

Tertium Ari genus, ra-
 rissime flores profert. Folia
 huius nigris maculis resper-
 sa sunt, ueluti Satyriones
 quidam, necnō Persicaria,
 & Ranunculi nonnullæ spe-
 cies.

Proin omnia Ari gene-
 ra quæ nunc commemora-
 uimus, insigni acrimonia
 sunt prædita, ut quæ non
 aliter atque vrtica diutinas
 & miras in lingua punctu-
 ras excitent. Omnium uero

feruentissima est eius Ari radix, quod maculata habet folia, ita quidem ut
 integro die linguam semel gustata mordicer. Radices omnium Arorum
 dum teneræ sunt, lacteum succum stillant incisæ. Nascuntur omnes Ari
 species.

species in umbrosis locis, montibus, & dumetis, ubi uermes plerumq; morari consueverunt.

NOMENCLATURA.

Omnes uno consensu herbarij, tradunt eam herbam quam Germani ^{ap.} Aron uocant, Arum esse Dioscoridis, quod ille Lopham, Alimon, Thy- ^{Dioscor. lib. 2. cap. 157.} mon, Dracontiam, & Colocation cognominat. Mihi uero non Aron, sed ^{ap.} uideretur esse, propterea quod ueteres, Ari radicem non tantum magnam, sed etiam elui aptam esse scribant, quæ sane in nostro Aro minime reperias, quod radicem oliua haud maiorem obtinet, eamq; adeo acrem, ut edendo prorsus non sit. Qui sit ut ego ad Arisaron potius quam ad Arum has plantas referendas censeam. Sed iudicium esto penes candidum lectorem. Neque hic de cocta nobis Ari radice, sed de cruda sermo est: scimus namque quid de elixa Galenus lib. ij. de alimentis scribat.

Arum quod suggillata lituris folia profert fortasse exiguus Dracunculus fuerit.

Arum nonnulli Serpentariam, Colubrinam, Dracontiam minorem nominant, sed quod parum referre puto, licet hæ quoque appellationes ad alias quoque plantas pertineant, quemadmodum primo libro in historia Colubrinæ docuimus. Apud Simonem Ianuensem, Iarus, Barba Aron, & Pes uitulî dicitur. Nonnullis sacerdotis Virile, & Germanice Psaffenpint nuncupatur. De Aro plura Plinius lib. xxiii. cap. xvi. & Galenus de aliment. facult. lib. ij. cap. ultimo.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTUM.

Aros, calidus & siccus est, discutiendi & extenuandi, quo suis crassos humores facultate præditus, utrisq; corporis partibus salutaris.

INTRINSECVS.

Radix Ari, eius maxime quod maculata habet folia, siue sicca, siue recens, ac ad minus drachmæ pondere sumpta remedium est præsentissimum, ac minime fallax aduersus uenenum & pestem. Quidam tantundem adijciunt Theriacæ.

Succus herbæ expressus mensura cochlearis, aut maiore, potus, eandem habet facultates. Quod si illi parum aceti admiscueris, quo minus linguam uellicet efficit, ut idem de radice iudicium tibi sit.

Aron in puluerē redactū ac interdū drachmæ pondere cum binis Sacchari drachmis sumptū suspensiosis prodest, crassam enim & lentā pituitam inci-

dit, excreationes iuuat, pulmonum & pectoris uitia purgat, & ad tussim maxime est utilis.

Idem remedium stomachum phlegmate & atra bile infectum purgat.

Radix Ari siue recens, siue arida, tusa ac sumpta, mulieres à partu ualide purgat, potestq; hoc pacto & iumentis purgandis exhiberi.

Eadem succus expressus, & aqua distillata possunt. Tradunt etiam aqua Ari distillatam ramices sanare singulis uicibus binis uncjs, aut minori mensura potam.

EXTRINSECVS.

Ad pestem ac Anthracem uix præstantiorem ac salubriorem herbam noui, ac folia Ari recentia imposita, Eadem siue arida, siue uiridia, ad inueterata & putrida pedum ulcera faciunt.

Aqua Ari & succus, quæuis uetera uulnera purgat, sanatq;.

Ari folia cum radice in uino & oleo decocta, in fessionibus calidis fici sanant, & sedem procidentem retrahunt.

Nonnullæ mulierculæ folia Ari, caseis uermiculis scatentibus imponunt, qui sicut ab actis uermibus casei hac ratione à corruptione uindicati diutius durari possint.

De Dracunculo maiore. Cap. LXXXI.

OC BVLBI GENVS, CUIVS EFFIGIEM DEPICTAM exhibemus integrum uidere mihi non licuit, præsertim cum non satis nostris regionibus sit cognitum, & non ita pridem doctissimo uiro D. Othoni Brunfelsio ex Brabantia missum fuerit. Folia gerit satis longa, lataq; instar Lapatij uulgaris, ac aliquantulum inflexa rubris notis aspersa. Dicebatur autem racemum quendam luteum tandem proferre, sicut & Aron, qui fructus eius est, quod ita se habere uel tandè ipse uidi, posteaquam eius bulbi copia mihi facta, ac in hortulis meis plantata fuit.

NOMENCLATURAE.

Otho Brunfelsius cuius statim meminimus, persuasit mihi hanc plantam Dracunculum maiorem Dioscoridis esse, quem ille Draguntium magnum Aron, Isaron, Iaron, Hieracium, Biarion, Armigrion, & Cyperida nonnullis uocari tradit. Sed parum meo iudicio refert, siue Dracunculus, siue Aron censeatur, nam earundem fere sunt facultatum utriusq; radices, quæ propter a Serapione uno & eodem capite, nimirum xliij. Luf. hoc est, Dragontea,

Spaneria myda
Diosco. lib. 2.
cap. 155.

*Dracunculus maior.**Drachenwurz.*

gontea, Dracontion, uel
Draction: Iarus, hoc est,
Aron &c. tractantur: Apu-
leio ca. xiiij. Dracontea, Py-
thonion, Asclepias, Ancho-
manes, Sanchromaton,
Arifaron, Therion, Schæ-
nos, Dorcadion, Typhoni-
on, Crocodillion, & Colu-
brina dicitur.

VIRE AC TEMPE-
ramentum.

Dracunculus maior ut
Aron usurpatus omne ue-
nenum a corde pellit, pe-
ctus purgat, crassos ac len-
tos humores incidit, ac qui-
busvis internis prodest uti-
tjjs, venerem stimulat. Ex
his facile est colligere, calie-
dæ esse temperaturæ.

EXTRINSECVS.

Ex radice Dracūculi ma-
ioris, necnon folijs, olea,
unguenta, & emplastra præ-
stantissima conficiuntur, ad
sananda ulcera quæ uocant
Cacoethe, atque phagedæ-
rica, necnon fistulas, & pe-
dum maligna, depascen-
tia, ac serpentia ulcera.

Folia cum melle illita fa-
ciei maculas extergunt,

Succus expressus auribus instillatus dolorem sedat.

Folia uenenatorum animalium moribus imposita, uenenum extrahūt,
ac breui tempore partes affectas sanant. Alia quibus pollet facultates in-
historia Ari explicatæ sunt,

De Orchios, & Satyriuarijs generibus.
CAP. LXXXII.

Satyrium mas quorundam.
Knabenkraut.



MVLTA SANE OR-
chios & Satyri genera in
nostris regionibus nascun-
tur, quorum nonnulla, quę
nobis quidem obseruata
sunt ordine recensēbimus.

Primum itaque idemq;
uulgatissimum, Maio men-
se florens in pratis reperit-
tur, ternis aut quaternis ple-
runque folijs uestitum, Li-
lio similibus. Porro in du-
as species hoc genus, quod
ad florem attinet dirimis-
tur. Aliud namq; flore co-
mat purpureo, aliud niueo,
eoq; Aristolochiæ uulga-
ris flori confimili. Folia
utriusq; Februario mense
ē terra exeunt, aliquanto
Lilio angustiora. Quędam
ex his nigris maculis nota-
ta, uelut Aron, aut Auro-
ta, quod genus piscium tor-
rentibus syluestribus fami-
liare est, Germani Forzellen
uocant, apparent. Radices
harum plantarum, instar
nucularum quarundam,
ceretes, geminę, oliuis re-
spondentes, sed meo iudicio
rotundiores sunt, alte-
ra quidem inanis & rugo-
sa, &

Cynosorchis mas nostra quarto
loco a nobis descripta.



sa, & marcida, & quæ in dies decrescat, altera uero plenior, quæ quantum illa minuitur tantum quotidie maiori incremento augetur, quoad perfecta fuerit & absoluta, id quod Iunio sit mense, quo tempore altera plane euanescit. Post Autumnum, quæ de radice gemella superest pars, aliam gignit, candidam plane, instar Ciceris Arietini rotundâ. Atque hoc pacto quæ priorem decedentem exhausserat, aliamque ex se procreauerat, ea ipsa sequenti anno marcescit, recentiore semper superstite manente. Cæterum quæ de radicibus hoc loco diximus, ea in omnibus Orchiorum & Satyriorum generibus locum habent.

Alterum, folijs caule, & flore, antedicto consimile est, nisi quod radicem habet quæ formam repræsentat binarum manuum, non eo quo alias manum manui iungere solemus, sed in uerso ordine inuicem superpositarum, quarum recentior natu cum flore augmentum capit, altera marcescens

æ. Nascitur hoc genus Orchios in quibusdam pratis, & nonnullis graminosis montibus. Radices tam huius quæ superiorum testiculorum fere dulces sunt gustatæ.

Tertium

Satyrion primum Dioscori
 ridis nostra sententia.
 das iij Stendelwurz Menlin.



Orchis foemina, ad quartum or-
 dinē in nostra historia pertinens.
 das iij Stendelwurz Weiblin.



III. Tercium peculiare quoddam genus est, & a superioribus diuersum, licet caulem proferat ut illa teretem & mollem, folia item Lilio similia, radicesq;

Orchis foemina altera.
Creißblüm Weiblin.



cesq; gemellas & rotundas, sed magis exiguas, flore copioso, ac racemi instar coacto, foris spadiceo, intus uero candido & minutissimis maculis asperso plenum. Gaudet humo argilloso, nasciturq; tam in pratis quam montibus. Proinde Iunio mēse flores occipit.

Quartus Testiculus du- III.
 um quoque est generum, si
 florem, quem alius purpu- 1. 20
 reum prorsus, alius uero ex
 roseo candidum, purpu-
 reisq; ac exiguis maculis
 notatum profert consi-
 deres. Planta est omni ex
 parte satis magna, cuius
 uiridia & mollia folia Liliū
 fere referunt. Radices illius
 quæ succulentæ sunt & dul-
 ces binis oblongis auicula-
 rum ouis, aut ueteris galli
 gallinacei testiculis confer-
 ri possunt. Huc accedit ter-
 tium in hoc ordine genus,
 quod radices habet manus
 similes, ueluti & in primo
 genere audiuius. Atque
 hanc foeminam in hoc ge-
 nere censemus, propterea
 quod radix foemininum se-
 xum figura sua æmuletur.

Quintum Testiculi genus similiter bipartitum est, utrumq; folio uestitū
 Lilio simili, flore emicans purpureo prorsus, nec enim ullas ostendit litu- V.
 ras, coq; instar frumentorum in spicatum desinente cacumen. Quod in hoc
 genere.

Orchis quinta odorata.

das v, wol riechend Margendrehen.

VI.
Satyrion alterū
 Diosco. lib. 3.
 cap. 135.



VII.
 6 12

genere minimum existit su-
 auissimo commendatur odo-
 re, & ad Garyophylleam ac-
 cedente. Nascitur utrunque
 in asperis plerumque monti-
 bus subter Iuniperos terra
 forti & alba gaudens.

Sextus testiculus, qui &
 ipse isdem cum præceden-
 ti natalibus prouenit, radi-
 ce gemella, satis magna, bi-
 nas nuces myristicas re-
 presentante, dulci, succulen-
 ta, flore diuersicolore, nam
 constat is purpureo, luteo,
 & uiridi, qui tamen com-
 miscentur. Forma floris ita
 se habet, ut inferior illius
 pars crabronem, superior
 uero quæ capitulata & ala-
 ta quodammodo esse cerni-
 tur, auiculam repræsentet.
 Exiguum huius testiculi ge-
 nus (est enim & hic Testi-
 culus in duo distributus ge-
 nera, non quidem forma,
 sed magnitudine foliorū,
 caulium, & radicum, diffe-
 rentia) folia Allij fert, ma-
 ius uero Lilij.

Ceterū reperiuntur bina a-
 lia Satyrj genera admodū
 exigua, quorū flosculi auis-
 culas uolantes imitantur,
 coloris ex uiridi lutei. Cau-

les horum haud temere digiti longitudinem excedunt. Nascuntur partim
 in apricis montibus Iunio mense, partim uero Autumno apperente, in ul-
 iginosis campis & pratis.

Extant

Orchis sexta.

das vj. Margendrehen.



guis & rectus asparagus, forma uulgare Satyrion, colore lignum, uel fungos syluis familiares referens. Radicem habet, multo capillitio contortam, & implicatam, ueluti Valeriana, uel Elleborus niger adulterinus. Estq; hoc

Extant & alia bina in al. VIII. dissimilis syluis Satyrj gene^{1.} 2. ra, folijs uestita Colchici, radice prædita capillata instar Valerianæ, quo nomine a reliquis Satyrj & Orchid generibus dissidēt. Ex his aliud florē gerit candidum aliud roseo emicat, eoque filij seu seminū Raphani receptaculis similimo, nisi qd hic hiat, ac fatiscit, formāq; pileoli refert. Hoc flore decidente (quod idem de omnibus Satyrj & Testicularis, quorum descriptionē in hoc capite persequimur, intelligas uelim) nullum subsequitur semen, ut in alijs plantis fieri uidemus. Flore quidem decussso filij quæ quædam exiguae apparent, tenuissimo puluere refertæ, quæ & ipsæ una cū caule intereunt. Seruntur igitur Satyria & Testiculari non semine, sed radice, quæ quotannis renouatur ut diximus, & ex illa folia caules & flores prodeunt singulis annis alijs.

Nonum Satyrj genus in uliginosis & umbrosis syluis nascitur, Maio mense flore & folio uiduum. Est enim nihil aliud quam pin-

Satyrion exiguum.

das viij. vnd kleinſt Satyrion.

X.
Bifolium.Vnde Satyri-
ones primam ori-
ginem trahant
opinio Tragi.

Satyrion genus vitium po-
tius quoddam ex putri-
lagine enatum, quam planta
censendum.

Decimum acultimū no-
bis cognitum Satyrion
Aprili mense in uliginosis
densis ac tenebrosis dume-
tis, nonnullis etiam agro-
rum limilibus & quibusdā
pratis profilit, binis folijs
Plantagini latifoliae simili-
bus, per quæ rotundus as-
surgit coliculus, idemq; ue-
luti Plantago in cacumine
spicatus. Radix eius fre-
quentibus cirris ac capilli-
tis contorquetur. Euane-
ſcit hæc planta circa festum
Diui Ioannis Baptiste, nul-
lo post se relicto fructu. An-
no inſequenti e' radice bi-
na alia prorumpunt folia.
Sunt qui hanc Perfoliatæ
genus eſſe credant, Nec de-
ſunt qui Alisma eſſe statu-
ant, ſed perperam. Atq; hæ-
cenus omnia Satyriorum
& Teſticulorum genera or-
dine qua potuimus perſpi-
cuitate & breuitate perſtrin-
ximus, ſuper eſt, ut ad no-
menclaturas earum & fa-
cultates explicandas nos
conuerſamus. Sed anteq̃

eo ueniamus, operæpretium duximus, paucis commemorare, quid de pri-
ma iſtarum plantarum origine nobis uideatur. Non enim ex ſemine pro-
prio, ut noſtra fert opinio, hæc plantæ, primam originem ducunt, ſed ex
alieno

*Satyrium nonum.**desix. Margendrehen.*

alieno potius, hoc est, ex
 spermate Turdoru & Me-
 rularum. Cum namq; vere
 appetente antequam turdi
 terra nostra excedant, aues
 commiscuntur, mira uides
 as, maxime cum in Iunipe-
 rorum montibus, & pra-
 tis conuenerint, ita ut uerifi-
 mile sit ex spermate horu,
 si quando in terram forte
 deciderit, Satyriones pri-
 mum nasci. Nam quemad-
 modum ex historia illoru
 uidere est, tertio demum
 anno Satyriones omnes,
 primos proferunt flores,
 quos nullum ut diximus
 semen consequitur. Deinde
 constat Satyriones nusquam
 locitius prouenire, quam in
 montibus Iuniperorum &
 pratis, in quibus locis au-
 culæ eas suas querere asso-
 lent.

NOMENCLAT VRAE.

Quas hoc capitę plantas
 descripsimus, eas uno uoca-
 bulo Germani Margen-
 drehen uocant, propterea
 quod nonnullę earum folia
 maculata, ac lituris quibus
 dam sugillata appareant. *Testiculus.*
 Aniculæ aliās, quę plerun-
Theoph. lib. 10.

que variarum sunt peritæ artium Stendelwurz/ Znabenkraut/ & Creutz-
 blumen appellant. Theophrasto omnes sub *epixus* uoce comprehenduntur. *Diosco. lib. 3.*
 Dioscorides duo Orchios proponit genera, quorum alterum *uoris epixus* uo-
cap. 132.

Hunc Aegineta cat, hoc est, Testiculum canis, quod nomen nos quarto loco huius capituli
Triorchin uo- descriptæ plantæ attribuimus; alterum uero *αγναιδα* cognominari tradit,
cat lib. 4. cap. 41 ad quod quintum huius capituli Testiculum referimus.

αγναιδα τριπυλλου Post historiam Testiculorum Dioscorides Satyrion ponit trifolium, qd
Diosco. lib. 3. nos ad primum nostrum genus referimus. Huic subiungit alterum Saty-
cap. 134. rion, Erythronium, siue Erythraicon, Melian aqueum, Entaticon, Priapi-
 con, Satoryscon, Satorytesticulum, & Molorticulum veneris cognomina-
 tum. Hoc nobis id est Satyrion quod sexto loco descripsimus.

At quæ manus effigiem quod ad radicem attinet exprimunt, Foemellas
 Satyriorum esse iudicamus, uulgo Manus Christi, & Palmam Christi, &
 Testiculum uulpis nominât. Apuleius cap. xv. Panion, Serapion, Menem,
 Vram, Torminalem, & Testiculum leporinum cognominat.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Omnia Testiculorum & Satyrionum genera, quæ Germani Stendel,
 wurzel appellant, calida sunt & humida. Nec debent nisi necessitas id postu-
 lauerit intro sumi, Foris cataplasmatibus instar imponuntur.

INTRINSECVS.

Radices rotundæ & pleniores (sunt enim ut diximus nonnullæ vacuæ
 marcidæ & rugosæ) omnium Satyrionum, in cibo uel ecligmate usurpatæ,
 ad venerem stimulos addunt seniores.

Vtilis est hæc medicina ad conseruandum & augendum genus huma-
 num, modo rite & quo debet modo usurpetur.

Rursus aridæ & marcidæ Satyrionum radices venerem inhibent, quo
 nomine coenobitis qui castitatem uouerunt (ut hi loquuntur) utiles fue-
 rint. Paucos tamen in eo ordine hominum reperias qui id medicamentum
 expectant.

Radices plenæ in lacte caprino bibi possunt, aut cum albo pipere & mel-
 le instar Ecligmate confici ac assumi.

EXTRINSECVS.

Radices Satyrionis maxime eius quod odoratum esse diximus cum uino &
 melle decoctas, ulcera oris & quæcunque eius uitia sanant.

Radices eadem tusæ, & illitæ, inflammationes leniunt, tumores discuti-
 unt, ulcera fluentia purgant, sanantq; ueluti Aron & Dracunculus maior.

De Hyacintho Poetarum, seu Asphodelo offi-

cinarum, Germani Goldwurtzel uocant.

CAP. LXXXIII.

Hyacinthus Poetarum, alijs Asphodelus foemina.

Goldwurtzel / Heidnischwurtzel.



PLANTA HAEC, quam officinae Affodillū, & nonnulli alij Asphodelū nominant, radicem habet bulbaceam, ex pluribus coagmentatam, & quæ quodammodo tannis nouas subinde spicas seu nucleos gignit, nō aliter atque Croci radix. Forma sua Lilij (de quo altero ab hinc capite agemus) radicē prorsus æmulatur. Ex ea Maiorimense ap propinquante, teretes profiliunt caules, folijs rotatis illos ambiētibus, Plantagini similibus, sed uiridioribus & firmioribus seu solidioribus, per ambitum minime crenatis. Proinde si formam foliorum istorū necnon colorem consideres, haud possis ullæ aliæ herbæ commodius conferre quam uux lupinæ. Flores huius plantæ suauiter odorati sunt, & hi messis tempore erumpunt, ex roseo rubicantes, exiguis puniceis maculis notati, Lilio uulgarī de quo paulo post, aliquantulum mino-

DD ij

res. Foliolis constant singuli senis, ijsq; recuruis, e quorum medio sena, puenice coloris stamina effulgent. A flore Papaueri similia protuberant capitula, luteo ac lato semine referta. Plantatur hodie in hortis hic Narcissus, sicut alia quoque florum genera, uoluptatis gratia. Alias in altissimis syluis Heluetiorum, & ea quoque quæ Hercynia dicitur, nec non monte Tonitruui, quia Vuasgoia non longe abest, sponte sua prouenit.

NOMENCLATURAE.

Olim in ea sui sententia ut crederem præsentem plantam Asphodelum seu Hastulam regiam Dioscoridis esse. Sed cum Asphodeli descriptionem apud ueteres rei herbariæ penitus introspicerem, animaduerti nihil in Asphodeli historia esse, quod huic plantæ recte tribui posset. Ac posset fortasse Asphodelus uerus aliquando nobis innotescere, quod omnibus uotis Idem mecum sen-
tit Marcus Platearius. Cum itaque Asphodelus non sit, non uideo quo rectius referri possit hoc Liliæ genus, quam ad Hyacinthum poetarum, de quo Vergilius
Ægloga tertia ita cecinit.

Dic quibus in terris inscripti nomina regum.

Nascantur flores.

Huius & Ouidius meminit his uerbis.

Ipse suos gemitus folijs inscribit & u.

Flos habet inscriptum sine staq; litera ducta est.

Et alibi.

Litera communis medijs pueroq; uiroq;

Inscripta est folijs, hæc nominis illa querela:

Fabula de Hyacintho puero in florem nominis sui conuerso extat apud Nicandrum in Theriacis. Iam nullum sane noui florem, qui possit aptius Hyacinthus poetarum dici, quam hæc ipsa planta, quam Germani Goldwurtz/hoc est, Auream radicem, & Heidenisch blüm appellant, Dereliquis Hyacinthis supra plura diximus.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vires Hyacinthi superioribus capitibus cum de uarijs eius generibus ageremus explicatæ sunt. Ceterum est & hæc planta non contemnendi in medicina usus. Quod n. ad multa efficacissimè, experientia minime fallax edocuit.

INTRINSECVS.

Qui difficulter urinam reddunt, radicem in uino decoctâ bibant, prodest id medicamenti mulieribus quoque quibus menses impediti sunt. Eadem fere & de Hyacintho leguntur.

EXTRINSECVS.

E X T R I N S E C V S.

Omnes calidi abscessus & tumores radice Hyacinthi tusa, ac cataplas-
matis instar imposita, emolliiri possunt, præcipue uero mammarum, & ge-
nitalium tumores hac radice & emolliiri & sanari debent. Quidam radicẽ
ad eadem uini fœcibus prius conquoquendam tradunt, ac tum imponen-
dam.


Radix in cinerem redacta, cum q̃ melle temperata, ut unguentum fiat, il-
litu alopecias explet, Reliquas cum Lilio albo uires obtinet.

DAVID KYBERVS AD STVDIOSOS

rei herbariæ.

Verum Asphodelum primus monstrauit is Herbarius, qui anno supe-
riore Latinus ex officina Egenolphi in lucem prodijt, quo nomine laude sa-
ne dignus est, tam autor huius libri quam Typographus. Optime .n. meo
iudicio de uniuerso medicorum ordine, rei q̃ herbariæ studiosis omnibus
merentur, qui in id incumbunt, ut erroribus officinarum detectis, pro fal-
sis & adulterinis, genuinæ & quæ ueterum rei herbariæ scriptorum descri-
ptionibus respondeant stirpes, in posterum medicamentis adhibeantur.
Quanto enim cum errore, ne quid acerbius dicam, officinæ nonnullæ ha-
ctenus pleraque, maxime quod ad simplicia attinet, administrarint, manife-
stius est quam ut probari debeat. Proinde placuit nobis effigiem ueri Aspho-
deli, e prædicto exemplari mutuari, ac una cum descriptione Dioscoridis
in gratiam studiosorum rei herbariæ, hoc loco inferere, non tantum eam ob
causam quod Asphodeli in hoc capite ab autore nostro facta est mentio,
sed etiam ob hanc maxime, quod a doctissimis uiris tam ueteribus quam *Plinius. lib. 22.*
recentioribus, duo Asphodeli statuuntur genera, quorum alter fœmina ap- *cap. 22.*
pellitur, is nimirum quem hoc capite descriptum habes, alter uero mas di- *Leobardus Fuch*
catur, Latinis alias Hastula regia uocatus. Vt itaque utrunque Asphode- *sus cap. 40.*
lum simul habeant studiosi rei herbariæ, age proponamus, & figuram eius *hist. plant.*
& descriptionem Dioscoridis. Cæterum patientur pro summa sua huma-
nitate optimi uiri, Lonicerus inquam & Egenolphus, ut cum bona ipsorū
uenia effigiem Asphodeli mutuemus. Neque enim uideo cur nobis irasci
uelint, si unam ab ipsis desumamus depictam plantam, cum in Herbario
ipsorum quamplurima sint, quæ ex nostris hisce commentarijs desumpta
sint, quod illis nec inuidemus, nec in malam interpretamur partẽ. Si enim
doctissimis quibusq̃ uiris laudi, non uictio uertitur, quæcunque apud uete-
res hinc inde de stirpibus dispersa leguntur, in unum uolumen redigere, or-
dineq̃ meliore, ac maiori perspicuitate explicare, quod ætate nostra summa

Ἀσφόδελος.
Hastula regia.



cum laude fecit Ruellius, cuius institutum alij quoq; doctissimi viri secuti sunt, cur non idem nostro quoq; liceret auctori, præsertim cum eius sit candoris, ut quod aliorum est inuentum sibi non arroget, & patienter etiam ferat, quod non solum nonnulli ex suis multa desumant, sed etiam parum candide ipsius labores interpretehtur? Quem ad modum uero minime uituperamus eos, qui uerba ueterum auctorum in historia stirpium recitant, ita haudquaquam speramus indigne hos ferre, si uel unius plantæ delineationem ita mutuemus, ut interim nihil nobis, sed plurimum his, qui primi in agnoscenda eaherba nobis duces fuere tribuamus. Sed non erat opus pro re tantilla tot uerba facere, nisi calumniatorum, qui nihil nisi a se factum probare possunt, peruersitas nos coegisset.

Historia Asphodeli
 ex Dioscoridis lib. ij.
 cap. clix.

Ex uersione
 Ruelliana.

HASTULA REGIA uulgaris notidæ est, folijs maioris Porri, caule leui, ferente in cacumine florem, quem anthericon appellant: radices subiacent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres, quæ excalfaciunt, urinam

urinam & menses epotæ ciunt: lateris doloribus, ruptis conuulsis & tussibus, drachmæ pondere potæ ex uino medentur. Ea uero uomitiones adiuvat, ludricitali magnitudine commanducata: à serpente demorsis datur apertissime, uerum trium drachmarum pondere, folijsq; floribus, radice ex uino morsus illinire oportet. Item ulcera sordida & depascentia, mammarū quoque et testium inflammationes, tubercula, furunculosq; decoctis in fece uini bulbis, recentibus inflammationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto uetere uino dulci, Myrrha & Croco decoquitur, fitq; perq; utile oculis medicamentum: ad purulentas aureis per se, & cum thure, mele uino & Myrrha tritus, prodest, in contrariam aurem fusus, dentium dolorem mitigat. Cinis è radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum in excauatis radicibus igni decoctum, illitu exulceratis pernionibus & ambustis igni, conducit: & lurditati, instillatum in aurem, auxiliatur. Candidam uiriliginem linteo antea perfrictam in sole, illita radix emendat. Semen floresq; in uino poti, scolopendræ & scorpionum uenenis, mirum in modum resistunt, aluum purgant.

De Lilioruso, Germani Rotgoltgilgen uocant.
CAP. LXXXIII.

THVIVS PLANTAE RADICES BVLBOSAE SVNT,
E Lilio similes, punicei fere coloris. Porro singulæ earum quotannis unicum duntaxat emittūt caulem, eumq; cubitalem, ab imo usque ad summum multis perexiguus & angustis folijs forma Salicem representantibus, colore nigricantibus uestitum. Florem fert principio Maij mensis, Lilio albo similem, igneo colore, qualem prunæ ostendunt, si à longinquo spectes, præditum, inodorum, qui nullo post se relicto fructu aut semine (nam sola radice propagatur aut innouatur quotannis) tandem cunescit, licet primus inter omnia Liliorum genera ædatur.

NOMENCLATURAE.

Plinius & Dioscorides testantur Lilia rubra arte fieri posse, quod an uerum sit necne, nō affirmare poterunt, qui hoc experti fuerint. Neque satis nobis constat, an hoc Liliū genus quod Germani Rotgoltgilgen uocant, id sit quod Plinius rufum dixit. Hieronymus Braunschueig Narcissum uocauit, nec temere quidem, cum & Theophrastus ipse lib. vi. cap. vi. Lilia Narcissi uoce appellauerit, licet alio in loco seorsim de Narcisso agat. Proinde tot fere Narcissi extant, quot sunt rei herbariæ scriptores.

Lilium rufum.

Rot goldgilgen.



VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Crediderim equidem radicem huius quoque Lilij sicut & albi, maturandis & emolliendis quibuscuncq; abscessibus prodesse, Hodie uoluptatis tantum

tum gratia plantantur in hortis Germaniæ. Plura forte alia ad quæ faciat hæc planta, quotidiana experientia docebit.

De Lilio albo, Cap. LXXXV.

Weiß Lilgen.



QUEMADMODVM
rosam rubram ex sanguine
Veneris, qui ex pede eius
manauerat, aut ut alij dicunt
ex Adonidis pueri sanguine
nata: ita & Lilium à la-
cte, quod mamma Iuno-
nis lactantis Herculem in
terram profusum fuit, ori-
ginem suam traxisse fabu-
lantur Poëtæ. Hæc nempe
ueterum gentium deliria
sunt: Christiani sciunt Deum
Opt. Max. ut aliarum om-
nium, ita & huius plantæ
autorem esse. Est autem Li-
lium hoc, inter candidos
flores, in nostris quidem re-
gionibus elegantissimum,
nobilissimumq; si uel for-
mam uel odorem eius spe-
ctes. Floret plerumque Iu-
nio mense. Radice quam ha-
bet bulbosam, candidam,
quotannis intra terram aug-
mentatur, ueluti Hyacint-
thus, cuius altero ab hinc
capite mentionem fecimus,
uel Crocus. Radices singu-
læ multis constant nucleis,
iisq; folijs Sedi maioris qd
ad formam attinet simili-
bus. Hæ nucleis seu bulbuli

quarto anno pangi possunt, debentq; in terram deponi mediocriter p̄nā-
guem, nec omnino apricam. Nam in ijs locis qui soli plane expositi sunt, ra-
ro hi flores proueniunt, quin plerunque appetente Maio mense caules nul-
lo ædito flore marcescunt. Liliū bis in anno folia noua procreat, nimirū
in inijs veris, deinde uero Autumno cum flores cū caulibus emaruerunt.
Ea herbaceo nitent colore, tenera sunt, & palmea, & linguæ formam repræ-
sentant, aut folia Colchici, & nonnullorum Satyrionum, E singulis radici-
bus singuli enascuntur caules, iſq; interdum bicubitales, multis pinguibus
ac lingulas referentibus folijs ad uerticem usq; uestiti. Flores Lilij singuli
plerunque senis constant pinguibus, ac linguæ quoq; similibus, in rotundū
ita compositis folijs, ut campanulæ aut cymbali formam æmuletur unus-
quisq; flos, e cuius fundo senī iſq; lutei emicant apices, deinde & in illorū
medio, stamen quoddam, crassiusculum, uiride, caput obtinens triangulare
clauæ instar prominet. Folijs decidentibus proceri quos diximus caules
aliquandiu superstitēs manent, paulo post & ipsi nullo post se uel fructu uel
semine relicto euanescent, sicut & Liliū rubens, de quo superiori disserui-
mus capite. Caules intra terram depositi, solent nonnunquam Autumno
appetente inter foliola bulbos candidos progignere.

NOMENCLATURA.

Germani Weißgilgen / Latini Liliū, Græci λείων & λήριον, Hebræi
לשן Schoſchan appellant. Serap. Sufen ca. clxxxix. Auerrh. Alcostā uoca-
uit. Latini Rosam Iunonis ob causam supra commemoratam cognomina-
runt, aiuntq; Pani deo Arcadiæ admodum gratam fuisse. Lilij plura alia
apud Dioscoridem leguntur cognomina lib. iij. cap. cvj. uidelicet, Crinon
basilicon, Crinanthemon, gallirion, Martis sanguis, Aura crocodili, Sym-
phæphon, Tialon, Sasa & Abliblabon. De Lilio Plinius copiose egit libro
xxi. cap. v. & xix.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Liliū flore & radice ad calidam & humidam temperaturam accedit, in
medicina magni & præstantissimi usus.

INTRINSECVS.

Flores & radices Lilij raro intra corpus assumuntur. Quanquam aqua
distillatam pleriq; magnis laudibus efferant, ut quæ ad amissam uocem re-
cuperandam, & his qui animi deliquio uiribus labuntur, duarum aut triū
cochlearium mensura pota utilis sit.

Alij tradunt aquam Lilij distillatam inflammationi epatis, & hydropicis prodesse, fortum cum mitigatione doloris trahere, quo nomine mulierculis quam gratissima est, magnoq; in honore habetur.

EXTRINSECVS.

Oleum quod ex Lilio cõficitur ad quosvis leniendos dolores unice facit, calidos namq; dolores sedat, & igni ambustis medetur, necnon anthraci, si litu, sed & foliola florum locis affectis postquam oleo oblita fuere imponenda erunt.

Oleum lirinon induratos nervos emollit, necnon duritiem & tumore matricis, quo nomine obstetricibus magno usui esse potest.

Post flores Lilij radix commendatur, tertium locum recentia folia occupant.

Radix calido cinere tosta posteaq; tusa, ac cum oleo rosaceo temperata, ac cataplasmatibus instar imposita ambustis igni efficaciter medetur.

Radix Lilij cum melle tusa & illita, nervorum præcisionibus & luxatis auxiliatur, necnon uulneribus quæ in capite musculorum (teste Galeno) eueniunt.

Omnia capitis manantia, aliaq; maligna ulcera, maculæ cutis, inprimis uero faciei, hac radice cum melle subacta curantur. Quidam acerrum huic medicamini adiungunt, maxime ubi inueterata mala curare uoluerint, hoc enim pacto, ad omnia quæ exiccare postulant, efficacius redditur, asserente id Galeno.

Si cui ulcus aliquod obortum fuerit, in manibus præsertim, quod uitiũ Germani das mittel uocant, aut si quis inflammatione testiculorum laboret, is radices Lilij quantum uolet accipiat, ac cum Herba Hyoscyami, & farina hordeacea contundat, ac cataplasmatibus instar imponat, quod si fecerit, sentiet & inflammationem, & dolorem mitigari, durumq; tumorem emolli & leniri.

Quidam radicem Lilij in lacte caprino decoquunt, cum ad ea quæ diximus, tum uero ad duritiæ & tumores maxime mammarum, necnon ulcera genitalium.

Folia Lilij recentia, ignibus sacris, & atris pustulis opitulantur, ictibusq; scorpionum medentur.

Mulierculæ apices luteos qui ex fundo Liliorum prorumpunt magni faciunt, & ad nescio quæ usurpant, cum uero eiusmodi medicamen non omnibus usui esse possit, relinquamus illud tenellis ac molliusculis mulierculis. Nos interea radicis & florum usu contentos esse conuenit, Lilium odoratum Simeoni Sethi frigido capiti prodest.

De Ebulo. Cap. LXXXVI.

Attrich.



EXPOSVIMVS HA-
ctenus per aliquot capita
Bulborum historiam, su-
perest, ut ad hederas & ser-
pentarias plantas transe-
amus. Sed antequam eo no-
stra progrediatur oratio,
Ebuli historiam perstringe-
mus, qui quidem si uel for-
mam, uel odorem & facul-
tates spectes, nihil aliud est,
quam exiguus, brevisq; &
alsiolus Sambucus. Quæ
sit inter hunc & Sambucū
differentia, nemini ignotū
esse existimo. Sambucus si
quidem arborefcit, Ebu-
lus uero herbaceo generi
propius accedit, ut qui
quotannis tota sua substan-
tia marcescat, de mpra sola
radice, quæ intra terrā hinc
inde serpit, & digitalis est
crassitudinis, frigorisq; cō-
temptrix. Ea quotannis
Maie mense appetente ē
gemmantibus oculis tene-
ros emittit asparagos, qui
in rotundos tādē abeunt
caules, uiri quandoq; pro-
ceritatem attingentes, me-
dulla referti, utrinq; nī-
gricantibus & grandibus
uestiti folijs, graui odore
nauseosis, n̄sq; Sambuco per omnia similibus, acuno ē pediculo senis aut
septenis

septenis dependentibus, & sese mutuo respicientibus, qua ratione & folia nucis fere collocata uidere est. Iunio mense caules quos diximus umbellas gerunt ex candido leuiter purpurascens flore emicantes, eoq; odoratiore, quam sit Sambuci. Hic in acinos teretes, nigros, Augusto mense maturascentes abijt, quo tempore a tinctoribus & Ephippiarijs colliguntur.

NOMENCLATURAE.

Gentiles olim Ebuli acinos ad superstitionem, & Idolatriam usurparunt, his enim in Festis quibusdam Idola sua colorare solebant, hoc pacto numi na sibi placare uolentes. Postea Minium inuentum est, quo pari superstitione Deos suos colere coeperunt stulti homines. Huius rei Vergilius meminit in Gallo suo.

*Pan Deus Arcadiae uenit quem uidimus ipsi,
Sanguineis Ebuli baccis minioq; rubentem.*

His superstitionibus non tantum gentes ante multa saecula imbuti fuerunt, sed & hodie etiamnum, inter eos qui Christiani sunt nominis, qui Idola sua, effigies inquam ac imagines ex ligno, lapide, alijsq; rebus confectas, diebus festis ornare, ac nescio quibus superstitionibus colere consueuerunt. Quasi uero his nugis uel Deus, uel immortales spiritus delectarentur, aut quasi non sit extrema stultitia, non cogitare in mente sua, ut Prophetæ uerbis utar, neq; cognoscere, neque sentire, ut dicas Medietatem eius (ligni scilicet de quo Idola fabricantur) combussit igni, & coxi super carbones eius panes, coxi carnes & commedi, & de reliquo eius Idolum faciam, & ante truncum ligni procidam &c. Sed hæc quidem superstitiones, a gentilibus primum ortæ, in Ecclesiam tum inuectæ fuere, cum Pastores & Episcopi dormitare, & sua tantum querere coeperunt. Cæterum relictis his nomenclaturas huius plantæ tandem explicemus. Dioscoridi ergo *χαμαίαντα*, Heliosacte, Dio. lib. 4. Agria acte, hoc est, agrestis Sambucus (Germanice *Feldholder*) Euboica, cap. 168. Ducone, Olma, Latinis Ebulum, Germanis *Altich* appellatur. Meo iudicio non inepte Sambucus æstiuus, seu alsius dici posset, Germanice uero *Summerholder* & *Heilender*. Theophrastus lib. iij. de historia plantarum cap. xij. Sambuci tantum, Ebuli nullam facit mentionem. De Ebulo Plinius lib. xxv, cap. x. & lib. xxvi, cap. vi. Apuleius cap. xci. plura.

VIRESC. TEMPERAMENTVM.

Ebulus temperamento suo calidus est & siccus, ideoq; aquæ cutem subire incipienti, & frigida tussi utilissimus.

INTRIN.

INTRINSECVS.

Teneri & recentes Ebuli turiones in vere decocti, inq̃ cibo sumpti, alui emolliunt citra periculum.

Caules teneri quorum nunc meminimus uino decocti, adiecto melle, ac per aliquot dies poti, frigida & sicca tussi profunt, uicia pectoris purgant, & quosuis crassos lentosq̃ humores incidunt.

Radix Ebuli folijs efficacior est: ea singulari experimento hydropicis in uino decocta, mane & uesperi potanda exhibetur.

Idem nonnulli aquæ distillatæ tribuunt. Sed quo maiorum sit uirum, eo largius potanda fuerit.

EXTRINSECVS.

Aqua Ebuli distillata anginae gargarizatu opitulatur.

Idem possunt folia in aqua decocta. Quod si illi decocto pyrethrum adiungas ad humectam supra modum columellam faciet.

Ebulus uuluas emollit insidentium decocto: patefacit earum spiracula, & uicia corrigit. Folia Ebuli dolores calidæ podagræ mitigant.

Folia Ebuli per noctem in aqua uel macerata, uel cocta, si eo decocto locus aspergatur pulices & mulcas enecant.

De Chamæcisso. Cap. LXXXVII.


AD SERPENTARIAS ERGO HERBAS TANDEM VENIO, quarum haud postrema ea est quam Germani Gündelrebb uocant. Hæc plerunque in hortis, iuxta etiam sepes & muros, toto anno uegeta reperitur, non aliter atq̃ alia Hederarum genera. Mense Aprili purpureis uiolis emicat, quæ nullo post se relicto semine & fructu protinus decidunt. Caules huius plantæ quadrati sunt, ac undiq̃ rotundi maluaceisq̃ foliolis uestiti, q̃s q̃ subhirsutis, perq̃ ambitum instar Beroniæ crenatis, admodum odoratis, gustu uero ad amaritudinem quandam uergentibus. Hæc Hedera humili statu contenta est, nec alta petit, sed semper humi inter alias plantas serpit.

NOMENCLATURAE.

Generosus Comes, Dominus Hermanus de Neuenare, putauit hanc Elatinen, simul & Chamæcisson esse Dioscoridis. At quæ uera sit Elatine primo libro, cap. lxiij. supra docuimus. Proinde quam Germani Gündelrebb

Chamæcissos, seu Hederaterrestris.

Grundtreb / oder Gundelreb.



reb, aut Grundtreb / hoc est, humi repentem uiticulam appellant, uerus est
 Diosco. *xapavios*, qui & Chamæleuce, Cissos acarpus, Terræ coronæ, *cap. 123*
γίαν, Selinitis, et Hederæ pluuiaticæ apud eundē cognominatur. Hic uero
 nonnulli

Diosco. lib. 4.

nonnulli clamabunt, scio, descriptionem Chamæcissi apud Dioscoridem huic plantæ minime quadrare, posteaquam non solum folia dicatur habere longiuscula, sed etiam flores gerere violæ albæ simili. His ita satisfaciendum censeo: primum facile potuit erratum committi uitio scriptorum, ut pro *μυγώρινα, μανγώρινα*, quæ lectio hodie extat, scriberent. Recipiatur ergo ea lectio quæ rei ueritati magis fauere uideatur, hoc est, legamus *μυγώρινα* & res erunt omnes saluæ. Iam quod Dioscorides Chamæcissum flores habere *λευκοῖς ὁμοῖα* hoc est, violis albis similes, non euincit, albas autorem significare uoluisse, violas, cum constet sub Leucoñ uoce non solum albas sed & rubras, & purpureas & luteas violas, & si quæ sunt alia genera comprehensisse. Adde his quod tam flores quam folia huius nostræ plantæ amaritudinem manifestam obtinent, ut uel hinc satis appareat, eam Chamæcissum esse, eiq; descriptionem adamussim respondere.

Sunt uero nonnulli alij, qui Asclepiada uocari uelint, quorum error manifestior est quam ut refutari debeat. Nos primo libro quæ uera sit Asclepias diximus. Serapio cap. xli, sub Cusso eius mentionem fecit, & cacos nominauit.

VIRES AC TEMPERAMENTVM:

Dioscorides duo Chamæcisso suo tribuit, primum quod tricenis quædragenis uē diebus in aqua decoctus & potus, Ischiadicis prodest, deinde uero quod senis aut septenis diebus bibitus regium morbum purget. Ego, si hac herba uti statuissem, uino potius decoquerem illam, atq; sic eam potarem. Recentiores medici ad uarias illam usurpant passiones. Temperatura sua calida est & sicca.

INTRINSECVS.

Sunt qui asserant folia Chamæcissi in aqua decocta & pota dysenterię prodesse.

Eadem uino decocta & pota, urinam & menses ciunt, uenenum & regium morbum expellunt, obstructions epatis & lienis soluunt. Eadem aqua distillata tribuunt.

EXTRINSECVS.

Folia Chamæcissi uino aqua uē decocta, exulcerationi uitijq; colli & faucium gargarissata conducunt. Hoc decoctum scabiei alijsq; oris & locorum muliebrium uitij medetur.

Succus Chamæcissi, fistulis alijsq; id genus malis purgandis, maxime prodest.

De

De Hedera. Cap. LXXXVIII.

Æphem.



D VO APVD NOS HEDERAE GENERA NASCVN-
tur, quorum alterum, nimirum maius, acinos nigros & rotun-
EE

1.
Hederula.

2.
Hedera.

dos profert, alter sine fructu in syluis profilit, folijs nigricantibus, angulosis cum plurimum in triangulam faciem exeuntibus, imaq; subientibus, & per terram muscumq; uagantibus. Hæc Autumno appetente auersa parte punicant. Solet uero istud Hederæ genus admodum exiguis radiculis seu filamentis potius proxima quæq; amplecti, non aliter atq; Polypodium. Quod si arbores attigerit, alta petit, easq; perstrictu suo ad cacumina usq; circumdat, ac multiplicibus radiculis caudicibus earum pertinacius nonnunquam hæret, ut uix ab illis diuelli possit. Vbi ergo cacumina arborum Hedera occuparit, mirum in modum superbire, ac in ramos plurimos longe lateq; sese diffundere occipit, ac si suis uiribus ad tantum fastigium ascenderit. Tum & foliorum formam mutat, ita ut quæ prius angulosa extiterint nunc in oblongum cordis instar rotundentur. Posteaquam uero per annos aliquot maceris, muris, arboribusq; tortuoso reptatu implicata minimeq; læsa adhæserit, in flosculos exit pallentes ueluti *ἀμπελὶς ἀγρία*, qui in acinos nigros, Iuniperorum baccis similes abeunt. Recensuimus quam paucissimis omnem Hederæ historiam, ex qua id facile animaduertere licet in nostris regionibus nullum fere inter utranque, Hederulam inquam & Hederam discrimen obseruari posse, nisi ætatem ipsam. Omnis namq; Hedera, dum in tenera sua ætate assiduo reptatu per terram uagatur, triangularis figuræ folijs spectandam se præbet. Quamprimum uero arbores murosq; inuasit, ilico foliorum figuram uariat, quemadmodum diximus. Hanc rationē proculdubio obseruauit & Theophrastus. Is enim posteaquam lib. iij. cap. xviij. uaria Hederarum genera enumerasset, tandem inquit, *τρία δ' ὅντων γένεταί μάλιστα* (supple γόνι) *ὅ, τελευκός, καὶ ὁ μέλας, καὶ τὸ γένος ἡ ἡλίξ.* Hoc est, Triæ ergo apparet esse summa (Hederæ scilicet) genera, album scilicet, nigrum, & tertium appellatur Helix. Ac inter cætera quidem non dissimulat idem autor prædicto capite lib. iij. maximam Hederarum differentiam in ætate ipsarum positam esse. Rursus sexto libro cap. ij. in duo genera redigit Hederas, cum ita scribit, *καὶ γὰρ μὲν αὐτὴ γόνι διακρίνεται, τὸ μὲν ἄγρον, τὸ δὲ βάλαν.* Quo loco dissimulandum non est, lectionem Theophrasti hoc loco deprauatam Ruellio uideri, illiusq; sententia pro *καὶ μὲν* legendum *καὶ γὰρ*. Rationes huius lectionis immutatæ in commentarijs de natura stirpium lib. j. ca. lxxxvij. ipse Ruellius recitat, quem uidere poteris, nos ad nomenclaturas pergimus.

NOMENCLATURAÆ.

Quantum Plinius lib. xxiiij. cap. x. Hederæ genera xx se demonstrasse scribat, tamen lib. xvi. cap. xxxiiij. duo prima Hederæ statuit genera, marem scilicet & foeminam, quod idem Theophrastus quoque libro tertio capite fecit. His addit Plinius plures alias horum generum species esse, quarum.

quarum discernicula in folijs, colore, & fructibus posita sint, quemadmodum supra quoque docuimus. Hederam Germani *Æphew* uocant, Hebraei teste Aruch Monstero *סוסק* Kassus, Serapio Cissum appellauit, cap. xli, quo loco Cissum legendum puto.

Iam ut particulatim & de speciebus Hederæ quas proposuimus aliquid dicamus, appellatur prior, minima scilicet, & quæ humi semper repit *χαμαῖς* est discrimen in *ἡρώς*, hoc est, Hedera terrestris (quod nominis commune habet cum ea planta quam superiori proximo capite descripsimus) alijs *ἑλξ*, Clauicula, & *ἑλξ* *ἡρώς*, nam derula, Germanis *flein* *Æphew* hoc est, Hedera exigua nuncupata. Altera, hoc alterius fructu uulgaris nimirum, quam Germani *gemein* *Æphew* uocant, Dioscoridi lib. i. *ἡ. ca. clxxi.* *ἡρώς ἡρώς*, & a luteo fructu *χρυσόκαρπος* dicitur. Ac quoniā olim uide Diosc. lib. i. coronis Hederaceis Bacchus cultus fuit, aut quia Liber pater prim^o coronā cap. iii. illud uen ex Hedera factam sibi imposuit, ideo Hederam Bacchicam, Nyssiam & Di- ro ad Hederas ut onysiam cognominant. Dicitur & quibusdam *ἀσπλύνος*, quod ad splen facia diximus pertis at, necnon *ποιντικὴ*, quod hac Poëtæ olim coronabantur. *net.*

Theophrastus Hederam acinos seu corymbos ferentem, *κορυμβία*, & *ἀχαρ* Pastores Hedera *ῖνδεν ἀρδωόμηνος*, exiguam uero, quæ illi & *ἑλξ* dicitur, quæ appetente Autum crescentem orna no, colorem uarium acquirit, *βραβία* cognominat. *te poetam.*

VIRE S AC TEMPERAMENTVM.

Folia & acini Hederarum, nunquam nisi summa necessitas coegerit introsumi debent. Inprimis uero mulierculæ ab hac planta abstinebunt, nisi consultores boni uti illa iubeant. Est enim inconstans & contraria Hederarum natura, nunc frigida & sicca, alias calida & sicca, interdum etiam humida.

INTRINSECVS.

Flores Hederæ arefacti ac in puluerem redacti, drachmæq; pondere e ui no poti, dysenteriae opitulari traduntur.

Folia uino decocta & pota, menses impeditos euocant, ut idem de acinis in puluerem redactis, ac usurpatis tibi pollicear.

Acini Hederæ tusi, ac pondere drachmæ in uino sumpti, calculum expellunt, experientia id attestante.

EXTRINSECVS.

Folia Hederæ cum aceto decocta, ac lieni imposita, dolores eius sedant. Folia uino decocta omni ulcerum generi sanando illinuntur, quæ & ex decocto hoc utiliter colluuntur.

Hoc decocto insidentibus menses ciuntur. Idem corymbi triti & subditi præstant.

Succus foliorum instillatus, putrida tædia narium graueolentiamq; emendat. Idem & ambustis igni medetur.

Folia cum aceto contusa, admixto modico rosaceæ aquæ distillatæ, unice contra dolores capitis ueteres faciunt. Succus Hederæ capillos denigrat, illitur.

De Volubili maiore & minore.

CAP. LXXXIX.

VO VOLVBILIS GENERA PASSIM IN GERMA-

^{1.}
Volubilis maior.

D. nia nostra reperiuntur, quæ ordine describemus. Maior iuxta sepes maxime prouenit, easq; rependo, ac conuoluendo sese, ad fastigium usq; ascendit, non aliter atq; Lupulus. Hæc in tenera sua ætate lætæum incisa reddit succum, radicem habet candidam, & fracidam quemadmodum & Lolium, & quæ longe lateq; intra terram sese ita diffundit, ut eiſci uix possit, ubicunq; enim eius uel minima portiuncula in terra remanserit, ilico nouos emittet asparagos, eosq; teretes, id quod fit Aprili mense. Folijs uestitur teneris, elegantibus, molliusculis, uulgaricq; Hederæ pene similibus, Iunio mense appetente, candidi, teretes, ac cymbala imitantes calathi apparent, quibus decidentibus, semen profert in folliculis nigrum, angulosum, ac Orobo persimile. Hulus plantæ tam foliorum quam radicis sapor ad amaritudinem quandam inclinat, ac facile uomitiones excitat.

^{2.}
Volubilis minor.


Volubilis minor, radice, coliculis rotundis, folijs, & orbiculatis ac campanulam referentibus floribus, maiori plane respondet, nisi quod per omnia magis exigua, tenuior & breuior existit. Cæterum nonnullæ eius generis campanulæ candidæ sunt, aliæ rosæ, ac puniceis lineis per totum florem ductis, pictæ. Nascitur hæc Volubilis in aridioribus pratis, & in hortis, singulari fruticum & herbarum cum damno, quascunq; enim circumuoluit, eas in terrâ deprimit. Difficile est enim hanc exterminare, propterea quod tenuissimæ ac candidæ eius radiculi ima terræ profundissime subeant, penetrentq; ac nullo negotio radiceantur, nouosq; subinde procreant asparagos, sicut Lupulus.

NOMENCLATURÆ.

Germani priorem a forma florum Weißglocken/hoc est, candidam campanam, alteram Klein schellen/oder glocken/hoc est, paruam campanam uocant, utramq; uero communi uocabulo Winde/ a conuoluendo nominant.

Volubilis maior.

Weiß Windeglocken.



iiiij. descriptam. Alij Periclymenon esse dictitant, nonnulli Smilacem leuem, cap. 15.
Inter has opiniones prior mihi magis arridet, eam & Ruellius uir unde
quaq; doctissimus lib. iij. de Stirpium natura, cap. lxxx. sequitur.

nant. Latini Volubilem
maiolem & minorem di- *Auicenna cap.*
cunt. Et maior quidem ea *735. lib. 2. Funem*
dubio procul est quam Me- *Papauerum ap-*
suas cap. xxiij. in Simplic- *pellat, uel ut ali-*
bus Funem arborum, (qd *habent paupere-*
est, si Germanice interpre- *rum, Germanis*
ris Seilbaum) nuncupa- *Berleseyl.*
uit. Alij Cymbalarem &
Campanellā uocant. Otho
Brunfelsius Volubile Ciss-
sophyllon, aut Cissampe-
lon esse existimauit. At si di-
ligentius rem pensitare ue-
limus, sane Cissophylli ap-
pellatio proprie ad Asclepi-
ada pertinet, uide Diosco-
ridem lib. iij. cap. xcviij. qd
caput quidam ad Hederā
terrestrem, cuius altero ab
hinc capite meminimus re-
ferunt. De Cissampelo sub
Parietaria, quam Oribasius
Helxinem interpreta-
tur, (uide supra lib. i. cap.
vi. & Diosc. lib. iij. capite
xxxviij.) dictum est satis.
Plinius Volubilem maio-
rem Conuoluulum uoca-
uit lib. xxi. cap. v. eiusq; flo-
rem non inepte Lilio albo
confert. Alij conabantur
mihi persuadere Volubile
sub Clematide altera apud *an aqua triph.*
Dioscoridem cap. viij. lib. *Diosco. lib. 4.*

Volubilis minor.

Blein weiß Winden/oder glocken.



Proinde si omnino quid sentiam effari liceat, uideatur mihi sane hanc plantā Scammoniae (quæ Dioscoridi Colophonía, Dactylion, Colophonium, Apopleumonos, & Sanilum cognominatur) genus esse syluestre, sed non noxium, quale est Scammonium, quo officinæ magno cum egorum in nostris regionibus, quibus plus officit quam prodest, damno utuntur. Quamobrem ego quidem omnes eas compositiones, quibus hæc us & uenenosus Scammoniae succus, à Mesua Dominus Lacticiniorum appellatus, admiscetur, tanquam uenenum præsentissimum fugio, uitoq. Causam multū in se experti sunt, et nos in plerisque uidim⁹. De his qui plura cognoscere desiderat, is libellos D. Symphoriani Campegi de cribratione medicamentorū legat, Scammonis paucis meminit Theophrastus lib. x. cap. xxij. Plinius lib. xxvi. cap. viij. proluxius de ea agit. Serapio harum plantarum cap. xli. mentionem facit.

Et hæc quidem de appellationibus Volubilis maioris dicta sint: nam minor, quæ nihil aliud est quam angina & pestis hortensium herbarum Volubilis, seu Cymbalaria minor appellatur, neque enim est Cissampelos, nec

VIRES

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Quanquam his plantis apud nos nihil sit uulgarius, tamen raro in medicina usurpantur. Nostri Emperici, semine maxime ad stranguriam utuntur, alij aduersus eundem morbum herbam decoquunt, eiq; decocto infundere, uel in solio calido in quo sit decocta usurpandam hanc herbam tradunt. Potest uero & intro sumi citra periculum, licet calidæ sit naturæ, nam foliū eius linguam gustatum cum amaritudine uellicat.

INTRINSECVS.

Seminis duodecim aut sedecim grana tusa cum uino aduersus stranguriam exhibentur.

Aqua è floribus albis distillata, pota uel in linteolis foris imposita, quales uis internas & externas inflammationes mitigat.

EXTRINSECVS.

Aqua è floribus albis distillata, rubentibus, ac inflammatione laborantibus oculis, indita, uel foris imposita unice prodest.


Folia utriusque Volubilis in deflectionibus, & solijs calidis, aduersus stranguriam & calculum faciunt.

De Nummularia. Cap. XC.

IC VERO SERPENTARIAM ILLAM VERAM HABEMUS, quæ plerunque in pratis, & hortis humectis colibus, & syluis graminosis prouenit. Ea tanquam anguis latens subter alias plantas humi repit, terræ exiguis radiculis, seu fibris aut filis potius sese alligans. Folia utrinque ex ordine coliculo tenuissimo adnascuntur, rotunda, obolo, aut nummo nequaquam latiora. Florem hæc planta fert Maio mense auri coloris, Ranunculo luteo similem. Proinde toto anno uegeta ipsa herba reperiri potest.

NOMENCLATURAE.

Reptantem hanc plantam Germani *Schlangenfraut*/hoc est, Serpentariam minorem, & *Egelfraut*/id est, Hirudinariam, quod passim terræ Hirudinis instar affixa sit: necnon *Pfenningfraut*/hoc est, Nummulariam

Numularia**Egelkraut.**

a' foliolorum forma uocant. Posset & Wundkraut hoc est, Vulneraria herba appellari, ob insignes quas in uulneribus percurandis facultates obtinet. Nonnullis Centummorbia dicitur.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Inter eas herbas quae uulneribus medentur, haud potissima est Centummorbia. Non solum externis & recentibus uulneribus sanandis prodest, sed etiam interanea uulnera & ulcera potissimum pulmonis sanat, experientia id attestante minime fallaci. Facultatis est astringentis & desiccantis.

INTRINSECVS.

Centummorbia cum uino & melle decocta & posita, pectoris & pulmonis exulcerationes sanat, tussientibus ergo & suspiriosis ea medicina exhiberi debet, necnon infantibus arida tussi laborantibus, qui per aetatem alia pharmaca accipere non ualent.

Quidam herbam eam cum aqua & Saccharo ad easdem affectiones decoquunt, Qua ratione etiam ad dysenterias & mulierum uicia facit.

EXTRIN

EXTRINSECVS.

Multa equidem uidi uulnera admodum maligna & periculosa hæc herba sanari. Vulnera uino in quo hæc herba decocta fuerit utiliter lauantur, quibus & folia ex decocto desumpta, deinde imponi debent.

Aqua distillata huius herbæ earundem est uirium.

Hæc herbam serpentes proculdubio nobilitauere, ea enim si uulnerentur sibi mederi compertum est, cuius rei nonnulli qui hoc uiderunt & obseruarunt, grauissimi extant testes.

De Androsace. Cap. XCI.


ANDROSACES, VEL UT VVLGO VOCANT CV
A scuta, in segetibus Lini & hortis non acceptus est hospes, propterea quod cacuminibus stirpium impendens, humi eas deturbet, ac gratitudinis omnis oblita, propriam parentem suis laqueis strangulat. Eius duo passim extant genera, candidum scilicet & rufum.

Candidum nonnullis aridioribus pratis ualde familiare est, in quibus *Androsaces candidum.*
gramen, fastigia illius scandens, instar telæ aranei obducit, ut in altum egresse sese attollere possit herba. Rufum quoque uertices plantarum petit, nam *Androsaces rufum.*
sepes crebris uoluminibus assiduoque reptatu ascendit, conuoluitque, non sescus atque Lupulus. Quod si plantas alias apprehenderit, sane comas illarum ita complectetur, ut nihil aliud quam iniuriam ferre, non culpæ oporteat irretitas plantas. Androsaces uorticis adnatum omni reliquo in medicina præponitur, nam hepaticis & Ictericis prodesse unice traditur. Est autem Androsaces nil aliud quam implicatum & inuolutum reticulum, multisque filis aut capillamentis miræ longitudinis perplexum, fructu suo minime destitutum. Nam in fine Iunii mensis rotundos profert acinos, semine perexiguo, ac Argemonæ, seu erratici Papaueris simili, ex quo ubi in terram deciderit, quotannis sponte sua repullulascit, refertos. Planta hæc uiridis adhuc gustu ad amaritudinem inclinat, radicem habet prælongam, quam non multi, scio, obseruarunt. Solet autem e terra prodire Androsaces Iunio mense, quo tempore magnæ muscæ uolatu suo omnia complent.

NOMENCLATURÆ.

Sed quonam ingratissimam omnium plantam, quæ per se subsistere nequit, sed auxilio, & adminiculo stirpium quibus adnascitur opus habet, referemus? Ac primum quidem negari non potest, eam in hortis nequaquam

Androsaces, uulgo Cuscuta.
filizfrant.



Dioscor. lib. 2.

cap. 131.

Diosco. lib. 3.

cap. 141.

utilem sed damnosam esse, qua de causa à quibusdam Podagra lini, & Angina lini appellata fuit, & recte quidem, cum utriusque herbarum, cuiusmodi sunt urticae, Cardui & Lappae, accenseri possit. Præterea quod Orobancha Dioscoridis non sit, manifestius est, quæ ut demonstrari debeat. Meo autem iudicio, non inepte quis fecerit qui illam *Androsaces* in Dioscoride appellari dixerit, quod alij *Androsaces* alij *Androsaces*, alij *Androsaces* cognominant. Huius sententiæ olim fuit Antonius Musa, et Euricius Cordus. Proinde cum Epithymo hæc planta adeo consimilis existat, ut uix aliud, sane aliter appellare non possum quam Epithymon. Quæ quidem uerba non de eo quod super Thymum duntaxat nascitur, sed de eo quod hoc capite descripsimus intelligas uelim. Nam non solum scilicet Epithymus, seu ut ante diximus ueluti tela aranei plantarum cacuminibus imminet (qua ratione soror Epithymi hanc nostram herbam esse iudico) sed etiam

pro Epithymo utiliter usurpari potest, quod non semel ego obseruavi, potissimum autem id quod urticis urentibus adnascitur. Hæc nostra est sententia, quam non ideo proponimus, ut cuiquam erroris ansam præbere uelimus,

mus, sed ut nostro exemplo alios cohortaremur, quo diligentius de stirpibus earumq; genuinis nomenclationibus aliquando cogitarent. Sunt qui Involucrum, Gringum & Cuscutam appellant. Serapio cap. xxxix Chasuth uocauit, Germani Seiden/Todtern/Silztraut/& Glachsfeiden nominant. Ruellius in ea est sententia, ut putet eam Cassyram esse Plinij, eam q; uocem in Cassutham ac demum in Cuscutam abiisse.

Ruellius li. 2. de
nat. stirp. cap.

131.

Plinius. lib. 16.
cap. ult.

VIRES AC TEMPERAMENTYM.

Quamquam mulierculis linum colentibus hæc herba uisita sit, tamen in medicina ualde commendatur. Estq; magis calidæ & siccæ temperaturæ, quam frigidæ, teste Constantino de gradibus. Licet ea quæ vrticis adnascitur calidior sit, quam quævis alia.

INTRINSECVS.

Quicumque ab atra bile proficiuntur prauis humores, hac herba emendari possunt, ut idem de morbo regio, & hydropic intelligas, hæc enim Epithymo a Dioscoride ascribuntur.

Manipulus huius herbæ uino decoctus & potus, obstructions epatis & lienis soluit, morbum regium sanat.

Aqua distillata Cuscutæ ad eadem magno experimento adhibetur, per aliquot dies mane mensura iij. aut v. ligularum calida pota, admixta eiisdẽ mensuræ aqua Absinthij distillata, ita tamen, ut potionem sumpta, probe te contegas, sudoremq; elicias.

Qui malas illas pustulas morbi, ut uulgo uocant Gallici, sanare uolunt, ij aquam Cuscutæ distillatā magno in honore habeant, nam insignem obtrinet expultricem facultatem, & sanguinem purgat manifeste, & uenas a prauis humiditatibus, unde tertianæ oriri solent febres asserit, maxime in pueris, teste Constantino.

EXTRINSECVS.


Cuscuta in fomentis, deflectionibus & balneis sudatorijs, ad quasuis melancholicas affectiones, regiumq; morbum inueteratum, præstantissima habetur.

De Lupulo. Cap. XCII.

VPVLVS QVI IN GERMANIA PASSIM PROVENIT, quum quoque est generum, satius inquam, & syluestris.
Sarius

Lupulus.
Hopff.

Lupulus sativus



Satius magna cura plantatur, in ijs potissimū Germaniæ partibus, quibus ut num natura negavit, quæ ut foelicius, & maiori copia Lupulum, in hortis et agris huic plantationi destinatis consequantur, solent admodum proceros palos terræ insigere, per hos hispidi Lupuli, ac prælongi caules nō aliter atq; Smilax horten- sis reptando ascendunt. Maio mense dimidia ex parte exacto asparagos suos Lupulus mittit, eosq; teretes, puniceos, folijs uli- duos, qui si proceritatem uiri consecuti fuerint, alpe- riusculi, ac spinulis quibus- dam toti horriduli euadūt. Actum quidem prodeunt et folia, similiter horrida, ternis diuisuris, ac nonnun- quam quinis dissecta, nigri- cantia, folijsq; Rubi simi- lia. Iulio mense appetente adulti iam Lupuli caules in cacumine flores ex luteo cādicantes, cōferctim stipa- tos, ultri pene similes, sed ple- niores et maiores proferūt. Ex his flosculis molles & quasi inanes, leues, ac squa- matim cōpactiles multi fol- liculi (Germani illos Hopf-

fen uocant proprie ut qui Augusto mense, & in initijs Septembris ad conficiendam ceruissiam legi soleant) satis odorati, sed & perinde quoque gustu amari, inter quos puniceum & teres semen delitescit enascuntur.

Syluestris

Sylvestris Lupulus passim in omnibus regionibus, iuxta vepres, sepes, fossas, muros, necnon quoscunque quibus niti possit locos, prouenit, satiuo per omnia similis. In ijs regionibus quibus vinum natura largita est, a pistoribus colligitur, hoc enim fermentum & massam præparant quo panes elegantiores appareant. Turiones Lupuli uelut & asparagi ab Apicijs uero tempore acetarijs adhibentur, asserentibus hoc pacto usurpatos obstructionibus hepatis prodesse.

Sylvestris Lupulus.

NOMENCLATURAE.

Meluas cap. xxiiij. in Smplicibus suis hanc plantam Volubilem tertiam nominat, alij Lupulum uocant; Germani Hopffen/Barbarus credit Lupū salictarium Plinij esse, Græcis *ῥόσος*, quasi ad Bryoniam aliquo pacto pertineat dictum. Manardus Lupulum, Lupum repticium, Tolophiam, Volubilem magnam & mediam, Habiolam, Habillam, & Brusculam uocari tradit lib. v. epist. Quorum sane omnium sententiæ, ut non multum ab inuicem distant, ita maxime mihi probantur. Sed cum ijs conuenire non possum qui Lupulum Corrudam interpretantur; cum tamen Asparagus Corruda dicatur. Theophrasto lib. vi. cap. iij. Cæterum ut quid mihi de Lupulo uideatur, explicem, existimo Lupulum eam esse apud Dioscoridē plantam, quæ illi *ῥόσος*, hoc est, Smilax aspera dicitur. Sed de hac plura infra sub finem capituli.

Plinius lib. 21. cap. 15.

Diosco. lib. 4. cap. 139.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Qui ceruissiam coquunt, loco condimenti Lupulum habet, sine illo enim raro bona conficitur Ceruissa. Pistores etiam nonnulli Lupulo carere nolunt. Est enim ad multa quam utilissimus. Proinde tam flores quam radices eius temperaturæ sunt calidæ, & siccæ. Recentes uero ac verni Lupuli turiones mediam obtinent naturam, ad humidam & refrigerantem qualitatem uergentes.

INTRINSECVS.

Apicij recentes Lupuli turiones non aliter atq; Asparagum, acetarijs in uere expetunt, nec sane inepte illi facere uideri debet. Siquidem Lupulus in tenera sua ætate in cibo deuoratus, sanguinem purgat, uentrem soluit laxatq; & obstructionibus epar & lien liberat. Vnde colligi potest non solum turiones hos in cibo usurpatos, sed & flores Lupuli uino decoctos ac potos, aduersus uenenum, & si quid aliud malum in interaneis fuerit, unice facere.


EXTRIN.

EXTRINSECVS.

Flores Lupuli in deflectionibus duritiem & tumorem matricis iuvant, necnon difficulter urinam reddentes, & eos qui inter meiendum, calculum vesicæ sentiunt.

De Smilace aspera uera.

Σμίλας τραχὴν. Stehendt winde.



CVM SVpra SMI-
lacis asperæ mentionem
fecerimus, operæpretium
facturi uidebamus, si hoc
loco plantæ huius quam
depictam exhibemus, men-
tionem faceremus. Ea in su-
periori Heluetia in locis uli-
ginosis & tenebrosis nasci-
tur, aculeata, implicata, fo-
lijs uestitæ hederaceis, flore
emicans in vere candido,
qui in rotundos & rubros
tandem abit acinos. Solet
uero sicut & aliæ Volubi-
les proxima quæcque reptan-
do scandere, ipsæ undiqua-
que circumuolui. Hanc D:
Otho Brunfelsius piæ me-
moriæ Berna Heluetiæ cla-
rissima urbe ad me misit.

NOMENCLATVRAE.

Cum nonnullos de no-
mine huius plantæ interro-
gassem, respondebant illi
Smilacem esse asperam Di-
oscoridis, quæ alijs Epapri-
tis, alijs Lycantheon,
alijs Cynosbaton, alijs
Aniceron, alijs Helyophy-
ton,

con, alijs Anatolicon, alijs Dylicon, alijs Helide, Ægyptijs Lyisthe, Romanis Mergina, Hetruscis Radia dicitur. Germani Storchendwinde uocare possunt.

V I R E S A C T E M P E R A M E N T V M.

Contra uenenata efficacissimi acinorum corymbi, in tantum ut acinorum succo infantibus sæpe instillato, nulla postea uenena nocitura sint. Hæc Plinius. Cæterum hæc quæ de Smilace aspera sua Plinius tradit, efficacius & certius præstare Lupuli florem odoratum (qui in Petro de crescentijs Leuertigo dicitur) nos credimus. Itaque Lupulum Smilacis asperæ genus esse firmiter tenemus.

De Glycypicro.

Cap.

XCIII.

T HAEC EX SCANDENTIBVS HERBIS VNA EST, quæ & ipsa arboribus circumuoluitur, si quando ad illas pertinere possit. Gaudet ripis maxime fluuiorum, ad quas cum diutius morata fuerit, lignosa tandē & prælonga, vitis instar, ac ex cano nigricantis coloris euadit. Radicē habet plane capillaram, e quibus quæ quotannis noua erumpunt germina, perpetuo uiuent, utrinque mollibus & nigricantibus uestita folijs, quæ uulgarī Hederæ conferri possint, nisi quod magis hæc sunt mucronata, præterea nonnulla etiam auriculata, ueluti Saluianobilis, quam Germani Creutzsalbey appellant. Iulio mense flosculi huius plantæ apparent, sæperumero deni aut duodeni uno pediculo suffulti. Ac singuli horum quinque mucronatis ac recuruis foliolis constant, e quorum medio luteum stamen prominet. His decidentibus uirides succrescunt acini, qui ubi maturuerint, rubri fiunt in modum corallij rubri, ingrati plane saporis. Cortex huius plantæ quo diutius manditur, eo dulcior & iucundior gustu redditur, nam primum quidem gustatu amarus existit, & qui minus arrideat.

N O M E N C L A T V R A E.

A gustu, quem subinde gratiorem reddit, ut diximus, dentibus probe commanducatus cortex, planta hæc Germanis Je lenger je lieber/Latinis Amara dulcis, Græcis γλυκύπικρον, quod & si interpreteris, Dulcamarum, Ruellius de Nard. tu. stir. lib. 3. cap. 38. uocatur. Quidam Germani Hynschfraut appellant, quod ad morbum peccorum die Hynsch Germanis appellatum faciat, non aliter atq; Aristolochia longa, Quidam Chamæpytum non sine magno errore esse asserunt. Quod.

γλυκύ-πικρόν.
Dulcis amara.
 Je lenger je lieber.



Diosco. lib. 4.
 cap. 140.

σμίλαξ
 { η κωνία
 λεία.
 τραχέα.

Quod cum obijcitur his, non desunt qui illos hoc pacto defendant, astruentes nihil referre, quo pacto nominentur plantę. Quod si ita est, certe & nobis licebit huic plantę aliud imponere nomen, quanquam id quidem nō constringemus, sed ex ueterum scriptis adducemus. Dicimus ergo hanc plantam Hederam esse Ciliciam, seu Smilacem Theophrasti lib. iij. capite ultimo, aut certe eam quę Diosco. *σμίλαξ λεία*, hoc est, Smilax levis et nō aculeata dicitur. Ex his quę hacten⁹ de Smilace diximus apparet, id leguminis genus qđ hoc libro cap. xij. exposuimus Smilacem hortensem, hanc uero quam modo tractamus Smilacem læuem, Lupulū deniq; Smilacem asperam in scriptis ueterū uocari, ita ut omnia Smilacis genera nostra quoque Germania producat. De Smilace Poëtę fabulantur, eam fuisse virginem, a Croco puero adamatam, deinde uero in fruticem nominis sui mutatā, qua de re uis

de Plinium libro xvi. capite xxxv. & Ouidium in Metamorph. libro quarto fa. x.

VIRESCENTIA TEMPERAMENTVM.

De Smilace sua Dioscorides ita scribit. Semine cum Dorycnio poto, æternis singulorum obolis, uaria & tumultuosa in somnis obuersari traduntur. Hæc ille. Nos de nostra læui Smilace meliora non sine certa experientia prædicamus.

INTRINSECVS.

Accipe lignum de hac planta libræ pondere, ac minutim in frustula tali ludicri instar concide, dein cum mensura uini albi, in nouam ollam eamq; operculo (per qd tamē foramen in medio exiguum transfigito) probe connectam, ita quidem ut cum farina ex aqua undique oblinatur, reponas, superq; carbones lento igne decoquito supra tertias, demumq; his utare. Hæc potio manē hora una prius quam surgas, & uesperti cum lecto te committere uelis, cyathi uulgaris mensura sumpta, morbum regium præsertim inueteratum leniter per aluum & urinam exigit.

Quidam hoc decoctum aduersus putridas uentriculi febres, ex quibus regius morbus oritur, exhibent.

EXTRINSECVS.


Smilax læuis pastoribus nota est, nam solent illam pecori e collo suspendere aduersus morbum quem uocant die Synsch/Vnde Germanicum herba nomen natum est, ut Synschfraut uocaretur.

De Vite syluestri. Cap. XCIII.

ITIS SYLVESTRIS, NON EA QUAE ALIAS LÆBRUSCA dicitur, sed quæ ubiq; locorum fere nota in siccis fossis, iuxta sepēs, muros, & in dumetis, prouenit, Hederis quoq; adnumerari potest, cum & ipsa ueluti Hedera arbores conscendat. Quamquam uero clauiculas non habeat, quibus reptando se arboribus & fruticibus aliget, tamen folijs hederaceis quæ unopediculo quina plerunque obtinet, quod in Smilace hortensi quoque uideas, uicina quæq; amplectitur. Caudex eius uiti uiniferæ teneræ similis est, & prælongas lentasq; spargit uiticulas, quibus fasces quoscunque quasi uinculo aptissime constringere possis. ad eos enim uitis syluestris apud nostros præcipue adhibetur. Iulio mense florem producit niueum, odoratum, ac multiplicem, flori Tilie

Vitis sylvestris.

Waldreben / oder Lynen.



pene similem, quibus decussis, semen subnascitur plumis quasi uestitum, aut barbae canae effigiem repraesentans, gustu feruidum uelut Ranunculus. Hoc semen Autumni tempore a uento in uarias partes hinc inde dispellitur, e quo intra paucos dies noui pululant asparagi.

NOMENCLATVRAE.

Sunt qui putent hanc plantam, quam Germani Waldreben / oder Lynen uocant, Vitem esse albam. Sed errant hi quidem, quam plane sylvestre sit vitis genus, non quidem illud quod Labruscam uocant, quo de Dioscorides lib. v. cap. ij. sed id quod Dioscoridi lib. iij. cap. clxxv. *ἄμυρα ὀξυς*, hoc est, vitis sylvestris uocatur. De Vite sylvestri apertius scribit Serapio cap. xxxv. cuius uerba in gratiam studiosorum rei herbariae annotabimus.

Et sunt eius duae species, quarum una non habet uvas, sed facit flo-

res, & est illa quae dicitur foemina, & alia profert grana parua, nigra, similia racemis uuae paruis, & quando sunt matura, color eorum.

rum est rubeus, & figura grani est rotunda, & racemi ipsi, & summitates eius reseruantur. Hæc ille. Cæterum quæ de foemina dicuntur a Serapione, in Dioscoridis hoc loco commissum, sed nolo ego omnia plana facere. Florem canum & lanuginosum vitis sylvestris Serapio Butaniam appellat. Vitis sylvestris plantæ & Plinius mentionem fecit: meo quidem iudicio hæc planta Salictarium eiusdem fuerit. Plinius lib. xxiij. capite primo:

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Ampelos agria apud nos in medicina non frequentis est usus, nam fere ad constringendos fasces, ueluti Salices & alia uincula adhibetur.

INTRINSECVS.

Feruefacta radix in aqua, & in cyathis duobus uini aqua marina dilusi, pota, humorem alui ciet, ideo hydropicis datur, testis est Dioscorides, & post hunc Serapio.

EXTRINSECVS.

Succus & flores Vitis sylvestris, tusi, aut cocti, illitu uicia ac asperitatem cutis, & maculas omnes extergunt, quales sunt papulæ, serpigines, & morphaea. Quod uero harum sit uirium Vitis sylvestris credi facile potest, cum tota sua substantia, feruidæ qualitatis & strenue calefacientis sit facultatis.


De Bryonia. Cap. XCV.

BRYONIAE HERBACEI CAULES, BREVI TEMPORE magnæ euadunt proceritatis, quam reptando uicinasque sepe dumeta, & muros clauiculis suis non aliter atque Lupulus complectendo consequuntur. Aprili mense e radice rapitua magna & foetida uirides exeunt asparagi, qui ubi primum in altum sese attollere cœperint, simplices assequuntur capreolos filis similimos, quibus uicinos frutices amplectuntur, sicut Vites aut Cucumeres. Folia gerit Bryonia angulosa, hirsuta, & cineræa, forma Colocynthidi peregrinæ similia, sed magis exigua. Flore emicat in fine Maij mēsis uiolaceo, ex pallido albicāte, & qui uulgari Solarro qd ad formā attinet respōdeat. Hoc decusso acini subsequuntur rotundi & uirides, qui ubi maturitatem iustam adepti fuerint, rubent, non aliter quam Corallium rubrum, cum odore tum sapore malo & nauseoso.

*Bryonia.**Bundeskürbs.*

NOMENCLATURAE.

Quotquot rei herbariae extant scriptores, non omnes unanimi consensu Bryoniam quam modo descripsimus, ad vitem referunt albam Dioscoridis lib. iij. cap. clxxvi. excepto D. Othone Brunfelsio, qui in Onomastico suo, Vitem nigram Diosco. ueram esse Bryoniam perhibet. Huic stipulatur & Simon Ianuensis, atque Fesiresin, hoc est, Bryoniam, esse nigram, & non albam vitem. Diuersum sentiunt & Auicenna & Mesuas, necnon Iacobus quoque Maenius, qui dicit Fesire vitem esse albam, ac alias uocari, Alphefera, Alhazarasin, Hezeriazem, & Tanorus. In Matheo Syluatico haec duo eius quoque nomina extant, nimirum Fescera et Viticella. Germani Wild rüben (hoc est, Rapum syluestre) Wildkürbs (Cucumerem syluestrem) Wilden zitwen (Zedariam syluestrem) Bundeskürbs (Cucumerem caninum) & Teuffels Kürsen (Cacodæmonis cerasum, ab

*Bryonia.*

acnis nimirum rubris uocant. Apud Dioscoridem Vitæ albæ hæc extant nomina, ἡ μύρα & λινάρι, ὅτι βρυονία, ἢ δι' ἐπισφύλων, ἢ δι' χαλδῆς ἰσμερ, μύρα δὲ ὄρε, ἢ ἐξ ἰσμερ, ἢ ἄλλου, ὅτι ὁ ὄρε καλεῖται. Vitem nigrā quæ buxei coloris radicem ha-

bet,

bet, foliaq; hederacea, & nigros profert acinos. Dioscorides Bryoniam quoque appellat, sed ad differentiam alterius addit, nigram, unde satis liquet diuersam eam esse a nostra vulgari Bryonia. Quia uero nondum eius mihi facta est copia, pergemus ad reliqua. βρυονία μίλκτα.

VIRES AC TEMPERAMENTVM:

Bryoniæ radix in expellendo est efficax, temperamento prædita calido & sicco. Hæc introsumitur ad purgationes per inferna perficiendas, foris uero ad emendanda cutis uitia, & suppurationes rumpendas usurpatur.

INTRINSECVS:

Agyrtæ nonnulli mira quædam monstra ex hac radice effingunt, quæ cum aliquot dies siccæ arenæ mandauerint, pro Mandragoris postea distrahunt. Alij immaniter per illam homines purgant.

Recentes huius plantæ turiones plus utilitatis habent, nam vere instar Lupuli & Aspargi decocti ac præparati, uentrem leniter laxant citra periculum, & urinam ciunt.

Succus radicis verno tempore expressus, ac ex aqua mulsa potus, lentæ exigit pituitam.

Qui morbo comitiali, uertigine laborant, necnō attoniti, possunt quotannis radicis huius drachmam unam in portione aliqua sumere.

Eodem medicamento utitor qui a serpentibus ictus fuerit.

Eclegma ex ea fit, ut est autor Dioscorides, cum melle difficile spirantibus, strangulatu oppressis, tussientibus, uulsis, ruptis, & laterum doloribus.

Lienem ternis obolis potam hanc radicem ex aceto, triginta ex ordine diebus, consumere ferunt, sed & radicē cum fico tusam foris illinire oportet.

EXTRINSECVS.

Semen Bryoniæ rufum tusum, accataplasmatis ritu impositum, omnis generis scabiei, gangrænosæ & immundis uulneribus ulceribusq; prodest, putrem enim & malam exest carnem, & uulnera putrientia mundat.

Eadem potest & radix, nam & suppurationes rumpit, reduuias committit, uitia cutis, maculas, uaros, lentigines, cicatrices nigras, suggillata, tollit, extergit, & emendat, cum oleo temperata ac imposita.

Radix hæc imposita aculeos & infracta ossa extrahit.


Eadem foeminarum locis apposita, partus mortuos, secundasq; morantes trahit mirifice. Quidam ad membra paralytica ex hac radice unguen-

um conficiunt, oleo oliuæ, & axungia suilla illam temperantes.

Quidam ex ea aquam distillant, ad supra dicta mala compescenda.

De Periclymeno. Cap. XCVI.

Waldgilgen/ Geißblat.



IN DENSIS CAEDV-
isq; syluis, ac fruticetis, ma-
xime in quibus Coryli
luxuriant, plerunque & hoc
scansile Periclymenum re-
peritur. Solet autem non
aliter atq; Vitis syluestris
in altum cōscendere, arbo-
ribusq; circūuolui. Quan-
quam longe firmius frutici-
bus, arboribusq; hæret Pe-
riclymenon, q̃ ullum fere
scansilium plantarum ge-
nus, nam ita quidem cum
arboribus quas in uicinia
comprehendit, nonnunq̃
coalescit, ut citra damnum
diuortiū neutra pars susti-
nere queat. Proinde in cacu-
mine Corylorum, seu frus-
ticum, quibus adnascitur
Periclymenon. Florem
fert suauissime odoratum,
cādidum, ac multiplicem,
cuius quidem singulæ par-
ticulæ, seu flosculi acutum
pileolum, aut certe Conso-
lidæ regię uocatæ herbæ
florem referūt. Iunio mense
florere incipit, & deinceps
per totam æstatem in Au-
tumnū usq; flores quos
diximus tandem in baccas
rubras

subras abeunt, seu racemos Aro similes, at sapore præstantiores & dulciores. Hæc planta radicem habet lignosam, candidam, ac intra humum hinc inde repentem, & quæ facile radicitur quocunque loco plantata fuerit, quo nomine a diuitibus uoluptatis ergo in hortos transfertur. E radice multæ prælongæ, tenuesq; sparguntur uirgæ, quæ proximis fruticibus circūuoluntur, non aliter atque Lupulis, utrinque pallentibus folijs, Salici similibus, sed tenerioribus & latioribus uestitæ.

NOMENCLATURAE.

Hanc plantam Germani Waldtgilgen (hoc est, Lillum syluestre) uocant, & Speckilgen/ & Zeunling/ & Geißblat/ quod est Latine Caprifoli- *Lilium conuallium quid proprie sit, supra libro primo cap. 197. docuimus.*
um, Vulgo Lillum inter spinas, Lillum conuallium, alij Matersylium, & Narcissum appellant. Sed appellet quisque plantas & flores suos utcunque uoluerit, modo ne eas res de quibus agimus, amittamus. Ego existimo eam esse Periclymenon Dioscoridis lib. iij. cap. xv. quod nonnulli eodem autore teste, Aeginam, alij Clymenon, alij Carpathon, quidam Splenion, alij Epetitim, alij Axinam maiorem, nonnulli Clematitin, alij Myrsinen, alij Calycæthemon, Magi polion ueneris, Aegyptij Turcon, Romani Volucrū maius, Aphri Lanath appellant.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Nostro tempore flores in medicina maioris sunt usus, quam fructus aut folia. Temperatura sunt præditi calida & sicca.

INTRINSECVS.

Aquæ e floribus distillata, ac aliquoties per diem duabus aut tribus uicibus pota, suspiriosis, tussientibus, prodest, internos stomachi æstus refregat. Qui lienis uitio laborant, ij medicamentum ex fructu Periclymeni petant, sic enim de illo scribit Dioscorides. Semen Periclymeni postquam ematuruit collectum, & in umbra siccatum, si drachmæ pondere detur in uino, quadraginta diebus, lienem absumit, lassitudinem discutit.

Baccæ Periclymeni expellendi ui pollent, ideoque cruentam urinam ciere, & partus accelerare ualent.

Aqua distillata usu gratioꝝ & minus molesta existit.

EXTRINSECVS.

Hæc ad quosuis calidos oculorum affectus, necnon ad inflammationes hepatis facit, si linteola in ea madefacta foris imponantur,

De Cucurbita. Cap. XCVII.

Cucurbitæ omnis generis.
 Allerley Kürbsen.



Q. VOD CITO FIT, CITO PERIT, SIC VVLGO DICIS O
 let. Quod sane dictum si ulla alia de re, certe de Cucurbita.
 quam

quam uerissime dicitur. Ea namque una æstate, in sublimem ita conscendit, ut fastigia altissimarum arborum attingat: Autumno uero si uel unam pruinam senserit, deijcitur, folijs & palmitibus prorsus marcescentibus. Qui sit ut quotannis Cucurbitam ferere necesse sit, id quod in nostris regionibus Aprili mense facere solemus. Tum enim nonnulli ea accipiunt semina que in uentre Cucurbitarum enata fuere, eorumque mucronatas partes in terrâ defigunt, pollicentes sibi hac ratione foeliciorem Cucurbitarum prouentum. Alij semina priusquam serant, in dulci lacte, aut aqua Sacchari mace- rant, quo scilicet citius erumpant, & dulcior euadat fructus, id quod non raro contingit. Quamprimum uero bina prima ac pinguis Curcubitæ fo- lia eruperint, continuo rigare humum oportet, aliter tardius augetur, Iunio mense appetente, cum folia quaternâ aut quina Maluæ Romanæ haud dissimilia prodierint, tum & capreoli uitium clauiculis similes progignun- tur, quibus natura sublimitatis auida, palos, arbores, aut quodcunque ap- prehenderit, conscendit Cucurbita. Post hæc flos apparet, atque is quidem duum generum. Primus namque lanuginosus, albæ rosæ exiguæ similis, quinis aut senis folijs præditus spectatur, qui tertio ab ortu die sine fructu decidit. Qui hunc subsequuntur flores magis exigui sunt, in quorum fine fructus in formam Pyri syluestris turbinatus, conspicitur, qui indies flore marcescente admodum augetur, ac aut in orbem collectus intumescit, aut in longum propagatur, quidam cornu instar recuruus spectatur, alius recta figura contentus est, alius grandis, alius contra exiguus euadit, quæ sane ua- rietas, diuersitasque a seminis natura dependet, quod elegantissimi Columel- læ uersus, quos subiiciemus testantur.

prægnansq; Cucurbita serpit.

Vna neq; est illis facies, nam si tibi cordi.

Longior est, gracili capitis quæ uertice pendet.

E tenui collo semen lege, siue globosi.

Corporis, atq; utero nimium quæ uasta tumescit.

Ventre leges medio, sobolem dabit illa capacem.

Nariciæ picis, aut Actæi mellis Hymetti,

Aut habilem lymphis hamulam, Baccho uel lagenam.

Tum pueros eadem fluminis innare docebit.

NOMENCLATURAE.

Germani Cucurbitam Kürbß / Hebraei קיקיון Kikaion (Ionæ iij.) Ara Serapio cap. 238. bes Haraha, & Villa uocant. Græcis κολοκυνθα κολοκύνθη, dicitur. Quidam Mara Auerrh. cap. 41. cello Vergilio teste inter longas & rotundas eam differentiam statuunt, ut

cap. 3.
Plinius lib. 20.

has ~~removendas~~, illas ~~cinivas~~ uocatas uelint. Vulgares Cucurbitæ Plinio lib. xix. cap. v. Camerariæ, & plebeïæ, oblongæ uero Anguinæ appellantur. Sylue fris & exigua illa Cucurbita quæ non nisi in saxosis nascitur, Græcis Somphos, Latinis Barbara, & Marina uocatur, nostris regionibus incognita. De Cucurbita satiua Dioscorides egit lib. ij. cap. cxxij. Huius Columella, Paulus Ægineta lib. j. cap. lxxx. & lib. vij. Galenus item lib. ij. de alimentis, & lib. vij. de Simplic. & Auicenna lib. ij. cap. clxxxix meminere.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Omnia Cucurbitarum genera, frigidæ & aqueæ sunt naturæ, ut recte dixerit Plinius, Cucurbitam nihil aliud esse quam congelatam aquam. Cucurbitæ ad ardentes febres utrinque usurpatæ mirifice faciunt.

INTRINSECVS.

Quancquam Cucurbitarum usus propter frigidam quam obtinent humiditatem, stomacho non usque adeo conducatur, nihilominus tamen culinæ passim familiares cernuntur. Sunt enim qui teneras illas & molliusculas adhuc in cibis esitare solent, eo quo sequitur modo. Corticem exteriori abijciunt, interiorem uero & candidam substantiam una cum mollibus ac immaturis seminibus bulliunt, posteaq; minutim conscindunt, ac cum cepa, butyro & sale coquunt. Hic cibis fere cum Brassica capitata confissa & cocta conuenit, macilentisq; hominibus prodest. Nonnulli Cucurbitam immaturam orbiculatim instar malorum scissam, cum butyro in sartagine frigunt. Quidam purgationes ex Cucurbita conficiunt hoc pacto. Cucurbitam recentem excauant, uinoq; repletam noctis spacio relinquunt, ac mane ieiuno stomacho illud uinum bibunt.

Aqua ex immaturis Cucurbitis distillata, his qui ardentibus febribus ita laborant, ut nullis alijs medicamentis calorem restringere possint, potanda exhiberi, necnon foris in Epithemate cordi & iecinori, ut reprimatur calor immensus admoventi potest.

EXTRINSECVS.

Aqua ex immaturis Cucurbitis distillata, ardori capitis quam Syrii infantes maxime efficacissime magno experimento in linteo imponitur. Quod si aqua distillata non suppetat, succus sumatur, parique ratione usurpetur.

Eadem, puta aqua stillatitia, & succus immaturæ Cucurbitæ, non tantum aurium

aurium dolori instillatu auxiliantur, sed & oculorū & omnium membrorum inflammationes, & podagras refrigerant.

De Cucurbita ita cecinit Fiera.

Succi aquei, cursus rapidiq; Cucurbita, bilem

Vincit, & Illa cum non bene cocta ciet.

Quam bene grata tamen, cuiusq; admixta secundat.

Huic externa magis quam sua forma placet.

De Colocynthis. Cap. XCVIII.

C OLOCYNTHIS VERA IN NOSTRIS REGIONIBVS ^{1.} Colocynthis
prouenire recusat. Equidem sæpenumero vere appetente semina ^{uera.}
eius terræ mandauī, sed frustra. Nam licet binis rotundis & canis foliolis, sicut & Mali semina, è terra erumperent, tamen nullos facientia progressus, marcescebant tandem. Cæterum nonnullæ quæ ex semine Colocynthis mihi nascebantur plantulæ, quina aut sena producebant folia, eaq; aspera, cineracea, per ambitum dissecta, formaq; per omnia Bryoniam referentia, sed minora & magis cana. Hæc ubi sese in memoratis plantulis spectanda præbuisent, Autumno deinde accedente euenerunt.

Germanica uero Colocynthis, diuersi plane est generis ab altera, id quod ²
non solum fructus, uerum etiam folia & uniuersa demonstrat forma. Ea ^{Germanica Colocynthis.}
Spiræ a nonnullis uoluptatis gratia plantari consuevit. Semine quoque quod habet latum, & Citrullis uulgo uocatis quadamtenus simile, feritur. Folia profert non cineracea, sed nigricantia, aspera, forma uero Cucumerem luteum re præsentantia. Caules eius seu sarmenta rotunda & aspera, humi repunt sicut Bryonia, neque unquam sublimia affectant, humili ac deiecto statu semper contenta. Per terram enim reptant, ita quidem ut una sæpe planta latissimum campum uestiat, nam plures obtinet clauiculas, quibus uicinis se alliget fruticibus. Duo quoque gignit florum genera, & ea quidē lutea, ac flori Cucurbitæ consimilia, quorum primum quidem cum nullū habeat in fine adiunctum fructum protinus euanescit, alterum uero fructū post se relinquit, in modū Pyri mediocriter magni, maxime eius qd Germani Regelsbyren uocāt, turbinatū. Is ubi Autumno appetēte maturefcit, citrei cernitur coloris, intus fungosus, ac multis seminibus refertus, impense etiam amarus. Hic bilem & pituitam leniter & citra periculum purgat: Colocynthis hæc arenosa & humida gaudet terra, fructum fert copiosum, ut non raro ducenta lata poma una de planta legerim.

NOMEN

Colocynthis.
 Coloquinten.



NOMENCLATURAÆ.

Prior *Colocynthis* species, quæ fungosam obtinet medullā, & hodie
 ex Ægypto & Alexandria ad nos deferitur, Græce *Kolokynthís*, Latine *Cucubita*,
 tula,

cula (Germanice *Bürbslin*, oder *Coloquinten*) *Cucurbita amara* (*Bitterfürbs*) *Cucurbita sylvestris* (*Wildfürbs*) *Cucurbita caprina* (Germanice *Geißfürbs*) *Alexandrina Colocyntha*, *Thymbra*, *Autogenes*, & *Tutras* appellatur. *Melus* Fel terræ (*Erdtgallen*) necem plantarum, & *Cucurbitam deserti* nominat. *Scrapio Kandel*, & *Melonem agrestem*. cap. cclxxij. nuncupauit. *Auerrhoes Haanthal* dixit. *Colocynthida Elifa* propheta, ut sacra testatur historia, conquendo dulcem reddidit iij. Regum iij. quo loco *Colocynthides* פקעות פקעות *Pakkuoth*. Sade, hoc est, *Cucurbitæ sylvestres* dicuntur, a singulari nimirum פקע, *Pakkuah*, *Colocynthis*. Cæterum quid in eum locum *Rabi David Kymhi* annotet, paucis in gratiam rei herbariæ studiosorum annotabimus: פקעות שרה בעין אבטיחים. Hoc est, קטנים והם מרים והוא חזקא בלשון ישמעל חזל.

Cucurbitæ fune sicut *Pepones* parui, & sunt amaræ. Vocatur autem (hec planta) in *Ismaelitica* lingua *Chandel*. Hæc ille.

Altera *Colocynthis* Germanica a nobis cognominata, *Teütsch Coloquinten* appellabitur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vtraq; *Colocynthis* uim purgatoriam obtinet, calido & sicco feretemperamento prædita, Medico tantum utilis, nō coquo, nisi illi qui artem *Elisæ Prophetæ*, qui filijs *Prophetarum* *Colocynthidas* dulces reddebat, caleretur, iij. Regum iij.

INTRINSECVS.

Confectioni quam officinæ *Hierapicram* nominant, peregrina admiscetur *Colocynthis*. Quia uero ea non cuius commodat, ut quæ sæpenumero non sine damno usurpari potest, ideo ut paretur, nunc commemorare nolumus, rogantes interim probos & integros seplasiarios, quo uelint recto cum iudicio hæc & alia administrare. Nam quanto cum periculo *Colocynthidis* peregrinæ usus coniunctus sit, dici satis non potest. *Agyrtæ* illam uino maceratam, aut decoctam, ijs quos purgatos uolunt exhibere solent, ac ita quidem illos purgant, ut plerique satis concedant. Hac arte omnes fere Iudæi imbuti sunt. Ab his ergo medicis, qui ualitudini sue recte consultum cupit, abstinere.

Quod si omnino *Colocynthide* uti uelis, accipe Germanicam nostram, nam ea non est in expellendo tam strenua & immitis.

Pilam, ergo seu fructum eius *Colocynthidis* bene maturum excavato, fungosamq; eius una cum seminibus medullam cyathu uini inijce, ac quatuor aut quinque horis macratā, per linteolum exprime, expressumq; succum, noctu cum cubitum ire uoles, bibe, quod si leceris, uidebis luce appere

ente pituitam, crassos & uiscosos humores, necnon bilem citra noxam leniter exigi.

Idem medicamen colicis prodest, & ad putridas uentriculi febres facit, hydropicis apprime conducit.

Plura de utraq; Colocynthide adferre in medium possem, ni uererer, ne his medicamentis plerique imperiti Iudei, & aniculæ ad pernitiem potius quam salutem aliorum abuterentur.

De seminibus Colocynthidis lib. xx. cap. iij. ita scribit Plinius. In morbo regio utiliter semina eius insumuntur, & protinus aqua mulsa. Et paulo post. Præterea mirum dictu, semina eius si fuerint pari numero addalligata febribus, sanare dicuntur, quas Græci Periodicas uocant. Hæc ille, cui fidem adhibeat qui uolet, ego ista expertus non sum.

De Melone, Pepone, Cucumere, & Citreolo.

CAP. XCIX.

IN ITALIA ET GALLIA MVLTÀ PLANTANTVR

Melonum, Peponum, & Cucumerum genera, quæ & in Germaniam nostram non ita pridem commigrarunt. Habent uero Melones, Pepones, & Cucumeres, eiusdem fere formæ, folia, caules, & flores ac humi magis sparguntur, quam in altum sese attollant, clauiculas quibus proximos cõplectuntur frutices, Cucurbita longe magis exiguas obtinet. Folia Melonum & Peponum rotunda sunt, aspera, ac minora Cucurbitæ folijs. Ramuli horum seu uiticulæ duplici eoque luteo emicant flore, quorum alter decidit, alter uero hoc est posterior fructum facit, qui nihil aliud est quam Pomum quoddam, sed diuersæ formæ & coloris. Inuenias enim Melones & Pepones alios oblongos, alios rotundos, nonnullos luteos, quosdam uirides. Hi omnes foris cernuntur striati, aut sulcati, intus uero succosi, seminibusque in uero elegantibus, & liratin digestis, referti, odore suauissimi, iucundissimique, sapore uero satis dulces. Melonum & Peponum magna in agro Norimbergensi copia prouenit, necnon in Vngaria.

At Cucumeris pomum luteum & oblongum, in quo multi prominent undique toruli, licet forma & colore elegantius sit, tamen crassiorum est partium, & cibus meo iudicio non perinde gratum atque superiora, quippe quod peculiarem quandam & agrestem habeat saporem, intus candidum, ac acutis seminibus prorsus repletum. Folia huius asperiora sunt, maiora & latiora, Peponibus, & Melonibus. Gaudet Cucumis mediocriter pingui solo. Radices Peponum, Melonum, ac Cucumerum omnium rectæ sunt, mul-

tiæque

1.
Melo.

2.
Pepo.

3.
Cucumis.

Melo, Pepo, Cucumis, Citreolus.
Melonen, Pfeden, Cucumer, vnd Citrullen.



et spaccandidis capillamentis fibrata, sicut & Cucurbitarum. Maturan-
 tur vero poma omnium horum generum in nostris regionibus inter aesti-
 tem & Autumnum, hoc est Augusto plerunque mense.

Cucumis sylvestris.
Wilder Cucumer.

4.
Citrullus.

9.
*Cucumis sylue-
stris.*
αἰνός ὄγκος



αἰνός ὄγκος.
αἰνός.

Theoph. lib. 7.
cap. 4.

Τὸ δὲ σῖνός τριπλ.
(suppleyina) καὶ
καυκασίος, σκυταλίσ-
κος, βοιωτικόν, τέταρτον
δὲ μὲν λακεδαιμόνιον.
Ἀρμενίος δὲ διὰ τὴν
αὐτὴν, ἢ δὲ ἵστυα αὐτὴν
ἀγρῶται.

v. Cucumerum ex Græcorum sententia, tria statuit genera: Laconicum
Scythalicum, Boeoticum. Addit præterea, Cucumeres cum magnitudine ex-
cellere Pepones uocari, Germani Pfsden/Galli Pompons uocant. Atro-

Est & aliud Cucumeris
genus, per omnia huic simi-
le, sed magis exiguum, latis
& phoeniceis seminibus in-
tus refertum. Folia gerit
Colocynthidi peregrinæ,
aut Bryoniæ similia, mul-
tis incisuris dissecta. Hoc ge-
nus, Citrullum uel Citroco-
lum uocant.

De sylvestri Cucumere
uide Dioscoridem lib. iij.
cap. cxlix.

Extant fortasse Cucume-
ris satui alia et plura quam
nos descripsimus genera,
quæ, quia non uidimus, de
illis nihil possumus scribe-
re. Satis enim nobis est, ea
quæ uidimus cum alibi tum
in hortulis nostris nata, in-
dicasse.

NOMENCLATURAE.

Quemadmodum Dio-
scorides omnia Melonum,
Peponum, & Cucumerum
genera sub τὸ ἀμύρα σῖνός, &
τὸ πῖπός, (hoc est Satiui Cu-
cumeris, & Peponis) uoce
comprehendit, ita Germani
omnia prædictorum gene-
rum poma, Melonen uo-
cant. Plinius lib. xix. cap.

tunda & citrei coloris poma, Melo pepones, et Stapones à forma appellan-
tur, uide Palladium in Martio & Aprili mensibus. Quæ uero ex uiridi colo-
re nigricant gustuq; optimo prædita sunt, quidam Hircos, Hircinos (Ger-
manice *Bockshoden*) uocant. Galli Pompons turquois. Cucumerem
luteum, Columella Anguinam uocat, atq; is Marcello Vergilio præcipuus
inter reliquos censetur. Huius poma admodum oblonga fiunt, præsertim
si per harundinem flos deducatur. Reliquos Cucumeres, uocant Citrinos,
Citrulos, Citreolos, & Citrullus. Serapio cap. cccxxiij. ita scribit, Barecha,
& Chatha, & Kura, id est, Melo, & Citrullus, & Cucumer, Iacobus Manli-
us Bathecam Serapionis, & Albathecā Auicennæ (quam nonnulli Cu-
cumerem Sarracenicum, Anguriam, & Languriam interpretantur) unam
& eandem esse plantam contendit. Hebræi Cucumeres *קישויים* Kiffchuim,
Chaldæi *קטאיא* Kattaia (a quâ uoce Chathē Serapionis nō multum ablu-
dit) Pepones uero *אפתיחם* Afthichim (quod a Batheca, & Albatheca, nō
multum abesse uidetur) & ut Thargum habet Hierosolymitanum *מלפניא*
Malpania uocant, Vide Num. xi.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Quod de Cucurbita diximus, idem de hisce quoque pomis intelligendū
erit. Sunt enim omnes frigidaē qualitatis, nec cuius conueniunt. Qui cali-
dioris temperaturæ sunt homines, aut ab ineunte ætate eiusmodi cibus as-
sueti, hisce uestigi possunt. At qui frigidiorē sunt præditi uentriculo, si hoc ci-
bo frequentius uti uoluerint, facile in febres incidere possunt.

INTRINSECVS.

Cucumeres, Melones, & Pepones, ad calidas affectiones usurpari pos-
sunt.

Melonum omnium semina in medicina ualde commendantur, ut quæ
stranguriæ, alijsq; renum & uesicæ passionibus profint.

EXTRINSECVS.

Succus cum semine adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata,
quæ faciem repurgant, & nitorem afferunt, sed cum uino illinire oportet:
Mulieribus hæc medicina conuenit.

De Cucumere ita cecinit Baptista Fiera.

*Sic nocet humescens Cucumis gelidusq; Citrullus,
Vt tremuli ardores cordis odore leuet.*

Ne diuturna tamen sit concommitata cauetō

Febris, in aſiduos ſi datur eſca cibos.

Hic bilem, ſubigitq; ſitim, ſtomachoq; calenti

Gratus erit, medici ſi ſapit arte coqui.

De Cucumere, ſeu, ut vulgo loquuntur, Zucco marino. CAP. C.

INTRA PAUCOS ANNOS QVAMPLVRIMA PERE-
grinarum ſtirpium genera, e' longinquis rēgionibus in Germā-
niam deportata ſunt. Inter cætera uero, & hæc poma æſtiua, quæ
una in æſtate tota ſua ſubſtantia adoleſcunt, florent & maturantur, ad nos
commigrarunt. Eorum nonnulla magna, alia parua, quædam rotundę fi-
guræ alia oblonga, rurfus hæc dulcia, illa amara, quædam cærea, ſeu au-
rea, alia luteola ſed pallida, nonnulla candida euadunt. Omnium uero ea-
dem fere folia, idem caulis, ſi demq; flores, licet hæc in his maiora, in illis ma-
gis exigua appareant. Semine quotannis in hortis optimis et apricis proue-
niunt. Plantatio eorum ſic ſe habet. Aprili menſe lata & dulcia ſemina (quæ
Amygdalo putamine detractō ac purgato conferre recte poſſis) in pingui
ſolo panguntur, ſed non nimis profunde, cubitali interſtitio ab inuicem di-
ſtantiā, requirunt enim latum ſpaciū, ſiquidem ſœliciter prouenire debe-
ant. Decimo a ſatu die erumpunt, eruptione binūm foliolorum Cucurbi-
tis ſimilia, inter quæ alia, & maiora, nigricantia, aſpera, forma Maluam Ro-
manā, ſeu hortenſem referentiā proſiliunt. Cum ergo in caules & uiticulas
planta hæc exierit, qd unius menſis ſpacio ſit, tum ſuffulcire illam, ac in altē
admiculis quibuſdam promouere oportet, quod niſi feceris breui totum
agrum obducet, ſolet enim ſe longe lateq; diffundere, flagellisq; ſuis perneci
reptatu uicinis ſe alligare fruticibus ueluti Bryonia. Flores fert duplices, lu-
teos, cymbali formam repræſentantes, quorum priores quamprimum nul-
lo poſt ſe relicto fructu decedunt, quod in Cucurbitis quoque fieri uide-
mus. Qui uero ſuperſtites manent, campanulæ ſimiles, quinis acumi-
nibus inferiore ſui parte ſerrati, ac in medio aurei quid coloris habentes,
odore ſuaui præditi, capitulis uiridibus e' quibus fructus exit, inſident. Hi
cum corrugari cœperint, ilico pomeus fructus conſequitur, alius oblon-
gus, alius rotundus, alius læuis glaberq; alius multis craſſiſculis & pro-
minentibus quaſi coſtis ſtriatuſ, alius albus, alius expallido luteus, alius
nigricans, qui tamen cum Autumni tempore maturuerit cærei efficitur co-
loris. Porro omnium horum generum poma corticem, ſeu cutem exteriorē
rem lignoſam habent, intus crocei ſunt coloris, maxime ea quę foris nigrant,

Cucumis, seu Zucco marinus.

Nec Cucumern, oder Indianisch Spffel.



gricant, lato & dulci semina
necopiose referta, ita ut du-
centa unum quandoq; po-
mum contineat. Porro qđ
inter semina & corticem in
omnibus generibus mediū
est, præstantissimum cense-
tur. Quæ candida foris, &
quæ ex pallido lutea sunt
poma, carnem habent can-
didam, Rapoq; forma & sa-
pore similem. Tertium ho-
rum pomorum genus ama-
rum prorsus est ueluti Co-
locynthides. Vniuersa ue-
ro eorū genera durare per
annum possunt, nec interea
temporis putrilagini obno-
xia fiunt, siquidem rite le-
gantur, eaq; qua decet cura
conseruentur.

Postremo quod in his po-
morum generibus aureo
nitet, seu cæreo colore, subin-
de mutatur, nam uiridem
rursus assumit colorem,
quem mēse integro seruat,
deinde aureum recipit, atq;
sic alternis mensibus, alio
atq; alio tingitur colore,
quod non semel magna rū
admiratione obseruauī.

*Miraculum
naturæ.*

NOMENCLATURAÆ.

Sunt qui hæc poma Cucumeri adnumerent, asserantq; Turcicos uoca-
ri Cucumeres, quorum sententiam probare non possum. - Cucumeres
enim omnes humidæ sunt qualitatis, putrilagini facile obnoxij, quare du-

rare diu non possunt. Ego uero hunc fructum Germanice Summeröppfel/
Indianisch öppfel/hoc est, Mala æstiuæ & Indica appello, possunt uero cum
multa eorum sint genera, ita suis appellationibus distingui, ut dicantur,

Mala Indica	Crocea	Germanice	Saffrangäl	Indianisch öppfel.
	Lutea.		bleichgäl	
	Citrina.		goldtgäl	
	Nigra		schwarz	

Vulgo Zucco marina dicuntur, quod ex ultramarinis regionibus, par-
tim ex Syria partim ex India ad nos primū uenerint, quod testantur appella-
tiones ipsorum. Vulgo enim Zucco de Syria, Zucco de Peru dicuntur.
Hæc habui quæ de nomenclaturis huius plantæ dicerem, quibus qui con-
tentus esse nolit, is certiora & magis probanda in medium adferat.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vt mediam quandam inter frigidum, calidum et siccum, temperaturam
obtineant uniuerſa hæc pomorum genera, necesse est, cum tanto tempore
a putrilagine tura sint, ut diximus. Possunt ergo non tantum in cibo, sed &
medicina usui esse,

INTRINSECVS.

Omnium quæ hoc capite recensuimus pomorum caro, a cute et inter-
na medulla repurgata in olla cum aqua modica, sale & butyro decoqui po-
test, quo ritu Rapas & Mala decoquimus. Estq; hic cibus non contemnen-
dus. Quod si loco aquæ uinum ijs adijcias, gustum suauiore obtinebunt,
Malisq; decoctis similem.


Ex semine putaminibus repurgato iuscula dulcia parantur, instar iusculi
Amygdali. Hæc decoctio stranguriæ, calculo, ardori urinæ apprime con-
ducit. Si quæ alia huius plantæ sunt iuuamenta, ea progressu temporis co-
gnosci forte poterunt.

De Lappa maiore. Cap. CL.

INTER VITIA HERBARVM LAPPA MAIOR QVO-
que numeratur, quæ æstate puerorum crepundijs inseruit: Folia
profert

Lappa maior.

Groß Kletten.



profert latissima, & prælonga, Cucurbita aut Lappatio maiora, nigricantia ex altera sed parte auersa cineracea. Caulem altero demum ab eruptione anno fundic teretem, concavum, multis adnatis furculis ramosum, foliolisq; exiguis, angustis, mucronatis, maxime prope uerticem uestitum. Iulio mense fructus apparet uiridis, & rotundus, ex alis erumpens, multis recuruis spinulis, quibus uestibus adhæret, horridus, Germani hanc ipsam ob causam Kletten uocāt. Flore comat dilutæ purpuræ, uti uulgaris Carduus. Semine cum maturuerit, prægnat oblongo & incano, quod à maturitate in terram spargitur, nouasq; quotannis gignit ex se plantulas, quarum radices rectæ, longæ, foris nigræ, intus candidæ, gustu amaræ sunt. Ceterum ueteres plantæ quotannis regerminant, nouosq; tum caules, tum fructus generant. Quæ uero è semine nuper natæ fuere, altero aut tertio demum anno caules & fru-

ctus producant. Nascitur Lappa maior in humectis plerumq; hortis, iuxta sepes, arcis antiquis, prope sumum, & alijs incultis publicisq; locis.

NOMENCLATVRÆ.

*ἀπριν, ἢ προυν
ον, ἢ προυνισ.
Personata, Per-
sonata, quidam
Aparinem cog-
nominant,
ἐπριν.*

Nisi hoc loco reprehensio quorundam nobis timenda foret, affirmare non dubitarem, Lappam maiorem primo & secundo anno antequam ex-
caulescit, fructumq; seu lappas suas profert, Germanis non Bletten / sed
Groß letschen / Personatiam, qua de Dioscorides cap. cñ. lib. iij. egit, uocan-
dam: rursus eandem cum caules & fructus produxerit Germanis non am-
plius Letschen / sed Bletten / id est Lappam a fructu appellari, & ad Xanthi-
on Dioscoridis lib. iij. cap. cxxxij. pertinere. Huic nostræ sententiæ, tam
Personatæ, quam Xanthij descriptiones suffragari uidentur. Sed nihil ita
asseueramus, quin eos admissuri simus, qui certiora docuerint, modos suas
sententias firmis munierint rationibus. Proinde rogamus ne nobis succen-
seat quisquam, quod nostram in medium adferimus sententiam. Nam neq;
nos his irascimur, qui Tussilaginem seu Vngulam caballinam, Bardanam,
Lappam maiorem & Personatam uocare non dubitant: monemus autem tam
hos, quam quoscunque alios qui in re herbaria uersantur, ne quid nobis
obtrudere uelint, quod non certitudinem, aut rationem aliquam habere ui-
deatur. Xanthion suum Dioscorides lib. iij. cap. cxxxij. alijs Phasganon,
alijs Antithesion, alijs Chascanon, alijs Chiradolethron, alijs Aparinem
uocari tradit.

VIRE S A C T E M P E R A M E N T V M.

Quæ a nobis non nunquam uitia herbarum censentur, in medicina sæ-
penumero præstantissimi sunt usus, id quod nos hæc Lappa maior doce-
re potest, cuius fructus utrisque corporis partibus commodat, temperatu-
ra sua fere siccus, folia eius recentia astringentis sunt facultatis, in ueteratis
ulceribus utilia.

I N T R I N S E C V S.

Radix drachmæ pondere pota, cum pineis nucibus, purulenta & cruen-
ta extussientibus auxiliatur.

Semen Lappæ maioris maturum nonnulli in puluerem redactum, cal-
culosis potandum exhibent.

E X T R I N S E C V S.


Folia recentia antiquis ulceribus imposita mirifice conducunt, calorem
namq; restinguunt, & dolorem mitigant.

Eadem luxatis & con fractis membris impositu profunt. Semine Lappæ
maioris quidam flauos faciunt capillos, adiecto nitro illud illinentes. Vide
Dioscoridem in historia Xanthij.

De Lappa minore.

Cap. CII

Klein Bletten/oder Betlerleiß.



QUANQVAM LAP-
 pa minor, quod ad formā,
 odorem & gustum attinet,
 diuersum ab eo genere esse
 uidetur, quod proximo ca-
 pite descripsimus, nihilo-
 minus tamen hīs plantis re-
 cte adiungitur, quæ uesti-
 bus adhærescere consueue-
 runt. Nascitur autem illa in
 hīs potissimum locis, in qui-
 bus pecora commorari
 frequenter solent, in uetu-
 stis areis, iuxta sepes & no-
 ualibus, in quibus opilio-
 nes septa sua sæpenumero
 habere solent. Planta est al-
 biflora, & quæ quotannis e-
 semine pullulascit, foliis
 mollibus, cineraceis, instar
 Altheæ, aut Vngulæ cabala-
 linæ. Cæterum singuli frus-
 tices multis adnatis ramu-
 lis brachiantur, ut arbuscu-
 lam repræsentent. Inter fo-
 lia & surculos fructus na-
 scitur oblongus, aculeatus,
 Erinaceis animalculis simi-
 lis, binis plerumque aut ter-
 nis lappis cōiunctim erum-
 pentibus. Mirum quod de
 hoc fructu aniculi, rerumq;
 naturæ obseruatores qui-
 dam affirmāt. Cum namq;

Autumni tempore maturuerint quas diximus lappæ, & apertæ duo hordei grana ostenderint, annum fertilissimum, sin uero auenacea grana bina conclusa illis fuerint, contrarium, hoc est annonæ caritatem portendere asserunt. Hæc ita se habere ipse quoque experientia didici. Sæpe enim eiusmodi lappulas aperiens, in plerisque bina nigra & auenacea grana deprehendi.

NOMENCLATURAE.

Tribulus terrestris

Sed quonam hoc Lappæ genus referemus? ad Xanthion ne, an uero ad Tribulos? Equidem Xanthij descriptio non male illi quadrat, Tribuli historia non item. Qui sit ut & hoc loco quod nobis obijciant, aduersarij habeant. Sed quis est qui omnia facta recta ausit polliceri. Si namq; ueterum rei herbariæ scriptorum exemplaria genuina, nec a Librarijs adeo corrupta haberemus, dubium non est, quin in plerisque certiora pronunciare possemus. Sed ut ut hæc se habeant, uocabimus nos Lappam nostram minorem, Tribulum terrestrem, qui apud Dioscoridem lib. iij. cap. xvi. *ῥαβδον* & *ταυπον*, quæ duo nomina ad aquaticum (de quo sequenti dicemus capite) proprie spectant dicitur. Serap. ca. cxij. Hasach nominat. Germani *Flein Bletten*/hoc est, Lappam exiguam, & *Berlerleuß*, i. mendicorum pediculos nuncupant. Cæterum cum Lappam minorem Tribulum terrestrem uocamus, nemo existimet nos cum intelligere quem Dioscorides describit, illius enim historiam a Lappa hac nostra discrepare iam pridem diximus, sed ad differentiam maioris Lappæ, quam & *ἀραβον*, & *ῥαβδον* recte dici posse supra docuimus, ita a nobis uocatam Lappam minorem, qua nihilominus ad Xanthium posse referri, non inficiamur.

VIRESCACITATEM ET TEMPERAMENTVM.

Quod si Lappa minor Tribuli terrestris genus aliquod fuerit, certe in

Hec ex Marcelli

medicina usum quoque habere cognoscitur.

Vergilij transla

tione desumpsit

autor noster, ali

ter uero se habet

in translatione

Ruellij, cuius ad

monere lectore

placuit, ne cui er

roris aut calum-

nia occasionem

daremur.

INTRINSECVS.

Drachma terrestris Tribuli pota, illitauē ictos a vipera recreat, contra uenena cum uino aptissime bibitur.

Bibitur calculosis utiliter ex uiridibus expressus amborum succus.

EXTRINSECVS.

Folia imposita omnis generis tumores sedant, dolores mitigant.

Herba uino & melle decocta, ulcera in ore erumpentia, putredines, glauas conillasq; per sanat.

Succus

Succus ex his (puta Tribulo terrestri aquatico) colligitur ad oculorum medicinas.

De Tribulo aquatico.

Cap. CIII.

Wassernuß.



TRIBULI TERRE-
stris mentio, ad aquaticum
nos deducit, qui non ubiq[ue]
locorum, uerum in nonnul-
lis duntaxat fossis aquam
continentibus, piscinis &
lacubus provenit, quemad-
modum Theophrastus
libro quarto. cap. xi. (in quo
multis & elegātiſſimis uer-
bis historiā Tribuli aquati-
ci ob oculos posuit, quæ in
gratiam studiosorum rei
herbariæ subijciemus) me-
minit. Proinde neminem es-
se puto qui non concavas,
leues, nigras & aculeatas,
tribusq[ue] corniculis aut acu-
minibus conspicuas nuces
Tribuli aquatici uiderit.
Folia huius corniculatæ nu-
cis uisua uidere mihi nondū
cōtigat, depicta in charta ui-
di, in qua tota planta hanc,
quā iuxta apposuiſimus fa-
ciem repræsentabat. Descri-
ptio eius apud Dioscori-
dem extat luculenta, libro
quarto cap. xvi. necnon
apud Theophrastum, quæ
ita se habet.

Εκατοὶ δὲ τῶν ποταμῶν ἰσχυροῦς
ἰδιὸν τι πῖπτον, ὡς καὶ καὶ τῶν χερ-
σίων. καὶ ἰδιὸς τριβώνος οὐ ἀπὸ

σιν· ἰσθὶ πάντα ᾧ φύνται, ἀλλ' οὐ τοῖς ἰλιόδοις τῶν πεταυῶν. οὐ μὲν γὰρ δι' βάλα πισταπέλα, ἢ με
 κρῶ μέλιν, καθά οἱ περὶ τὸν σφύμονα. σκιδῶν δ' οὐ τοσούτο καὶ ὁ πάλας, καὶ τὰ ἄλλα. κατ' ἴκα δὲ
 ἴσιν αὐτοῖ, πλὴν αὐτὰ τὰ φύλλα, ὅσπερ ἐκινῶντα, καὶ κρύπτοντα τὸν τέβολον. ὁ δὲ τέβολος αὐτὸς αὐ
 τῷ ὕδατι νύκτα εἰς βυθόν. τὸ δὲ φύλλον ὄρεϊ πλατύν, προσμεμῖνεν τῷ τ' ἐπιλίαν. μίσχον δὲ ἴκα, σφύμα μα
 κρόν. ὁ δὲ ναυλὸς εἰς ἄκρον βαθύτατος, ὅθεν τὰ φύλλα, καὶ ὁ καρπός. τὰ δὲ κάτω λιπτότερος ἂν, μί
 χρι τ' ῥίσις. ἴκα δὲ ἀποπερυκτόντα ἀπ' αὐτοῦ τριχῶδη, τὰ μὲν πλεῖστα παράλληλα, τὰ δὲ καὶ παραλλά
 τόντα κάτωθεν ἀπὸ τ' ῥίσις μεγάλα, τὰ δὲ ἄνω, ἀεὶ ἰσάτω προΐσιν, ὥτι τὰ πλεοναῖα μικρὰ πᾶσι
 ἴσιν. καὶ τῶν διαφορὰ μιν γὰρ τῶν ἀπὸ τ' ῥίσις πρὸς τὸν καρπὸν. καὶ τὰ ἀραβλαστύματα πλεον, καὶ
 γὰρ τρία, καὶ τέσσαρα. μάλιστα δ' αἰνὸς πλεονέστερον τ' ῥίσις, ἵτα τὰ μετὰ τοῦτο, καὶ τὰ ἄλλα κατὰ τὸ
 γόν. τὸ δὲ παραδλάσκημα ἐστὶν ὅσπερ ναυλὸς ἄλλος, λιπτότερος μὲν τὸ πρῶτον, τὰ δὲ φύλλα καὶ
 τὸν καρπὸν ἴσιν ὁμοίους. ὁ δὲ καρπὸς μέλας, καὶ σκληρὸς σφύμα. ῥίσις δὲ ἰλίαν καὶ πόαν ἴκα, σκίπτ
 ῃ. ἢ μὲν οὖν φύσις τοιαύτη. φύνται ὡς τοὶ ἀπὸ τοῦ καρποῦ πιπτόντες, καὶ ἀφ' ἑαυτοῦ ἐλατύν τὸ ἴσιν. φάν
 δ' οἱ μὲν ἴσιν ἐπ' ἵστασθαι, οἱ δὲ διαμυλῶν τῶν μὲν ῥίσις ἀσχερόν, &c.

NOMENCLATURA.

Nomenclaturæ Tribuli aquatici, qui Græcis τριβύλον δicitur, supra
 exposita sunt. Germani Wassernuß (aquaticam nucem) Weiernuß, & See
 nuß, hoc est, Lacustrem nucem appellant. De Tribulo Theophrastus lib.
 vi. cap. 1. & iij.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Tribulus aquaticus refrigerandi & spissandi naturam habet, ad inflam
 mationes ergo usurpari potest. Reliquas facultates cum terrestri commu
 nes obtinet.

De Tribulo aquatico Baptista Fiera ita canit:

Tribule in undosis sinate paludibus alges
 Cur tamen irate cornua frontis habes?
 Secretas tutamur opes, sub cortice dulcis
 Esca latet, dulce hoc nec nisi ab igne datur.
 Et mihi ab æthereo numerosa potentia rore,
 Me maris & cæli prouida cura fouet.
 Languentes uereor fauces: nec mandere lumbus
 Discupit, urina huic, cum nocuit hæc lapis.
 Ex me mica iuuat, grauidas sed contrahit aluos,
 Me miserum, mortis dos mea causa mihi.

De Lappa agrestis. Cap. CIIII

Lappa agrestis:

N AGRIS QVIBVSDAM FRVMENTARIIS INTER
 Speltam, alias quid genus fruges, Lappæ quoddam genus repe
 ritur,

Lappa agrestis.
Ackerkletten.



ritur, folijs dissectis, caule terete, & cubitali ueluti Corianon, flore in umbellis cædido Aceri arbori quam similimo, nam qui exteriores in muscarijs partes occupant flores latiores sunt & maiores, ijs qui mediũ obtinēt locum. His deciditibus, lappulæ subnascuntur asperæ, latæ, aculeatæ, ac undiq; binæ coniunctim profiliētes, duabus rotulis haud absimiles, singulæ uero Cimicis formam representātes, uestibus quoq; ut alia Lapparum genera herentes.

Proinde extat in uliginosis quibusdam syluis, nonnullisq; dumetis alia quædam Lappæ species, multos quotannis ex radice cædida ac serpente tenues, teretesq; coliculos perinde ut luncus emittens, eosq; totos teneris, rotundis, & hederaceis uestitos folijs, ac exiguis & candidis flosculis ab imo ad summum usque emicantes, qui & ipsi in minutissimas teretesq; abeunt Lappas, ac ijs quas Agrimonia, seu Eupatorium gerit magis exiguas, uestibusq; similiter adhærescentes.

NOMENCLATURÆ.

Primum in hoc capite descriptum Lappæ genus, cum frugibus molestũ & nox

& noxium sit, posset forte Tribulus campestris cenferi, cuius Vergilius
 1. lib. j. Georg. meminit. Nostri homines Germanica lingua *Seldt* / *oder* *acter*
Fletten nominant, quas ego hos imitatus, Lappulam agrestem, seu campe-
 strem uoco. Iacobus Syluius excellentissimus nostri temporis Medicus,
 iuxtaq; doctissimus, existimat hanc plantam Myrrhidam esse Galeni, quod
 si ita est, facultates eius supra cap. clviij. libri primi commentariorum no-
 strorum reperies.

2. Alteram huius capitulis Lappam, quæ in syluis & dumetis nascitur, no-
 stri *Waldt Fletten* / hoc est, Lappulam syluestrem uocant. Nec dubium est
 quin ea quoque herbula peculiare in Dioscoridenomen habeat, sed quod
 nobis haud dum constat.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Duo hæc Lappæ genera frugibus ut diximus obsunt, forte in medi-
 cina præstantioris usus. Cum uero de illis maxime quod ad facultates
 attinet, nihil certi mihi conpertum sit, missa ea nunc facimus.


De Cartamo, siue Cneco. Cap. CV.

VICQVID DE EXTERARVM REGIONVM FERTI-

Q. litate prædicetur, certe & Germania suas opes quas solum no-
 strum fundit, ostentare potest, & non minus quam aliæ natio-
 nes deuarijs Dei donis gloriari. Habemus autem inter cætera & Cartamū
 illum, quem Ægyptij olim Italiæ ignotum sibi uendicarunt, oleo, non ci-
 bo ipsis gratum. Atque hic tanta copia apud nos prouenit, ut mercatura ad
 modum celebri & magna hinc inde distrahatur. Qui sit ut cum quæstuosa
 sit planta, ab hortulanis Argentinenfibus & Spirenfibus quocannis in-
 ter æstiuas fruges seratur. Sationis uero hic apud illos obseruatur ritus.
 Aprili mense semina Cartami oblonga, candida, & quadrangula ex ordi-
 ne panguntur, quæ inter paucos dies a fatu erumpere solent, licet dulcia il-
 la semina testaceo quasi cortice operta sint: postquam e terra erupere, bre-
 ui deinceps tempore in altum tendunt, caulesq; emittunt rotundos & bicu-
 bitales, multisq; solidis, angustis & aculeatis folijs uestitos. In cacumine
 horum quamplurimi uisuntur ramusculi, capitulis rotundis aculeatisq; uer-
 ticillorum magnitudine emicantes. Illa Iulio mense in florem sese expli-
 cant croceum, odoratum, multiplicem, et qui si seorsim e uasculis extractus
 spectetur, stellam referat senis radijs distinctam. Hunc hortulani e capitulis
 aculeatis

Plinius lib. 21.
 cap. 15.

Cartamus, siue Cnecus.
 Wilder Saffran.



aculeatis euellunt, ac postea
 uendunt. Atque hic est Cro-
 cus ille syluestris. Augusto
 mense lapidosum semen in
 capitulis quæ diximus con-
 ferctim ex ordine inter can-
 didam lanuginem (quod
 idem in omnibus Carduo-
 rum de quibus proximis
 agemus capitibus, animad-
 uertas) positus maturatur.
 Ex illo Cartamus ut dixi-
 mus quotannis reuiuiscit.

NOMENCLATURA.

Multi flosculis Cartami
 aridis in cibis condiendis
 non aliter atq; Croco utun-
 tur. Neque prorsus con-
 temnendum est id condi-
 menti genus. Germani hæc
 plantam Wilder Saffran/
 hoc est, syluestrem Crocū
 uocāt. Latini Cartamum,
 Crocum Sarracenicū, seu
 campestre dixere. Quo
 loco monendus mihi est
 candidus lector, ut memi-
 nerit aliud esse Cardamum
 per d scriptum, quod Na-
 sturtium significat, & aliud
 Cartamum per t, quod est
 nomen huius presentis plā-
 tæ, quæ apud Dioscoridē

anin & *ayla* non
 men est eius her-
 bæ quam Atran-
 tylida, Colum-
 rusticam &c. Di-
 oscorides uoca-
 uit lib. 3. cap. 98.

lib. iij. cap. clxxxij. *anin* & Cnecus, uel ut Ruellius legendum cenfet Cnecus
 appellatur, De Cartamo Theophrastus lib. vi. cap. iij. & lib. x. cap. j. Plin-
 ius

Nota.

nus lib. xxi. cap. xv scripsere. Auerrhoes de Cartamo ita scribit cap. xli.
 „ Elcratis, alias Cartamum, id est, semen de Papaga, ex eo utimur
 „ semine, & est ex medicinis manifestis in purgando phlegma si-
 „ ne aliquo timore, & eius nobilitas est quasi super nobilitate om-
 „ nium medicinarum purgantium &c. Hæc ille. Ex quibus sane
 uerbis quantæ sit utilitatis Cartamus intelligi facile potest. Pro illo ergo
 gratiæ sunt agendæ Deo Opt. Max. ac alto animo reponendum, quantâ
 beneuolentiam Deus nobis exhibeat, in eo quod tot & tam uaria nobis do-
 narit Simplicia, quibus & in cibo & medicina magno nostro cum commo-
 do uti possumus. Quod si hæc beneficia ita à nobis expendere uti dece-
 bat, sane non uideo cur pro Turbith alijsq; exoticis & peregrinis nummos
 nostros exponamus. Sed ne mercatoribus aduersari uideamur, emat quisq;
 quod uelit eoq; utatur, nos nostræ terræ ut debemus dotes exponimus,
 exosculamur, laudamus, extollimusq; qui his nobis cum contentus esse no-
 lit, is ex India & Arabia sua petat pharmaca, & usq; pecunijs suis novos
 morbos, aduersamq; ualeitudinem, & naturæ labefactionem redime-
 re pergat. Nos quoque in Cartami historia pergamus. De illo Sera-
 pio duo scripsit capita, nimirum cxxvi. & ducentimum secundum, in qui-
 bus Churtal, & Cartam illum nominat.

VIRE S AC TEMPERAMENTVM.

Tinctores Cartami usum optime norunt, nimirum quod ad inficiendos
 pannos faciat. Quanquam in medicina suam quoque laudem obtinet, ma-
 xime semen, quod calidæ est naturæ.

I N T R I N S E C V S.

Pauperes flosculis Cartami tussis, condimenti uice utuntur, nec male, ci-
 bos namq; croceo colore commendant, & aluum emolliunt.

Seminis tussi expressus succus, cum iure gallinæo potus, non solum aluū
 emollit, sed & lentā trahit purgatq; pituitam Dioscoride & Galeno testibus.

Officinæ compositionem habent Diacartamum appellatam, quæ adea
 quæ iam diximus apprimè conducit, si recte conficiatur.

Semen tustum ac in iure carniū, aut Ciceris arietini bullitum ac potū,
 phlegma, lentosq; ac uiscosos humores trahit, non aliter atque Epithymum
 melancholicos.

E X T R I N S E C V S.

His floribus panni inficiuntur, & mulierculæ quoq; in liniendis suis le-
 cis ijs utuntur.

De Carduo Fullonum.

Cap. CVL

Barten Distel.



IN OMNIVM FERRE
 stirpium genere duo fasti-
 gia statuere licet, nimirum
 ut hoc satium, illud uero
 sylvestre aut erraticum dica-
 tur. Id cum in omnibus pro-
 pealijs, ut diximus, locum
 habeat, tum uero in hoc
 quem nunc describendum
 sumpsimus Carduo uel ma-
 xime habet. Satius itaq;
 Carduus fullonius, qui
 ab asperimis ac firmissi-
 mis aculeis, sylvestris potius
 dicendus erat, a rectori-
 bus & fullonibus in hortis
 plantatur. Sunt qui totos
 agros illo conserant, quod
 in agro Spirensi uidere li-
 cet. Planta est elegantissi-
 ma, nonnunquam uiri pro-
 ceritatem attingens, radice
 candida, recta, laeui, Pastila-
 nae hortensis (de qua nos
 supra cap. cxlvij. lib. i.) simi-
 li praedica. Folia quae pri-
 mo anno erumpunt, longa
 sunt & lata, Lapathoeae
 similia, per ambitum
 incisuris minutis serrata.
 Altero anno caulis profilit
 rotundus, concauus, aculea-
 tus, geniculisq; distinctus.
 Singula genicula, bina ob-

*Carduus fullonis
 us sativus.*

longa, sursum tendentia folia, per quae caulis procerus transit, complectun-

tur

2.
*Carduus fulloni-
 us erraticus.*

tur e regione inuicem opposita, carinato alarum sunt, qui peluis uel labri modo aquam semper continet, quod in spina quoque alba, de qua sequenti differemus capite, uidere est. Scaporum fastigia echinato minantur uertice, resupina hamulorum flexura, mucronibusq; leuiter uncinatis, inter quæ exigui & candidi, e minutissimis receptaculis apum fauis similibus prorumpunt. A flore semen in isdem quæ diximus conceptaculis reperitur, Fœniculo aliquanto minus, gustu amarum. Porro dissectis echinatis capitulis, id quod peculiari suo tempore fieri debet, vermiculi in medulla eorum candida, cernuntur, licet nō semper hoc uidere cōtingat. Syluestre seu erraticum Cardui fulloni genus, quod sponte sua iuxta sepes plerunque, ac alijs præsertim humidioribus locis prouenit, satiuo per omnia respondet, nisi quod folia habet magis mucronata & spinosiora. Flos in hoc genere inter spicula echinati uerticis emicat purpureus seu roseus potius. Cæterum hamuli huius uncinati non perinde sunt asperi, atque satiui, quam obrem a textoribus ad læuigandum rude lanificium usurpantur.

3.
*Tertium Cardui
 fulloni genus.*

Tertium huius Cardui genus multo magis exiguum est supradictis, si uel folia uel capitula aculeata spectes, sed caulem habet altiore utroque iam commemorato Carduo. Vertices echinatos habet exiguos nunc iuglandem paruam, a ut nucem myristicam magnitudine fere referentes. Est autem hoc Cardui genus, syluestris plane planta, inter Lappas & cetera herbarum uicia prorumpens. Posset forte ad Atractylidis aliquod genus referri.

NOMENCLATURAE.

Quamquam plura alia extent Carduorum genera, quæ concauo foliorū quo se in geniculis coniungunt sinu, aquas, rores & imbres asseruent, ut sunt ij quos Germani *Dehe distel* & *Bracken distel* nominant: tamen hic noster fullonius Carduus principem inter illa obtinet locum. Hic Græcis, teste Dioscoride lib. iij. cap. xi. *δίσταμος*, (quod nomen a contrario inuenit, quoniam concauo alarum sinu rorem uel imbrem recipiat, quo uelut ad abigendas sitis iniurias abutitur) Latinis Labrum, seu Labrum veneris. Recentiores Carduum Mariæ, de quo statim sequenti capite, Labrum veneris nuncupatum uolunt, quod nos minime offendit, cum Apuleius Dictamnū quoque hoc pacto appellauerit cap. lxiij. Germani *Kartendistel* / *Büben strål* / *Weber strål*. Officinæ Virgam pastoris, & Carduum fullonum nominant, quæ omnia tolerari possunt, modo sciamus Carduum fullonum nihil aliud esse quam *Dipsacon* Dioscoridis, quem aliqui *Crocodilion* uocant, alij *Chamæleonem*, alij *Onocardion*, alij *Veneris lauacrum*: Romani Labrum veneris, alij Carduum veneris; Ægyptij *Seneor*, alij *Chir*, alij *Méleta*, Daci sciaram uocant.

VIRE

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Dipsacos frigida & sicca est qualitatis, qua de causa humiditate semper appetit. In exterioribus duntaxat corporis partibus usum habet, Radix aliquantulum ad siccam temperaturam accedit.

E X T R I N S E C V S.

Vermiculi (annotante Dioscoride) capitulorum in folliculo alligati, collo aut brachio appensi produntur quartanis febribus remedio esse.

Folia capiti imposita phrenesim sedare tradunt.

Succus foliorum auribus inditus, uermes eorum enecat.

Aqua e' folijs distillata collutu, ulceribus & putredini oris opitulatur.

Sanat rimas sedis, fistulasq; si tusa & decocta in uino radix, usquedum sit crassitudo ceræ immittatur. Medicamentum ærea pyxide recondendum.

Adiunt fornicationibus, uerrucisq; pensilibus remedio esse.

Aqua quæ in foliorum concauo reperitur, caliginosis & rubentibus oculis prodest.

Eadem macula faciei, maxime eas quæ oculis subsunt emendat & exterrit collutu.

Mulierculæ formæ studiosæ usum huius optime tenent.

De Carduo Mariæ. Cap. CVII.

C ARDVVS MARIAE (VT VVLGO VOCANT) ET ipse siticulosus esse uidetur, siquidem inter caulem & foliorum sursum tendentiū concauos sinus aqua semper colligitur. Folia hic habet permagna, & omni quidē Lactuæ genere latiora, aculeata, multisq; acutissimis spinulis horrida, insuper lacteis undiquaq; aspersa maculis. Caulem proferit altissimum, teretem, tota sua substantia spinosum, surculosumq;. Cæterum tam in illius quam surculorum fastigijs capitula echinata rotunda & asperrima emicant, in orbem rotatim spiculis prælongis munita. Hæc Iulio mense florem, quo tempore & Cnecus floret, ostendunt purpureum, quo euanescente semen relinquitur longum & læue Cnico simile, gustu dulce nucleum nucis iuglandis emulans, tenera ac candida lanugine delitescit, quæ & ipsa a maturitate in auras auolat. Carduus Mariæ quorannis ex semine deciduo, ut plæræque aliæ æstiuæ plantæ repullulascit. In hortis nascitur, nam in illis hodie plerunque plantatur.

Carduus Mariæ.

Unserfrawen/oder Wehe distel.

NOMENCLATURAE.

Mulierculæ nostræ tam
semine quam aqua foliorū
distillata aduersus pleuriti-
cum morbum usurpant, ab-
sisteruntq; id Cardui genus
Marien distel / frawendia-
stel / vnd Wehe distel Germa-
nica lingua appellari. Latine
uulgo Labrum ueneris,
Carduum Mariæ uocant.
Dioscoridi *ἀναβλάνη*, lib.
iij. cap. xij nuncupatur.

VIRE AC TEMPE-
ramentum.

Vires ac facultates Spi-
næ albæ sub nomenclatu-
ris fere explicatæ sunt. Pro-
inde usurpantur hodie u-
trisque corporis partibus me-
dicandis.

INTRINSECVS.

Aqua e folijs Cardui
Mariæ distillata, ac quantū
mediocris haustus conti-
net pota, laterū morbo au-
xiliatur. Si huic potioni se-
minis Cardui Mariæ tussis
dimidiam drachmam adie-
ceris, efficacius id præsta-
bit, quin & pestilentiali ue-
neno, & quibuscunq; alijs
corporis internis malis exi-
gendis apprime conducit.

EXTRINSECVS.

Aqua distillata inflammationibus incensi epatis, deliquio animi in lin-
teolis foris imposita opitulatur.


De



Spina alba

De Chamæleone. Cap. CVIII.

Chamæleon vulgaris.
Gemein Eberwurtz.



Q VANQVAM CHAMAELEON INTER CARDVOS,
quos Germani in genere Distel nuncupant, haud postremus
HH ij

Chamaeleon exiguus.

Blein Eberwurz.



1.
Chamaeleon ni-
ger vulgaris.

Serap. cap. 265.

Carduus suaria-
us, Scordistel.

2.
Chamaeleon al-
bus seu exiguus,
Blein Eber-
wurz.

fit, tamen lingua germani-
ca eo quo diximus uocabu-
to a spinis quibus quam-
plurimis horret, illud mi-
nime appellare uoluit, sed
Eberwurz, quasi verrinā,
(Eber enim Germanis idē
est quod verres Latinis) ra-
dicem nūcupat, forte eam
ob causam quod in polen-
ta exhibita, sues enecat.
Eius duo sunt genera, quo-
rum primum & præstantis-
simum quidem in Hercy-
nia sylua, in Eissalia eti-
am ea sylua quæ der Y-
dar dicitur, alijsq; asperis,
& altis montibus proue-
nit, radice longa, nigra, su-
periore sui parte quasi dis-
secta, aut ut Serapio quoq;
animaduertit, corrosa quæ
quotannis nouos emittit
caules, in uertice aculeatis
ac pallidulis floribus emi-
cantes. Floret Iulio & Au-
gusto mensibus, quo tempo-
re & Carduus suarius uul-
garis floret, Germanis
Scordistel dictus, cui her-
ba, aculeis, colore & flore
hic noster respondet Cha-
maeleon.

Alterum uero & exiguum
Chamaeleontis genus fere
ubique locorum prouenit, potissimum uero in asperis montibus, ac forti
albaq; terra, radice, folijs & semine Chamaeleonti nigro simile, sed magis
exiguum. Flos eius aculeatus & purpureus, humi procumbit, caule uacat,
& in

Chamaeleonurus.

& in papporum lanugine tandem euanescit. Semine prægnat Cnico assimili. Radices aliquantulum rubicant, grauissimi odoris. Augusto mense florē ostendit in perfectione sua hic Chamaeleo, qui Ruellio doctissimo uiro optime fuit cognitus, nam nostri illum minime norunt, licet uulgatissima sit planta, et incultis asperisque agris, maxime ædito loco sitis, familiarissima.

NOMENCLATURAE.

Quam Germani Ebermurg uocāt, eamego Eryngij, aut certe Chamaeleontis nigri (quem Pancarpon aliqui, alij Vlophonon, alij Ixiam, alij Cynomazon, alij Ocimoides, alij Cnidion coccon, alij Cynoxilon, Latini Carduum nigrum, aut Vernilaginem, Ægyptij Sobeluocant) genus esse existimo. Plinius lib. xxi. cap. xvi scribit Chamaeleonta in folijs non habere aculeos. Quo in loco aut redundat particula NON, aut necesse est Plinium de alio quopiam Chamaeleonta locutum fuisse. Nam lib. xxi. cap. xvij. idem Plinius, Chamaeleontē, maxime candidiorem, asperiora habere folia dicit, &c.

Cæterum innotuit nostris quoque regionibus uerus Chamaeleon niger, uerus,

Diosco. lib. 3. cap. 9.

χαμαλέον μίλας.

Ixia nomen propriū solum.

ad Chamaeleontē album pertinet,

uide Ruellium de nat. stirp. lib. 3. cap. 9.

3.

Chamaeleon niger, uerus,

HH in

ger, elegantissimum sane Cardui genus, pallidulis Carduisq; cæteris simili-
bus floribus emicans, semine uero oblongo & capillato.

Auicenn. lib. 2.

cap. 674.

Rafes de Simpl.

cap. 48.

Dioscor. lib. 3.

cap. 8.

Ἀμαρανθὶς

ἀγυρία.

Exiguum Chamæleontis genus Succaham Arabum esse semper pu-
taui. Pertinet uero ad Chamæleonta album Dioscoridis, quod descri-
prio testabitur, quæ huic plantæ ita conuenit, ut nulla nota reclamare uidea-
tur, quod Ruellius præclarissimæ eruditionis & summi iudicii uir, diligen-
ter obseruauit, uide commentarios illius de natura stirpium lib. iij. ca. viij.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Agyrtæ & qui radices hinc inde uenales circumferunt, pleno ore Cha-
mæleontis uulgaris radicem prædicant. Ac fieri potest ut ad multa illa uti-
lis sit. Veteres namq; cum multa inuenerint, nobis quoque plura alia ex his
quæ antenos inuenta fuere colligendi occasionem dederunt. Verum enima-
uero danda est opera ne quid temere plantis affingamus, quod præstare
nequeunt. Proinde Chamæleontis utriusq; radices calidæ, & siccæ sunt sa-
cultatis.

INTRINSECVS.

Chamæleontis albi radicis tusæ succus expressus, ac mensura cochlearis
in acerabulo uini potus tincas interaneorum pellit, hydropicis prodest,
urinam ciet, & aduersus quoduis uenenum Theriaca est optima.

Radix in puluerem redacta, ac drachmæ pondere è uino sumpta, pesti ad-
uersatur, quo nomine pecori, potissimum autem suis nonnulli radicem
hanc exhibent, persuadentes sibi hoc pacto iumenta & sues à fœda & pesti-
lente lue conseruari posse.

Aliqui eadem de causa radicem lintri clauo affigunt, ut super hac sem-
per cibum sumant.

Alij escam columbarum quo multas alias uenentur, è radice Chamæ-
leontis uulgaris conficiunt, ea qua sequitur ratione. Radici enim iam dictæ,
adiungunt limum adustum de clibano aliquo desumptum, mel, urinam, mu-
riamq; qua haleces conditi fuerint, quæ omnia ita temperant, ut in massam
redigantur, postea columbarijs imponunt, &c.

EXTRINSECVS.

Ferunt radicem hanc uires his qui eam gestauerint augere, alijsq; comi-
tibus nimirum, & quibus cum alter degit, adimere. Sed credat hæc qui uo-
let, ego quod sciam nusquam in scriptoribus eius rei mentio facta legi-
tur.

Chamæleontis nigri radix cum aceto decocta, collutu scabiem, & impe-
tiginis,

elgines, aliaq; difficilia curatu uitia sanat, doloriq; dentium conducit. Quæ uero nunc diximus, non uulgari, sed uero illi ac peregrino Chamæleoni ascribi debent.

Cæterum scribit Dioscorides Chamæleonem album canes & sues, nec non mures occidere, quæ sane de uulgari nostro Chamæleoni intelligi nō possunt, ut nonnulli statuunt, cum constet illum, maxime uero radicē eius suis salutare, ea enim de causa ab agyrtis uenalis circumfertur, & a multis ueterinarijs emitur.

De Leucacantha. Cap. CIX.

PIRENSES PVELL'AE INTER RELIQUAS CORONARIAS plantas Cardui spinosum quoddā genus plantant, folijs Chamæleonti nigro, seu uulgari adeo cōsimile, ut in initijs anteq̃ floreat, ab illo uix discerni queat. Hoc altero a' satione anno caules emittit altos, asperos & aculeatos, uulgari Carduo syluestri (de quo statim sequenti capite) adsimiles, quamplurima aculeata capitula in uertice gerentes, e quibus flores candidi, beneq; odorati prorepunt, forma alias nihil a' cæteris Carduorum generibus distantes. Semine prægnat magis exiguo Carduo Benedic'to, candida lanugine inuoluto. A' flore & caulis & folia, nec non longa & candida radix prorsus pereunt. Puellæ ut diximus magna diligentia hoc Cardui genus plantare consueuerunt, propterea quod flores eius inter Rosmarinum coronas suas nectant. Cæterum nullo alio in loco hanc Leucacantham unquam me uidisse memini.

NOMENCLATURAE.

Puellæ & mulierculæ Spirenses hunc Carduum Weiß distel/hoc est, Spinam albam nominant. Quia uero id nominis alteri cuidam Carduo tribuendum erit, ut paulo post dicemus, ideo ad discrimen aliorum hunc *Carduus puella* nostrum Carduum Weid/oder Jungfrauen distel/hoc est, Carduum *puerum*. *ellarum*, & *Zamgartendistel*/hoc est Carduum satiuum hortensem nunc *Carduus satiuus* pare placuit. Nobis sane in Dioscoride *λευκαναλθα*, (quam quidam *Polygo hortensis* naton, alijs *Phyllon*, alijs *Ischiada* uocant, Romani Spinam albam) recte dici Diosco. lib. 3. posse uidetur, quanquam neminem nostræ sententiæ subscribere cogimus. cap. 20. sed dominum Deum precamur eos nobis donet uiros, qui tam Carduos, *Leucacantha* quam alias quas cunq; stirpes discernere nos doceant. Serapio cap. xcix. uox & *Rhamno* Spinam albam *Bedeguard* uocat, de qua uoce multi multa dixerunt, licet tribuitur, uide plerique illorum non satis ex Spina alba se aut alios extricare queant. Vide Diosco. lib. 1.

Iacobum Manlium super Syrup. de Eupatorio, & Auicennam lib. ij. cap. lxxxij. Hactenus ergo duo proposuimus genera Spinæ albæ, de tertia paulo post.

VIRESC. TEMPERAMENTVM.

Quod si hic Carduus Spina alba, seu Leucacantha Dioscoridis sit, certe in medicina locum quoque habebit.

INTRINSECVS.

Leucacantha cum radice sua uino decocta, ac per diem uno atque altero cyathio hausta, ueteri laterum dolori, Ischiadicis, necnon ruptis & conuulsis prodesse a Dioscoride traditur. Sed hæ facultates ei potius attribuentur Carduo, quem cap. cxi. describemus.

EXTRINSECVS.

Radix Leucacanthæ manducata, dolorem dentium sedare dicitur, sed de his plura paulo post.

De Carduo sylvestri. Cap. CX.

VLTA ALIA CARDVORVM GENERA INTER

M: fruges, potissimum uero auenam enascuntur, quorum alia proceritatem uiri attingunt, quædam humiliore statu contenta sunt, in uniuersum tamen omnia aculeatis, & dissectis folijs caulem ambientibus prædita, necnon capitulis (quorum alia rufos, alia candidos, nonnulla roseos gerunt flores, cætera Carduo puellarum, consimiles) in uertice spinosis emicantia. Eorum semina oblonga apparent, punicei fere coloris, læuia, ac Carduo Mariæ magis exigua.

NOMENCLATURAE.

Vniuersa Carduorum iam descriptorum genera, quæ agricolis & melioribus subinde impedimento sunt, nos uita frugum, seu Carduos sylvestres esse iudicamus, de quibus Vergilius in hunc modum,

Carduus ex spinis surgit Paliurus acutis.

Germani Haber/oder Feld distel uocant. De uero Carduo, seu Scolymus, suo quoque dicetur loco.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Cardui syluestres, seu agrestes non magni sunt usus. Teneros asini cibo maxime expetunt, alijsq; quibuscunque herbis anteponunt. Hoc pacto sui mentis pabulo exhibentur in tenera sua ætate, Temperamento calido & sicco præditi.

De Spina alba. Cap. CXI.


IC VERO TERTIAM HABEMVS SPINAE ALBAE
 H speciem, quæ iuxta sæpes & nonnunquam arenosis & incultis quoque locis prouenit, inter omnia fere Carduorum genera maxima. Hæc folia gerit prælonga, latissima & aculeata, caules emittit admodum proceros & crassissimos; eosq; canos & albicantes, ac si tenuissima candidaq; lanugine, aut tela aranæ obducti essent, quod idem & in folijs spectare licet. Vertices caulium capitula sustinent aculeata, aspera & echinata, quæ Iulio & Augusto mensibus purpureum ostendunt florem, postquam is defloruit, semē incanum siue nigricans, candida lanugine occultatur, rotundius magisque exiguum semine Cartami, amari & feruidi insuper gustus. Radix huius Cardui amara est, & foris nigra. Altero demum anno, florem & semen profert, posteaque suo quasi munere perfunctus tota sua substantia perit, ac subinde e semine deciduo repullulascit.

NOMENCLATURAE.

Quod nos parui aut nihili facimus, id natura plerunque optime munit. Quid enim Carduo contemptius? Rursus quid aduersus omnem iniuriam magis natura armauit hoc ipso Carduo? Siquidem & folia & caules spinis horrida sunt, & capitulū in quo semina delitescunt acutissimis & ualde asperis aculeis munitur, ita quidem ut frustra hæc natura administrare fieri non possit, quin potius peculiare quid per hoc, quod semen adeo diligenti cura conclusum, et a quauis iniuria assertum uoluit, significare uelle uideri merito debet. Sed omittis his, nomenclaturas recitemus. Germani Weißwegdistel nominant, & est altera Spinæ albæ, quæ Græcis *ἄνδα μιν*, Arabibus Bedeguard dicitur, apud Dioscoridem lib. iij. cap. xij. quod neminem negare posse puto, qui descriptionem Dioscoridis cum rerum uisus imaginibus contulerit. Neq; opus fuerit in re manifesta præter necessitatem multa uerba facere: Nos Spinæ albæ cognomina pro more nostro recensēbimus, sunt autem hæc, Agriocinara, Donacius, Eryisceptrum, Spi-

Spina alba.

Weißwege Distel.



Radix decocto dentes in dolore collis prodest.

na alba, aut regia. Carduus
camparij. Cæterum mul-
ta Carduorum gen era A-
canthæ nomine apud Dio-
scoridem censentur, uideli-
cet, Spina alba, Topiaria
Acantha, Arabica Acan-
tha, & Acantha Agria: si-
cut et Erysi sceptri uox mul-
tis alijs comunicatur plan-
tis, uide Dioscoridem lib.
primo. cap. iij. cap. xix &
lib. iij. cap. viij. & lib. iij.
cap. lix. De Spina alba uide
Bedeguard Arabû, & Aui-
cennam lib. ij. cap. 680.

VIRES AC TEMPE-
ramentum.

Omniû Carduorum ra-
dices & semina fere uene-
no aduersantur, potissimû
autem semina, nam calida
sunt & sicca.

INTRINSECVS:

Spinæ albæ radix in ui-
no cocta & pota, cruenta
& purulenta reſcientibus,
& stomachicis prodest.

Semen omni aduersatur
ueneno. Idem eporum con-
uulsis infantibus auxiliatur

De

De *Atractylide*, seu *Cartamo sylvestri*.

CAP. CXII.

Atractylis, seu *Cartamus sylvestris*.

Dreidistel.



ALIUD PROIN CAR
 dui teneri genus in aridioribus ac incultis gramino-
 sisq; campis reperitur fo-
 lio instar Cardui sylvestris
 (de quo paulo ante disserui-
 mus) dissecto, cineraceo,
 aculeisq; seu spinis molli-
 bus horridulo, radice autē
 breui, & recta præditum.
 Hoc caules emittit altero
 demum anno rotundos, cu-
 bitales interdum, nec teme-
 re altiores, ab imo ad sum-
 mū usq; exiguis crispis acu-
 leatis folijs uestitos, eosq;
 fere singulares, in fastigijs
 nonnunquam ternis aut bi-
 nis, interim paucioribus,
 pluribusue ramulis seu sur-
 culis brachiatos, capitula
 in fastigijs aculeata, lutea,
 seu aurea potius gerentes.
 Atq; hi illius flores sunt,
 forma sua stellati, oculumq;
 elegantissimum exprimen-
 tes. Semen ubi maturuit,
 id quod appetente sit Au-
 tumno, forma sua Cyanū
 cœruleum prorsus æmula-
 tur, nisi quod aliquantulū
 crassius, fortiusq; existit.

Anicu

Aniculæ circa Festum Assumptionis, ut uocant, Mariæ hoc genus Cardui magno studio quærunt, suisq; sagminibus, (ut plena sunt hodie omnia prohdolor foeda superstitione) adiungunt, maxime uerò eos expetunt in hoc genere Carduos, qui tres surculos, seu ramulos supra in uertice ostendunt, eosq; ut præstantissimos cæteris anteponunt, unde & nomen Germanicum *Sreydistel*, quasi dicas Carduum trium surculorum, deriuatum fuit. Vocant uero & *frawendistel*, quod una cum cæteris sagminalibus herbis die Mariæ uirgini sacro in templis consecrari soleant. Proinde silentio prætereundum non est, quod in huiusmodi Carduo olim ipse non sine admiratione uidi. Is enim duorum digitorum latitudinem habebat, utrinque crispis & aculeatis foliolis uestitus, qui cum unicus & singularis esset caulis, unicum quoque latissimumq; capitulum aureo fulgens flore, admixto modico candore, ostendebat, miraculum ab omnibus hauduulgare existimatus.

NOMENCLATURAÆ.

*Fusus agrestis.
Colus rustica.
Cartamus syluestris.*

Aniculæ, ut diximus ad superstitiones suas adhibent, quare Sagminibus illarum hoc Cardui genus relinquamus. Sunt nonnulli qui Germanica uoce *Sewdistel*, hoc est, Carduum iuarium nuncupatum uelint. Quod uero in Dioscoridenomen habeat, mihi non satis constat, nisi sit *οὐρανὸς ἀναστός* Dioscoridis lib. iij. cap. lv. quod Ruellius quoque lib. iij. de natura stirpium ca. lv. sensit, fusum, seu colum agrestem, & Cartamū syluestrem appellans.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Semen tusum accum uino potum, icribus scorpionum mederi dicitur.

De Carduo pratensi.

Cap. CXIII.

CARDVVS PRATENSIS IN NONNVLLIS PRATIS, unde ei nomen nascitur, folio satis longo, latoq; utrinque serrato, exiguis, tenerisq; aculeis; spinis uē exasperato, ex uiridi pene albicante, ac Carduo fullonum quadamtenus consimili, quod in tenera ætate uerno tempore a mulierculis inter cætera olera legitur. Iunio mense caules emittit hic Carduus prælongos, oblongis in cacumine capitulis emicantes, flore uero in pallorem languescente, uti Carduus fere benedictus. Cæterum in singulis floribus exigua & purpurea apparent stamina. Flore marcescente semen maturatur, tenera ac candida, ueluti & aliorum Carduorum, lanugine inuolutum, & in pappostandem euanescens, alio
quanto

Carduus pratensis.
Wysenföl.



quanto maius Cyano. Cau-
les huius Cardui teretes, e'
geniculis singulis bina fun-
dunt folia, quæ & ipsa a-
quas interdum retinere pos-
sunt, sicut & Carduus fullo-
nius. Planta est hyemis con-
temptrix, & quæ frigora fa-
cile ferat. Aprili mēse quot-
annis noua, candida folia ē,
capillata exeunt radice.

NOMENCLATURAÆ.

Cum huius Cardui fo-
lia incubis quoque ut reli-
qua olera expetantur, ideo
a mulierculis Wysenföl/ &
Grassföl, hoc est, Brassica
pratensis nuncupatur. Est
autem inter omnes Cardu-
os hic tenerrimus, si spinas
cōsideres molliusculas. Mi-
hi sane *ἄγρια ἀνάρθη* Diosco-
ridis lib. iij. cap. xviij. esse ui-
detur, cuius & Plinius lib.
xxij. cap. xxij. meminit. La-
tino & uulgato uocabulo
Carduus pratensis, & Bras-
sica pratensis dici potest.

VIRES AC TEMPE-
ramentum.

Quod si hæc planta Acan-
thus sirsyluestris, ut ego
coniicio, uiribus ac faculta-
tibus satiuo respondet, de

quo cap. xvij. lib. iij. Dioscorides. Proinde cum apud Mediomatices folia
eius ut diximus in oleribus decoquantur, hinc facile colligi potest, plan-
tam no esse insalubrem aut noxiam, præsertim cum temperamento sit præ-
dita medio.

De Carduo benedicto. Cap. CXIII.

Cardo Benedict.



Aecloga. s.

D

IVINVS ILLE ALCIMEDON, SIC ENIM A VERGE
lio nominatur, Damae pastori duo olim fecit pocula, molli
anfas

anfas amplexus Acantho. Quodnam uero Cardui genus mollis Acanthus esset, in Germania hactenus cognitum minime fuit. Qua de causa, quæ uulgo Carduum benedictum uocant, eum ego Acanthum Germanicum appellare uolui, propterea quod descriptio Acanthi aliquo modo Carduo benedicto respondeat. Is enim hodie in hortis plantatus prouenit, folijs longis Lactucæ similibus, sed angustioribus, per ambitum instar Sinapis albi dissectis, nigricantibus, teneris, mollibus & pinguibus, caulibus nonnunquam altis, & digitali crassitudine præditis, nonnunquam tenuioribus, maxime uero quod ad eos attinet, qui primario cauli adnascuntur, iuxtaque eundem è lateribus radicis prosiliunt, qui & ipsi minutioribus quidem & crispis, sed oblongis & aculeatis foliis undiquaque ambiuntur. In uertice coliculi Junio aut Iulio mense, prout serius aut maturius satus fuerit hic Carduus, rotunda & lanuginosa emicant capitula, nucis iuglandis magnitudine è quibus flos prorepat pallescens, & in luteum colorem uergens. Semen in prædictis capitulis, postquam defloruerunt, reperitur, subluteum oblongum, alba lanugine inuolutum. Radices eius satis longæ sunt, teneræ & succosæ. Tota uero sua substantia, hoc est, folijs, caule, succo & flore, Absinthio amarior est hic Carduus. Delineaui utcumque Acanthum nostrum, quæ sane descriptio non multum ab Acanthi satui apud Dioscoridem historia ab iudit, unde cognosci facile potest, quid nos mouerit, ut Carduum benedictum, Acanthum Germanicum uocarem. Quanquam ut & hoc obiter dicamus, non ita pridem uerus seu peregrinus Acanthus in hortis Germanicis uersari coepit, qui, ut Dioscoridis uerbis utamur, folia habet multo lactu caceis latiora, & longiora, erucæ diuisura, nigricantia, pingua, læuia: caulem binum cubitorum, digitali crassitudine, leuem, prope uerticem ex interuallis circumdatum foliolis, seu nucamenta quædam oblonga, referentibus, Hæc omnia peregrino Acantho adamussim respondent.

1.
Acanthus Germanicus.

2.
Acanthus uerus.

NOMENCLATURÆ.

Supra in historia Cardui benedicti, qui Germanis Cardio benedict dictatur, indicaui quonam illorum in Dioscoride referendum censeamus, non mirum ad Acanthum satium, quem idem author Herpacantham, propterea quod coliculi eius humi sparsi serpere uideantur, & Melamphyllon a nigro foliorum colore cognominat. Proin quæ eo in capite præter ea quæ recensui, nomina extant, ad peregrinum potius Acanthum pertinent, quem nonnulli Welsch Berentlaw, hoc est, Brancam ursinam italicam, seu ueram nuncupant. Sunt qui Carduum benedictum Atractylidis speciem hirsutam esse statuunt, doctissimum uirum Ruellium secuti. Vide de natura stirpium lib. iij. cap. iv. Ruell.

ἀκανθῶν
Diosco. lib. 3.
cap. 17.
ἰριόκανθα.
Μελάνφυλλον.

Branca ursina.
uera.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Inter omnes Carduos, Benedicſus hic noſter Carduus, hodie maxime commendatur, ut qui ad multos variosq; morbos utrinque adhiberi poſſit. Temperamentum obtinet calidum & ſiccum.

INTRINSECVS.

Placet hoc loco ex doſirina recentiorum de Carduo Benedicſto, eiusq; uſu & facultatibus Emperias aliquot annotare.

Tradunt etenim hanc plantam primum omnium ex India ad inuiſtiſſimum Imperatorem Fridericum ante annos aliquot honoris gratia miſiſſam, mirisq; laudibus celebratam, ut quæ in cibo & potu uſurpata ab immenſo illo præſeruet capitis dolore, quem Græci Hemicraniam uocant, Germani den Nægel hoc eſt Clauum, quod in eiſmodi morbo tantus caput tenet dolor, ut clauus inter oculos (nam ſupra illos maxime graſſatur) impactus uideatur.

Eadem in cibo & potu uſurpata, contra uertiginem ualere, memoriæ bonam facere, & amiſſum auditum reſtaurare ſertur.

Folia Cardui benedicſti in puluerem redacta, ac ex uino pota, pituitam, malosq; humores abſumunt, & educunt, maxime ſi ex illis pilulæ, ut uocāt, conficiantur.

Eadem uſurpata uitia peſtoris, & ſanguinem purgant, phthiſicis proſunt.

Folia uino decocta & calida pota, tormiua ſedant, ſudores eliciunt, calculos comminuunt, menſes promouent.

Foliorum puluis meſura nucis juglandis corticis cum uino potus, aduerſus peſtem ne noceat præſentiſſimum eſt remedium, ſi intra ſpaciū xxxiij horarum quem corripuiſſet. Idem præſtant folia in uino decocta & pota.

Puluis prædicſtus, & decoctum his exhiberi debent, qui putridis febribus uentriculi & quartana laborant.

Sunt qui puluerem foliorum, aut decoctum, ſuccum uē omni ueneno hauſto aduerſari teſtentur, aſſerentes puellam quandam Paulæ, cum uenenū inſcia in pomo quodam ſumpſiſſet, adeo intumuiſſe, ut nec Theriaca, nec alio quouis antidoto curari potuerit, tandem uero aqua Cardui benedicſti diſtillata ſumpta, periculo omni & ueneno liberatam.

Nonnulli etiam referunt ſerpentem, cum puero cuidam in agro dormienti per os irrepiſſet, aqua Cardui benedicſti diſtillata, per inferiora quamprimum ſeceſſiſſe, puerūq; incolumem, omniq; periculo liberū ſuperuixiſſe.

Erut

Et ut paucis multa dicam, asserunt, folia, succum, semen & aquam stillatitiam omni prorsus, utrinque usurpatā, ueneno aduersari. Hęc fere Empirici illi.

Cæterum si Carduus benedictus, Atractylis ueterum sit, quemadmodum nonnulli astruunt, talia de eo prædicantur a Dioscoride.

Coma, semen & folia cum pipere & uino teruntur utilissime contra scorpionum ictus, percussos tradunt quamdiu ea teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recrudescere. Hęc ille.

Ex quibus sane uerbis colligi potest, Carduum benedictum aduersus uenenum facere, quemadmodum experimenta quoque quæ recensuimus, testantur.

Brancæ ursinæ ueræ, seu Acanthi ueræ radices potæ urinam ciunt, sed aluum cohibent, ruptis, conuulsis, & tabem sentientibus, mire prosunt.

EXTRINSECVS.

Cardui benedicti aqua distillata, oculis indita, rubedinem & pruritus illorum iuuat Idem de succo intelligas uelim.

Folia tusa & imposita ambustis igni, anthraci prosunt. Eadem & aqua stillatitia potest.

Folia tusa & imposita scorpionum & serpentium ictibus medentur, hæc de Atractylide quoque dicuntur:

Aduersus cancerum, aliaq; maligna & putrida ulcera uix aliud Cardui benedicti folijs, succo, decocto, aut aqua distillata est præstantius remedium. Ac tradit nonnulli maxima mala uitiaq; hoc pacto sanata fuisse. In primis uero testantur ijs, mulierem quandam, cuius mammæ cancro ad costas usq; absumptæ fuerant, aqua distillata, & puluere foliorum insperso mundatam & sanatam fuisse.

Vaporationes, fomenta, deflessiones & balnea sudatoria, calculis & mensibus eliciendis, ex Carduo benedicto parari ac confici recte possunt.

De Scolymo. Cap. CXV.

VM SUPERIORIBVS ANNIS MVLTALOCA, HER-
C barum gratia perlustrarem, forte accidit ut Spiram quoque deuenirem, ubi inter cæteras multas sane & uarias plantas, quas in horto nobilissimi domini, Domini Ioannis a Lewenstein/Canonici, ac Cantoris summi templi eiusdem ciuitatis, uidimus, & hæc duo quæ nunc

Scolymus.
Strobilodon.



describēda sumpsimus Car-
 duorum genera nobis oc-
 curerunt.

Primum in his genus fo-
 lia ostendebat admodum
 magna, expallido uiridia,
 per ambitum asperrimis
 aculeis armata, nonnulla
 bicubitalis lōgitudinis, hu-
 mi sparsa, Eupatorii seu A-
 grimonix pene instar utrin-
 que lacinjata, sed per om-
 nia maiora, caule rotundo,
 & crasso ē medio illorum
 erumpente, paucis quibus-
 dam foliolis similiter acu-
 leatis, sed longe minoribus
 uestito, in fastigio elegantis-
 simis rotundis, asperrimisq;
 ac aculeatis capitulis, pines-
 am nucem fere æmulanti-
 bus, purpureum q; florem
 fundentibus, conspicuo.
 Hæc uero quæ diximus ca-
 pitula flore pereunte, ubi
 maturuerant plane, semine
 prægnabant ex cano albi-
 cante, molli lanugine, seu
 capillitio inuoluto, ad Cni-
 ci fere formam accedente;
 Radix huic prælonga erat,
 quam, ut tum mihi hortula-
 nus indicabat, Galli & Itali
 cū sale, aceto & pipere in ci-
 bo esitare assueuerūt, quem
 admodū nos Raphanum.

Alterum Cardui
 genus.

Alterum Carduigenus, superiori per omnia, quod ad folia, caules, capi-
 ta, & radices attinebat, similis erat, nisi quod nullis horrebat aculeis, spi-
 nisū ē. Hoc præstantissimum Cardui genus esse mihi tum dicebatur, quibus.

& hoc

& hoc addebatur, utriusque Cardui nunc descripti capitula tenera cum gal-
linis & carnibus in Gallia coqui, ita quidem ut nullum fere opiparum con-
uiuium apud hos quidem censeatur in quod non Carduus asciscatur, ut res-
ste hac exclamatione cum doctissimo uiro Ioanne Ruellio nostri sæculi lu-
xum accusare posse uideamur, cum inquit, O gulam audacem, quæ porten-
ta terrarum in luxum & ganeam uertit, quæ nimirum conscia quadrupe-
des respuant, tantum quæ uoluptatibus nostra indulget ætas, ut iam ne quis
dies sine Carduo sit. Ea semper est illarum rerum cura, quæ ueneris deside-
rijs obsonantur, & à culinis inserunt, ut magno ueneant, & maximi quæ-
stus existimentur, Carduetis multos nummos ærario redentibus &c.

Ruellius de na-
tu. stir. lib. 3. ca.
cap. 14.
NVLLA DI-
ES SINE CAR-
DVO.

NOMENCLATURAE.

Cum Carduorum nunc descriptorum, loco prædicto nomenclaturas
inquirerem: responsum accepi, primum quidem quod spinosum & aculea-
tum est, Italis Cardchoffil, alterum uero quod aculeis caret, ipsdem Cardon
nuncupari. Vbi uero super his duobus Carduis scripta ueterum consulere
cepissem, intellexi primum sub Scolymo Dioscoridis lib. iij. cap. xiiij. com-
prehensum, quem ut ipsemet Dioscorides testatur, Romani Strobilum uo-
cant (a) capitulis nimirum quæ pineis nucibus seu Strobilis similia appa-
rent) a) qua nomenclatura Chardchoffil non multum abest, licet rectius
Strobil dei posse uideatur, nam sic Germanice dicimus Strobildorn / uel
Welsch distel / hoc est, Italicum Carduum. Scolymi apud Dioscoridem
hec quoque leguntur cognomina, Pherusa, Pyracantha, & Cnus. De hoc
Carduo cap. iij. & iij. lib. vi. Theophrastus egit.

on in quo.

Alterum Cardui genus proculdubio Cinara Columellæ hispida fuerit. Col. lib. ii. ca. 3.
De Carduo qui esui est, Plinius secundus lib. iij. de re medica cap. xvi. Ga-
lenus de Simpl. facult. lib. viij.

De plantatione Scolymi coronidis uice adijcere libet, quæ cap. xiiij. li.
ij. de natura stirpium Ruellius annotauit. Si seminum acumina (inquit ille)
lapidis attritu retundantur, spinis carebunt, annoque toto per hunc modum
Cinaras creari confirmant. Sine aculeis etiã nascuntur, si deliberata Lactuce
radix in tenues particulas difficetur, et singula semina singulis indica segmint-
bus obruantur. Si semina madefeceris per triduum rosarum succo, uel lilio-
rum, uel Laurino oleo, uel alterius cuiuscunque suauiter olentis liquore,
eiusdem odoris orietur, cuius semina laticem hauserint. Hæc ille,

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTUM.

Itali & Galli rationem apparandi Cinaram, maxime quod ad capitula,

quæ cum recentia tenerescunt, in cibo admodum expetuntur, attinet, optime callent. Sunt autem ea naturæ aliquantum calidæ & humidæ urinamq; copiosam foetidamq; potenter expellunt, teste Diosco. Columella addit radicem aqua decoctam potatoribus bibendi appetentiam augere & in venærem stimulos addere. Sicenim in libro de hortorum cultu scribit,

*Hispida ponatur Cinara, quæ dulcis iacho.
Potanti ueniat, nec Phœbo grata canenti.
Hec modo purpureo surgit glomerata corymbo,
Myrtiolo modo crine uiret, deflexaq; collo,
Nunc adoperta manet, nunc pinea uertice pungit,
Nunc similis calatho, spinisq; minantibus horret.
Pallida nonnunquam tortos imitatur acanthos.*

Huius & Fiera in cœna sua meminit ijs numeris.

*Carduus, horten si cui spina est mollior arte,
Cui calor est modicus, cui tumidusq; liquor.
Et stomacho & lumbis sapidus, si duxit olentem
Urinam, os redolet, nec sapit. Ala caprum.
Hunc tibi ius præpingue coquat præstantior inde est,
Ibit & in numeros sic Venus apta suos.*

Cæterum de Cardui uiribus ita perscriptum reliquit Plinius. Item graueolentiam alarum emendat radicis emedullatæ uncia, in uini falerni hominis tribus decocta ad tertias, & a balneo ieiuno, itemq; post cibum cyathis singulis pota. Mirum est quod Xenocrates promittit experimento, uitium id ex alis per urinam effluere.

De Resta bouis. Cap. CXVI.

ISI SPINIS ET ACULEIS HORRERET RESTA BO-
uis, poterat leguminibus, dñ ad flores & semina attinet, recte ac-
censeri. Flores enim profert Iunio mense, alios quidem dilutio-
ris purpuræ, alios uero prorsus candidos, & quod ad formam pertinet pha-
siolis (quos Germani *fäseln* / oder *schwarz Erweissen* uocant) adeo simi-
les, ut discerni illa duogenera uix queant. Floribus decidētibus, siliquis sub-
nascuntur exiguæ, ueluti Lenticulæ, in quibus semen reperitur latius, forma
& sapore exiguam uiciā referens. Rami Restæ bouis, quos habet multos re-
retes & fruticosos, undiq; nigricantibus folijs rotundis, Teucrio aut Trifo-
lio pratensi similibus, uestiuntur, aculeisq; ac spinis simul asperrimis hor-
rent.

Restabouis.
Ofsenbrech.



rent. Radicem habet hęc
 planta praelongam, quo no
 mine uix eradicari & encl
 se patitur. Impedimento
 est haud uulgar, non tantū
 frumentis, sed & pratis.
 Quin & aratra & falces,
 necnon foenifecas, quam
 plurimum sæpenumero re
 moratur.

NOMENCLATURAE.

Quidam Germani hęc Galli Suefionen
 plantam Ofsenbrech ap= ses potissimum
 pellant, quod radices non= Ononim Bugra
 nunquam habeat adeo lon= ues & Bugra
 gas, ut aratra, & boues, des uocant, teste
 equosq; arantes impedire Ruellio.
 & sistere queat. Alij Bew
 heckel, Beckelkraut, &
 Stalkraut nominant. Her
 barijs uulgo Restabouis,
 Remora aratri, Acutella,
 Vrinalis, Vrinaria. Diosco. lib. 3.
 ridi lib. iij. ca. xix. *ἰωνίς*, (scu cap. 138. quo in
 ut alij legendum censent) loco *ἰωνίς* per
ἰωνίς dicitur, quanquam id non per scribi
 nominis Onosmati quoq; tur, licet in exen
 tam a Galeno quam a Di= plaribus Theo
 oscoride tribuatur. De O= pbrasti Gracis
 none Plinius lib. xxi. cap. per, quoq; scri
 xvi. & Theophrastus lib. batur Ononis,
 vi. cap. v. cuius uerba in ut infra patebit.
 gratiā studiosorū subijcere
 non pigebit. Ea sic se habet.

Ἡ δ' ἰωνίς ἐστὶ πηλοῦ καυλοῦ, ἡ πύκναι διὰ φύλλων ἔχει πηλοῦς καὶ παραπικρὴ κατὰ ὅλην τὴν καυ
 λὸν ὅπου σφάντι πῶν ὅλην ἔχειαι μερῶν διασπασμένην ἐν ἀλλήλοις. καλλασσέντις δὲ καὶ ὅλη

θεαυδὲ ἀδυνατῆται. φάντα δὲ ὅτ' ἐν γλίσχρῳ καὶ γανύδει, καὶ μάστιγα ἐν τῇ σπερμῇ καὶ γιγρῇ
 μέλη. διὰ καὶ πολλοὶ μὲν τοῖς γυνόσι. καὶ ἴτε δυσώδεος. ἴταρ γὰρ λαβὴ χάρας βαθεῖ, καὶ τὰ κατω
 αὐτῆς. καὶ κατ' ἱνασθόντες ἀπεφύσσει ἀφελὴν ἐς τὰ πλάγια, πάλιν ἐς τοῖς ἱεροῖς ὁδεῖται κατω. γὰρ
 σκελὴν ὅτως ὄλη. ποτὶ δὲ βροχάσκει γίνεταί τῆς γῆς, καὶ ἀπόλλυται ῥῆον. ἰδὼν δὲ μικρὸν ἀπολαφθεῖ, ἀπὸ
 ἐντε πάλιν βλαστᾷ ἀρχεται δὲ βλαστῆσις βίρη. τελευτῇ δὲ μὲν τοῦ ῥου.

VIRE S AC TEMPERAMENTVM.

Veteres hanc herbam antequam spinosa fieret muria condire solebant, cibis gratissimam, ac ab antiquis mire celebratam, ut quæ in cibo usurpata foetidum oris halitum emendare tradatur. Exhibenda ergo erat his, qui continuas noctes potando traducunt, ut foetorem halitus corrigerent.

INTRINSECVS.

Radix cortex ex uino potus, urinam ciet, calcucos comminuit, Plinio & Dioscoride attestantibus.

Idem decoctum per aliquot dies potum latētes mariscas elicit per sanaturq;

EXTRINSECVS.

Radix uino decocta ac in ore retenta, dolorem dentium mitigat.

De Eryngio. Cap. CXVII.


CVLEATARVM GENERIS ET HAEC PLANTA EST,

quam modo describemus. Ea in tractu Rheni in nonnullis agris,

potissimum uero secus itinera & limites agrorum, prouenit, fo-

Eryngium

llo crispo, dissecto, perq; ambitum spinis aculeisq; acutis exasperato, in tenera ætate uiridi, deinde uero ubi perfectionem suam consecutum fuerit ex pallido albicante admixto modico cœruleo, seu cæsis colore, ut uiride æs colore fere referat. Planta est elegantissima, & quæ altero demum anno caulem emittit cubitalem, surculosum, arbusculam pulchre exprimentem. Singuli ramusculi, seu surculi globosa in fastigijs proferunt capitula, eaq; aspera & uiridi pallenscetiā, durarūq; & acutissimarū spinarū ambitu stellatim circumuallata, quæ cum Autumno appetente maturuerint, ex aculeata stellataq; rota cui insidebant, excutuntur. Et hoc illius semen est, cuius singula granula binis aut ternis horrent spinulis, Hispanici oleris seminibus aliquanto minora. Radicem habet hæc planta rectam & prælongam, pollicari crassitudine præditam, foris nigra, intus candida, satis fortis tum saporis tum

Eryngium.
Mangetu.

tum odoris. Ea quotannis novos emittit asparagos, iuxta hos qui aruerūt
caules. Nam ij novis succedentibus folijs & caulibus, decidunt, ac globi
instar rotundantur, qui sit ut a vento facile in quasvis partes dispellantur,

unde iocus de Sartore quodam & Eryngio, apud nos uulgo narratur, Is cum in militiam profecturus Eryngiū a uento agitatū obuiam habuisset, eius crepitatione & stridore ita territus fuit, ut hastam abijciens in fugam conuersus fuerit, periculumq; quod ab aculeigero & crepitante hoste sibi imminere putabat, effugerit.

2.

Alterum Eryngium.

Alterum Eryngium similiter aculeatarum generis est, stellata & ipsa, folijs tamen angustioribus & nigricantioribus, aculeis & spinis longioribus, asperioribusq;. Capitula quæ quamplurima habent singuli caules & furculi, eaq; radiata, & spinosa admodum, flosculis emicant purpureis, aut Bersilici potius colorem representantibus. A flore semen in memoratis capitulis inclusum reperitur omni Carduorum & aculeatarum seminijs magis exiguum. Estq; hoc Eryngium tota sua substantia diuersum ab eo quod primo loco descripsimus.

NOMENCLATURAE.

Diosco. lib. 3.
cap. 20.

Eryngium.
Diosco. lib. 3.
cap. 22.

Germani Eryngion Wallendistel / Brackendistel / Manstrew / Ellend / vnd Kadendistel. Cæterum uariant & in hac planta Herbariorum sententia. Sunt enim quibus ea Aster Atticus esse uideatur, eo quod capitula eius spinarum stellato ambitu circumuallantur, alij Leucacantham Dioscoridis esse existimant, propterea quod folia illius quodammodo albicent. At meo quidem iudicio, quisquis ueterum, præsertim uero Dioscoridis scripta diligenter excutiet, is deprehendet hanc nostram quam modo tractamus plantam, nihil aliud esse quam Eryngion, quod alias Centumcapita uocant. Quanquam non desunt, qui Centumcapita diuersam ab Eryngio stirpem esse contendunt, suamq; sententiam ex Plinij uerbis stabilire conantur. Is enim cum lib. xxij. cap. viij de Erynge, seu Eryngio scripisset, statim in sequenti capite, herbæ quam Centumcapita uocant, tanquam diuersæ ab Eryngio, historiam subiungit. Serapio etiam cap. xvi. duplicem herbam nomine Centumcapita proponit, ac primam quidem uocat Astaraticon, Centumcapita, & Byonyon; alteram Iringi & Centumcapita nominat, cuius descriptionem hisce uerbis exequitur.

Sed Centumcapita alba est species spinæ, & sumitur folium eius sale conditum, in principio augmenti sui, & folia eius sunt lata, aspera, in summitate aromatica, quando gustantur, & quando creuerint, fiunt ramuli rubei & multi, & in summitatibus eius sunt capita rotunda sicut stellæ, & in circuitu eorum sunt spinæ, & stipites eius durus, & color capitellorum eius est similis colori Oleandri, aut albus, & fortassis aliquando sicut color lacinthi, & habet radices longas & latas, nigras de foris, & interius albas, & in grossitudine.

fitudine pollicis boni odoris, nascitur in locis petrosis & asperis.

Hæc ille, quæ omnia recte ex Dioscoridis de Eryngio capite translata esse manifestius est, quam ut multis probari debeat. A nobis uero hæc in medium adferuntur, ut rei herbariæ studiosos admoneamus, prima xcix. apud Serapionem capitibus parte, per Centum capita, non Eryngion, sed Bunion illud, de quo lib. iij. cap. clv. Dioscorides quoque egit: rursus posteriori eiusdem capitibus parte in qua alia herba similiter Centum capita appellata depingitur, Eryngion hoc nostrum intelligendum, id quod res ipsa clamat, nec multa opus habet probatione. De Iringis lxxxix. capite idem Serapio sub uoce Secacul mentionem fecisse uidetur, qui fit ut nonnulli asserant, Centum capita, Iringij, & Secacul, hæc inquam nomina ad unum hoc nostrum Eryngion spectare, propterea quod in Auerrhoa Eryngion hisce appelletur. nominibus, Elgarzaria, Panicul, Alchartama, Secacul, & Iringij. Quod si hoc pacto scripta ueterum conferre uelimus, dubium non est quin magno id cum fructu facturi simus. Sunt uero, ne id prætereamus, qui Secacul Arabum, non Eryngion, sed Sisaron (quod Germani Berlin uocant, cuius historiam infra ca. cxxxvi. habes) esse uelint, quorum opinio mihi satis probatur.

VIRESC. AC TEMPERAMENTVM.

Eryngion cum Onone temperamento & facultatibus conuenit. Vtraque enim planta calida est & sicca, calculumque pellit.

INTRINSECVS.

Radix uino decocta, & pota, iocinerum, lienis & lumborum uitijs medetur, tormina inflammationesque discussit, menses, & urinas pellit, ueneno hausto resistit, drachmæ pondere cum semine Pastinacæ syluestris tusa, & pota.

Affirmabat quidam (teste Aëtio) assiduo Eryngij usu, nunquam postea mixxisse calculos, cum prius eo morbo frequentissime uexaretur.

Pota hydromelite radix opisthotonicis, & comitialibus medetur.

EXTRINSECVS.

Radix appensa strumas & parotidas discutere traditur.

Radix tusa & illita aculeos impactos refigit. Cum salso adipe suillo tusa & imposita carnem ab ossibus recedentem retrahit, & nudata ossa carne operit &c.

Sunt qui Veneri & Sappho mirum in modum se placere posse existimant, si radicem hanc secum gestauerint,

De Ammi. Cap. CXVIII.

Ammei.



Quo anno Traa-
gus commenta-
rii sua de stirpi-
bus conscripserit

AMMIOS HISTO-
riam post Carum, Fœnicu-
lum, & Anisum exposu-
isse, situm temporis cum
de memoratis plantis um-
belliferis scriberem, uel in
hortis meis, uel aliunde re-
cens & uiride Ammi uide-
re mihi contigisset. Itaq; in
hunc locum tractationem
eius reieci, expectans dum
perfectionem & absolutā
omnibus numeris maturi-
tatem consequeretur. Sæ-
pe numero equidem in hor-
tis meis semen 'Ammios'
exiguū serui, sed nunquam
in his florem protulit, nisi
hoc anno supra millesimū,
quingentesimum, trigesimo
sexto, quo hæc scribo. Ac
animaduerti semen Ammi-
os in fine Aprilis mensis
terræ mandandum, quam
requirit soli expositā et aprī-
cā. Erumpit autem primo
exortu binis exiguis, & acu-
tis foliolis, ueluti Petroseli-
num uulgare, post quæ alia
subsequuntur subinde au-
ctiora & latiora, quorum
nonnulla Fœniculi equi-
ni, aut Leuistici aquatici foe-
liis similia apparent. Am-
mi quamprimum in rotun-

dos, concauos, geniculatos, & furculosos caules assurgit, in fastigijs mag-
nas

nas & perelegantes candidoq; flore refertas umbellas, Aniso fere aut Coriano similes, Iulio mense gerentes. Semen Ammios exiguum albicansq; Autumno apperente cum Fœniculo maturatur, gustu feruidum & acre. Ammi planta est albosia, seu æstiuæ, ut quæ quotannis semine feri necesse habet, nam postquam defloruit, semench; maturauit, tota sua substantia, caules, radix & folia pereunt. Ammi proceritatem uiri nonnunquam adipiscitur, multis ramulis & adnascentijs brachiatur, radicem habet rectam, candidam & lignosam.

NOMENCLATURAE.

Hippocrates Ammi Cyminum regium nuncupauit, quod Germanice Berentümmel interpretari licet. Ægypto olim familiare fuit, panem enim compinsebatur, sicut apud nos Caros. Hoc pacto usurpatum tormina & inflationes uentris sedandi ui pollere traditur. Dioscoridi lib. iij. cap. lxiij. *Quid Ammion proprie sit, uide Manardum lib. 4. epist. 2.* *sup.* Ammum alexandrinum, Cyminum Æthiopicum (Germanice Mo-
rentümmel) nominatur. Recentiores & officinae Ammiū & Ammeos uocant, Germani Ammey/Ammi Serapioni cap. cclxxxvij. Nanchach, Anazue, & pomum ancheninon. De Ammi uide Galenum de Simpl. facult. lib. vi. Auicenna lib. ij. cap. lxi.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Semen Ammios calidum & siccum est temperaturæ, Constantino teste: miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ Ecdoria uocant, potest & introsumi aduersus frigidas affectiones.

INTRINSECVS.

Semen Ammios tusum, ac dimidiæ drachmæ pondere cum uino calefacto potum, torminibus uentris, quæ mulierculæ nostræ die Barmütter uocant, medetur.

Idem semen pari ratione sumptum, ueneno hausto aduersatur, urinam & menses pellit.

EXTRINSECVS.

Semen Ammios tusum, ac cum melle cataplasmatitis instar illitum suggillata tollit.

Suffitum cum uua passa aut resina, uulvas purgat.

Folia & caules Ammios, aridi, fomentis, desensionibus, & balneis utiliter adijciuntur, quibus calculosi, & lumborum dolore affecti utuntur.


De Cuminò satiuo. Cap. CXIX.

1 CVMINVM SATIYVM HORTIS GERMANICIS

perinde familiaris esset, atq; Caros, utiq; primo libro post Carum Cuminum satiuum.

Cuminum satium.

Römischer Bummel.



2.
*Cuminum sylue-
stre.*

*Diosco. lib. 3.
cap. 62.*

Dioscorides *κύνινον* *κύνινον*, *Cuminum satium* nuncupat. Germani *Zamen-
garten kummel*/oder *Römischen Bummel* (hoc est, *Romanum Cuminum*)
uocant, Galli *Comin*.

rum historiam eius profes-
sus fuissem. Nuncuero
cum peregrinum sit, inter
peregrinas quoque stirpes
locum suum sortitum est.
Est autem hoc *Cuminum*
umbelliferis plantis, cuius-
modi sunt *Anethum*, *Fœ-
niculum*, & *Anisum*, pene
consimile, unico plerunque
caule, ceteris surculoso, folijs
Fœniculo quadamtenus si-
milibus, semine copioso,
oblongo, ac tali omnino,
quale officina ostendunt,
radice rotundiore ceteris
Cumini generibus supra
terram fere sparsa, nec in-
tra humum radicante, uti
aliarum umbelliferarum
plantarum radices. Verno
tempore in locis calidis &
humidis feri expetit.

Cuminum syluestre, quod
folia gerit *Gingidn* hauddu-
uidi, nisi forte id sit quod
Romani *Roskummel*/hoc
est *Cuminum equinum* no-
minant, de quo libro pri-
mo cap. cxlij. egimus.

NOMENCLATURAÆ.

Theophrastus *satium*
Cuminum Hemodorum,
Cuminum *Hemodorum*,
Sylue

Syluestre, Germani *Kosfümmel*/Latini *Rusticum*, & *Thebaicum*, Græci *κίμινον* *κίμινον* uocant.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vtriusq; Cumino facultas inest excalefaciendi, exiccandi, & astringendi, quare utrinque usurpari potest.

I N T R I N S E C V S.

Cuminum satium in cibo ueluti & piper usurpatur. Sunt qui cum Ciceri arietino, seu pisfis concoquant, nec sine præcipua utilitate, siquidem inflammationes quasuis & flatus uentris discutit, phlegmata, lentosq; incidit humores, stomachiq; nauseam tollit.

Sunt qui asserant hoc Cuminum cum uino albo a balneo potum, regium expellere morbum, necnon uertigini prodesse.

Cuminum satium ex uino dulci sumptum difficultati & ardori urinæ auxiliatur.

E X T R I N S E C V S.

Cuminum satium tufum naribusq; inditum, sanguinem inde manantem sistere dicitur.

Idem probe arefactum ac contusum, cumq; melle rosaceo, & cera temperatum, ac impositum, testium inflammationibus, collectionibusq; auxiliassit dicitur, doloremq; sedare.

Quod ad reliqua attinet, conuenit hoc Cuminum cum Sefeli, de quo sequenti capite dicemus.

De Silere montano officinarum, & omni Sefeli.

CAP. CXX.

ATVM ILLVD ET ACRE SEMEN SILERIS (VT VOCANT officinæ) montani, in Germania nostra non prouenit nisi satum. Dominus Georgius Ollingerus Norimbergensis ciuis, in *Siler montan.* horto suo plantam Sileris montani per duodenos iam annos habet, quæ quotannis florem suum profert.

Duo uero Sefelis genera in syluis Germaniæ nostræ proueniunt, quorū^{2.} alterum procerum fundit caulem, eumq; non aliter atq; Anethum in fastigio umbellas ferentem, in quibus semen a maturitate uidere est oblongum & angulosum, gustanti acre ueluti Gingiber. Radix huius prælonga est, sicut Pimpinellæ magnæ, odoris gratissimi, gustus uero acris.

Alterum caule, & folijs euadit altius & crassius, ita quidem ut non raro^{3.} caules proferat bicubitales, digitumq; crassos, uti Cicuta, folijs paucis, ijsq; uulgare.

Seseli.
Seseli.



uulgare Petroselinum referentibus, sed maioribus, gustuq; acrioribus, deniq; & nigricantioribus uestitos. Umbellas hñ ferunt, exiguis candidisq; flosculis emicantes, qui in semen abeunt latissimum, perq; omnia Pastinacæ similimum, sed non ita scabrum, uerum acrius eadem. Radicem habet hoc
Seseli

Seseli admodum longam & teretem instar Foeniculi, hyemis patientissimum. Nascitur in altissimis syluis, humo arenosa.

Tertium Seseli, quod folia habet tenerrima, & admodum dissecta sub 3. Pimpinella descriptum habes lib. j. commentariorum nostrorum.

Quartum Seseli Æthiopicum appellatum, quod folio est hederaceo, 4. haudum uidere mihi contigit.

NOMENCLATURAE.

Seseli officinarum, teste Manlio in Lumine Siler montanum uocatur. 1.

Arid quod oblongo prægnat semine, Dioscoridi σισελι τὸ μακροσπέρμον, hoc 2. est, Seseli Massiliense, & σφαγύνη dicitur, Hippocrati Seli, & Sili appellatū. Hoc Dioseo. lib. 3. in Gallia Saxifragia maior ab herbarijs existimatur, uide Ruellium lib. iij. cap. xliij. Germani Sesel/oder Langen waldfümme/hoc est, Cyminum sylvestre oblongum uocabunt.

Quod laro instar Cimicum aut Pastinacæ semine est, nobis σισελι τὸ πλατύφυλλον, 3. latum Cyminum dicitur, Dioscoridi Peloponesiacum nuncupatum. Germani Breitenwaldfümme/hoc est, Cyminum sylvestre latum nominare possunt.

Quartum quod folia habet incisa, & gustu Pimpinellam æmulatur uerum 4. est Creticum Seseli, quod alias teste Dioscoride lib. iij. cap. lvi. τέρδιλον, σισελι τὸ τετρακτύλον, uel ut habet Egineta Gordylion uocatur. Cæterum Tordylion, siue Gordilion non est Daucus, quem Germani Beerwurz nominant, ut quidam asserunt, nihil enim cum Dauco, Tordylon commune habet.

Postremo id Seseli quod hederacea habet folia Dioscoridi αἰθιοπικὸν dicitur 5. tur, Germanice Moienfümme appellatur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Inter omnia Cuminoꝝ genera, Seselis tum odoretum sapore excellit, temperatura sua calidum & siccum, quare ad frigidas affectiones utrinq; adhiberi potest.

INTRINSECVS.

Plinius lib. viij. cap. xxxij. scribit foeminas in ceruorum genere ante partum Seseli se purgare. Namq; omnem frigidum & aquosum humorem, unde Epialus oriri solet, exigit.

Radix & semen in hoc genere præstant, nam ut paucis mulra dicamus, faciunt illa ad omnia interanea, pulmones inquam, stomachum, epar, & matricem.

Semen tusum & cum uino albo potum concoctione adiuuat, tormina sedat,

dat, frigidam & lentam phlegmata, unde Epialus ortum trahit, discutit, inueteratę tussi medetur, obstructions iocineris soluit, orthopnoicis prodest, strangurię quę a frigore profecta est, conducit apprime.

Radix aut semen in uino decoctum ac exhibitum, suffocationibus mulierum, uuluz malo nonnunquam concidentium auxiliatur.

Idem medicamentum non tantum urinam, sed & primos & secundos partus trahit: quę de causa ut scribit Dioscorides capris, ceterisque pecudibus datur in potu, quo facilius suos foetus enitantur.

Per niuem ituris cum pipere & uino contra perfrictiones bibitur utiliter. Ad eadę omnia facit et Creticum & Seli, quod Tordylion cognominant.

De Peucedano. Cap. CXXI

1.
Peucedanon.

PEUCEDANON IN ALTIS VMBROSIS ET OPACIS syluis, ut est Hercynia, & ea quam Germani den Speßart / & quam den Ydar nominant, necnon in Vuasgoia & Monte toustrui prouenit, radice prælonga, succosa, & amara, quę supra terram barbam, seu comam canam setis porci similem obtinet, per quam teres erumpit caulis, folijs sceniculaceis, aut pincis potius, (cum Pino enim plus similitudinis quam cum Foeniculo habent meo iudicio) uestitus. Florem profert in muscarijs luteum, semen eius haud dum uidi. Radix effossa difficilis est, cum prælonga sit, & alte in terram demissa. Præterea dum effoditur grauissimum spirat odorem, ita quidem ut nisi munitus quis illam aggrediatur, odore suo deliquium animi inducere ualeat, quę de causa ueteres priusquam illam colligerent, caput & nares rosaceo perlundebant, ne capitis dolor premeret, & uertiginem sentirent. Autumno mense efficacissima creditur, tum enim temporis non raro radici succus concretus quasi & Thuripe ne consimilis adhærere deprehenditur, quod inde fieri credendū est, quando per uermes, aut aliud quod uis incommodum radix uulnerata fuerit. Cæterum liquor hic concretus in medicina præstantissimus est. Quidam radicem in particulas cultro concidunt, alij integram illam in umbra siccant, quę ratio mihi magis probatur. Eadem postquam effossa fuerit, nigra euadit, alias albicans existens, gustu acris & amarę instar pene Gentianę. Hodie in hortis meis magna in copia prouenit.

2.
Peucedani alticorum genus.

Alterum illius genus ad Rhenum in arca tenuissima reperi, folijs angustissimis, ueluti Cuminum equinum.

NOMENCLATURÆ.

Germani Peucedano uarias tribuunt appellationes. Alij namque a comama quę

Peucedanon.
Harstrang.



maquæ supra radicem cer-
nitur, Harstrang/alijs a' for-
lijs, et facultatibus Scwfen-
chel/hoc est, Fœniculum
suarium, alijs a' croceo illo
succo Schwebelwurz/
quasi Sulphuratam radicē
uocant. In Dioscoride lib.
ij, cap. lxxxij. hæc legun-
tur illius nomina, *πινυδαντα*,
ἀγριον, *ἀγρίον*, *αἰθέριον*, *ἀγρίον*,
Pinaestellum Sataria. Sca-
pioni cap. cclxxvi Harba-
tum dicitur.

**VIRES AC TEMPE-
ramentum.**

Radix Peucedani & suc-
cus eius in medicina apud
ueteres ualde comendatur.
Sunt enim calidæ & admo-
dum siccæ qualitatibus. Sed
quis est qui facultates illius
radicis satis explicare pos-
sit?

INTRINSECVS.

Peucedani radicem, uis-
cosos, & lentos humores,
necnon bilem educendi fa-
cultate pollere ueteres pro-
didere. Quamobrem radix
quidem Peucedani uel ui-
no decoqui, & bibi, uel in

puluerem redigi & assumi potest, hoc enim pacto thoracis uitia purgat,
lentos & frigidos extrahit a pulmone humores. Eadem succus in puluerem

quoque redactus & usurpatus efficit, imprimis uero tussi inueterata, a frigore ortum trahenti utilissimus est.

Succus mellis mixtus, ac intro sumptus, stranguriæ prodest, serpentium quoque ea ratione ueneno aduersari dicitur. Quisquis ergo ab his sibi timet oleo cui succus Peucedani mixtus fuerit corpus perungat, quod si fecerit ab iniuria serpentium proculdubio tutus erit, nihil enim minus ferre possunt serpentes quam Peucedanon.

EXTRINSECVS.

Radix in puluerem redacta & ex oleo & aceto illita, neruorum uitijis uniceprodesse dicitur, Ischiadicis potenter auxiliatur.

Qui spasmo continuo uexantur, succo eius se perungant, & sanabuntur.

Succus cum aceto temperatus auribusq; instillatus, dolores illorum mitigat. Cauernis dentium inditus, dolorem sedare dicitur.

Infantium ramices & procidentes umbilici, si hoc succo illinantur, persanantur.

Succo naribus obiecto, aut puluere indito, non tantum lethargici, sed & uulæ strangulatus respirant.

Radix & lachryma eius recentibus uulneribus sanandis experimento singulari conducunt, ita quidem ut uel ex ossibus purulenta extrahant.

Radicis puluis inspersu sordida ulcera purgat, & uetera cicatrice obducit.

Alia ex his quæ retulimus iuuamenta Peucedani colligi facile possunt. Nec enim possibile arbitror, omnes eius facultates enumerare.

De Filipendula. Cap. CXXII.

HANC PLANTAM GERMANI NONNVLII *Rotensteinbrech*, hoc est, Saxifragiam rubeam appellant, quo nomine post Saxifragiam albam, illius mentio facienda fuerat. Sed quia tum præsto non aderat, reieciimus tractationem eius, in hunc usq; locum. Est autem planta sane elegantissima si uel herbam & caules, uel florem aut radices spectes, gignitur in altis & lapidosis montibus, ac rupibus. Folia eius Anserinæ haud multum dissimilia apparent, licet propius quod ad diuisuras eorum attinet, ad formam foliorum Pimpinellæ Italicæ accedere uideantur. Caulem habet teretem, sæpe cubitalem. Florem profert in fine Maij mensis pulchrum, candidum. Radicem obtinet torosam, ut quæ in filamenta extenuetur, sed per extrema glandosa, licet non raro quaterna, aut quina capita

Filipendula.

Kotensteinbrech:



capita uno dependeant qua
si filo, cuiusmodi & radix
Pœoniæ apparet, licet hæc
magis exigua, & gustu ama-
ra deprehenditur.

NOMENCLATURAÆ.

Vulgo hanc plantam Fi-
lipendulam a torulis illis,
quia a radice tanquam a filo
dependent, nominare so-
lent. Germani a colore ra-
dicis, necnon facultatibus
Kotensteinbrech / & Wilde-
garb / hoc est, Saxifragiam
rubeam, & sylvestre Mille-
folium nuncupant. In Dio-
scoride libro tertio capite
cxxxvi. teste Othone Brunfel-
sio (cui ego quoque in præ-
sentia subscribo) *οιανάδα, λί-
πυλον, & κυρσάνη* dicitur.

VIRE AC TEMPE-
ramentum.

Oenanthe calida & sicca
est, a recentioribus medicis
in medicandis internis cor-
poris affectionibus pluri-
mum laudata.

INTRINSECVS.

Folia Oenanthescum se-
mine cum uino & melle decocta & pota, secundas eijciunt. Sunt qui ad eas-
dem cum aqua & melle despumato decoquant.

Radix tula & cum uino decocta, earundem est facultatum, Præterea uri,


nam pellit, stranguriæ & stillicidio urinæ, & quemadmodum Ægineta scribit, morbo quoque regio medetur, necnon quibusuis uelicæ passionibus conuenit.

Radix in puluerem redacta, & melle temperata ut Eclegma fiat, suspiriosis, & anhelantibus prodest, & tussim tollit, si Plinio credimus.

De Scordio. Cap. CXXIII.

Q V ANQVAM PRÆSENTEM PLANTAM IAM OLIM uideram, non tamen ausus fui Scordium eam appellare, donec doctissimus uir Valerius Cordus palam affirmauit illam esse Scordium, quod hactenus Galli & Itali non tantum suam duntaxat terram proferre iactarunt, sed & Germanos adeo cælarunt, ut unciam illius aureo coronato eisdem uendiderint, cuius rei uerissimus testis esse potest Dominus Georgius Ollingerus Norimbergensis Simplicista, qui ipse tanto ab his emit pretio Scordium. Nunc uero & Germanis ea herba innotescere cœpit, ut quæ facile reperiri possit. Quanquam enim non ubique locorum gignatur, tamen non in paucis locis affatim luxuriat, potissimum uero circa Norimbergam. Cum namque superioribus annis ea in ciuitate comitia celebrarentur, Scordij recens herba ad mensam Serenissimi Romanorum regis Ferdinandi allata fuit, quam cum serenissima eius maiestas, (cui non solum Scordium, uerum pleræq; & innumerae aliæ plantæ probe cognitæ sunt) uidisset, mirata est supra modum. Scordium in solo quoque Norico gigni. Hæc eo mihi dicitur, ut nemini obscurum sit, Scordium æque in Germania nobis nasci atq; Cretensibus in Creta, aut Gallis & Italis in Gallia, Italia uel. Proinde ut historiam Scordij aggrediamur, gaudet illud solo humecto, & nullo negotio quocunque in loco siue semine, siue surculo seratur, germinat celerrime. Ac ubi terræ alicui assueuerit, longe lateq; serpendo se propagat, ac undique exiguis fibris adhærescit, non aliter atq; Pulegium. Caules quos in altum erigit, quadranguli sunt, ac prope fastigia purpurant, utrinque rugosis & ferratis folijs, Gamandreae uulgaris prope cõsimilibus, odore ingrato, & Allium pene æmulantē præditis, uestiti. Inter folia & caules flores erumpunt subrubri, & folliculis exiguis exeuntes, sicut & flosculi viticæ, quam Germani Bynsaug uocant, quibus decidentibus minutissimum in ijs uasculis reperitur semen. Radicem obtrinet capillatam, cuiusmodi omnes Serpentariæ plantæ habent. In hunc fere modum Scordium Mithridatis manu depictam, Crateuas herbarius olim uidit.

NOMEN.

*Scordium.**Lachenknolauch.*

NOMENCLATURAE.

Cum secundum paludes nascatur Scordium, praeterea odore quoque Allij
 sit, uolui Germanice Lachenknolauch/ quod est, si interpreteris Allium pa-

lustre, uocare. Latini à foliorum forma Trixaginem palustrem nominant, rura Gallica, ut inquit Ruellius Chamaram. In Dioscoride lib. iij. cap. cxvi. σκώδιον, σκώδιον, πλωρίτις, ἀνέσσωμεν, καὶ ἀμύνει τὴν ἀγρίαν, χαμᾶιδρον, μὴ μὲν ἀνέσσω, ἀμύνει τὴν ἀγρίαν, & ἀρὸν nuncupatur. Vt ut uero appelletur, Deo agenda sunt gratiæ, cuius beneficio Germaniæ quoque Scordium innotuit.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Scordium uim excafactoriam habet, & omnia uiscera purgandi facultatem obtinet, qua de causa Theriacæ inter cætera miscetur. Ceterum haud uulgariter hæcenus à pharmacopæis erratum fuit, qui pro Scordio tam salutari planta in Theriacos pastillos Allium syluestre inseruerunt. At spero bonos Sepiasarios errorem hunc in posterum emendaturos.

INTRINSECVS.

Scordium siue recens, siue aridum è uino potum, serpentium ueneno adueratur, interanea omnia purgat, urinam & menses cit. Præterea conuulsæ ruptæq; & laterum dolores ab obstructione & frigore natos sanat, potu.

Scordium cum Nasturtio sumptum facit ad ueterem tussim, potest uero ad eadem herbæ farina cum melle in eclegmate misceri, præsertim cum exulceratum est pectus & purulenta excreantur.


Succus ex herba expressus & potus ad omnia ea quæ diximus multo est præstantissimus efficacissimusq;.

EXTRINSECVS.

Scordium recens impositum uulnera conglutinat, uetera ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Quid multis: ad multa facit tam interna quam externa mala, siue siccum siue recens Scordium.

De Botry. Cap. CXXIIII.

INTER OMNES AESTIVAS PLANTAS VIX ALIAM quamcunque reperiās, quæ æque copioso tum florem tum semine emicat, atq; odorata hæc herba, Botrys appellata, quæ tamen non omnibus locis familiaris sit, tamen non ita pridem in humidioribus hortis plantari coepit. Ea Maio mense primo exortu exigua dissecta, rubra & lauginosa fundit folia, humi procumbentia, post quæ subinde longiora subsequuntur inſtar Cichorij fere, quod Germani Sonnenwübel uocant, inſa.

*Botrys.**Traubenkraut.*

sa. Deinceps caules prode-
unt teretes, in multas alas
parvi, paucis, & angustissi-
mis uestiti foliolis, florem
gerentes, ab imis partibus
ad summas usq., exiguum,
copiosum, subluteum. A
maturitate, quam Augusto
mense consequitur, semine
racematim ramulis adna-
to, suauissimi odoris, ro-
tundo & Coronopi semina
minoris prægnans con-
spicitur Botrys. Radicem
insuper habet breuem & li-
gnosam, ueluti Anethum.
Botrys alioquin est, hyemisq.
impatiensissima, ita ut quot
annis e semine proprio re-
pullulascere necesse habeat.
Estq; fertilis omnino plan-
ta, ubi enim semel sata fue-
rit, ibi assatim postea luxu-
riat, nec opus habet ut de-
inceps seratur, quin sponte
sua ex deciduo semine sese
ipsa propagat.

NOMENCLAT. VRAE.

Germani hanc herbam
Traubenkraut / a semine
quod racematim ramulis
adnascitur, necnō Gewand
oder Mottensamen / pro-
pterea quod, Parisiensibus

matronis magno studio hæc planta quæritur, pecunijsq; redimitur, solent
enim illam odoris gratia uestiarijs arcis pannis linteis, curiose interponere,
ut odoris gratiã contrahant, uocare possunt, Scribit Ruellius lib. iij. cap. lxi.

Gallisuulgo Pſimen, uel Pigmen nominari, qđ Germanice Gewandſalben interpretari licebit, quaſi dicas vnguentum uestiariū. Dioſcoridi lib. iij. cap. cxxi. *ſirpus*, à ſemine quod racematim circa totam plātam naſcitur. Alij Artemiſiam nominant. Cappadoces Ambroſiam.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Cum guſtu amara ſit Botrys, calidam & ſiccā eſſe iudico.

INTRINSECVS.

Planta eſt odorata, quæ cum uino pota non niſi recta ceruice ſpirantibus auxiliatur. Exiſtimo autem herbam in puluerem redactā eclegmati admiſceri, & ita ad orthopnoceam uſurpari poſſe.

EXTRINSECVS.

Veſtibus interpoſita Botrys ſucundo illas commendat odore, quo nomine à Pariſienſibus matronis ſtudioſe colitur. Vide Ruellium libro tertio de natura ſtirpium cap. lxi.

De Campanula ſylueſtri, ſeu Digitali.

CAP. CXXV.

N ALTISSIMIS, ET OPACIS SYLVIS, NECNON TE-

I nebroſis & ulgiſinoſis uallibus Herciniæ, & eius quam den ydar uocant Germani, & Vualgois, potiſſimū uero ijs in locis ubi Carbonarij & Fabri ferrarij, carbones & ferrum conficiunt, hæc planta quam modo deſcribere conſtituimus hac facie prouenire ſolet. Flores Iulio & Auguſto menſibus oſtendit, forma campanulas referentes. Folia habet nigricantia, longa & lata, per ambitum ſerrata, Verbaſculo (de quo ſupra lib. j. cap. lxxij) quadamtenus ſimilia, ſed non nihil anguſtiora. Iunio menſe breui & capillata radice, teretem emittit caulem, cubitalem, à cuius lateribus ordine dependent flores campanulam referentes, eoſq; in nonnullis luteos, in alijs uero purpureos, omnes uero inodoros. His deciditibus in rotundis calycibus ſeu torulis potius, Blattariam (de qua infra ca. cxlvi) æmulantibus, ſemen oblongum, & latum à maturitate reperitur.

Campanula ſylueſtris, ſeu Digitalis duo genera.

NOMENCLATURAE:

Dioſcor. lib. 4. cap. 99.

Quod ad caules & folia attinet, poſſet hæc planta Verbaſcis adiungi.
At

Campanula sylvestris, seu Digitalis.
Waldglocklin/oder Fingerkraut.



At si uel florem uel facultates eius spectaueris, uideatur sane ad Galiopsum referenda. Sed appellet eam quisque ut uolet. Nos a flore, qui campanulas imitatur, Campanulam, seu No lam sylvestrem, Germanice Waldglocke/oder waldschellen/inter ea nuncupabimus, dum commodius emergat nomen. Sunt qui Digitalem, Germanice Fingerkraut appellant.


Diosco. lib. 4.
 cap. 90.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Cum herba hæc amara sit, facile colligi potest, illam naturam suam calidam & siccam esse. Itaque usus illius in ijs extare potest, quæ excalfactionem, extenuationem, absterfionem, & purgationem expostulant.

KK. v

De Mandragora. Cap. CXXVI.

Mandragora, *Ulaun.*

QVAE DE MAN-
dragora, eiusq; sub patibu-
lis nascētis periculosa euul-
sione, agyrtæ & circumso-
ranei illi impostores fabu-
lentur, hætenus non solū
audierunt plerique, sed &
uiderunt, nebulones illos
radices humana utriusque
sexus imagine insignitas,
uenales circumferre. Quas
quidem imagines fictitias,
manuq; ex Bryoniæ radici-
bus factas certo constat. So-
lent namq; illi Bryoniæ ra-
dici (ut diximus) effigiem
humanam utriusque sexus
insculpere, posteaque in ca-
lida arena conseruare, in
qua ubi aliquandiu deten-
tæ fuerint eę imagines, con-
tabescunt, ac aliam arte fa-
ciem induunt, apparentq;
ē terra ita natæ. Hoc pacto
miseri & imprudentes ho-
mines decepti Bryoniam
pro Mandragora emunt.
Quanquam uero impostu-
ræ tam in his quam in alijs
rebus nullus est finis, nemo
tamen hodie est, qui illi se
opponat, eamq; ē medio

tolli curet, quin quod deplorandum sane est, eum in mundo hodie summo
loco haberi, qui alijs arte quadam imponere nouerit, ut recte ille dixerit,
Mundus uult decipi, darumb scint wir bie. Proinde sciant omnes Man-
dragoras

dragoras agyrtarum, nihil aliud esse quam meras imposturas. Mandragora namque ueterum, licet humano corpori quadamtenus similis esse appareat, maxime si inferiores partes radices spectes (unde a' Pythagora *ἀνδρῶν ἀνδρῶν ἰσχυρῶν* *μύησις* proculdubio uocata fuit Mandragora, quæ appellatio impostoribus his occasinem fictitiæ suæ Mandragoræ dedit) tamen tota sua substantia Mandragoræ agyrtarum fictitiæ, prorsus non responder, id quod ex descriptione eius facile intelliges. Ea namque radices habet bene magnas, Raphano nigricanti & longo similes, easq; binas ternasue inter se conuolutas. Duo Mandragoræ Dioscoridi sunt genera, mas scilicet & foemina. Maris folia lata, læuia, candida, humi procumbentia ut Betæ. Hic caule uidiuus est. Poma fert secundum folia satis magna, colore in crocum inclinante prædita, iucunde cum grauitate quadam olentia. Hoc Mandragoræ genus in syluis opacis & tenebrosis prouenire dicitur.

Fœmina folijs est angustioribus, & minoribus quam Lactucæ, in terra sparsis, caule & ipsa orbata. Mala gerit secundum folia c' radice prodeuntia, pallida, odorata, Sorbis aut Mespilis quod ad magnitudinem attinet similia, in quibus semen ueluti pyrorum. Acque hæc hæcenus, nam cum Mandragora mihi nunquam uisa sit, non est quod pluribus de ea agam.

NOMENCLATURAE.

Tempore messis Mandragoræ maturantur, eo namq; tempore a' Ruben filio Leæ matri ex agro allatas testatur Moses Genesis xxx. Dicuntur autem Mandragoræ quod ad mandras pecorum aliasq; speluncas proueniunt. Dicuntur etiam Latinis Mala canina & terrestria (Germanice *Erdsopffel* vnd *Hundsopffel*.) Mandragora mas ueteribus quibusdā Morion, aut Norion, Fœmina Thridacias a' folijs Lactucæ similibus appellatur. Mandragoram (quam Germani *Alraun* uulgo uocant) alij teste Dioscoride cap. lxxiiij. lib. iij. uocant Antimalum, alij Circæam (quod ad amatoria radix eius facere uideatur) alij Xeranthès, aliqui Antimnion, alij Bombachylon, nonnulli Minon, Aegyptij Apemum, Pythagoras Antropomorphon, alij Alæten, alij Thridaciam, alij Cammaron, Zoroastes diamonon aut Archinen, Magi Hermionos, aliqui Gonogeonas) Romani Caninum malum, alij terrestre malum. Serapio cap. cccxxxij. labora uocat. Auerrhoës Lephaa.

David Kyberus ad Lectorem.

MANDRAGORAM Hebræi uocant *דודאִים* Dudaim, Chaldaei *גנפֿיס* Genes 30. *לברוכים* labruchim pluraliter, Nam singulariter *דודאִי* Dudai, & *לברוח* labruach

labruach dicitur. Quid uero Hebræi commentatores de Mandragora senti-
ant, in gratiam studiosorum tam linguæ sanctæ quam rei herbariæ, anno-
tare non pigebit. Ac primum quidē in Dictionario suo Kimhi ita explicat
וְהָאֵם שֶׁהָאֵם בְּרִמּוֹתָאֵם זֶה וְזֶה בְּרִמּוֹתָאֵם בְּרִמּוֹתָאֵם
Hoc est, Mandragoræ (Dudaïm) sunt, radix herbæ, quæ habet similitudinē
hominis, tam uiri quam mulieris, & dicitur Mandragoras in uulgari lin-
gua. Rabi Salomon dicit esse herbam סִיגְלִי Sigle, & in lingua Ismaelitica

In Serapione ca.
276. herba qua-
dam Iesemin ap-
pellata describi-
tur

Serapionis
enim labora-
labruach non ni-
si mutatus uoca-
libus diffat.

Dioscorides quo-
que dicit nonnul-
los Mandragoræ
Circeam appe-
lare, quoniam ui-
deatur radix ad
amatoria condu-
cere.

יִסְמִין Ismin, cui reclamatione Rabi Moses Nehemanides doctissimus inter-
pres, & dicit Ismin aliam esse herbam quandā hoc nomine apud Arabes
uocatam. Addit insuper expositionē ipsius Onkelos Chaldei (qui Mosē in
linguam Chaldaicam optime traduxit) accipiendam, qua pro דּוּדַאִים Du-
daim reddidit יִבְרוּחִין Iabruchin, sic enim apud Arabes quoque Mandra-
goras uocari. Postea Rabi Abenezræ sententiā citat, qui de Dudaïm ita
scripsit (Chaldaus Iabruchin transulit, & sic uocantur in lingua Ismaeliti-
ca, & habet optimum odorem, sic enim scribitur in Canticis Salomonis ca-
pite vii: Dudaïm dederunt odorem, & sunt forma hominis, habent enim si-
militudinem capitis & manuum, & sunt qui dicant quod prosint ad conce-
ptum, quod tamen ego nescio quomodo fieri possit, cum naturæ sint frigida-
dæ.) Hactenus uerba Abenezræ, quibus iam dictus Nehemanides subiun-
git. Videtur mihi (inquit) Leam Mandragoris propter bonum odorem de-
lectatam, nec conceptionem medicinali herba, sed precibus a Deo impe-
trasse. Quare attulit illi Ruben filius ramulos de Dudaïm (id est, Mandrago-
ra) aut fructus eius qui sunt sicut mala, & sunt bene odorati. Sed radicem
(Mandragoræ) quæ habet effigiem capitis & manuum non attulit, de ea
nempe dicunt aliqui quod conceptionem iuuat, quod tamen ego in nullis
medicorum scriptis unquam legi. Hæc ille. Paulo post recitat idem Ne-

hemanides sententiā quorundam, qui dicunt Dudaïm, id est, Mandrago-
ras, herbas esse quæ uenerem stimulent, & ad amorem mulierum incitent,
unde dicunt hi דּוּדַאִים Dudaïm, a uoce Hebræa דּוּדִים Dodim, quæ sig-
nificat amores, deriuari. Hactenus illi: quib⁹ paucis, quid Elias Leuites Ger-
manus in suo Chaldaico Lexico de Mandragoris dicat, subiungemus. Sic
ergo ille scribit.

דּוּדַאִים בְּשֵׁרָה יִבְרוּחִין בְּחֻלָּא בְּרִאשֵׁי לָ בְּלֹא אֲדָרִינִין וְכֵלֵץ
מֵאֲדָרִינִי הוּא מִין פֶּרֶחַ שְׂדֵיחוֹ טוֹב. אֲבָל הַדּוּדַאִים נִתְּנוּ רִיחַ
שִׁיר וְכֵלֵץ וְיֵאֵל. Hoc est,

Et inuenit Ruben Dudaïm, hoc est, Iabruchin, id est, Mandragoras in
agro, Genesis xxx. significantes uoces in lingua Germanica Alraunen, in
Hispanica uero Mandraguli, & est species stirpis admodum bene odorata.
Sed quod dicitur Canticorum vii. Dudaïm dederunt odorem, exponitur
in lingua Germanica Veielen/hoc est violæ. Hæc ille. Exposui sententiā
Hebræo=

Hebræorum de Mandragoris, iudicet æquus lector, & in bonam partem; quod bono animo a nobis scriptum est, interpretetur. Et hæc hæc tunc ad institutum reuertamur.

VIRE S A C T E M P E R A M E N T V M.

Mandragoræ mala in ijs regionibus in quibus gignuntur ab incolis interdum eduntur, quæ edenti somnum inducunt, ut quæ natura sua sint frigida & sicca, potissimum vero radicis cortex, qui in aëre suspenditur, & siccat, ne mucilagine delibratus corrumpatur, earum est facultatum: quare summa cura & cautione illo uti conuenit, præsertim si internis sit adhibendus partibus.

I N T R I N S E C V S.

Multa de Mandragora ueteres scripsere, quæ hic persequi animus non est, satis fuerit unum & alterum medicamentum cui Mandragora admisceatur perstringere.

Succus radicis expressus, duobus obolis ex mulso potus, & ueratrum, per uomitiones bilem atram pituitamq; extrahit. Infanorum uero hæc est medicina.

Cortices radicis Mandragoræ uino decocti, exhiberi possunt, ante sectiones & utiones, ne sentiantur.

De Mandragoræ facultatibus qui plura scire laborat, legat Dioscorid. lib. iij. cap. lxxiij. & Plinium lib. xxv. cap. xij.

E X T R I N S E C V S.

Folia Mandragoræ recentia imposita, recentia uulnera sanare dicuntur.

Idem radicem cum oleo & melle tritam & illitam posse asserunt.

Trita radix, ignibus sacris ex aceto medetur, strumas atq; tubercula cum aqua dissipat, articulorum cruciatus, cum polenta sedat.

Si quis nimium Mandragoræ succi hauerit, ita ut nimio ueterno ne opprimatur periculum sit, ei caput rosaceo, & aceto perfundatur, piperq; aut aliud quod uis quod sternutamenta ciet, naribus olfaciendum obijciatur.

Vide Dioscoridem lib. vi. cap. xvi.

De Mandragora tertia, quæ apud Theophrastum Morion cognomina-
tur, supra libro primo, cap. ci, disseruimus.

Mandragora

Morion

De

De Malis insanis.

Cap. CXXVII.

Mala insana.
Dollöpfel.



QVAE VVLGO
Mala insana uocantur, ea
è Neapoli in Germaniam
commigrarunt, quanquam
Germanis minus conueni-
ant, ut quæ non facile, præ-
sertim annis pluuiosis et fri-
gidioribus, in nostris regi-
onibus proueniant. Quod
ad me attinet, primum om-
nium a Domino Ollinge-
ro è Norimberga eorum
semen, piperi Indico (de
quo paulo post) fere consi-
mile, sed non perinde acris
gustus, luteumq; colore, ac-
cepi. Hoc in scitilibus pri-
mum plantare necesse fuit,
in quibus angusta, & acu-
ta primo exortu eruperunt
foliola, quæ sequuntur alia
nigricantia, forma sua So-
lani sylvestri (quod Man-
dragoram Morion alias
appellant) similia, sed tactu
aliquantum asperiora. Sin-
guli frutices unico rotundo
contenti caule, qui è breui
& capillata proflit radice,
dimidium fere cubitum al-
titudine æquant. Inter pur-
pureum hunc caulem, & fo-
lia, elegantissimi prodeunt
flores, alij purpurei, alij al-
bi, stellati, singuli asperis pe-
diculis

diculis nitentes, qui Autumno appetente in oblonga abeunt & aspectu elegantissima mala, granis referta, alia purpurea, alia lutea. Planta est speciosa, aspectu ut diximus, gustu uero & sapore non perinde grata. Est autem alsiosa, frigorisq; impatientissima, sicut & Cucumeres, quare quorannis semine feri illam necesse est.

NOMENCLATURAE.

Germani Italos imitati Melanzan, & Dollöpfel / hos fructus appellant, Latini Mala insana, & iure quidem, cum ad sanitatem nihil faciant, & *μανδραγόρη* difficulter concoquantur. Hermolaus Barbarus putauit hunc fruticem *τὴν μάναν* tiam esse Mandragoram, Morion cognominatam apud Dioscoridem lib. iiij. cap. lxxiiij. cuius sententia quidam putant minime reſcienda fuerit, cum descriptio Dioscoridis huic plantæ satis fauere uideatur. Cæterū obseruandum est, Mandragoram Theophrasti lib. vi. cap. ij. (cuius fructum his uerbis autor depingit *ἰδιὸς δὲ καλεῖται τὸ μανδραγόρη, τὸ μέλαν τι καὶ παχύδεν, καὶ ἐν ὁδῷ ἔχει τὴν χυμὴν*) nihil cum his insanis malis commercij habere, est enim alia & peculiaris planta, nimirum ea quam sub Solanis descripsimus.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.


Speciosa hæc, sed male sana mala frigida sunt & humida temperaturæ, & meo iudicio sicubi necessitas id postularit uices Mandragoræ obire possunt. Sed hoc certum est prædicta mala his qui sanitatis studio tenentur minime utilia esse. Qui nobis hac in re credere noluerit, is cruda hæc poma degustet, & sentiet uera nos dixisse. Si quis uero fuerit, qui in cibo his uti uelit, is artem apparandi illa a Gallis & Italis discat. Mihi enim animus non est pluribus illa uerbis persequi, cui satis fuerit in hortis ea, cum elegantiæ solum & pulchritudine placere possint, inter cætera quæ uisum delectat, spectare.

De ea quam Stramoniam uocant.

CAP. CXXVIII.

VIVS QVOQUE PLANTAE (QVAE ET IPSA NON
H minus quam superiori proximo capite descripta, alsiosa est) semen e' Norimberga ad memisit Dominus Georgius Ollinger, quod terræ a me mandatum Maio mense prima eruptione duo produxit angustissima & acuta foliola, primis Atriplicis satiuæ recens erumpentis similia, post quæ subinde alia & maiora profiliunt, aliquantum lata Atriplici
cia

Stramonia, seu Pomum spinosum.
Stechöpfel.



cis latius, aut Solatri formam fere representantia, quod admucronatos ipsorum apices attinet, tenera, & læuia, cineracei coloris. Hinc caulis subsequitur, bi-num dodrantum, furculosus tenerrimis uestitus folijs, cui radix est capillata, & contorta, seu implicata. In fastigijs caulibus & ramulorum, calyces uirides, rotundi, digitumq; longitandem nascuntur, qui cum fatiscere coeperint, flores prorumpunt candidi, longi, cymbalaris figura, quaternis in extremitate prominentibus apicibus, in modum pene albi Liliij, odoris gratissimi. His pereuntibus mala demum aspera procreantur, intus granulis seu seminibus exiguis & læuibus repleta. Frutex hic frigoris impatientissimus existit, ut qui ne pruina quidem ferre possit, qui sit ut quotannis semine hunc ferere oporteat.

NOMENCLATURÆ


Venetijs hoc pomi genus Melospinus, & Paracoculi dicitur (alijs Stramonia) Germanis Rauch/ oder Stechöpfel/ hoc est, Malum asperum, seu spinosum appellari potest. Quod ad formam attinet Mandragoris, aut Strychnis accenseri queat:

Facultates

Facultates eius quod ad me attinet experiri nolum. Quapropter eas alijs describendas relinquam

De Vesicaria nigra, seu peregrina.
CAP. CXXIX.

Schwarze / oder welsche Schlutten.



VESICARIA ISTHÆC non tantum peregrina est, sed etiam in nostra Germania cum ætas fuerit pluviosa, & frigidior paulo, læte provenire & fructum edere recusat. Caulem habet surculosum, folijs dissectis seu laciniatis, vitis sylvestris frondi forma consimilibus, sed viridioribus, & tenerioribus uestitus, cubitalem, claviculis quas habet Bryoniæ instar tenuissimas, proximis quibusque fruticibus sese alligantem, flore emicantem per exiguo, rotundo, ex albo in pallidum uergente. Hic in uesticariis abie, in quibus semina reperiuntur nigra, rotunda, Ciceris arietini magnitudine prædita, quæ si singula seorsim spectentur, cordis albi in nigro exculpti & incisi, aut capitis monachi rasi in cuculo nigro effigie repræsentare videntur. Et hic frutex aliosus est, & calidioribus terris scilicet provenit.

NOMENCLATURAE.

Hanc plantam Germanice Münchsföpfflin/hoc est, Caluariam monachi, & Schwarz, oder welsch Schlutten/ id est, nigram seu peregrinam vesficariam uocare in praesentia uoluimus, cum neque de alijs nominibus, neque facultatibus illius quicquam nobis constet.

De Pomo mirabili, siue Hierosolymitano.

CAP. CXXX.

INTER OMNIA AESTIVA POMA, QVORVM ALI-
quot genera proximis hisce capitibus descripsimus, haec quae mo-
do praemanibus habemus. elegantissima & speciosissima sunt.

Sed & ipsa quotannis ex semine quod ex cano nigricat, et asperum, ricinoq;
animali simile apparet, seritur. Folia eius necnon caules Bryoniae respon-
dent, nisi quod illa uiridiora, speciosiora, teneriora, & hi magis tenues &
teneri sunt. Clauiculas multas habet quibus proximis quibusque frutici-
bus se illigat, quam obrem ubi primum excalescere coeperit samentis seu
palis suffulcienda erit ut illis alligata a uentorum iniuria tuta esse queat.
Flores ex albo in luteum sanguescente colore sunt praediti, quae uero hos se-
quuntur poma, carnosam habent cutem, per uersus uerrucosam, ac rigidio-
ribus bullis intumescentem, Cucumeris syluestris instar. Tarde maturan-
tur in Autumno, intus speciosa, & sanguinei coloris.

Aliud uero Balsaminae genus a nonnullis statuitur, quod huc quoque
referunt. Planta est caule ex uiridi rubescente, crasso, folijs Salici similibus,
per ambitum serratis, flore purpureo, forma ad Consolidae regiae flosculos
accedente, post quem mala, sequuntur primo herbacea, dein pallida luteaue
& pilosa. Haec in Autumno quoque maturantur, si solem habuerint propi-
tium, quo si destituuntur non proueniunt. Norimbergae, anno supra sesqui-
milesimum, quadragesimo, magna in copia haec poma prouenire.

NOMENCLATURAE.


In Hetruria haec planta, Pomum Hierosolymitanum, Liguribus Pada-
pis Balsamina, Gallis Pomum mirabile, Italis Charantia, nonnullis Ma-
mortica, Germanis Balsamöpffel dicitur. Hebraeis תמר ירושלמי
Thappuah Ieruschalmi non inepte appellabitur. Barbarus in corollario

suo

Balsamina

Balsamina
altera.

Balsamina, seu Pomum mirabile.
Balsamöpfel.



eius quoque meminit, Cha-
 ratiam nominans, nec plu-
 ra mihi de nomenclaturis
 eius constant.

VIRES AC TEMPE-
ramentum.

Cum nihil certi de ap-
 pellationibus huius plan-
 tæ habeam, nihil etiam cer-
 ti de facultatibus eius affir-
 mare possum. Hermolaus
 oleum ex Balsamina pri-
 mi generis seminibus ex-
 primi scribit, ad uulnera
 præcipuum. Alij asserunt
 poma hæc in oleo macera-
 ri, idq; postea uulneribus
 glutinandis mirifice pro-
 desse, ita quidem ut si equo
 nigro auriculam præscin-
 das, albo postea equo, cui
 itidem sua præcisa sit, ut
 huius olei agglutinare pos-
 sis, & contra. An uero sic se-
 res habeat, mihi non con-
 stat. Autor Pandectarum
 multa de illa scribit.

• LL ij

De Saponaria. Cap. CXXXI.

Speichelwurz, oder Seiffenkraut.



CVM DE HERBA cruciata libro primo cap. xxxiiij scribere cōstituissem, nondum uideram Saponariam hanc. Ac in ea aliquandiu opinione fui, ut putarim herbam cruciatam eam esse quæ Dioscoridi Struthion, uulgo uero Saponaria dicitur, cum non multū ei absimilis esse uideatur. Quamprimum uero Saponaria mihi uisa fuit, errorē agnoui. Proinde multis hodie etiamnum Saponaria ignota & peregrina existit, quanquā nō solum utilitatis sed & formæ gratia, notissimam illam esse præstaret. Est enim frutex speciosissimus, caule piloso, & multis geniculis interstincto, folijs angustis genicula ambientibus, quæ Milio solis quadantenus respondere uidentur, licet, si rerum formas exactius considerare uelimus, ad violam agrestem de qua supra libro primo cap. xciiij. quamproxime accedat hæc planta, non solum quod ad folia, sed & flores, caules, genicula, & radices attinet, qui sit, ut ad

unum & idem genus Saponariam, & violam agrestem referendam esse nostro mentis compos inficiari possit.

NOMEN.

NOMENCLATURAE.

Saponariam Germani *Spaizenwurtzel* / *Speichelwurtzel* / *Weschfrait* und *Seiffenfrant* / appellant, propterea quod Monachi nonnulli & Coenobitæ (praesertim pauperes illi Franciscani qui conqueruntur se non habere pecunias, ut saponem & alumen emanent) illa lauandis cucullis alijsq; uestimentis utantur. Latinis *Lanaria*, *Radícula*, *Herba fullonum*, *Saponaria* *Officinis* *Conditi*, *Serapioni* cap. ccclij. *Condes*, *Dioscoridi* deniq; *apud* dicitur, alijs *Cerdon*, alijs *Catharsis*, alijs *Struthocamelus*, nonnullis *Chamaerhyton*, magis *Challirhyton*, *Aegyptijs* *Oeno*, *Poenis* *syris*, Vide *Dioscoridem* lib. ij. cap. clj.

Auerrhoes Helleborum album
Conditi uocat.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Radix hæc ut admodum calida sit, necesse est, id quod non solum gustus, sed & facultates & iuuamenta eius manifeste arguunt. Apud ueteres magni fuit in utrisque corporis humani partibus medicandis usus.

Hinc forte medicis olim Aureum poculum fuit appellata hæc planta.

INTRINSECVS.

— *Radix* *Saponariæ* drachmæ dimidiæ plus minus pondere cum melle sumpta, crassa & glutinosa thoracis uitia incidere & educere dicitur.

Eadem iocinerosis, lienosis, orthopnoeæ, tussiq; prodest. Vrinam ciet, menses trahit, aluumq; soluit. Proin & uenerem fatigatam uiris reparare & instaurare traditur.

EXTRINSECVS.

Radix foris usurpata secundos partus, nec non mortuos trahit, quare cum iudicio illa utendum censeo.

Succus radicis, aut puluis naribus attractus, cerebrum purgat, nam sterutamenta mouet, sicuti *Helleborus*.

Apud ueteres ocularibus collyrijs claritatis causa radix hæc miscebatur.

Eandem tuberculis discutiendis tusam, cum lepras, & malam scabiem tollere cupiebant, aceto uel uino decoctam illam imponebant, uel ex melle illinebant. Hodie ut diximus a mendicantibus nonnullis coenobitis, eluendis uestimentorum maculis, sordibusq; saponis uicem exhibet.

De Staphide agria. Cap. CXXXII.

IPEDICVLARIA ISTHAEC, CVM CAPVT OCTOGESIMUM TERTIUM PRIMI LIBRI SCRIBERE CONSTITUISSEM, AD MANUS

LL in

Staphis agria.

Leüßwurzcl.



mihî fuisset, eo in loco mentionem eius quoque inter cæteras pedicularias fecissem. Sed de ordine fortasse non opus est ut plus æquo solliciti simus, modo stirpes ipsas cognoscamus. Itaque relictis his historiâ aggrediamur.

Pedicular

Pedicularia, quam hoc capite tractamus, folijs est plerunque sex aut septem, interim & paucioribus incisuris diuisis, caule terete, flore violæ formam repræsentante, eoque subcæsis. Hoc decedente folliculos profert herbaceos, in quibus semen acre triquetrum, Ciceris instar, continetur. Herba hæc uoluptatis potius quam utilitatis gratia hodie in hortis plantatur

NOMENCLATURAÆ.

Sunt qui præsentem plantam, propterea quod pediculos & lentes enecat, ueram Pediculariam esse statuunt, & eam quidem, quæ Dioscoridi *ῥάγις ἁγρία* lib. iij. cap. cl. dicitur. Sed cum descriptio Staphidis agrias non plane huic Pediculariæ nostræ respōdeat, dicimus eam Staphidis agrias speciem esse, non ipsam Staphidem. Alij Pituitariam Latine, Speichelwurtzel Germanice appellant, quod cominanducata feruore multam pituitam trahat, non aliter atque Pyrethrum. Quod si Staphidis agrias species sit, quemadmodū diximus, alijs apud Diosc. Triphyllon (nimirum a foliorū forma) alijs Stesion, alijs Astaphida, alijs Phthiroctonon, alijs Phthirion, alijs Apanthropon, alijs Polyides, alijs Arsenoten, Ægyptij Ibesoaden, Romani Herbam pediculariam uocant. De his appellationibus plura dici possent, sed alijs ea discutienda relinquo. Nos Germanice hanc plantam *Leißwurtzel* / *Küßmörder* / vnd *Speichelwurtzel* / semen uero, *Meiß* vnd *Kartenspesser* / hoc est, Piper murium aut glirium in præsentia appellabimus.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTUM.

Pedicularia in quarto est ordine excalfacientium & desiccantium. Debetque externis potius quam internis corporis partibus adhiberi.

INTRINSECVS.

Grana quindecim si trita in aqua mulla dentur, crassum humorem per uomitum purgare ueteres testantur.

Ego nucleis eius ad purgationem uti nolim, nam feruore suo fauces lædunt. At gliribus & muribus cibos eo semine condiam, ubi plus æquo mihi molesti fuerint.

EXTRINSECVS.

Eadem trita, & ex oleo illita, phthiriasi profunt, pediculosque & lentes tam in hominibus quam iumentis, interficiunt, profunt & prurigini & psoris.

Radix cum semine in aceto decocta, colluto ore dentium dolori subuenit.

Ulcera oris manantia sanat, sed melle prius illam temperare conuenit, ne acredine sua & feruore lædat.


Plura alia ex his quæ diximus colligi poterunt. Facit enim hæc planta ad malas scabies, & papulas serpiginesque, & psoras, aliisque id genus uitiis hominum, necnon iumentorum, quæ nullo alio remedio curari poterunt.

Pastilli præstantissimi purgandis gliribus, & muribus, si radix uel semen in puluerem redactum cum farina decoquatur.

De Sphatula foetida, seu Gladiolo Italico.

CAP. CXXXIII.

Welsch schwertel/ oder Wandtleußkraut.



GLADIOLVS HIC in Italia frequens est, apud nos nō nisi satus prouenit. Folia fert angusta, acuta, exigua, uulgarī Gladiolo, potissimū uero luteo quadamtenus similia. Caulem habet rotundū, in cuius fastigijs oblongas uidi siliquas, Pæonię pene similes, quę si Autumno maturitate dehiscere cœperint, semen ostendunt rotundum, & rubrum, & adeo acre ut fauces quasi ureret. Florem non uidi. Radix eius quam uidi candida erat, rotunda, & multis capillamentis fibrata, gustu similiter feruido prædita.

NOMENCLATURAE.

Hęc planta quibusdam Wandtleußkraut/ hoc est, Cimicum herba dicitur, a necandis cimicibus. Officinis Sphatula foetida, quod grauem exhalet odorem, appellatur.

VIRE.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vehementer acrem qualitatem, tum radix tum semen Sphatulæ foetidæ obtinet. Proinde natura sua sicca est, & posset meo iudicio corrosiuis (ut uocant) medicamentis misceri.

E X T R I N S E C V S.

Succus huius plantæ expressus manantem, humidam, simulq; serpentem scabiem illius sanat. Si cui libet, is & erodentibus medicinis adijciat, periculumq; quid possit, faciat. Est enim corrosiuum uehementer adurens, hsc qui pustulas curant, probe conueniens.

De Cyclamino. Cap. CXXXIII.

CRESISTAE PLANTAE QVAS ALIQVOT HISCE
 A capitibus descripsimus, ad Cyclamini mentionem me deducunt. Cyclaminus licet non ubique reperiat, tamen hodie ut
 & olim in usu esse haud uulgarè cernitur. Nascitur autem in umbrosis & uliginosis lucis, sub arboribus maxime, radice nigra, rotunda, lata & uoluti non nihil pressa orbis mēfarij pene instar, multis & exiguis capillamentis fibrata, folijs humi in orbem sparsis. Hederæ, aut ut ego sentio, Asaro consimilibus, uiroris saturati, altera qua terrā spectant, subruissis, altera suscp deq; maculis albicantibus aspersis, inter quæ flores Autumno appetente rosarum effigie emicant. Radix admodum acris est, & linguā gustata, nec non fauces uehementer adurit.


Exigua Cyclaminus superiori per omnia respondet, nisi quod non perinde acris est & feruida, ut illa. Nascitur & hæc in umbrosis syluis. Eam ego in Rhetia superiori non procul a Curia oppido primum uidi. Supra cap. lxxv huius libri descripta est, Germanico nomine Waldzeitlosen appellata. Dicebatur mihi tum Hermodactylum eam esse, sed falso, nam Cyclamini exiguae ueræ species est.

N O M E N C L A T V R A E.

Nomenclaturæ huius plantæ, quam Germani Waldruben/Erdruben/oder Apfel, hoc est, Rapum syluestre, Malum terrestre uocant, supra cap. xix. exposuimus, quæ hoc loco repetere superuacaneum esse duximus. Vnum est cuius candidum lectorem admonitum uelim, nempe Rapum hoc sylue.

Cyclaminus.

Waldtrüben/ oder Erdräpfel.



stre, panis terræ, seu porcini nomenclatura minime insigniendum, cum nullo animali, neque homini, neque porco, aut alijs cuius pecori hæc radix pabulis grata sit, ut quidam affirmant, sed perperam, quod proculdubio ita

se habere intellecturi essent, si Cyclamini radicem degustarent.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Cyclaminus, quæ & Vmbilicus terræ cognominatur, calidæ & siccæ est qualitatis, prudenter tamen attendere oportet, si quando eius radicem internis partibus medicandis usurpare uoluerimus.

INTRINSECVS.

Ego sanè hoc nigro & syluestri Rapo minime delector. Relinquam autem ijs qui strenue se purgare uolunt, & his qui Panem terræ ex ea faciunt, qui tamen non porcis, ut illi astruunt, sed Lupis & vulpibus magis conuenit. -

Cyclaminus tribus drachmis pota cum passo aut diluto mulso regium morbum discutere traditur. Mihi uidetur drachmam una uice exhibitam satis esse, licet Constantinus in libello aureo cap. xxxiij. ad prædictum morbum duas uncias succi e radice expressi exhibendam docuerit. Qui eiusmodi medicamentis uti uoluerit, is multis uestibus contextus, loco calido & a perfrictionibus tuto, recumbat, quo facilius exudet, Vide Dioscoridem lib. ij. cap. cliij.

Quod ad alia attinet, respondet hæc radix Scillæ, de qua proximo capite. Reliqua prudens omitto.


EXTRINSECVS.

Chirurgis, qui strumas, tubercula, excrescentias, & mariscas, uel corrosiuis, uel sectione aut uisione curare consueuerunt, hoc quoque Rapum commendabo, ad ea enim quæ commemorauimus, sicut & quamuis malam scabiem & psoam, uel præstantissimum & efficacissimum præbet medicamentum, Vide si placet Dioscoridem.

De Scilla. Cap. CXXXV.

EPAM HANC PEREGRINAM HORTIS NOSTRIS
C nunquam seruissem, neq; hisce commentarijs adduxissem, nisi me ueneficiorum & malorum medicamentorum noxa admo-
 nuisset. Cum namq; hodie noui subinde prodeant Medici, Iudæi, Errones, qui se Ægyptios uocant, Magi, seplastiarij pessimi (de bonis nihil dico) Ri-
 zotomi, denique & agyrtæ, qui non tantum loquacitate sua ægris, sed & sa-
 nis multum incommodi adferunt, consentaneum est, ut in posterum aduer-
 sus

Scylla.
Meer zwylbel.



Plinius lib. 20. sus insidias eiusmodi impostorū, & me & alios muniam, cōsilio in hoc usus
cap. 9. Pythagoræ, qui Scyllam in limine ianuæ malorū medicamentorū introitū
Theoph. lib. 7. auertere tradit. Sed licet fabulosum hoc quidem dici possit, certum tamen
cap. 12. est,

est, quotidiana id attestante experientia, usum Scyllæ saluberrimum esse, nec eo nos carere posse, præsertim uero officinas, quorum claræ sunt confectiones, Aceti inquam & Oxymelitis de Squilla, ut uocant. Scylla itaque, cuius radix Cape modo multipliciter tunicata corticosaque cernitur, officinis omnibus cognita est, licet hortis meis assuescere recularit, quantum uis omni à me impensa opera. Nec constat mihi eius rei causa, nisi forte ea sit, quod Ficum adiunctam non habuerit, uti Plinius significare uidetur. Sed ut historiam Scillæ absoluiamus, caulem profert illa primum omnium, luteo emicante in flore, eo decedente folia consequuntur grandia, longa & lata. Theophrastus Scillam florum ternos prouentus ostendere tradit, quæ uerba ego sic interpretor, ut dicamus, Scillam caulem primum emittere, deinde flores eius violæ effigiem referentes emicare, denique uero folia se conspicienda præbere, quæ Satyrionis maiori aliquo modo respondent forma. Scilla in aërem suspensa, non cito arefcit.

NOMENCLATURAE:

Nos cum Iacobo Manlio hanc plantam Cepam muris (Germanice *Meißzwibel*) uocamus, quod nominis inde sortita est, quod mures in cibo ab illis esitata enecare ualeat. Vocatur & Cepa marina (Germanice *Meerzwibel*) & officinis Squilla dicitur; Dioscoridi uero lib. ij. cap. clxij. *σύνδα*, Serapioni cap. ccxcij. Haspel; Auerrhoi Halanchat nuncupatur.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Magna cura & prudenti consilio opus est his, qui Scilla uti constituerit, nam quemadmodum non parua est utilitatis si rite usurpetur, ita uel maxime incommodat, si secus accipias, præsertim crudam & recentem. Est enim Scylla naturæ acris, & feruentis, & siccae in tertium usque gradum, ut inquit Christophorus de honestis super Mesuen, qua de causa ut diximus, prudenter ea uti conuenit.

INTRINSECVS.

Propterea quod Scilla cruda usurpata homini noxiam adfert, ideo ueteres diligenter de usu & præparatione eius monuerunt, quemadmodum uel delictet assari, torreret, coqui, liquoribus macerari, & exiccari debeat. Ex his itaque præparandi rationibus, eam quicquid deligat, quam intellexerit sibi commodiorem.

Squillitici aceti confectio apud Serapionem talis traditur,

Sed aceti squillitici operatio, est in hunc modum, ut accipias
tur.

tur Squilla alba, & purgetur bene, & incidatur in frusta, & inferatur in filo lineo, & sit inter utrunque frustum distantia, ne se tangent, & desiccentur in umbra quadraginta diebus, postea de ea sumatur quantitas unius mannes, & ponatur in uase, & proijciantur super eam duodecim Kist acetii fortissimi, & ponatur in sole quadraginta diebus, & uas sit coopertum bene, & clausum, post hoc tempus extrahatur Squilla ab aceto, & exprimatur, & abijciatur acetum, aut reponatur. Quidam uero accipiunt ex Squilla unum mannes, & proijciunt super eam quinque Kist acetii, quidam autem accipiunt Squillam & mundant eam, & non exiccant illam, sed sic recentem præparant ipsam, proijcientes super unum mannes ex ea acetum, & dimittunt sic sex mensibus, & illud acetum squilliticum factum secundum hunc modum, est magis incisuum chimorum grossorum, quam aliquod aliud acetum squilliticum. Est autem acetum squilliticum ad multa utilissimum, &c. Hæc ille.

Galenus uero non laudat eorum institutum, qui recentem aceto & crudam macerant Scillam, quare nos in posterum ipsam prius exiccabimus.

Vinum Scilliticum.

Sunt qui Autumno Scillam minutim & frustulatim in taleolas concissam musto imponant, simulque ita deferuescere sinant, quibus uini quam acetii Scillitici iucundior est usus.

Sed sciant omnes qui febri aut interno apostemate laborant, ab usu tam uini quam acetii Scillitici sibi abstinendum. Nam utrunque crassos humores incidit, aluum turbat, urinam ciet, & uomitiones.

Constantinus in libello de gradibus scribit medicamentum ex Scilla confectum hydropicis, dispnoicis, iocinerosis & splenicis, & omnibus istis uitijs quæ a lentis & crassis humoribus oriantur, prodesse eaque incidere.

Alii Scyllæ radicem pistorio opere circumlinunt, & in clibanum conijciunt, ut asseritur, quod si prima uice non satis assata uideatur, nouum statumen superinducitur, & rursus in clibanum mittitur, quoad probe assata fuerit, & cum frusta eius aëre siccanda suspenduntur.

Nec desunt qui aqua illam discoquant, & aquam subinde mutant, donec ipsa nec acrimoniam, nec amaritudinem habeat, traiectaque lino frusta siccantur in umbra, ita ut ne ulla quidem sui parte se contingant.

Dioscorides Scillæ tres obolos in delinctu ex melle sumptos, hydropicis & stomachicis, quibus innatat cibus, regio morbo, torminibus, ruffi ueteri, suspiriosis, & ore reiicientibus unice prodesse tradit, quas facultates

Plinius

Plinius aceto quoque Scillitico ascribit, quod & tineas, & reliqua uentris animalia pellit.

Acetum necnon Oxymel & Eclegma Scilliticum (ut semel finiamus) melancholiam expellunt, apoplexiæ aduersantur, calculos comminuunt, & expellunt, uulvas purgant, & coxendicum doloribus profunt.

EXTRINSECVS.

Acetum Squilliticum colluto ore, mobiles dentes firmat, & foetidū oris halitum emendat. Auribus instillatum, crassos & lentos fluxus auditum impediētes discutit.

Oleum in quo Scilla macerata fuerit uerrucas & rimas pedum illitu sanat. Idem capiti oblitum manantia eius sanat ulcera, & furfures tollit. Ictibus etiam serpentium aliorumque id genus animalium medetur.

De Sisaro, seu Rapunculo hortensi.

CAP. CXXXVI.

VM DE STAPHYLINIS SCRIBEREM LIBRO PRIMo, & huius Sisari mentio facienda erat. At quoniam tum quidem temporis maturitatem suam haudum assecutum fuisset, uolui historiam illius in hunc reuocare locum: Est autem radix eius dulcis, & boni saporis. Caulem habet satis longum, multis incisus folijs, maioris Pimpinellæ similibus uestitum: Florem in umbellis candidum, qui in latum semen tandem abit, quem diligenter colligere quidam solent, ut postea illud serant &c.

NOMENCLATURA.

Huius plantæ cum Rapunculi historiam texeremus, mentionē fecimus, & Sisarum Columellæ esse docuimus. Quanquam id nominis uulgari quoque attribuerim eo in loco Rapunculo, quo sane dignum esse censeo. Germani hortense hoc Rapunculum *Zamgarten Rapunzel*, *Gerlin*, *Gierlin*, & nonnulli *Gurgelin* appellant.


VIRE S AC TEMPERAMENTVM.

Radices Sisari cibo gradissimæ sunt, calidum fere & siccum temperamentum sortitæ.

INTRIN-

Sisarum.

Sam garten Rapunzel.



INTRINSECVS.

Quemadmodum Pastinaca, ira & Sisarum a coquis paratur. Illud in cibo usurpatum stomacho gratum est, cibi appetentiam excitat, genituram auget, venericq; subinde offensanti prodest, & urinam ciet, teste Galeno.


De

De Rhodiaradice.

Cap.

CXXXVII

Kosentwurz.



ET HAEC PLANTA in Germania tanquam aduena & peregrina, uoluptatis gratia in hortis passim plantatur, diciturque primū e Græcia ad nos uenisse. Radicem habet satis crassam, multis capillamentis fibratam, quæ si teritur, rosæ odorem spirat. Caules eius neque florem, neque fructū ostendunt. Folia eam sere plantam emulantur, quam libro primo. cap. cxxij. descripsimus.

NOMENCLATVRÆ.

Hæc planta ab odore rosæ nomen suum apud Latinos, Græcos & Germanos obtinet, dicitur *ῥοδία*, *ῥίζα* Græce, Rhodia radix Latine, Kosentwurz Germanice. Agyrtæ & circumforanei illi Rizophori multa & magna de ea radice prædicant.


VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Rhodia radix calidæ est qualitatis, & capitis doloribus tusa & cū rosacea aqua

temperata, frontique imposita, uel si linteola in eo liquore madefacta, & prædicto modo imponentur, mederi dicitur.

De Lunaria. Cap. CXXXVIII.

Non Rautten.



LUNARIA IN QVI-
busdam altissimis syluis
nascitur, rotundo cau-
le, unico, sed utrinque
quinis aut senis incisuris
dissecto folio, Rutæ prope
consmili, semine in fastigio
caulis exiguo, copioso, ra-
dice frequentibus fibris ca-
pillata instar Plantaginæ
Latifoliæ. Iulio mense ap-
paret hæc planta, deinceps
uero non item.

NOMENCLATURÆ.

A folijs hanc plantam
Germanice *Monrautten*/
(quasi dicas Lunaticā Ru-
tam) appellare libuit. Lati-
ne Lunaria uocatur. Aiunt
illam cum Luna augeri &
decrefcere, ita ut quot die-
bus supra terram Luna fue-
rit, tot etiam incisuris disse-
ctum Lunariæ folium uideatur.
Multi præclara que-
dam de Lunaria sibi & alijs
pollitentur, præsertim ue-
ro Chymistæ.

VIRES AC TEMPE-
ramentum.

Lunaria meo iudicio exic-
catoriâ habet uim, possitq;
forte ad calidas uentris fluxiones usurpari. Plura de hac herba quæ dicam
equidem non habeo. Si quis tamen præter ea quæ diximus, de facultatibus
& usu Lunariæ aliquid scire laborat, is agyrta illos ueteratores, & eos qui
Chymistas se esse iactant, Mihi sane nihil de illa compertum est.

De

De Cypero. Cap. CXXXIX.

Wilder Galgan.



C YPERVS CAULEM PRODVCIT CVBITALI ALTI-
tudine, angulofum, in cuius cacumine minuta folia prodeunt,
MM ij

inter quæ semem residet. Radices habet rotundas, multas inuicem contextas, quam plurimis capillamentis fibratas, suauiter olentes, & amaras. Hæ quotannis nouos oculos, asparagosq; emittunt, qua ratione propagantur, uti omnia Harundinis, Iunci, & Gladiolorum genera. Gaudet Cyperus humectis & palustribus locis. Afferunt nonnulli Cyperum in tractu Rheni gigni: Ego nusquam illum, quam in hortis satum prouenire uidi.

NOMENCLATURAE.

Κύπερος, κυπερόν, κύπρις, tria hæc Græca nomina, licet diuersarum plantarum sint, tamen indifferenter a plerisque huic a nobis nunc descriptæ plantæ attribuantur, quæ a Dioscoride lib. primo. cap. iij, Aspalathum quoq; & Erysisceptrum cognominatur, licet & hæ appellationes ad alias quoque pertineant plantas. Cornelius Celsus libro tertio cap. xxi. Iuncum quadratum, Plinius lib. xxi. cap. xviij. Triangularem & angulosum uocauit. Germani Wilden Galgan, vnd woltrichende eckere Bingen / hoc est, syluestrem Galangam, & Iuncum odoratum, angulosum (a caule nimirum) nominant.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Radix Cyperi calida & sicca est, & intro sumi, foris uero unguentis pretiosissimis mixta, salubriter imponi potest.

INTRINSECVS.

Hydropicis & calculosis in potu radix hæc exhibenda fuerit, nam intro sumpta urinam & calculos mouet, necnon menses. Aduersus etiam scorpiionum ictus remedio est.

De Lithospermomaiori. Cap. CXL.

LITHOSPERMON MAIUS IN GERMANIA NON TANTUM peregrinum ut paucis cognitum est, uerum etiam tarde maturatur. Folia profert longa, Sphatulæ foetidæ pene instar. Inter folia & caules, magna, dura, incana, & lapidea semina apparent, nucibus uescarijs (de quibus infra lib. iij. cap. lxviij.) magnitudine paria, forma uero Ciceri per omnia respondentia. Sunt qui ex his seminibus orbiculos precarios uoluptatis gratia conficiant.

NOMENCLATURAE.

Quantum iudico, certe hæc planta Lithospermon est Plinij, quod lapillos

fos magnitudine Ciceris gerere dixit lib. xxvij. cap. xi. quæ uerba de uulga-
ri Lithospermo Milium solis uocato intelligi non possunt. Germani Grof-
sen stein samen/hoc est Lithospermon maius, aut Groffen meerbirsen/ hoc
est, Milium solis maius, appellant.

De ea, quam Itali Celosiam uocant.

CAP. CXLI.

ANC STIRPEM DOMINVS GEORGIVS OLLINGE
H rus Norimbergæ in suis hortis plantat, & magni facit, ob insig-
nem coloris gratiam, qua nemini non arridere possit. Planta
est cubitalis altitudinis, folia gerens Persicæ aliquo modo similia, sed latio-
ra, puniceo, luteo, & uiridi coloribus mixtim Iridis instar prædita, a lon-
ginquo aspectu gratissima. Cæterum huius plantæ florem nullum uidi,
quanquam gemmantem oculum eumq; subasperum mihi ostenderet. Sed
quid illo conclusum fuerit, me latet. Diuites uoluptatis gratia in figulinis
ante fenestras plantant, & magno in pretio habent.

NOMENCLATURAE.

Itali hanc plantam Celosiam uocant. Ego quia peregrina & mihi inco-
gnita est Wider schein/a' coloribus uarijs effulgentibus, Germanice appel-
lare uolui. Quod nomen in Dioscoride habeat ignorare me ingenue fate-
or, nisi forte Lycopsios, aut Anchusæ sit species, qua de re aliorum & docti-
orum sententias audire cupio;

De Nerio. Cap. CXLII

ERION PERNITIOSVM PLANTAE GENVS NO-
N stro quoque orbi cognitum fieri iam pridem coepit. Frutex est
fatis elegans, arbusculæ similis, folijs uestitus angustis, solidis,
Lauro confimilibus. Flores uidere mihi non contigit, sed fructum uidi, is
digitalis erat longitudinis, intus lanugine aut pappis quibusdam refertus,
filiquis Asclepiadicis respondens.

NOMENCLATURAE.

Νέρειον Græce, Nicandro Neris. Dioscoridi lib. iij. cap. lxxx. *ἰσίδωρος*,
MM iij

Nerion.

Vnholden fraut.



ῥοδὸν ἑρμῆος, (Germanice *Rosenhäumlin*) dicitur. Est uero Nerion inamabilis planta, hominibus & iumentis pernitiōsa, quapropter Vnholden fraut illam nominare uolui. Dicitur alias Germanis *Olander* / a uulgarito officinarum nomi.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Nerion calidæ & siccæ est qualitatē. Ego illud hortis meis abdicauī.

Scribit Dioscorides illud ē uino potum, Ruta ad dita, hominibus contra serpentium morsus præfidiū esse. Sed eas facultates non ipsi Nerio, quin potius Rutæ attribuerim.

Flores & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedum plurimis uenena sunt.

Imbecillę etiam animantes, ut pecus & capræ, si aquam bibant, in qua folia ea maduerint, moriuntur. Recte ergo Galenus Nerion perniciosum et uenensum non tantum hominibus sed plerisque etiam pecoribus esse scripsit, lib. de simp. facult. viij.

De.

De Rusco. Cap. CXLIII.

Meißdorn.



VENETIIS QVOTI *Horridior Rus-*
 dianio in usu spinosus hic *sco, proiecta uin-*
 frutex habetur, solent enim *lior alga.*
 ex eo scopas conficere, qui-
 bus cōclauia purgare que-
 ant. Nam ubi Betulæ de-
 sunt, (ex ijs enim in nostris
 regionibus scopæ fiunt) ibi
 Erica aut Rusco contentos
 esse oportet. Sed non pro-
 pterea contemnendus est
 Ruscus, quod ad uilia ope-
 ra adhibeatur, quin potius
 magni est faciendus si non
 ob multas quibus scaturit uti-
 litates, certe uel ob æternū
 uirorē quo tam hyeme q̃
 æstate uigere cernitur. For-
 lia is habet Myrtilli per o-
 mnia similia, nisi quod hæc
 in cacumine aculeata sint,
 quod in Myrtillis non ui-
 deas. Ruscus fructum per
 maturitatem ostendit a me-
 dijs folijs dependentem, ru-
 brum, Corallij rubri instar,
 duritia nucleo ossea. Semē
 eius per triennium sæpe in-
 tra terram delitescens, tan-
 dem erumpit. Radix Rusci
 recta est & lōga, gustu ama-
 ra. Frutex est Ruscus non
 admodum altus, in Italia
 facile & sponte sua gignitur

multis in locis, secus itinera aspera, & sæpes, præcipue prope Bononiam. In

Germania nostra seri se quidem patitur, & a' fatu ut diximus profilit, & in mediocrem euadit fruticem, sed fructum non profert, quod rigidiori apud nos hyemi ascribi debet.

NOMENCLATVRAE.

Multa hic frutex apud Dioscoridē nomina habet quæ ordine percenſebimus, *μυρτίνα ἀγρία*, id est Myrtus, sylueſtris, *μυρτίνα ῥαβδα*, *ἡ ῥαβδα*, *ἡ ῥαβδα*, *ἡ ῥαβδα*, *ἡ ῥαβδα*, hoc est, Murina spina, Germanice *Meißdorn* (propterea quod muribus & gliribus hic frutex aduerſetur. Solent enim rura Italix cum caſeis, quos in aëre ſiccare uolunt, & falſis ac ſumatis carnibus adiungere, ut his (pennis mures, glires, & vespertilioes deterriti, carnibus caſeoq; parcant) Agonon, Scincos, Mintha, Catangelos, Anangelos, Acæron, Cinen, Lichene, Chamæpitys, *χαμαίφυτον*, Gyrenia, Herculis genitura, Ruscus. Et hoc quidē (de Rusco loquor) propriſſimum est nomen, quod adiecta a' fronte littera officinæ corrupte Bruscum efferunt. Equidem in his quas enumerauimus nomenclaturis multæ sunt, quæ huc non pertinent, sed donabimus illas doctis quibusdam (qui perplexis & dubijs gaudent) discutiendas.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Semen Rusci in medicina ad calculum, stranguriam & menses mulierum usurpatur. Dioscorides quoque decoctum in uino semen regio morbo mereri tradit.

Cauliculi recentes, asparagorum uice in cibo ſumuntur. Noſtris regionibus id genus tibi incognitum & non uſitatum.

EXTRINSECVS.

Supra docuimus Ruscum Venetijs, alijsq; maritimis ciuitatibus scoparum uicem præbere. Deinde & mures gliresq; ac vespertilioes illo abigi, quominus caſeos & carnes inuadant.

De Alcea peregrina, seu Veneta.

CAP. CXLIH.

IRABILIS CUIVSDAM ET SPECIOSAE PLANTAE
 M quæ a' Venetis ad nos primum comigrasse dicitur, semen superioribus annis e' Norimberga ad me misit D. Georg. Olling. Hoc teres est, coloris incani & nigricantis, foraminulentum, quo nomine Aparing semē referre uidetur, licet nō maius sit Brassicæ semine. Cūq; Maio
 mense

Alcea Veneta.

Venediger Pappelen.



mense erumpere cœperit, bi
 na primum ostendit rotun
 da, & maluacea foliola,
 post quæ alia & maiora
 subsequuntur, dissecta in
 star Alceæ. Postea caulis
 emergit cubitalis, teres, pau
 cis ramulis brachiatus, fo
 lijs interim dissectis (ut dixi
 mus) uestitus, reliquis cauli
 culis adnatis humi procum
 bentibus, nō aliter ac si pri
 mario cauli inferuientes,
 primum illi floris locum
 concedere uelle innue
 rent. Nam nullus ex his in
 florem erumpit, quoad me
 dius & primarius caulis flo
 rere occœperit. Florem ue
 ro hoc pacto profert. Iulio
 mense capitula seu calyces
 primarij caulis rumpuntur,
 tum elegantissimi prode
 unt flores ex purpura dilu
 ta albicantes, effigiem cam
 panulæ, seu cymbali oblon
 gi æmulantes, in quorum
 medio quatuor aut quinque
 stamina, & ex his quidem
 luteum apicem effulgentē
 uidere est. Porro qui uelit
 hos calathos seu cymbala
 res rosas apertas contem
 plari, eum sane occasionem
 diligenter obseruare oport

tet, quod meo exemplo quem sæpenumero opportunitatem illam longa ex
 pectatione uenari non piguit, facere debebit, quisquis ista uidendi deside
 rio tenetur. Solent namq; hæ rosæ non nisi una hora diei, & ea maxime,

qua sol feruentissimus fuerit, hoc est, a nona usq; ad secundam pomeridias nam, ac alias nunquam, sese apertas ostendere. Ac postquam horæ spatio eo quo diximus modo floruerit, rursus clauditur, tandemq; decedit, uti aliarū Maluarum flores solent. Folliculi qui decusso flore, semen copiosum tenera in lanugine (unde & in auras nisi in tempore colligatur facile abire potest) continent, forsis lanuginosi sunt, multis nigris costis distincti, ac superne quinis apicibus emicantibus, cuiusmodi in seminum Lini conceptaculis hiantibus uidere est, licet hæc uascula illis maiora sint. Radicem habet hæc planta, alijs Maluæ generibus consimilem, non tantum quod ad formam, sed & saporem, & odorem attinet. Planta est alsiōsa, hyemisq; prorsus impatiens, qui fit, ut e semine quotannis repullulare necesse habeat.

NOMENCLATURAÆ.

Cum hæc planta, peculiarem suam habeat horam qua florem apertum ostendit, uolui eam Germanice *Wetterrößlin*/dicere. Quod ad formam & natale solum, unde primum ad nos allata dicitur attinet, putauī non ineptē me facturum, si *Venediger Pappeln*/hoc est, Maluam, seu Alceam Venetā appellarem. Conabantur nonnulli nobis persuadere hanc eam esse stirpem quæ Dioscoridi *Androsæmos* dicitur. Sed errant hī quidem, nam *Androsæmos*, uti supra libro primo cap. *xxij.* pluribus indicauimus, ad *Hypericon* pertinet. Nos existimamus eam congenerem esse uel *Althææ*, uel *Alcææ*, parati interim certiora docentes audire.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Temperamentum & facultates tam *Althææ* quam *Alcææ*, supra lib. primo cap. *cxix.* & *cxxi.* exposuimus, quas hoc loco repetere nihil attinet. Proinde Maluam hanc peregrinam illis ut diximus adiungemus, quoad quid possit addiscamus.

De Garyophyllis Indicis.

Cap. CXLV.

1.
Garyophylli Indici maiores.

2.
Exigui.

3.
Medij.

GARYOPHYLLORVM INDICORVM TRIA SVNT genera, exiguum nimirum, medium & grande, quod flores suos Autumno appetente producere solet. Nam exiguum plerumque in fine Maij mensis, medium uero Iunio mense flore comare cernitur. Porro tria hæc genera unum & idem habent semen, oblongum scilicet & nigrum, Helenio quadamtenus simile. Hoc binis primum e terra oblongis & an-

Garyophylli Indici.

Indianisch Negelin/oder Samat rößlin.



& angustis folijs, uti Cicutâ fere erumpit. Postea alia subinde folia & maiora, & utrinque dissecta, non aliter atq; Tanacetum (quæ de causa a nonnullis hæc planta Tanacetî aut Artemisiæ species cēsetur.) sequuntur. Caules tandem assurgunt teretes & purpurei, ueluti & Artemisiæ, surculosi, maxime ubi terram nactus fuerit hic frutex, humidam & pinguem, deinde & soli & aëri expositam. Cæterum inter omnes plantas uix aliam quamcunque reperias, quæ adeo sine ullo negotio radicaretur. Nam si uento aut alio quopiam casu surculi & ramusculi auulsi, in terrâ rursus pangantur, quam celerissime & ipsi radices agunt, quo non semel ipse obseruauit. Flores qui in fastigijs tenuissimis, rotundis & concavis pediculis insident, tenerissimi sunt, rubri, sed omnino odore destituti, ubi uero aliquamdiu superuixerint, in luteum, maxime ea parte, qua terram spectant, languescunt. His decussis semen in oblongis Papaue-

ri similibus uasculis, stipatum reperitur. Radices horum fruticum breues sunt, sed multis adnatis radiculis capillatæ, hyeme pereuntes, qui sit uersamine.

mine quotannis feri hanc plantam necesse sit. Folia eius grauem spirant odorem, gustu aliquantulum amara. Flores odore prorsus destituuntur, solaque coloris elegantia commendantur. Hoc genus stirpis non ita pridem Germaniæ innotuit, quippe quod temporibus Caroli V. Imperatoris Romani, una cum cæteris peregrinis plantis, ad nos commigrarit.

NOMENCLATVRÆ.

Germani hosce flores *Sammaetblumen* (quasi dicas *Seric* uilloso flores) vnde *Indianisch* *Negelin*/ hoc est, *Garyophyllos Indicos* nominant. Mihi uidetur *Caltham* esse *Plinij*, cuius folia olere dicit, non flores (*Plinius* libro xxi. cap. vi.) quæ uerba de ea quam Germani *Ringelblumen*/ (de qua nos libro primo cap. xlv.) intelligi non possunt. Mirari autem satis nequeo, cur nonnulli hanc plantam *Artemisiæ* adnumerare uoluerint, cum non solum forma, sed etiam odor & sapor manifeste reclamant. Multo autem minus *Tagetes* apud *Apuleium* fuerit, cum eius historia nulla apud eundem autorem extet. Proinde siue *Caltha*, siue *Scopa* regia autumnalis, aut quocumque tandem nomine appelletur, certe mihi est quam gratissima.

*Plinius lib. 21.
cap. 6.*

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Odor huius plantæ, nec non gustus eius, calidæ illam qualitaris participationem esse arguunt. Sed idem elegantissimæ stirpi, usu uenit, quod honestis & pulchris mulieribus contingere solet, quæ inuidiose nonnunquam propter formam suam traducuntur. Nam fuere nonnulli maleferiati homines, qui præter omnem rationem & experientiam in uulgus iniquos de ea plantæ rumores spargere non sunt ueriti, dictitantes leprosos eos fieri qui herbam secum gestauerint. Atqui quidquid hi quidem blaterent, ego in hortulis meis diligenter *Garyophyllos* meos excolam, ac obseruabo interea, ad quos illi usus adhiberi possint.

De Blattaria. Cap. CXLVI.

PLANTAE HUIVS LIB. I. CAP. LXXII. SVB VERBASCIS à nobis mentio facta fuit, quo tempore nondum mihi uisa erat. Cum uero paulo post *Landoiæ* forte fortuna mihi oblata fuisset, appellauim eam cum *Blain wulfrant*/ hoc est, *Verbascum exiguum*, seu *Verbasculum*, nam qui illam mihi adferebant, quodnam nomen haberet nescire se profitebantur. Sed age describamus plantam. Folia eius primo

anno

Blattaria.

Goldkõpfflin/Schabenkraut.



anno antequam excaulescat, Verbenæ tam sunt similia, ut discerni duo illa generatim possint. Altero uero anno appetente Iunio mense ceteres prosiliunt & proceri caules, flore emicantes luteo, odorato, forma & odore ad uulgare Verbasculum per omnia accedente, quæ mihi ratio fuit, ut Verbasculum hanc appellarem. Postquam flores deciderint, solliculi apparent Ciceris arietini, aut Ocimastri (quo de supra libro primo cap. vi.) seminum conceptaculorum magnitudine, semine multo minori reliquis Verbasculis referti Cumque fructum hunc suum protulerit, pereunt non tantum folia, caulesque, sed & breues eius rectæ & lignosæ radices. Nasciur secus itinera, & in limitibus vinearum.

NOMENCLATURAE.

Cum de Verbasculis scriberem, incidi in locum Plinij qui extat lib. xxv. cap. ix. ubi in hæc uerba loquitur,

Est similis Verbasco herba, quæ sæpe fallit pro eo capta, folijs minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc abiecta blattas in se colligit, ideoque Romæ Blattariam uocant. Hæcille.

Quia

Quia uero tum temporis, ut ante dixi, ipsam plantam uidere mihi non liceret, notavi locum, quoad ad manus meas ueniret. Itaque ubi primum illam uidi, uolui quidquid id esset studiosis rei herbariae communicare. Cæterum considerent studiosi caput Dioscoridis de Phlomo seu Verbasco, uideantque num Thryallis quoque hæc planta appellari possit nec ne, & quid me mouerit, ut Verbasculum illam uocitauerim primo. Germani qui ad Rhenum habitant Schabenfraut / vnd Mottenfraut nominant, dicitur & Goldesnopfflin quibusdam.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM.

Blattaria quid possit, libro primo in Verbascorum historia explicatum est. Puellæ folliculos in cuius semina huius plantæ includuntur inaurare solent, coronisq; suis & sertis inferere.


De Vuularia. • Cap. CXLVII.

1. *Vuularia maior* D. VO PLANTARVM FERME CONSIMILIA GENERA iuxta sepes & agrorum limites, necnon campis quibusdam et aridioribus pratis gignuntur, caulibus quadratis, altis, folijs asperis, nigricantibus, vrticæ foliorum effigiem referentibus, floribus purpureis, campanularum formam æmulantibus, Rapunculo maioribus, qui in folliculos demum abeunt, semine perexiguo, canoq; refertos. Radicem habet utraq; rectam & breuem. Exigua huius plantæ species, campanulas seu cymbalares flores fert violacei coloris, in fastigijs caulium coniunctim emicantes. Vtriusq; speciei flores inodorati sunt.
2. *Vuularia exigua.*

NOMENCLATURA.

Quod nomen binæ hæc plantæ in Dioscoride habeant, nihil certi pronuntiare possum. Sunt qui Zapffenfreutter / vnd Galsfreutter / hoc est, Vuularias & ceruicarias appellent, propterea quod decoctum illarum gargarissatu oris & colli exulcerationibus alijsq; id genus uitij proficit, ut quæ astringendi & exiccandi facultatem habeant.

VIRESCIT

Vuularia.
Balßtraut.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vires Vuulariæ utriusque sub nomenclaturis earum exposui. Nec enim quicquam aliud præter ea quæ adduximus, de his mihi constat.

De

De Siliquaſtro. Cap. CXLVIII.

Indianiſcher Pfeffer.



CVM SUPERIORI-
bus annis Autumni tempo-
re multa Germaniæ loca
herbarum gratia perlustra-
remus, quemadmodum
antea quoq; diximus, con-
tigit ut inter cæteras pere-
grinas plantas in hortis
generosi domini de Lewen-
stein, & hanc uiderem, stir-
pem iane perquam specio-
sam, quæ non aliter atque
Rosmarinus excolebatur.
Iam ut historiã paucis ab-
soluamus, referebat illa ar-
busculam furculosam, mul-
tis enim rotundis & conca-
uis ramulis brachiata appa-
rebat, nigricantibus insu-
per & teneris folijs uulgari
Solano similimis, sed an-
gustioribus & acutioribus
uestita, floribus emicans ex
pallido, albicantibus, ma-
gnitudine uulgaris Solani
flosculis respondentibus.
Hi in uirides abeunt sili-
quas, digitalis longitudi-
nis, quæ quidem antequam
iustam assequantur maturi-
tatem, nigrae prorsus eua-
dunt, ac demum in rubrũ
mutantur Minij colorem,
ita ut maturæ illæ siliquæ
corallium rubrum, aut cancri cocti pedem repræsentent, semine intus co-
pioſo,

piofo, & lato, candido, guftus feruentis immo acrioris ipfo Pipere, quò quotannis vere apperente nouæ plantulæ feri poffunt, refertæ. Mihi fane uidebatur planta effe alfiufa, & quæ hyemem ferre non poffet. Sed feram illam in hortulis meis, periculum facturus quid ferre uel poffit, uel recuset. Cæterum uidi paulo poft huius plantæ alia genera, quorum nonnulla latas, alia longas producerent filiquas.

NOMENCLATURAÆ.

Interroganti mihi quodnam huius tam speciofæ plantæ nomen effet, refponfum fuit Piper (Germanice Pfeffer) nomenclaturâ eius effe. Pofteaq; uero fcripta ueterum de Pipere excuffi, manifefto deprehendi, hiftoriam Piperis huic plantæ nequaquâ conuenire, nifi forte peculiare quoddam Piperis genus hæc fit, cuius ueteres, quod tamen haud facile crediderim, meminiffent. Quanquam in hiftoria Piperis, nec ueteres inter fe confentiunt, neque teftimonijs recentiorum refpondent, præfertim uero Marcelli Vergili, cuius uerba de Pipere in gratiam ftudioforum rei herbariæ adfcribemus, quæ ita fe habent.

Credebantur quondam Poëtæ cum in theatris canerent fore aliquando fecula quibus Oceanus uincula laxet, & ingens pateat tellus, typhisq; nouos iam detegat orbes, nec fit terris ultima Thyle: ea dicere: quæ ad implendos fufpendendosq; nouæ rei expectatio ne et metu plebis animos ingeniofe ab eis excogitata magis, quam optanda & fperanda fapientibus effent: cum tamen docentibus mufis, deoq; pleni ea uaticinarentur: quæ noftra ætas à Lufitanis regibus facta iam pridè fenfit, & quotidie adhuc fieri uidet. Quorum nunquam fatis laudauerit quifpiam pro humana re laborem, ftudium, confilium & regiâ operam. Longa liquidem & difficili in Indiâ nauigatione incognitum, Europam, Affam, Lybiâmq; incolentibus ad hâc diem orbem nobis aperuerunt. Et quas habet diues illa & beata regio naturæ opes, communes omnibus fecerunt. Licuitq; eorum auxilio diligenter naturam nouiffe inquirentibus, quæ antiquis fcriptoribus incognita, aut aliter quam nunc inueniantur tractata fuerunt, integre cognofcere. Inter quæ & Piper eft, cuius natales & omnem naturam aliter quam Theophræftus, Plinius, & hic ipfe, quondam tradiderunt, reuerfi ad nos plures inueniffe fe narrant. Fruticem enim non arborem Piper ferre affirmant, albæ Viti, quæ in fepibus plerunque inuenitur *Piperis hiftoria.*

similem:propinquas scandentem arbores, quæ racemosum fructum ferat, magnitudine ea qua uidetur, sed uiridem, nec aliter quam in Ligustro coaceruatum antequam maturitate nigrescant, lectumq; æstate ante integram maturitatem sub sole in palmeis tegitibus expandi, caloreq; solis & æstu corrugari & nigrum fieri. Nec longum aut album piper aliquod uidisse illic se dicunt, esse quidem arbores alias quæ sapore Piperis aliquid ferant, & inter eas cui conferre in nostro orbe aliquam posse se negant, quæ oblongum ueluti uillum inter folia ferat, Ponticæ nucis floribus similem, quod illic longum Piper incolæ appellent. Folium Piperis ipsi uidimus ab eis allatum, colore pallido magis quam herbaceo, longitudine quantum diuaticati pollex & index humani digiti aperiuntur: latitudine qua parte maxime patet quatuor digitorum, Plantaginis figura, præterquam in summo, cui habet numero pares, & in figura similes, à tergo fibras septem, per longitudinem extensas, mediam claudentibus utrinq; trinis: non tamen ut in Plantagine utrinque binæ à media nascuntur, sed inæqualibus interuallis utrinque prodeunt: in summo fastigiatum & acuminatus quam Plantaginis extremum folium est: Desinitq; in mucronem eodem quo in malo medica modo uidetur, non omni, sed in qua folium acuminatum est: idq; in Piperis frutice breui pediculo pendet: & qua parte à pediculo incipit, folium paulo minus quam rotundum est, &c.

Haftenus Piperis apud Marcellum Vergilium extans descriptio, cui si uel eam quæ apud Dioscoridem, uel eam quam Theophrastus ponit, comparare uelis, nihil magis dissentire uidebitur, quæ res magnam deprauationis exemplariorum ueterum in multis locis, aut quod parum fideliter aut diligenter à Librarijs olim transcripta fuerint, suspicionem parit non leuem. Sed ut pergamus, non solum Dioscorides, uerum etiam Plinius Piper in India gigni testatur, cum uicissim Aloysius tertio libro nauigationis suæ cap. lxxxiiij scribat Piper ultra Chalekutt è turri quadam deportari. Postremo addere libet & uerba Plinij quæ extant lib. xij. cap. vii. ubi inter cætera dicit, Piperis arborem iam & Italia habet, maiorem myrto, nec absimilem. Hæc ille. Quæ omnia dicta longius à nobis sunt, ut sinistram illam suspicionem, qua credunt plantam hoc capite descriptam Piper esse uerum, animis illorum eximerem. Cum namq; tam ueterum quam recentiorum repugnent testimonia, non uideo quo pacto illam Piper nominare

minare possumus. Ne tamen nomine apud Germanos prorsus destitueretur, uoluimus illi Pfeffers/id est, Piperis, ob feruentem gustum, à quo multæ aliæ quoque plantæ Piperis cognomentum accipere, ut est, Hydropiper & Piperitis nomen impertiri, sed non simpliciter, uocabimus. n. Teurschen Hebrei Piper פלפל
 oder Indianisch den pfeffer/hoc est, Germanicum, aut Indianum Piper, alias Pipel uocant, teste Elias Leuita
 & Hispanicum appellatur. Et ut tandē nos ab his expediamus, uidetur nobis hoc piperis genus Zinziber esse caninum Auicennæ lib. ij. cap. 748. & Siliquastrum Plinij, cuius lib. xx. cap. xvij. his meminit uerbis. Piperitis quam & Siliquastrum appellauimus, contra morbos comitiales bibitur. Castor & aliter demonstrabat, caule rubro & longo, densis geniculis, folijs Lauri, semine albo, tenui, gustu piperis, uti lem gingiuis, dentibus, oris suauitati & ructibus. Atq; hæc hæcenus nunc reliqua explicemus, ut finem tandem libro imponamus.

VIRES AC TEMPERAMENTVM:

Piper in medicina à ueteribus plurimum semper commendatum fuit, ex calefacientium & desiccantium ordine. Eiusdem facultatis par ticeps procul dubio & hoc Indianum piper, seu Siliquastrum fuerit.

INTRINSECVS.

Piper, quo uulgo in condimentis utimur, in medicina haud uulgaris est utilitatis, nam urinam ciet, concoctionem adiuuat, extrahit, discutit, tormina sedat, & caliginem quæ oculis obuersatur abstergit.

Dioscorides Piper potum cum recentibus Lauri folijs, tormina discutere, ad intinctus esculentorum additum concoctionem adiuuare, tussi, omnibusq; pectoris uitijs, siue eclegmate, siue potu succurrere, partus denique extrahere, urinam cietretradidit. Quid multa, Piper culinis, & officinis, medicinæq; conuenientissimum esse deprehenditur.


EXTRINSECVS.

Piper cum Staphide agria manducatum, pituitam à capite elicit, uirilgines ex nitro emaculat.

Siliquastrum gingiuis & dentibus prodesse, ex sententia Plinij supra docuimus.

De Aloe. Cap. CXLIX.

A LOE PEREGRINA ILLA ET MARITIMA PLANTa in quibusdā nunc Italiæ & Germaniæ locis, ut pote Romæ &
 NN ij

*Aloe.**Alos.*

Antuerpiæ, in hortis & figulinis plantatur. Folia habet cubitum longa, duosq; fere digitos crassa, plurima, sibiq; inuicem incumbencia, pinguia, gustu amara, odoris fortissimi, utrinq; aculeis, seu spinulis exiguis armata. Radicem.

Radicem uero longam, crassam, adnatis radiculis fibratam. Florem denique quem tamen in nostris regionibus, ut paulo post dicemus, proferre recusat, in cacumine caulium album obtinet, quem admodum testatum reliquit Dioscorides lib. iij. cap. xxij.

Aloe apud nos, quod ad folia attinet, nullo negotio provenit, ac in Autumno lætissimam se ostendit, & per hyemem uiriditate sua uiget. Dominus Georgius Ollingerus Norimbergensis in hypocausto suo aliquot plantas Aloes una cum radice & folijs aduentante hyeme suspendit, in quo uiriditatem suam per totam hyemem ita retinet, ut semper quasi ex horto recens allatae appareant, quare nonnullas in quintum usque annum incolumes conseruauit, ea qua dicemus ratione. Nam exacta hyeme in hortos illas rursus transfert & plantat, in quibus aliquantulum augentur, postea redeunte hyeme rursus euulsas, ac in hypocausto suspendit, ubi per tres septimanas quasi peritura colorem suum amittere uidentur, cum tamen paulo post non tantum natuum suum colorem recuperent, sed & incrementum accipiant, ac si e mortuis reuixissent. Hyemis tamē frigora in hortis ferre nequit Aloe, nā cum Autumno uiuacissima & lætissima apparet, intēpestiua hyeme nimis cito obruitur, quæ causa est ut in nostris terris florere non queat. Referebat mihi Dominus Ollingerus Aloem partim e Venetijs, partim e Lisebona ad se missam. Dicitur illa primum opera Turci cuiusdam Constantinopolitani, cum is cum Calciano Duce, cuius perfidia superioribus annis aduersus Turcos infeliciter pugnatum est, caperetur, nostris hominibus innotuisse.

NOMENCLATURA.

In omnibus linguis unum & idem nomen hæc planta obtinet, quod est *aloe*. Quod si idem alijs quoque plātis contingeret, hoc est, si singulæ unum & perpetuum nomen obtinerent, multo labore, multisq; erroribus liberatos nos diceremus, & præclare certe de re herbaria ageretur. Mercatores qui Antuerpiæ uoluptatis gratia Aloem e laquearibus conclauium suorum suspendunt, Semperuiuum, a sempiterno uirore cognominant. Serapioni cap. cci. Saber, Auerrhoi Cauar, Chaldaice אלוה Alluan Cant. iij. Psal. xlv. dicitur.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTUM.

Galenus Aloem, maxime uero eā quæ in Arabia, India, & calidioribus regionibus proueniat, testatur calidam & siccam obtinere temperaturam,

Aloe in omnibus regionibus ad multa, præsertim uero uarias pilulas conficiendas adhibetur.

INTRINSECVS.

Succus Aloes, qui rufi fuerit coloris, syncerus, dolique expers, drachmæ pondere e calida aqua potus stomacho apprime conducit, regio morbo medetur.

Hic in pillulis commodissime usurpari potest, qui fit ut in omnibus fere pilulis a quibuscunque expectatur. Quemadmodum autem Saccharum & mel, ita & succus hic uel præcipuum in officinis locum occupat.

Aloes succus ex frigida per se potus, sanguinis eruptiones intus factas compescit, eiusque generis uitia emendat. Quanquam uero quod ad hanc quidem partem attinet uariæ sint medicorum sententiæ, nos tamen uereturum placitis lubentes acquiescimus.

EXTRINSECVS.

Aloes puluis inspersu recentia glutinat uulnera, eaque sanat. Aloe etiam ad genitalia disrupra facit, & exulceratis genitalibus medetur. Mariscas nimio cruore manantes Aloes puluis inspersu compescit.

Aloe liuores & insignia ex melle tollit.

Dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosæ eo.

Capillum fluentem continet cum uino.

Tonsillis, gingiuis, & omnibus oris ulceribus, cum melle & uino proficit.

Succus Aloes ad curandas fistulas, & maxime quæ sunt in uirga & ano (ut inquit Auerrhoes) conducit.

Succus Aloes cum melle temperatus ac illitus carnem generat.


Breuitè ad multa utilissima est Aloe, sicut & Dulcis radix, de qua nunc agemus.

De Dulci radice. Cap. CL

RAE STANTISSIMA HAC, NOBILISSIMAQUE PLANTa, secundum hunc commentariorum nostrorum librum concludemur, paucula quædam in laudem eius, antequam historiam aggrediamus, dicturi. Quemadmodum enim aliæ nationes Saccharum prædicant & extollunt, ita Germania de Dulci radice gloriari potest, in prius uero Pabergensis ager, qui unicus toti Germaniæ satis Glycyrrhiææ suppet.

Dulcis radix.

Süßholz.



suppeditare potest. Non solum autem radix hæc una cum succo extracto
magni faciendus, uerum etiam suo modo utilior, commodior & salubri-
or ipso Saccharo esse mihi uidetur, ita quidem si altero ex his carendum

NN iij

mihiforet, Saccharo sane quam Glycyrrhiza carere mallet. Pro illo. namq; mel usurpare possem, quemadmodum & ueteres non Saccharo, sed melle pleraque medicamenta temperasse legimus. Saccharum equidem sicut & alia aromata ad officinas & diuitum culinas spectare potius uideatur, qui uero tenuioris sunt fortunæ melle & Dulci radice contenti erunt, & plus commoditatis inde quam ex Saccharo & aromatibus percipient. Nemo enim ignorat aromata & Saccharum sitim excitare, quam dulcis radix & succus eius restinguunt. Dolendum est autem tam præpostero nos præditos esse iudicio, ut noxia expetamus, salutaria respuentes, id quod in ægris, præsertim uero febricitantibus comperimus, quibus confectionibus Saccharo alijs uel aromatibus permixtis, sanitas non confertur, sed auferitur, sitisq; non adimitur sed additur, quæ tamen alijs & commodioribus medicamentis restinguenda erat. Sed relictis his historiam aggrediamur.

Radix dulcis nullo negotio, & quam facillime prouenit, quod ipsi diligenter obseruauimus. Primaria namq; eius radix licet deorsum recta uergat, tamen quorannis alias ex se mittit & multas radices, quæ hinc inde intra humum longe lateq; se diffundunt, non aliter atque Lolij radices. Hæ intus buxi sunt coloris, & ad Gentianam proxime accedentis, foris uero pulli, gustu subacerbæ & dulces. Vere incunite teneros emittunt asparagos, qui in lignosos tandem duum triumue cubitorum altitudine præditos caules abeunt. Hi folijs uestiuntur nigricantibus, ac dum tenera adhuc sunt, tactu gummosi, Dictamni uulgaris aut Ciceris similibus. Iulio mense appetere inter folia & caules, flosculi prodeunt purpurei aut phoenicei, qd ad formam attinet Lenticulæ aut Viciæ quam similibus, quibus decidentiæbus exiguæ & subasperæ consequuntur siliquæ, quarum singulæ duo aut tria inclusa gerunt & dura, Lentibusq; similia granula. Dulcis radice tam folia quam caules hyeme quorannis pereunt, qui sit ut quorannis e radice omnia hæc noua repullulascere necesse habeant.

NOMENCLATURÆ.

Mirari satis non possum, cur aculeatis plantis Glycyrrhiza a Plinio adnumerata fuerit, & echinatis folijs descripta, uide Plinium lib. xxi. cap. xv. & lib. xxij. cap. ix. Ac necesse est ut dicamus Plinium folia Glycyrrhizæ nequaquam uidisse, aut asperas illas, quas diximus siliquas intellexisse. Sed missa hæc facientes nomenclaturas exponamus. Dulcis radix Latine, *γλυκύριζα*, Græce, *Σύσγυρζελ* / aut *Σύσβολζ* Germanice dicitur, uulgo *Liquiritiam* & *Glicoriciam* nominant. Serapio cap. cxlvij. *Sus* uocat. Dioscorides

scorides lib. iij. cap. v. illam describens plura enumerat nomina, dicit enim Glycyrrhizā aliqui Ponticā, alij Glyceratōn, quidam Symphyton, alij Leonticā, alij Glycyphyton, alij Scythion, alij Adypsōn, alij Sylithram, alij Libyestafon, alij Homœon, alij Pœntamœon appellauere. In his appellationibus, Pontica, Leontica, & Symphyton ad alias pertinent plantas, nimirum Milium solis, & Consolidā maiorem, de quibus supra libro primo egimus. Theophrastus lib. ix. cap. xij. Scythicā uocat, & de illa in hunc modum scribit, *ῥανκία δὲ καὶ ἰσχυλινὴ καὶ ἰσχυρὰ γινώσκουσιν αὐτὴν διὰ τὴν ἀνὰ γῆν δὲ πυρὶ τὰν καυτὰν. χρησίμη δὲ πρὸς δὲ τὰ ἀσθματικά, καὶ πρὸς βήχα ξηρὸν, καὶ ὅλως τὸν πνεύματι τὸν ὀνύχον. ἔτι δὲ πρὸς τὰ ἰσχυρὰ, ὅτι μάλιστα. ἀνταρὰ δὲ καὶ τὰν διὰ τὴν πύλιν, ἵνα αὐτὴ οὐ τὸ πνεύματι ἴσχυρὸν διὰ τὰς τε καὶ τὴν ἰσχυρὰν, διὰ τὰς φασὶ τὸς οὐκ ἔστιν ἵσχυρὰ καὶ ἰσχυρὰ καὶ διὰ τὴν.*

Qui de Glycyrrhiza plura scire cupit, is legat Galenum lib. vi. de simpl. & Auicennam lib. ij. cap. cccclviij.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Nulla in uniuerſa medicina radix uſitatior reperitur, nec ſucco eius expreſſo ubique quicquam frequentius, & recte quidem, nam & radix hæc & ſuccus eius ad multa conducunt. Conſtantiſſimus Liquiritiæ media temperatura præditam eſſe ait, ut neque nimium calida ſit, neque abundanter exiccet.

INTRINSECVS.

Succus Liquiritiæ omnibus prope affectionibus medetur, nam ſabæ magnitudine in ore retentus, quo ad ſenſim liquetur aſperitatem arteriæ & ſcabitiam lenit æſtuant ſtomacho prodeſt, thoraci uniuerſo, pulmonibus & iocineri conuenit, apoſtemata emollit, & aſperam tuſſim mitigat, ſanatur eſicæ ſcabiem & renum dolores, ſitim ſedar ualenter.

Qui ardorem urinae ſubinde patiuntur, hî continuo radicem uel uino uel aqua concoctam bibant.

Dulcis radix cum lacte caprino cocta ad ardorem urinae uel maxime facit.

Cum itaque dulcis radix ſtomacho, thoraci, pulmonibus, hepati, ueſicæ & renibus conueniat, miſceri poterit, & debet alijs medicamentis, potiſſimum trageis & alijs qui pro ſtomacho conficiuntur pulueribus.

EXTRINSECVS.

Dulcis radix arida ac in tenuissimum puluerem redacta manantibus ulceribus oculis inspersa, fluxum inhibere, & ulcus sanare traditur.

HIERONYMI TRAGI DE STIRPIVM
HISTORIA COMMENTARIORVM
LIBRI SECVNDI FINIS.

HIERONYMI TRAGI DE STIR-

PIVM, MAXIME EARVM, QVAE IN GERMANIA NO-

stra nascuntur, usitatis nomenclaturis, proprijsq; disse-

rentijs, nec non temperaturis ac facultatibus, com-

mentariorum Liber tertius, Interprete

Dauid Kybero Ar-

gentinensi.

De Fungorum, atq; Tuberumuarijs generibus.

CAP. I.



VLTA EQVIDEM ET VARIA FVNGORVM
Tuberumq; genera in Germania nostra gignuntur, quo-
rum praestantissima ciboq; gratissima & commodissima
ea sunt, quæ verno tempore ab Aprili mense usq; ad Maij
mensis principia in nonnullis hortis graminosis, sub an-
tiquis pomiferis arboribus, nec procul a radicibus earũ
prognata cernuntur. Quamquam & ipsa Tubera in quibusdam Germa-
niæ, earumq; maxime regionum quæ Rheni tractui adiacent, sylvis, humo
arenosa proueniunt.

Hæc, ut formam illorum pingamus, rotunda sunt pileoli instar, foris fo-
raminulenta, non aliter atque fauus mellis, coloremq; canum obtinentia. ^{1.} Tuber.
Maio mense euanescent, & ab eo inde tempore nusquam apparent, unde ^{2.} Noichellen.
uulgato prouerbio apud Germanos dici solent, du nimbst zu wie diet No-
chellen im Meien / hoc est, Non aliter atq; Tubera Maio mense, crescis &
augeris. Hoc Tuberis genus aqua feruente bullitur, posteaque aromati-
bus & butyro conditum cibis apponitur.

At uulgares Fungi, qui uulgo coqui solent, in campis, graminosis agris,
aridioribus pratis, potissimumq; iumentorum pascuis nascuntur. Iunio
mense primum cernuntur (maxime si pluuiosa & humida tum tempestas
fuerit) nam neque hæc, neque alia Fungorum genera, nisi pluuiosa cœli con-
stitutione procreantur, quæ etiam causa est, ut hoc anno tardius citiusue
quam illo oriantur) & ab eo tempore ad Augustum usq; mensem cernun-
tur, pileolis rotundis & latis similes, inferius prope terram puniceæ, super-
riori uero parte membranulis liuidi coloris tecti, quos antequam in cibo
ueniant,

^{1.} Amanita, uel
Boleti.
^{2.} Reiderling.

Fungi & Tubera omnis generis.

Alletley Schwemme.

3.
*Boleti orbiculati.*4.
Xheling.5.
Digitelli.

ueniant, detrahre oportet, ac tum demum ipsos Boletos aqua bullire, butyroq; & aromatibus condire cōuenit. Sunt qui hos Fungos membrana auulsa super carbones ignitos assare, solumq; sale aspergere, cibisq; usurpare soleant, prout cuiq; uideatur.

Tertium Fungorū genus, cibis expetitum, in altissimis & tenebrosis syluis nascitur, coloris prorsus candidi, rotundum. In quo genere inuenias qui disco latiores sint. Omnes uero cum franguntur, lacteū ac feruentissimi saporis, (nam omni pipere linguā magis uellicant) succū fundunt. Hos, qui syluam uulgo den Odenwaldt cognominatam incolunt pauperes, sale asperfos carbonibus ignitis cibo assare solent.

Quarti generis & uulgaris quidē n̄ sunt, qui colorem obtinēt splendidū & luteū. Nascuntur & hi in uliginosis syluis, & coquo quoque inseruiunt. Solent uero bulliri, deinde concidi, buty-

roq; demum gingibere & aceto condiri.

Huius generis aliq; quoque Fungi in humectis & uliginosis syluis reperiuntur in digitos quasi dissecti, unde & digitelli dicuntur musco, qui in antiquis

tiquis adhæret arboribus, quam similimi, ijꝑ partim lutei prorsus, partim ex albo pallidi, & rosei. Gaudentiuxta putrida fere ligna prouenire. Succosi sunt plane, & meo iudicio frigidi, ac improbæ difficilisꝑ concoctionis, & prorsus insalubres:

Sexti ordinis Fungi in nonnullis altissimis syluis, ut est der Odenwalde ^{6.} appellata nascuntur, puniceo præditi colore, pratensum Fungorum, quos ^{Büdeling.} Boletos uocant, magnitudinem hæudquaquam excedentes, lacteum & dulcem manantes succum. Hi a quibusdam crudi deuorantur, sed qua utilitate ignoro.

Inuenitur porro Augusto mense in syluis prope radices quercuum, Fungi aliud genus, & magnum quidem, formam interaneorum vituli repræsentans, incani & plumbeicoloris. Decoquitur a nonnullis more aliorum fungorum. ^{7.} ^{Basenölin.}

Octauo denique Fungi qui edendo est genus in arbutis montanis cæsis ^{8.} reperitur, pratenribus seu Boletis quod ad formam totam attinet, sed coloris pallidioris. In syluæ Germanice der Ydar appellatæ frutetis & arbutis cæsis facile prouenit, sed non prius quàm incendantur illa quæ diximus frutetosa & montana a ruæ, id quod plerunque fit circa diem D. Iacobo sacrum, tum enim exusta terra frequentibus pluuijs humectata huiusmodi Fungos fundit. ^{Röbling/} ^{Augstschwem}

Exposuimus historiam Fungorum, eorum nempe qui in cibos ueniunt, superest ut de pernicialibus & qui edendo minime sunt aliquid dicamus, quis enim omnia genera recensere queat? Vt ergo præteritis multis quædam attingamus, nonne Muscarij passim Fungi cernuntur, partim rubri, partim albi, qui muscis alijsꝑ animalibus editati certissimam necem adferunt. ^{9.} ^{Mucken-} ^{schwemm-} ^{Muscarij.}

Quid uero de ijs Fungis dicam, qui sub Pinu nascuntur, magni & lutei, quos iumenta magnopere expetunt, licet gustatis illis in morbos incidat. ^{10.} ^{Bübenfist.} Sunt & Ouati quidam appellati, qui in campis graminosis gignuntur. ^{11.} ^{Crepitulupi} Hi terræ coherent nullo fulti pede, in globum, circinati, nec ulla sui parte patentes dehiscunt. Qui cum rumpuntur, atram fuliginem eructant, toto callo in fumum abeunte.

Iam & super finum, in tectis stramineis domorum, in putridis lignis, & ad arbores, Quercum scilicet, Fagum, Nucem, Betulam, Sambucum, pomiferasꝑ denique nec non in saxis & antiquis muris quamplurima Fungorum genera profiliunt, quæ omnia recensere neminem uel peritissimum rei herbariæ posse arbitramur. ^{12.} ^{Fungorum uaria-} ^{genera.}

Sed ne Agaricum, qui inter omnes Fungos uel præcipuus est, magnicꝑ apud medicos nominis, prætereamus, sciendum est illum non ubiqꝑ terrarum, sed in Galatia Asiæ, Cilicia & Sarmatia, altissimis & putridis arboribus ^{13.} ^{Agaricum.}

Plinius lib. 21.

cap. 9.

Diosco. lib. 2.

cap. 1.

1.

Agaricum mas.

2.

Agaricum foemi

na.

bus adnasci, quanquam in nonnullis arborum caudicibus, eius Heluetiæ partis quæ Valesia uulgo dicitur, reperitur Agaricum. Eius duo extant genera, teste Plinio, & alijs rei herbariæ scriptoribus, candidum nimirum & nigrum quod in medicina nullum habet locum. Candidum namq; solû usu receptum est. Hoc putridum lignum ferme exprimit, & in glandiferis maximis arboribus noctu relucens (teste Hermolao Barbaro) apparet, hoc namq; optimum & præstantissimum esse traditur, primo gustu dulce, dein de amarissimum. Electio Agarici apud Mesuen sic se habet, ut sit album, porosum, rarum ualde, frangi facile, leuè.

Possent forte alia plura Fungorum genera à diligentibus enumerari. Nos his quæ in medium attulimus contenti erimus, eorumq; appellatio- nes subiiciemus. Nam reliquorum historiam persecutus est Ruellius lib. de natura stirpium in. cap. cxliij.

NOMENCLATURAE.

Fungi, sicut & Tubera neque plantæ, neque radices, neque flores, neque semina sunt, sed nihil aliud quam terræ, arborum, lignorum putridorum aliarumq; putrilaginum superflue humiditates, id quod inde colligi potest, quod omnes Fungi & Tubera; maxime ea quæ edendo sunt, è tonitribus, & pluuioso cœli statu frequentius nasci solent, quemadmodum Aquinas Poëta confirmat. *Et facient lautas optata tonitrua cœnas.*

Hinc ueteres cum intelligerent Tubera nullo semine procreari, crediderunt cognationem illis aliquam cum cœlo esse. Porphyrius sane Deorum filios Fungos & Tubera uocat, quia prouenire uidentur sine semine. Sed ut ad nomenclaturas tandem ueniamus, scripsit de Fungis & Tuberibus duo capita Dioscorides, quorum prius lib. ij. cap. cxxxij. extat in quo *Idrij*, hoc est, Tuber uocauit, quod nostra sententia *Morchellen* dicunt Germani.

1.

Tubera.

Estq; ea prima hoc capite à nobis descripta Tuberum & Fungorum species, quæ Aprilis mense è terra prorumpit. Galli Truffla uocant, nonnulli ut Theophrastus testatur Geranea. Serapio Tubera Ramech appellauit, cap. cxxxvi.

2.

Fungi.

muntur.

Serapio cap. 342

3.

Amanite.

Heiderling.

Alterum de Fungis quos Græci *μύκηται*, Arabes Hatar, Hebræi *שׁוּמְרִי* Paapuln (Vide Aruch Monstari) Germani *Schwemm* uocant, lib. iij. cap. lxxxi. habetur, quo in loco omnes uno uocabulo dicuntur Fungi, siue eden do sint, siue Pernitiales.

Recentiores alia quoque nomina & genera dedere Fungis, Boletos, & Amanitas eos uocantes qui in cibos ueniunt. Hos Germani *Heiderling*

ling / & Drüschling appellant, quod in campis & aridioribus locis & iumentorum pascuis proueniant. Galli Campiniones nominant.

Quos uero supra in descriptione tertio loco commemorauimus Germani Psifferling dicunt, sed rectius Pfefferling / ab acri & Piperis gustu dici poterant. Hos Orbiculatos a magnitudine nuncupamus.

Qui lutei cernuntur, quarto ordine supra a nobis explicati, Germani Rbeling uocant Forte in Galeno Amanitæ quoque dicti.

At qui quinto loco leguntur in historia nostra, Digitelli a digito uocantur, Germanis Hendelschwemm.

Quos sexto loco proposuimus, qui syluam Germanis den Odenwalde uocatam incolunt, Brörling nuncupant.

Septimi generis Fungos, Germani Lichschwemm, & a forma Hasenöliling / hoc est, Lepusculi nominant.

Octauos Germani Rod / oder Augstschwemm / quod in montanis frutetis, usque exustis, & Augusto mense, nec deinceps amplius reperiantur.

Cæterum Fungi qui edendo non suut, nempe qui muscis perniciem adferunt, Muscenschwemm / hoc est, Muscarij dicuntur.

Iam qui radicibus arborum, potissimum Populi nigræ adnascuntur Fungi Agiritæ nuncupantur. Qui uero caudicibus quarumuis arborum adherent Arborei dicuntur, cunctique igni concipiendo parantur & usurpantur, Igniarj Germanice Zunderschwemm appellantur.

Quin & a forma quemlibet Fungum peculiari nomine insignire licet, ut dicamus, Ouatos, quos alias Crepitum lupi, Germanice Büben fist appellant, Spongiolos a Spongia, Porriginosos a porrigine, oblongos uero Digitellos nuncupantes. Quid quod nonnulli Sessiles, alij Spinuli, quidam Cardeoli, nonnulli Prunuli cognominantur, a locis uidelicet natalibus. Fungos & Tuberæ Arabes teste Rhase cap. xviij. Gofia, Fesich, Caucar nominant.

Postremum Fungi genus Ἀγάρικον Agaricus, uel Agaricum Dioscoridi lib. iij. cap. j. Germanis Holzschwamm dicitur.

VIRESCAC TEMPERAMENTVM.

Quod cito fit, cito perit, uulgo dici solet, quam autem uerum sit uulgatum hoc dictum omnia Fungorum quæ humi proueniunt genera nos docere possunt, quorum ortus occasusque septem includitur diebus, quod uero adeo repente e medio tolluntur, in causa est abundans qua scatent humiditas. Dioscorides de Fungis breuiter in hunc modum loquitur. Fungorum differentia duplex, aut enim manduntur, aut perniciales sunt, quasi de cere

cere uellet. Fungi in medicina nullius sunt usus, propterea quod nullum fere alimentum præstant, sed inflant, ac frigiditate corpus lædunt, pituitam crassam & lentam simulq; frigidam generantes. Fungorum itaque usus nimis tutus existit, caueant ergo sibi qui eiusmodi delicijs gaudent, ne idem ipsis accidat quod cuidam sibi probe noto usu uenisse tradit Galenus lib. ij. de aliment. facult. Innocentissimi autem Boleti quorum omnes fere docti meminere ij sunt, quos Germani *Norðellen / Heiderling / Rheling / Bötling / Psifferling* nominant, Latine Tubera, Amanitæ, Boleti orbiculati, & ij qui quarto & sexto loco a nobis describuntur. Proinde nisi hi ipsi probe coquantur, aromatibusq; condiantur noxij quoq; sunt & strangulare possunt, uide *Æginetam* lib. v. cap. lv. de arte medendi.

Cæterum quod ad Agaricum attinet, laudatur illud si fuerit candidum, leue, fungosum, & friabile, tunc enim ad medicamenta accommodatum est, quippe quod astringendi calfaciendiq; & quosuis crassos lentosq; humores educendi uim habeat.

INTRINSECVS.

Agaricum (ut illius facultates primo loco commemoremus) omnibus prope interaneis aduersus prauos humores auxiliatur, potestq; omnibus hominibus, ætate tamen & uirium robore consideratis, magna uel parua quantitate in uino uel hydromelite aut alio quouis liquore exhiberi, prout morbus ipse expostulare uideatur.

Dioscorides aduersus plerasq; affectiones una uice drachmæ pondere Agaricum præbet, *Æginetæ* binas Agarici ex melicrato exhibet.

Mihi *Mesuxæ* compositio arridet, quæ hoc modo se habet. Agaricus in puluerem redigitur, cui postea uinum optimum infunditur, singulisq; semuncijs Agarici, drachma gingiberis in puluerem triti, adjicitur, quæ omnia probe commiscuntur ut fiat massa, ex qua rotulæ seu Trochisci postea conficiuntur & pilulæ. Et quia compositi medicamenti incidit mentio, bona cum uenia medicorum omnium, in gratiam eorum qui ab officinis seplariariorum longius absunt, compositionem unam de Agarico ostendam. Recipe Agarici cum gingibere præparati, ut ante dictum est drachmas duas, medullæ candidæ & fungosæ *Colocynthis peregrinæ*, tussæ drachmam dimidiam, Mastichæ drachmam dimidiam, Croci tussæ oboli pondus, Aloepatici tussæ unciam unam. Subigantur hæc omnia bono uino, fiat massa, ex qua pilulæ magnæ aut paræ quantitatis formari poterunt. Quod si pili magnitudinem obtinent, numero undecim aut tredecim, interim plures, sæpe pauciores, eas nos sumendas una uice dare solemus. Hoc medicamento per inferiora ea educuntur uitia, a quibus putridæ febres

bres non raro in corpore humano oriuntur. Hæ pilulæ iocinerosis, pulmonum uitio laborantibus, splenicis, hydropicis, morbo regio affectis, & his qui magna cum difficultate urinam reddunt, aut colica passione instantur, apprime cōducunt. Pallidīs item mulieribus, et quibus menses impediti sunt, necnon podagricis & arthriticis. Egedem tinea uentris excutiendis, alijs uero noxijs intra corpus sumptis expellendis, magni sunt momenti, quæ omnia de Agarico per se intelligi quoque uolumus.

Quod si quis Fungos uel male coctos aut alioquin noxios deuorauerit, & inde stranguletur, aut torminibus molestetur, is uel Agarici per se, aut pilularum supra propositarum drachmam e uino bibat, & sanabitur.

Quia uero non satis tuti usus sunt Fungi, liber hoc loco coronidis uice adijcere ea medicamenta quibus strangulantem illam Fungorum uim compescere liceat.

Tradunt itaque omnes medici eum qui strangulatus, aut inflationes ex immodico Fungorum esu profectas senserit, confestim uomitiones siquidem possit prouocare debere, ac Oxy mel bibere, aut Leuistici siue Angelice radicem in puluerem redactam, e uino sumere, aut Rhaphanum escitare, aut Absinthites uinum potare. Vide Dioscoridem lib. vi. cap. xxiij.

EXTRINSECVS.

Fungi in externis corporis partibus medicandis non frequentis sunt usus, exceptis ijs qui in Sambuco gignuntur, nam illi omnis generis inflammationes & tumores ex aqua rosa cea aut uino impositi, sedare & deprimere traduntur.

Ouat quos Buben fist Germani nuncupant, inueteratis & fluuentibus ulceribus insperguntur, ea namque desiccant, & quo citius curentur efficiunt.

Muscarij Fungi in lacte decoquendi erunt, ac muscis necandis proponendi, sed danda est opera ne alia animalia eiusmodi lac degustent.

Reliqua Fungorum genera, quæ Fagis, Nucibus, alijsq; arboribus adnascuntur, ad igniarios usus adhibentur, ignem enim quem semel ceperunt non facile relinquunt. Sunt non pauci qui Fungos hos ad id negotij parare norunt, decoquunt enim illos in lixiuio, & siccatos tundunt, rursumq; nitro coquunt, hoc enim pacto ad concipiendum ignem aptiores redduntur. Inuenias qui e Fungis eo quo diximus modo paratis uictum suum queritant. Atque hæc habui quæ de Fungis in præsentia dicerem, qui plura de illis cognoscere cupit, Ruellium & alios legat, nos enim defatigati Fungis, historiam illorum ita tractasse nobis uidetur, ut qui hanc diligenter

euoluerit, illi nihil deesse putemus, quod ad præcipuos & uulgares Germaniæ nostræ Fungos attinet.

De Musco. Cap. II.

Moos.



1.
Musci arbo-
reæ.

2.
Musci saxatilis
aut sylvestris.

3.
Musci hortens-
is.

QVEMADMODVM uaria Fungorum genera, loco natali differentia numèrantur, ita Muscus non unus est generis. Inuenias enim in arboribus tam aridis quàm uirentibus, in faxis, syluis, hortis, campis & humidis pratis, alium atque alium Muscum.

Est autem Muscus quocunque tandem loco natus, potissimum uero incanus & albidus ille, qui uetustis et aridis arboribus et lignis adnascitur, nihil aliud quàm uillosum aut capillatū quid, quanquam alius in hoc genere magis tenuis, alius crassior, quidam breuior, hic prolixior cernatur, prout arbor uel lignum cui inhæret humidius aut siccus fuerit.

Muscum uero, qui humida & rorulenta sacca in syluis aut humectis & uliginosis pratis reperitur, agyræ circumforanei quidā magni faciunt. Colliculos. n. eius & flores, qui nihil sunt aliud quàm capilli quidā teretes, læues et punicei (sed cum de his supra libro primo ca. clxxxi. prolixius egerimus, non est quod hoc loco repetantur quæ antea dicta sunt) magno studio quærent & colligunt.

Tertium idem quod uulgatissimum Musci genus in hortis & pratis extat, uillosum, sed reliquis generibus gracilius & tenerius, ex luteo uiride. Hoc usitatus est ut diximus.

NOMEN.

NOMENCLATURAÆ.

Musculus Latine, *ῥέον* uel Splachnon Græce, *Moß* Germanice appellatur. De Musco quoque duo apud Dioscoridem extant capita, nimirum xx. lib. j. & cxxxi lib. iij. Sed posterius ad hunc nostrum Muscum minime pertinet, cum planta eo capite descripta, proprio suo nomine Phyllon, hoc est, Folium dicatur. Cæterum ut relictis his Musci genera suis nomenclaturis insigniamus, Muscum arborum officinæ Vſneam dicunt. Serapio Axneeh & Canianus appellauit cap. xciiij. Iacobus Manlius super confect. de Vſnea, aliam quandam Vſneam describit, quam autoritate Serapionis Kali, & Stercus passerū nominat, & ex ea sal Alkali confici traditur. Sed nos Germanicis plantis libenter contenti sumus, peregrina hæc suis relinquentes regionibus.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTUM.

Dioscorides Muscum cedrinum candidum, deinde populneum commendat, tertio loco quercinum. Muscus astringendi uim habet. Quamquam *Auicenn. lib. 2. cap. 724.* Auicenna teste, aperiendi, emolliendi & resoluendi quoque facultate polent Musci genera.

INTRINSECUS.

Auicenna Musci odorati candidi in puluerem redacti, drachmam dimidiam aduersus urinæ difficultatem, drachmam uero integram ad proritanda menstrua mulieribus exhibet.

Hydropicis idem drachmas tres dare iubet, dicitque id medicamenti soluendo aquositatem hydropisis educere. Id medicamentum mulieribus ad eiciendos partus mortuos exhibere conuenit.

Musculus quando infunditur in uino diebus aliquot, illud uinum facit dormire dormitione forti. Hæc Serapio ex autoritate Cozi cuiusdam. Hæc medicina inquietis infantibus, & his qui noctu in tempore cubitum se conferre recusant, meo iudicio conuenit. Addit Serapio. Et quando infunditur in uino stiptico, confert stomacho, & curat excussionem uentris, & aromatizat stomachum, & abscindit uomitum.

EXTRINSECUS.

Decoctum uuluis insidentium utile, unguento balanino, olei scq̃ in spissandigratia inseritur, thymiamatum acoporumq̃ compositionibus conueniens, inquit Dioscorides.

Nostri Imperici Musco ad sistendum sanguinem utuntur, ab vrsis admoniti, hi enim quamprimum uulnerati fuerint, Musco sanguinem sistunt.

Vsum proinde Musci norunt qui naues aquatica ædificia fabricant.
Musculus qui hortos & prata humecta obsedit, ita ut gramen supprimat,
Martio Mense cinere aboletur, sed eo, ex quo lixiuium fuerit confectum.

De Visco. Cap. III.

ATYRION E' SEMINE AVIVM MIRO QVODAM
modo procreari libro secundo docuimus. Non multo autem aliter Viscum satum nunquam nascitur, nisi per aluum auium reditum, maxime palumbis & turdi. Cæterum in nostris regionibus non in quercubus aut Fagis, sed Malo, Pyro, Populo nigra, Salice, Acere, Cynobato, Tiliæ sylvestri, Corylo & Betula, Viscum provenit, licet rarius Betulæ, Corylo, & Tiliæ sylvestri apud nos adnascatur. Viscum (ut ad descriptionem eius ueniamus) quacunque in arbore gignatur, eiusdem fere formæ apparet, hoc est, fruticosum, geniculis crebris interstinctum, surculisque frequentibus brachiatum, herbacei coloris, folio uestitum pingui, solido & crassiusculo, maiori etiam quam Buxi: floret in initijs veris, flosculos fundens perexiguos, luteos, qui Autumno appetente in baccas abeunt teretes, candidas, Grossularis (de quo infra cap. xiiij.) fructui adsimiles, intus lento albo, & viscoso humore repleti. In medio uero eius quem diximus Visci, qui intra baccas continetur, granula nigra reperiuntur, que uidentur seminis turam habere, licet sata nunquam proveniant. Breuiter cum in terra gigni non possit, in arboribus tantum nascitur, tanquam in alienis sedibus uiuens. Hyeme turdis cibus est Viscum, æstate insidiæ & perniciës. E' corticibus namque huius plantæ Viscum illud sit glutinosum, quo auiculæ capiuntur, ita ut Viscum pariter utile atque noxium auiculis esse appareat, quod (ut uolunt) Plautus de turdis loquens intellexit cum inquit, ipsa sibi auis mortem creat, cum Viscum ferat, quo postmodum ab aucupibus capiatur.

Ruellius.

Fuerunt & Ma:

gi nonnulli qui crediderunt Viscum aduersus omnia mala facere, quare uocabant Omnia facientem, uide Plin. lib. 16. ult. cap. in fine.


NOMENCLATURA.

Luber hoc loco inferere quæ superstitionem ueterum in colligendo Viscum obseruasse Ruellius uir unde quaque doctissimus, ætatisque nostræ singulare lumen de natura stirpium lib. j. cap. cxi. annotauit, cuius hæc sunt de ea re uerba.

Druides in Gallia nihil habebant olim Visco. & arbore in qua gignatur, si modo sit robur, sacratius. Quare roborum eligeabant lucos, nec ulla sacra sine ea fronde conficiebant. Ut inde possint

appellari

Viscum.
Mistel.



appellati interpretatione Græca Druides uideri, & adhuc apud nos ueteris uocabuli relucet uestigium, Dreus pro Druides uocantes. Quidquid illi adnascitur, è cœlo missum putabant. Erat

autem id rarum admodum inuentu, & repertum, magna religione petebatur, & ante omnia sexta luna. Post sacrificium & epulas sacerdos candida ueste cultus arborem scandeat, & aurea falce demetebat, candido id excipiebatur sago: tum demum tauros duos coloris candidi, nunc primum cornibus uinctos immolabant, precantes ut suum donum Deus prosperum faciat. Fœcunditatem eo poto dari cuicunque animalium sterili arbitrabantur, contraq; uenena omnia esse remedio. Hæc ille.

Theoph. lib. 3.
cap. 16.

Huiusmodi superstitiones quam plurimæ apud Christianos etiamnum hodie locum habent. Inuenias enim qui credant Viscum quercinum aduersus amuleta, ueneficia, & ludibria Sarranæ efficax esse, ideoque e collo puerorum & infantium suspendunt, quo a ueneficijs & amuletis tuti esse queant. Sed exponamus tandem nomenclaturas, Viscum Latinis, Germanis Mistel/Græcis *ἱστάρ*, dicitur, non *ἱστάρ*, quæ est uenenosa planta, de qua Dioscorides lib. vi. cap. xxi. & Leoniceus de erroribus medicorum. Viscum Plinius lib. xvi. cap. viij. Stelin, & Hyphear appellari tradit, & quod in quercu nascatur Dryos hyphear. Galli Dreus uocant. Ion poeta uetustissimus Viscum Sudorem quercus appellauit. Arabes Dabach, uel Dibach, & Hele nominant, uide Serapionem cap. clxvij. & Auerrhog simplicia.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Viscum tumores quosuis discutiendi, emolliendi extrahendiq; uim obinet. Temperaturæ est mediæ, neque nimis calidum, nec abunde frigidum, plus tamen ad aqueam quam siccam accedens. Vfus eius in externis corporis partibus frequentior.

INTRINSECVS.

Quidam Emperici existimant Viscum quod quercui, Corylo aut Pyro agnascitur, si terram non tetigerit, in puluerem redactum, ac e uino potum comitialibus mederi. Itaque eo ex orbiculos præcatorios conficiunt, quos ad eundem morbum facere credunt. Alij argento includunt, & inter alia e collo puerorum & infantium suspendunt.

EXTRINSECVS.

Omnia Visci genera dum uiridia adhuc & recentia sunt tusa, succo extracto auribusq; indito, discutiunt collectiones earum, & emolliunt eas intra paucos dies, doloremq; finiunt.

Viscum

Viscum tustum ac emplastri ritu impositum tubercula, parotidasq; discutit. Vetera ulcera abscessusq; quos Cacoëthes uocant, ex thure mollit.

Lientem cum calce, gagate, aut Asio lapide coctum & impositum absumit.

Mistum cum calce & uini sæce scabritiam unguium leuigare dicitur.

Vfus eius maximus ad capiendas aues, confectio eius hoc pacto se habet, teste Ruellio. Viscum fit ex acinis immaturis, hoc est, uiridibus, nondum candidis, qui messium tempore colliguntur. Siccantur deinde, & aridi tunduntur, ac conditi in aqua putrescunt, duodenis fere diebus. Vnumq; hoc rerum putrescendo inuenit gratiam.

Confectionem Visci aliam & quæ mihi magis probatur tradit Serapio his uerbis. Vidi autem in monte Nasca homines, qui faciunt ipsum ex arbore magna quæ nascitur apud eos, quæ nominatur ab eis Tarabella. Accipiunt ergo ramos eius & excoriant eos, & facientes fasciculos, infundunt in aqua, & dimittunt sic mensibus duobus, deinde contundunt contusione forti, & fit inde Viscus bonus.

Quidam putant Viscum in pabulis datum, iumentis efficere ut pinguescant illa & ageantur.

Fœcunditatem eo pabulo dari cuicunque animali sterili arbitrantur. Plinius.


De Erica. Cap. IIIL

INTER OMNES PLANTAS QUÆ IN GERMANIA nostra gignuntur, uix aliam reperiās qua apes nostræ æque delectentur, atque ea quam *Heiden*, hoc est, ut uulgo interpretari solent *Ericam* uocant. Eam namq; magno studio quærent Augusto mense, quo tempore florem ostendit stellatum in candido purpureum, suauissimumq; ac melleum prorsus odorem spirantem. Hinc sane multi asserunt re ipsa & experientia id quoque attestante, optimum clarissimumq; mel id esse, quod ex flore *Ericæ* apes efficiant. Quin etiam quod mireris, cum *Erica* non satis læto flore comat, aut aliquid damni patitur, mel quoque quod Autumno colligitur in *Vuasgoia* nostra, alijsq; montanis locis, non magna in copia reperitur. Hæc mihi propterea dicuntur, quod rei herbariæ scriptores tam Græci quam Latini uno omnes ore pronunciant, mellationem de *Ericæ* flore minime probatam esse. Qui sit ut unum ex duobus suspicari hoc loco necesse sit. Aut enim hoc quod hi affirmant de *Ericæ* melle in alijs tantum, non autem nostris contingit, aut certe ueterum *Erica* non fuit ea quam nos hodie hoc nomine appellamus, id quod magis uerisimi-

Erica vulgaris purpurea;

Diosco. lib. 1. cap. 102.

Pli. lib. 11. c. 16.

*Erica.**Heyd.**Erica candida.*

lefit, cum Dioscorides arborem fruticosam hanc appellet. Licet Plinius libro xxiii. cap. ix. Ericam his uerbis pingat. Ericen Græci uocant fruticem non multum à myrice differentiē, colore Roris marini, & pene folio. Hæcille. Siue ergo Erica hæc nostra eadem sit cum ueterum Erica, siue non sit, certe frutex est elegantissimus, quam plurimis uirgis & ramulis totundis & purpurantibus præditus, hisq; minutissimis foliolis, folia Chamæcyparissi referentibus, sed non perinde cineraceis quin potius uirgibus uestitis undique. Inueniuntur uero huius generis frutices, qui in syluis ad altitudinem duum cubitorum assurgant.

Reperias & nonnullos qui florem gerant prorsus candidum, sed rarius est hoc genus. Vtriusque autē flosculi Autumno nullo post se relicto uel semine uel fructu euanescent.

NOMENCLATYRAE.

Vulgarissimæ plantæ, in lingua latina hodie maxime ignotæ habentur, quod in hoc frutice uidere est, qui Germanis Heyd/Græcis *ἑrica*, & ut nonnulli uolunt Myrica Latinis dicitur. Palladius in Nouembri mense, titulo viij.

vii. de apibus hunc fruticem Tamaricen appellare uidetur, cum tamen Tamarix, seu ut uulgo dicunt Tamariscus longe alius sit frutex, quemadmodum proximo dicitur capite Sed parum hæc curanda putarem, si in reliquis certi essemus. Athenienses Plinio teste Tetradicem hanc uocant, Theophrastus lib. vi. ca. iij. Tetralicem, aij Quadrangulam, Quadratam. Amaricum & Amaricen (nam & Columella flores Amaricinos dixit, pro quo rectius Ericæos legi posse existimo, imitatione Pliniana, uide Plinium lib. xi. cap. xvi.) Sisarum denique aut Sisaram uocandam putant. Ruellius Genistellam uocatam officinis, Ericam quibusdam esse tradit libro primo cap. lxxxiiij. Proinde ego ijs assentior, qui Myricam Hieremiæ cap. xvij. de hac nostra planta interpretantur. Quid uero proprie Erica sit, infra cap. viij. dicitur. Breuiter Erica hæc nostra Tamarisci exiguum quoddam est genus, sicut & scopæ Amerinæ, de quibus proximo dicitur capite.

DAVID KYBERVS LECTORI HER-
barum studioso.

CVM autor noster Myricæ quæ (ut habet uulgata translatio) Hieremiæ xvij. commemorantur, mentionem iecerit, explicabo paucis quid de ea uoce ueteres Hebræi senserint, ארעא. Arcar igitur (hæc enim uox a' Hi-ronymo per, Myrica, est reddita) ut inquit Kimhi in suo Dictionario, est arbor quæ in deserto gignitur, & sunt quidam qui dicunt eam esse quæ Arabica lingua Aibahel, & lingua uulgari (hoc est Hispanica) Marbi uocatur. Alij dicunt esse Iuniperum. Thargum hoc est Chaldaeus paraphrastes interpretatus est eā uocem ארעא Accabitha, id est, spina. Accabitha uero exposuit Rabi Haij esse foris spinosum intus uero fructum esculentum, & uocari Hebraice Arcar. Hactenus Kimhi. Rabi Salomon ex sententia cuiusdā Menachem dicit esse fruticem aut arborem aliquam iytustrem, olim Hebræis Arcar appellatam, sed quæ hodie explicari facile non possit. Hactenus illi.

VIRESC. TEMPERAMENTVM.

Paulus Ericæ flores & folia tumores & collectiones citra mordicationē aliquam aut aduersionem digerendi uim habere cōtendit, quæ de causa haud immerito utrinque corpori adhiberi possunt.

INTRINSECVS.

Aquam e floribus Ericæ distillatam colica laborantibus, præsertim si calor & litis adsint, utiliter exhiberi expertus sum.

EXTRINSECVS.

Eadē ruborem oculorū tollit, & dolorem illorum mitigat.

Flores una cum teneris germinibus tussiac impositi serpentium morfib. medentur, teste Dioscoride, & tumores sedant.

Quidam e recentibus Ericæ floribus, fomenta & balnea sudatoria conficiunt podagricis & paralyticis membris, persuadent namq. sibi hoc pacto inueteratos & uiscosos humores unde morbus articulorum oritur dissolui & discuti.

De Myrica. Cap. V.

I N NOSTRA GERMANIA MYRICAE ALTERVM duntaxat genus habemus, nimirū sylvestre & scirile qd florē profert muscosum & purpurantem. Nicander Mantin in Theriaca hoc Myricæ seu Tamaricis genus nuncupauit, propterea quod Apollo uaticinaturus, uirgam Tamaricis manu gestare solitus fuerit, quem morem secuti Magi Scythiæ uaticinijs suis Tamaricen adhibuerunt. Ægyptij quoque sacerdotes Myrica seu Tamarice coronati Festum Iouis celebrabant, & ad multas superstitiones tam hi quam alij Tamarisco utebantur, non aliter atq. aniculæ nostræ superstitiolæ Erica candido flore emicante, uti apud nos consueuerunt. Sed facessant deliria, superstitiq. nos historiam Tamarisci exequamur.

Tamariscus frutex lignosus (nam Tamaricen arborem, quæ fructum gignit lignosum, ut Galla, Ægyptijs & Syris relinquemus) uiri proceritatem apud nos quandoq. consequitur, ramis est ex herbaceo fuluoq. variegatis, folio magis tenui Erica, cuius iam statim meminimus, aut, a Sabina herba minimum dissidēte, cinereo, aut ex pallido uiridi. Floret vere, cumq. flores emarcuerint in pappos auolant, non aliter atque Salicis. Nascitur Tamariscus in nostris regionibus ad ripas fluuiorum, potissimum autem ad Rhenum.

NOMENCLATURAE.

Germani Tamariscum Tamariscen / Dortz / & Birzenberg appellat. Latinis Myrica, Græcis *μυρίκη*, Corinthijs Tamarix, Achaïæ Brya, Gallis Bryaria, Nicandro *μάρτις*, Serapioni Tarfa & Carnezit, Auerrhoi Alcarphar. Nec prætereundum est, Serapionem aliud quoddam Tamarisci & & grandius genus describere, cap. xx. sub Athel & Abobainfa nominibus ex quo utensilia in Babylonia dicit confici.

Serap. cap. 32.

Scopæ Amarinae

Proinde scopæ quæ ad nos deferuntur, Amerinæ uocatae, expurgandis uestibus

*Myrica.**Tamariscen.*

uestibus expetitæ, uirgas
ostendentes tenuissimas &
ruffas, Tamarisci quoque
genus esse uidentur. Vide
Ruellium libro primo de
natura stirpium cap. xcix.

VIRES AC TEMPE-
ramentum.

Tamariscus abstergentis
est ac incidentis facultatis,
potestq; utrisque corporis
partibus utiliter adhiberi.

INTRINSECVS.

Folia, lignum, radices,
succusq; Tamarisci in ui-
no decocta & pota, pulmo-
num, iocineris, lienis, renū
& uesicæ tollunt obstru-
ctiones & melancholiam
potenter exigunt.

Datur id decoctum cru-
entæ excreationi in potu,
cæliacis, & contra proflu-
uia foeminarum, regium
morbum, & phalangiorū
morbus.

Tamariscus ad omnia
abundantia profluuia, ac
ea uitia quæ ab obstructio-
nibus lienis proficiuntur
unice facit.

Lienosis suisbus mederi
tradit Democritus Physicus aquam quæ potanda obijcietur, in qua can-
dentes myricæ carbonēs fuerint restincti: consulitq; hominibus uirgo lie-
nis laborantibus, uinum ebibere carbonibus myricæ igni flagrantibus
exustum.

Tama

Tamariscum uitio lienis præsertim suum quamplurimum conducere Columella sensiclib. vii. cap. ix. ubi hunc in modum scribit.

Solet etiam uitiosi splenis dolor eas infestare, quod accidit, cum siccitas magna prouenit, & ut Bucolicon loquitur poema, *Strata iacent passim sua quæq; sub arbore poma.* Nam pecus insatiabile est, si es enim dum dulcedinem pabuli consecantur, supra modum ætate splenis incremento laborant, cui succurritur, si fabricentur canales ex Tamariscibus & Rusco (seu ut Ruellius monet legens dum, Tamaricis è trunco) repleantur aqua, & deinde sitientibus admoueantur. Quippe ligni medicabilis succus, epotus intestinū tumorem compescit. Hæc ille.

Succus Tamarisci, sicut & radix (quam imperiti medici Casiam uocant, & pro Casia utuntur) ad huiusmodi affectiones magis conducit.

Quantarum uero uirium Tamariscus sit, ex his quæ è scriptis Serapionis annotabimus, intelligi facile poterit. Sic ergo ille cap. xxxi. scribit.

Tamariscus confert frigidis apostematibus, quando suffumigatur cum eo. Dixit mihi homo fidelis, quod fuit quædam mulier, super quā apparuit lepra & datum fuit ei ex decoctione radicis Tamarisci cum passulis sæpe, & curata est. Et nos quidem experiti sumus hoc in muliere alia, & curata est. Et dico super hoc quod istud contigit, quia ægritudo sua prima fuit apostema in splene, & propter opilationem eius, quæ quidem fuit causa non attrahendi melancholiam, & non mundificandi uel clarificandi sanguinem, quæ fuit causa apparitionis lepræ super eam. Quando ergo resolutum fuit apostema, et aperta est opilatio propter operationem istius medicinæ in eo, quod fuit de natura sua abstergere, reuersæ sunt ad sanitatem, &c.

Potorios calices è caudice Tamarisci lienosis moliuntur, quo datus in his potus proficiat. Dioscorides libro primo cap. ci.

Vinum Myriceum regium morbum conducere crediderim.

EXTRINSECVS.

Decoctum foliorum cum uino ad dolorem dentium in collutionibus salutare.

Folia pallidis mulierculis albis mensibus laborantibus in deflectionibus utilia sunt.

Lixiuia

Lixiuum e cineribus Tamarisci confectum, pediculos & lendes enecat.
Cinis Tamarisci ulcera manantia inspersu deficcant, & ambustis igni
medetur.

De Thymelæa. Cap. VI.

Zeilandt, Zellershalß.



FRUTEX HIC, ET
isquem proximo capite
describemus, earundē sunt
facultatū, ita ut si alterutrū
desit, altero uti possis. V.
trumq; tamen meo iudicio
noxium est, maxime his
qui imbecillo sunt stoma-
cho. Quisquis ergo ualetu-
dini suæ bene consultum
esse uoluerit, is sibi ab agyr-
tis cauendum sciat, quibus
moris est, immites istas &
a noxijs ac uenenosis plan-
tis petitas purgationes ci-
tra iudicium quibusuis ex-
hibere. Thymelæa ut mis-
sa hæc faciamus & historiā
aggrediamur, arbusculæ
instar profilit, uirgis mul-
tis, tenuissimis, tripedane-
is, aut breuioribus, folijs
exigujs, & pinguibus, flo-
recandido, fructu rotun-
do, seminibus Cannabis
haud maiori, linguam si
mandatur adurente, non
aliter atque Chamelæa, de
qua proximo capite. Thy-
melæa non ubique obuiū
est, sed incultis, altissimisq;
mōtibus et syluis prouenit.

NOMEN.

NOMENCLATVRÆ.

Germani hunc fruticem *Bellersbals* / vnd *Zeilande* appellant, Latini nonnulli *Linum sylvestre*, *Oliuellam* & *Leonem terræ*. Apud *Dioscoridē* lib. iij. cap. clxvij. *Quercia*, & *quercia*, dicitur, quanquam posterior appellatio ei quamproximo describemus capite potissimum conueniat. *Plinius* lib. xij. cap. xxi. *Pyros achneē*, *Cnestrōn*, & *Cneoron* uocari tradit, *Syri* *Apolinum* nuncupant, *Hyginus Cassiam*. *Liparonis* cuiusdā *Aētius* mentionem facit, quod & *Cnestron* nominari tradit, num uero ad hunc fruticem ea pertineat appellatio minime constat.

Fructus *Thymelææ* granum *Gnidium*, uel *Coccon gnidium*, ut loquuntur officinæ, appellatur. Errant recentiores qui *Cocco gnidium* ex *Chamelæa* nasci existimant. Multo autem maiori in errore uersantur qui *Chamelæam* cum *Daphnoide* seu *Laureola* confundunt, ac si ad unam & eandem herbam utraque appellatio referenda sit. Vide *Christoph. de honestis*, & *Iacobum Manlium* super confect. *Mezereon*.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Vfus huius fruticis, sicut & sequentis, nullus admitti debet, nisi ubi summa id necessitas exposulare uidebitur. Est enim uterque uehementer calidæ qualitatis.

INTRINSECVS.

Veteres hydropem inueteratum per inferna, granis *Thymelææ* uisginti exhibitis purgare sunt soliti. Ne uero fauces adurant, *Saccharo* priusquam usurpentur, obducenda erunt.

Mulieres grauidæ, & qui imbecillum habent uentriculum, ab hoc & illi similibus medicamentis abstineant.

EXTRINSECVS.


Qui ægre desudant, trito hoc semine cum nitro & aceto inunguntur. Sed neque hoc medicamento unquam utendum, nisi necessitate postulante, & cum alia nihil proficiunt.

Folia quæ peculiariter *Cneorum* appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recondi, Hæc tutoris usus esse prædicantur.

De

De Chamelæa. Cap. VII.

Chamelæa, seu Mezereon.
Seidelpast.



APVD MEDIOMATRICES, & in Vualgoia ad modum vulgare est notitia Chamelæa. Reperitur ea in uliginosis, densis & tenebrosis lucis, & dumetis. Februario mense antequam folia fundat, florem proferat Bersilici colore tinctum, odoratum, Violæ nobilissimæ instar, qui Aprilis mense in virides abeunt baccas, sed Autumno appropinquante rubescentes, cuiusmodi Arum quoque gerit. Folijs uestitur per omnia Ligustro, aut ut habet Dioscorides, Oleæ similibus. Cortice obducitur hic fruticulus lævi & cano, raroque ad altitudinem binum pedum assurgit, ramis non multo crassioribus culmo. Tota sua substantia grauius oler, excepto solo flore, qui iucundum ut diximus spirat odorem. Folia, flores, cortex, & grana gustata acriter mordent, faucesque ac guttur uellicatu acriori ipso Arolace sunt.

NOMENCLATURA.

Ab huius fruticis. usus
uel

in his nominibus
quædam ad Thy-
melæam perti-
nent.

Oleastelli uox ad
Calabricam Oli-
uam proprie per-
tinet, de qua Co-
lumella lib. 12.
cap. 49.

uel ipsæ nomenclaturæ, quibus uulgo Rapiens uitam, Faciens uiduas, hoc est, si interpreteris Germanice *Nörder*, vnd *Menschen dieb* appellatur, de-
terrere nos merito debebant. Dioscoridi lib. iiii. cap. clxvi. *χαραία*, Chame-
læa nigra, Pyros, Achne, Heraclion, Bddyra, Coccon gnidion, Citocacia-
um, Oleago, & Oleastellum nuncupatur. Serapio & Mesue Mezereon uo-
cant. Vide Serapionem cap. cccliii.

VIRE SACTEMPERAMENTVM.

Cortex Chamelææ igneam quædam uim habet, unde illi Pyros achnes
nomen, nam licet tufus intro fumatur, nunquam tamen confici potest, sed
per inferna nulla corruptione alteratus, redditur. Caueant ergo sibi qui ue-
lunt huiusmodi medicamentis. Ego namque Chamelæa quosdam agyr-
tas & impostores, non paucos ad orcum mittere uidi. Est enim illa sicca in
quarto gradu, quemadmodum auctoritate Cuzenæ cuiusdam Serapio pro-
didit.

INTRINSECVS.

Corticem Chamelææ antequam eo utaris, aceto bi duo aut tri duo macerare,
deinde dulci aqua aliquoties abluere, ablutumque umbra siccare & ad usum
recondere conuenit. Serapio autor est. Nunquam tamen exhibendus est per se
sed semper Saccharo, aut succo Dulcis radicis miscendus, dimidiæ dun-
taxat drachmæ pondere. Quod si hoc pacto præparetur, eoque pondere cum
alijs mixtus exhibeatur, medicina fuerit benedicta, aduersus melancholiã
& aquam intercutem, aquam citrinam ut uerbis utar Serapionis.

Pilulæ quas e Chamelæa Mesue & Serapio conficiunt, ad hydropem
maximi meo iudicio est momenti.

Ego existimo decoctionem florum Chamelææ ad prædictas affectiones
tutoris & minus noxi usus esse. Nemini tamen author aut magister hac in
parte esse uelim. Quin sequatur quisque quod ex re sua esse certo cognoue-
rit.

EXTRINSECVS.

Folijs cum melle tritis sordida ulcera & crustosa repurgantur.

Mulierculæ quæ formæ student, hoc medicamento uti poterunt, nam fa-
ciei maculas intra paucos dies illitu exterit & purgat.

De Genista, & Genistella. Cap. VIII.

GENISTA VULGARIS APVD GERMANOS NOTI-
G tix, incultis agris campisque, neque non quibusdam montanis ar-
bustis

Genista.
Pfrimmen.



bustis, quæ statis temporibus cædi solent, gignitur. Frutex est surculosus, multisq; uiridibus uirgis ramosus, fronde minuta, rutaceaq; fere foliatus, uiri quandoq; attingens proceritatem. Eius duo sunt genera, quorum grandius idemq; uulgatius Maio mense, nonnunquam & Autumni tempore, exiguum uero Iunio mense floret. Vtriusque flores quod ad formam attinet Cicer arietinum æmulantur. Quamq; ea quam uulgo Genistellam uocant, tota sua substantia breuior & magis exigua cernatur, præterea & aculeata sit, pungentiq; prædita folio, sicut & Oxyacantha, quam uulgo Berberim nominant. Necubique hoc Genistæ genus reperitur, sed in arenosis ac saxosis duntaxat locis prouenit, ut est sylua quam uocant den Ydar/ ad Mosellam, & in Vuasgoia. Flores utriusque in nigras, & incuruas abeunt filiquas Senæ fere respondentes, quinis, interdum senis, quandoque pluribus aut paucioribus seminibus, forma sua reniculos quos-

dam representantibus, phasiolorum gustum exprimentibus, refertas, quæ solis calore ruptæ diffiliunt, non aliter atque Cataputia maior, granula sua excutientes.

Genistella.

Stechende Pfirmmen.

NOMENCLATURAE.

Hunc fruticem Germani Pfirmmen / Latini Genistam uocant, quoniam genu modo flexilis ad nexus sit, uel quia genibus medetur dolentibus. Sunt qui existimēt Genistam & Spartion unum & eundem esse fruticem. Ac fieri potest ut Genistam sub Spartio suo, quod & Lobon, hoc est siliquam, & Lygon, id est, vimen cognominant, descripserit Dioscorides libro quarto cap. clij. Sed quantum ad me quidem attinet, intelligere hoc non possum, sicut ipse quoque Plinius lib. xxiij. cap. ix. dubitat, an Genista sit quam Græci authores Spartio appellauere. Quod siagnoscere mihi uelint Herbarij nostri dicere non dubitarem Genistam ad Ericam pertinere Dioscoridis, quæ Mesue Albrahim, myrticæ & Genestram uocat; rursus Spartion eam esse quam supra lib. ij. cap. viij. descripsimus, exiguam Genistam, Genistellam, quam Germani Klein pfirmmen / oder Stechend pfirmmen nuncu-



De Silybo Dioscorides lib. 4. cap. 153.

pant, sub Spartio, aut quod magis arrideret nobis, Silybo comprehendere.

VIRES.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Emperici Genistæ flores & semina ad internas quasdam affectiones exhibere hodie solent.

INTRINSECVS.

Aqua è floribus Genistæ distillata, & pota calculosis prodesse traditur, sicut & seminis per se tusa tertia parte drachmæ sumpta, ad sudorem interim eliciendum contexto corpore.

Apes flores Genistæ amant, sed mellatio ex illis facta improbat. Apes etiam cum foelici & copioso prouentu hi luxuriant, frequenter moriuntur. Hæc partim ipse quoque Dioscorides animaduertit.

Spartij (quod ego Germanice Gälserb blümen uoco, de quo supra lib. ij. ca. viij.) flores quinis obolis in aqua mulla poti, per superna uti fere Helieborus, sed citra periculum purgant. Easdem & semen facultates obtinet, sed eius non nisi dimidia drachma exhibenda fuerit: quæ omnia de Chamę spartio (cuius historiam secundo quoque libro cap. vij. tractauimus) intelligenda erunt.

Ramis in aqua maceratis, mox tuis, extractus succus, Ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant.

EXTRINSECVS.

Genistæ seu Ericę (si modo Genista sit Erica Dioscoridis) tam flos quam coma, serpentium ictibus illitu medetur.

Opiliones quidem è Genista unguentum conficiunt, quod scabiei ouium medetur.

Genistam tufam cum axungia, genua dolentia sanare Plinius scripsit lib. xxiij. cau. ix.

Spartij ramorum aqua salsa maceratorum, succus expressus, & clysteri additus strigmenta elicit cruenta.


Ego sane crediderim Spartion, quod nos Gälserb blümen interpretamur, id esse ex quo Asia lina piscatoria conficere solita est, uide Plinium lib. xix. cap. ij. Ruel, de nat. stirpium. cap. cxlij.

De Colutea Theophrasti, uulgo Senam nominant.

CAP. IX.

Q VANQVAM APVD DOCTOS ETIAM NVM HODIE controuertatur, quo in loco Senæ mentionem fecerit Dioscorides, tamen cum Germaniæ nostræ pridem innotescere ceperit,

DE STIRPIVM HISTORIA
Colutea Teophrasti, vulgo Sena.
 Senet.



non potui committere, quin hoc in hisce nostris commentarijs, uel obiter
Sena vulgaris. historiam pilius perstringerem. Est autem ex alsiolarum genere Sena, non mi-
 nus quam Cucurbita, aut Cucumeres. Folia gerit Trifolio acuto, aut Fœ-
 no græ.

no græco confimilia, sed maiora, caules habet rotundos & lignofos, candi
do in fastigijs & Violæ adsimili emicantes flore, qui in nigras abeunt & re
curuas instar Genistæ filiquas, semine aliquantulum lato, ac incano, quod *Ruellius de nat.*
a me aliquando satum plantulas Senæ mihi protulit. Sena alioquin ex *stirp. li. i. ca. 70.*
Italia ad nos magna in copia deportatur, nam in illis regionibus, sicut & in
Gallia sponte sua gignitur.

Præstantissima uero Sena ex Alexandria ad nos defertur. Ea luteos pro
fert flores, cætera uulgaris similis. 2.
Sena Alexandria
na.

NOMENCLATURAE.

Miror equidem cur Dioscorides, Plinius, Galenus & Ægineta nullam
huius stirpis mentionem fecerint, cum tamen a Theophrasto descripta fue
rit libro primo cap. xviij Liparæ peculiarem Coluteam asserente, quæ uer
ba ego lubens de hoc frutice intelligo, cum propter exactam descriptionē,
tum uero ob insignes quibus donatus est, uires. Quod uero quidam Senā
Delphinium seu Alypon, aut Peplium Dioscoridis esse dicunt, nihil me
mouet, quo minus Senam cum Ruellio Coluteam Theophrasti esse statu
am. Galli hanc Bagenaulde. Serapio cap. lviij. Habohanisa, Mesue Abalze
mer, Actuarius fructum siliginosum appellat.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Sena mediocriter calefacit & exiccat. Vsurpantur filiquæ & semina, de
hinc folia ad purgationes.

INTRINSECVS.

Inter omnes purgatorias, & expultrices medicinas, uix aliam reperias
utiliorem, usitatiorem, & minus noxiam. Decoctio namq; Senæ pota, cras
sos & uiscosos humores educit, melancholiam expurgat, sanguinem mun
dat, exhilarat cor, & omnia interanea.

Decoctionem Senæ ego sic conficio. Sumo Senæ foliorum unciam unā
& dimidiam, eaq; probe abluo, caulibus crassioribus & reliqua immundi
tatemora, caryophylla xij. gingiberis non tusi radicem minutim cōcisam,
seminum Foeniculi, Anisi, añ. drachmas ij. Hæc omnia in olla noua &
munda lento igne supra tertias in uino aut aqua pro ægritudinis ratione,
decoquo, mox per pannum percolo, Saccarumq; adijcio, quantum mihi
quidem uidetur res ipsa postulare, tum ægro mane & uesperī cubitum inu
ro, decoctionis huius calefactæ mediocrem exhibeo cyathum, ita tamen ut

nullum postquam potionem accepit, intra quatuor horas cibum assumat. Hæc decoctio citra periculum puero, uel adulto exhiberi potest. Puerperis tamen benedicta est medicina, sed his quidem non cum Saccharo condenda fuerit prædicta potio.

Sunt qui illi pauxillum Rhabarbari tusti admiscant, tum enim efficacius purgabit. Serapio drachmam foliorum Senæ in puluerem redactorum, in iusculo gallinaceo sumptam pares facultates habere tradit.

EXTRINSECVS.

Mesue foliorum Senæ & Chamæmeli decoctum lotione cerebrum nervos roborare, deinde & quouis modo sumptam Senam uisum & auditum firmare, melancholicis & antiquis febribus succurrere scribit cap. de Simp. xv.

De Cappari. Cap. X.

QUANTQVAM NON IN OMNIBVS GERMANIAE LOCIS Capparis nascatur, tamen culinis præsertim diuitum admodum familiaris esse cernitur, nedum autem diuites sed etiam pauperes in usu Capparim habent, sciuntque non tantum quid Capparis sit, uerum etiam cur illa expetatur, nimirum ut delectet, ciborum fastidia discutiat, & appetentiam inuitet. Antequam uero cibis adhibeantur, bulliuntur, ex oleo ac aceto eduntur, quemadmodum Paulus docuit. In quibusdam prouincijs sponte sua, aspera inculta, lapidosa & sabulosa terra Capparis gignitur. Non tamen omnia genera commendantur. Siquidem Apulum uomitus facit, peregrinum quod e' Marmarica Libyæ deportatur inflationes parit. Itaque usu merito tam hoc quam illud a nobis repudiabitur, erimusque Italico contenti, quod innocentius est. Capparis cultu & leui uel nullo contenta est; namque diligentia marcescere uolunt, & quo sollicitius colatur, eo minus læte prouenire. Atque hæc hætenus præfationis uice dicere uoluimus, nunc historiam subtexemus.

Capparis itaque frutex surculosus est, multis ramulis & surculis, humi fratris aculeatis fruticans. Spinæ habet acutæ ut Rubus, folia Afari, aut ut Dioscorides inquit, Mali cotoneæ, inter quæ rotunda erumpunt capitula, quæ cum dehiscunt, florem promunt stellatum & boni odoris. Cæterum habet flos quisque oblongum quoddam stamen in medio capillatarum fibrarum reconditum, quod flore excusso in fructum abit, oleæ pene, aut glandi exiguæ consimilem, acinis refertum, quod in mariscis quoque uideas. Caparis radicem habet magnam, longam, lignosam, acris & amari gustus, quæ

Capparis.
Cappres.

quæ quotannis noua emittit germina, qua ratione & Dulcis radix repullula
lascit. Cumque semel radices egerit, nisi frequenter & in tempore extirpetur,
postea non facile ejici se patitur.

NOMENCLATVRÆ.

καππαρις.
Diosco. lib. 2.
cap. 165.

Capparis quam Germani Cappern, oder Cappres uocant, multa in Dioscoride nomina habet. Nam quemadmodum apud Diosco. annotatum est, aliqui Cynosbaton, alij Capriam, alij Corui malum, alij Ophioscorodon, Phyllostaphylon, quidam Thalliam, aut Petream, alij Olophyton, alij Ioniten, alij Oligochloron aut Acontion, aut Hippomanes, alij Trichomanes, Magi potera, alij Pentheron, aut cor lupi, alij Alosthodon, alij Crinon, alij Thlaspin, Romani persicum sinapi aut inturim, Aphri Herbixathon, appellant. Quanquam inter commemoratas appellationes non paucae sint quae ad alias potius referendae sint stirpes, tamen in praesentia ab eo negotio supersedebimus. Palladius Cappar uocat. Serapio Capparus. cap. cclxxxi.

VIRESCACTEMPERAMENTVM.

Capparis non tantum culinis, sed & medicinae nata esse uidetur. Temperaturam habet calidam & siccam, maxime quod ad radicem attinet, quae de causa utrinque in his quae resolutionem indigent magni est momenti.

INTRINSECVS.

Capparis cruda stomacho aduersatur, aluum turbat, quare coctam prius, deinde ex oleo & aceto esse eam conueniet.

Paralytici, podagrici, plegmatici, & splenici, & mulieres quibus ante tempus menses fluere cessauere, ischiadici & qui magna cum difficultate urinam reddunt, his omnes continuo in usu Capparin habeant. Nam natura tam florum quam baccarum Capparis ea est, ut discutere, mouere, & expellere quosuis viscosos humores, urinam & menses ualeant.

Fructus Capparis duabus drachmis in uino potus, quadraginta diebus lienem absumit, & urinam cruentamque excrementum emittit, bibitur utilissime in coxarum doloribus, & neruorum resolutione, item ruptis & conuulsis, menses ciēt, caput purgat, aluum soluit, autor est Dioscorides, Serapio Clystere ad sciaticam (ut loquuntur barbari) e succo Capparorum, Raisen magna olim experientia factitasse scribit.

EXTRINSECVS.

Aurium uermiculos infusus Capparis succus enecat: doloremque sedat.

Dentium dolorem sedat semen ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radicis cortex ad eadem proficit.

Idem decoctum uisiliginēs albas absterget, ulcera omnia uetera & sordida, & quae occalluerunt, expurgat.

Radix.

Radixfoliaq; intrita strumas ac duritias discutiant. Lienosis cum farina hordei fructus aut folia illinuntur.


Sed ut hanc tractionem finiamus, ex his quæ diximus, plura alia quæ Capparitis præstare potest remedia colligent prudentes.

De Rubi varijs generibus. Cap. XI.

I QVIS EST, CUI PROPAGANDI ARBORES RATIO minus confit, is naturæ in Rubo solertiam consideret, & prudentiore euadet. Cum namq; Rubus execranda & plerisque mortalibus inuisa res sit, ita ut neminem facile reperias qui stirpem eam plantare uelit, sese ipsa propagat, miranda proculdubio & singulari id procurante naturæ providentia. Nam protinus quam paulo accreuit, retro uergens in terram, defigat capita, radicatur, iterumq; ex se nascitur, repletura omnia ni diligens resistat cultura, id quod rusticorum & agricolarum ignauia abunde confirmat. Siquidem cum illi uini tabernas plus amant quam agros suos, & in perniciem illorum Rubo conuiueant, quid possint aut quales illorum sint agri, nihil attinet hic dicere. Rubi duo sunt genera, humile ^{1.} *Humilis Rubus*, nimirum & grande. Humilis Rubus ripis fluuiorum gaudet, neq; non humectis nonnullis & macris & incultis agris, in quibus longe lateq; se diffundit, sparsis per terram tenuissimis & aculeatis uirgis. In altum nunquam se attollit, retro in terram ut diximus uergens, ne scilicet nobile genus pereat. Folia tam huius quam alterius Rubi Lupulo pene respondet, nisi quod magis nigricant, spinisq; asperioribus horrent. Rubus humilis (ut ad illū redeamus) flores gerit ex candido roseos, stellatos, Maio mense erumpentes, Fragariæ forma sua similes. Mora flore excusso subsequuntur, primo exortu uiridia, paulo post rubra, per maturitatem uero cæsia, non iniucundi gustus sicut & mora (ut Barbari uocant) celsi. Radix omnium Rubi generū nodosa est admodum, maxime cum illi cultura non aduersa fuerit.

Rubus grandior per dumos repit, & in syluis inter cæteras sentes & aculeatas plantas, neq; non ad sepes, & agrorum limites reperitur. Hic in altum ^{2.} *Rubus grandis*, crassiores emittit uirgas, quæ tamen & ipsæ gracilitate & proceritate nimia in terram retroactæ, capita defigunt & radicanur (ut de altero quoq; genere diximus) ne scilicet tam utile fruticis genus nulla post se relicta decedat prole. Rubus hic minaces ostendit spinas, nocentes, aduncas, ac pungentes non minus quam felium ungues. Folia gerit asperiora prædicto genere, & duriora, & quæ hyeme raro a uirgis suis excutiantur, quas non facile deserunt, nisi alia in locum ipsorū succreuerint. Flos huius & fructus priori

Rubus.
Brombeer.



³⁰
Rubus Idæus.

generi per omnia respon-
 det, nisi quod mora huius
 Rubi, per maturitatem quā
 Augusto mense & circa Au-
 tumnum assequitur, non cæ-
 sia, sed plane nigra euadunt,
 gustu dulcia, modica admix-
 ta amaritudine. Hæc a meru-
 lis, auibusq; ceteris expetun-
 tur, & in cibos quoque ue-
 niunt pauperum, qui alios
 non habent, nisi publicos
 hos, & a diuitibus qui aurū
 sequuntur, & quidquid pere-
 grinum ac sumptuosum fue-
 rit, neglectos prouentus.

At Rubus Idæus, uirgas,
 folia & spinas habet teneris-
 ores, ac inter omnia genera
 Rubi innocentissimas, mul-
 to enim clementius pungūt,
 quam reliquorum Rubo-
 rum. Inuenias in hoc gene-
 re qui prorsus non pungāt,
 maxime si qui primo anno
 e terra prosilierunt. Rubus
 Idæus folia habet qua terrā
 spectant albicantia, ut fari-
 na aspersa uideantur, tactu
 mollia & tenera. Floret
 Maio & Iunio mensibus,
 rotundos et ex albo pallidu-
 los proferens strobilos, qui
 Iulio mense in rotunda, con-
 caua, rubra, dulcia, & iucun-
 dum odorem uti fere Viola

Martia, spirantia, abeunt mora, rubris & pilosis pileolis similia. Fructus
 hic diu subsistere nequit, intra paucos enim dies vermiculi in eo nascuntur,
 & tum

& tum protinus pereunt. Frutex hic uliginosis & umbrosis syluis, locisq; minime apricis, neque non rorulentis & arenosis saxis gaudet, Vualgoia & sy luæ quam uocant den Yder familiaris.

NOMENCLATURAE.

Omnia Rubi genera aquæ Germanos Brombeerhecken / & Bremen / Latinis Rubi, Græcis Bati nuncupantur. Sed ut suis nomenclaturis singula genera insigniamus, putamus humilem Rubum, primo loco à nobis de scriptum, eum esse quem Theophrastus lib. iij. capite xviij. χαμῖδαρον, & Theodorus interpres illius Humi rubum appellauit. Grandem autem illū qui secundo loco à nobis describitur eum esse statuo qui Dioscoridi libro quarto cap. xxxv. βάτος, simpliciter dicitur, & ab alijs, eodem autore anno, tante, Cynosbatos, ab alijs Selinorition, ab alijs Asyntrophos, ab alijs Titani sanguis, ab alijs Ibidis sanguis, à Romanis Rubus, ab alijs Sentes, à quibusdam Mora baticana, à Dacis mantia, Ægyptijs Hæmos, alijs Ametros appellatur. Serapio Rubum, Buleich nominat cap. cxxiiij. Hebræi נידו Sene, Exodi iij. sic enim fere illam dictionem interpretes Btbliorum reddunt.

Titani sanguis,
Hæc appellatio
à Dioscoride lib.
2. cap. 125. Lacti
ca agrice attribui
tur, & potest fie
ri ut Rubo pro
pterea communi
cata fuerit, quod
mora illius san
guineum com
pressa succum
reddant.

Tertium genus Germani Hymbeeren / Hoirbeeren / vnd Sundtbeeren uocant. Recentiores medici Cynosbaton uocant, sed quæ uera sit ^{κυνοςβατος} cap. xviij. infra dicitur. Ego in ea plane sum sententia, ut credam hoc Rubi genus id esse quod Dioscoridi cap. xxxvi. lib. iij. βάτος ἰδαία, hoc est, Rubus Idæus dicitur, quoniā passim in Ida proueniat, Galli teste Ruellio li. iij. de na. stirpium cap. xcij. Frambosciā nuncupant. Nicander Rubum polybatē am a copā mororum nominat. Neque me latet recentiores quosdam Fra ga per Rubum Idæum intelligere, at quam recte ipsi uiderint, per nos enim his licebit, quicquid illi sibi arrogauerint.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM:

Quotquot de re herbaria scripserunt, folia, flores, germina, fructusq; Rubi astringere & exicare traduntur. Vsurpantur fere intrinsecus ad cohibendas & refrigerandas quasuis calidas fluxiones, & utrinq; aduersus serpentium & scorpionum ictus uenenatos adhibentur.

INTRINSECVS.

Galenus lib. ij. de aliment. facult. frequentem fructus Rubi usum dolorē capitis inducere iudicat. Quod an ita se habeat necne, haud dum expertus sum.

sum. Verum de Rubi Idæi fructus immoderato usu id testari possunt, quod mora illa uehementer refrigerant, ita quidem ut si quis aquam superbibat, eum horrores febriles continuo obruere facile posse. Quod si moderate illis utamur, quasuis ardentes febres refrigerabunt, ad quas affectiones aqua e' moris Idæi Rubi (quæ Germanis *Simbeer* dicuntur) destillata utilis est, sed & iucunda & grata ægris cum propter manifestam refrigerandi facultatem, tum propter suauissimum quem exhālat odorem violaceum.

Si fructus in promptu non sit tenellæ Rubi Idæi frondes, aut folia aqua decoquantur & ægris exhibeantur. Ea decoctio foris, inq; in inflammationibus conuenienter in linteolis imponetur, nam sedandi illas, & restinguendi uis pollere id medicamentum certa experientia docuit.

Qui cibos in uentriculo continere nequeunt, & frequentibus uomitionibus infestantur, hijs fructus Idæi Rubi deuoratus, & folia recentia tusa, ac foris stomacho imposita, mire prosunt.

Folia Rubi arida, necnon summa uirgarum fastigia, uino, aqua uel decocta ac pota, dysenteriam potenter cohibent, & mulierum abundantia profluuiâ. Iisdem facultatibus & mora immatura & folia in puluerem redacta, necnon flores pollent, sicut & e' teneris coliculus expressus succus, quē nonnulli sole cogi sinūt, singulari remedio cōtra omnia quę modo dicta sunt.

Rubi omnium generum flores & fructus uino decocti & poti remedio sunt & antidoto efficacissimo his qui serpentium, aliorumq; uenenatorū uermium & scorpionum ictus senserunt, testis est Nicander in Theriaca.

Radices Ruborum omnium Galeno lib. vi. de Simpl. facult. astruente, magis astringunt quam uel folia uel fructus. Estq; Galenus in ea sententia, ut credat calculos renum his radicibus comminui, si uel uino decoctæ, uel in puluerem redactæ assumantur.

E X T R I N S E C V S.

Foliorum & ramorum decoctum collutione gingiuas putridas non solum purgat sed & firmat, & oris uitij medetur, prodest & anginę hæc decoctio si gargarissatur, licet fructus in eclegmate ad eam affectionem conuenientius ab ægris sumi possit.

Decoctum cuius iam meminimus lauamenti chirurgorum utilissimū est, nam illo omnia manantia ulcera scabiesq; capitis, oculorum, sedis & genitalium lauantur & purgantur.

Eadem potest succus expressus sole coactus ut mellis instar spissetur.

Folia Rubi iunio decocta, si illo caput aliquoties abluas, capillos denigrant.

Folia Rubi Idæi recentia trita & inflammationibus epatis & stomachi foris imposita, calorem remouent, deliquiumq; animi & uires ægrotis ad-
dunt,

dunt, quod omnia aqua distillata efficacius præstat, potu & illitu, quemadmodum supra quoque meminimus. Ictibus serpentium illita folia addito oleo & uino ueneno aduersantur.

De Chamæbato, seu Rubo Idæo altero, Germani

Bocksheeren appellant. CAP. XII.



SUPEREST RUBI aliud genus, quod nunc perstringemus. Hoc non ubique locorum, sed in uliginosis & umbrosis arbutis provenit, uirgis tenuissimis humi sparsis, quæ non aliter atque Fragariæ aut Rubi vulgaris coliculi, sese ipsæ propagant. Folia gerit hic frutex Rubo ad similia, sed magis exigua, nullis spinis horrentia. Fructum edit Augusto mense, sed non copiosum. Atque nihil aliud est quam morum rubrum magnitudine Fraga non excedens, ternis aut quaternis acinis constans, fructui Rubi exiguo similis, gustu uinum referente sed pergrato præditus. Radix gustum obtinet asperum, & ad amaritudinem quandam uergentem. Ea quotannis nouos emittit & teneros coliculos.

NOMENCLATURAE.

Hæc mora in Vualgoia nostra & apud Mediomaureses Bocksheer uocant.
Ego

Ego existimo Chamæbati speciem esse, aut certe non male Rubo Idæo coniungi posse. Nam in altissimis montibus gignitur, neque alibi unquam illum me reperisse fruticem memini. Cæterum cum in hortulos meos illum transtulissem, in Rubum Idæum mutatus est.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTVM.

Quæcunque superiori proximo capite de Rubo diximus, ea puto huic quoque frutici recte attribui posse. Qui tamen vires illius cognoscere cupiat periculum faciat de illo, mihi satis est, si mea opera cognitus fiat hic frutex, omnesque sciant in Rubum Idæum illum quemadmodum diximus mutari.

De Myrtillo. Cap. XIII.

VM E DVMETIS ET SENTICETIS SYLVARVM

C propeperem, inter cæteras stirpes Myrtilli, quos non solum forma, sed & saporis suauitas plurimum commendat, primi sese nobis obtulere, & hii quidem duum generum, exigui scilicet & maiores, quanquam exiguum, ut omnibus fere passim cogniti sunt, ita maior undique apparet copia. Nam ubi hoc genus Myrtilli in syluis (nascitur autem in iis potissimum, quas Germani den Schwarzwaldt/den Odenwaldt/den Speßart/den Ydar/den Hemrich nuncupant, neque non in Vualgoia) ibi quam plurimi luxuriant fruticuli, uirgis præditi tenuissimis, quadratis, uiridibus uti Genistæ, folijs uestiti speciosis, herbaceis, solidis, Buxi per omnia similibus, sed tenerioribus. Maio mense inter folia teretes enascuntur flosculi, singuli, singulis pediculis dependentes, ex puniceo rosei coloris, forma sua campanulam referentes, ac in medio rufum quasi pistillum aut stamen obtinentes, quod in baccam rotundam & rubescentem abit. Hæc cum maturatur eo tempore quo & Cerasa maturitatem suam consequuntur, ex cæsis nigricat, colore baccas Iuniperi æmulans, gustus dulcis & suauissimus, pueris & syluestribus auiculis cibo gratissima.

Myrtillus grandis non in omnibus syluis gignitur, sed in uastis desertis, uliginosis & tenebrosis uallibus, aliisque humectis locis Vualgoiæ, Comitatus Bidiscensis & Bipontini territorij, prouenit. Quanquam autem hoc genus Myrtilli priori quod ad baccas, flores, & folia attinet quadamtenus respondeat, tamen ingens discrimen hæc duo separat a se mutuo generis. Siquidem maioris Myrtilli qua terram spectant cineracea prorsus apparet: deinde caules rotundi, proceri uidentur, ita ut arbusculam representent, tertio ramusculi seu surculi iidem teretes sunt & puniceant, quæ omnia in altero

1.
Myrtillus exiguus.

2.
Myrtillus grandis.

Myrtillus.
Heidelbeer.



altero genere diuersa reperuntur. Præterea fructus quoque huius magnitudine superat alterum genus, qui antequam maturetur, exuiridi albicat, postea rubescit, sapore uini præditus, demum ex cæsis niger apparet, & dulcior baccis Myrtilli exiguæ. Radices tamen huius quam alterius longe lateque intra terram sese diffundunt, fac subinde noua exerunt germina. Atque hæc est Myrtillorum propagatio.

NOMENCLATURÆ.

Primum genus Germani Heidelbeeren/vnd Stau delbeeren/alterum Kossbeeren/Drumpelbeeren/vnnd Brückbeeren nominant. Plerisque hodie Myrtilli latine dicuntur, quæ appellatio si formam fructus consideremus, non ita male huic fructui quadrabit. Atqui hos fructus vaccinia nigra appellant, autoritate Vergilij nitentes, ne illi mihi terque quaterque insulsi homines uidentur. Nam Vergilius non de fructu aliquo, sed de floribus quibusdam Aglogæ

secunda loquitur, & per vaccinia nigra Hyacinthum eum intelligit, cuius Dioscorides historiam lib. iij. cap. lxi. proponens Romanis Vaccinium dici testatur.

Cæterum

Cæterum de appellationibus Myrtillorum nihil peculiare in scriptis ueterum reperio, nisi quod Auerrhoes lingua sua Arabica Hes uocat.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Res ipsa clamat, & experientia testatur, hisce baccis terream & frigidam inesse substantiam, quare meo quidem iudicio cibo quam medicinæ accommodatiores sunt.

INTRINSECVS.

Pueri, nec non pastores & alij pauperuli, hisce baccis & ijs similibus fructibus, mense Iunio plurimum gaudent. Naturam habet refrigeratorem, ueluti fructus Rubi Idæi.

Quidam seplasiarj Syrupum (ut uocant) è Myrtillis ad inueteratam tussim, pulmonisq; uitia & exulcerationem. conficiunt, asserentes illum & stomacho prodesse non secus atque Syrupus de Agresta. Confectio prædicti Syrupi ita se habet. Accipiantur succi Myrtillorum probe percolati libræ sex, Sacchari puri & bene purgati libræ tres cum dimidia, aut tres duntaxat, quæ omnia lento igne super prunas simul decoquantur, quoad mellis instar aut Syrupi spissentur. Hanc decoctionem officinæ Syrupum de granis Myrti, & Chelmes nuncupant. Sed meo iudicio hæc non de nostris Myrtillis quos Germani Heidelbeer uocant, intelligenda erunt, sed de Myrti fructu. Nam quidam ita loquuntur, Myrtillum esse fructum Myrti, Vide Manlium super oleo Myrtino, & Columella lib. de re rustica xij. ca. xxxviij.

EXTRINSECVS.

Qui chartulas (ut uulgo nominant) luforias, aut alias picturas coloribus uarijs illustrant, ij succum Myrtillorum cum alumine & Galla temperant, coloremq; hoc pacto Venetum uel dilutum uel saturatum conficiunt.

Qui pannos, lanam & fila inficiunt, ij Vrceo. (Germani enim Fûbel nominant) Myrtillorum succi expressi cyathum aceti de uino, aluminis tussunciam unam, squammæ æris Germanice supferschlagtuse drachmas duas miscunt. Hæc omnia simul decoquunt, cumq; decoctio illa refrigit, ita ut manum tuto immergere possis, tum fila aut pannos tingendos demergunt in eam decoctionem, posteaque in locum aëri peruium suspendunt & siccant, tum de nouo ex frigida aqua lauant, & ita blau seu veneti coloris erit ille pannus. Quod si cupiant eum colorem dilutiorem esse squammæ æris non inficiunt decoctioni, sin uero probe saturatum uncia gallæ tussæ adijcitur.

De *Vua crispa.* Cap. XIII.

Grossel/oder Krausselbeer.



VUA CRISPA TER-
ritorio Treurenfi admodū
familiaris est, quo in loco se-
cus itinera, & in limitibus
agrorum magna in copia
& foelicius quidem cæteris
sentibus, provenire cerni-
tur, quanquam & apud Me-
diomatrices, aliosq; aspera
& lapidosa terra gignatur.
Frutex est surculosus, mul-
tisq; uirgis & adnatis ramu-
sculis brachiatus, qui om-
nes undique acutis, exiguis,
rectis, ac minime recuruis
spinis ijsq; plerunque bi-
nis, aut ternis conjun-
ctis, ut cornua capri repræ-
sentent, horrent. Caudex
eius non in altū attollitur,
sed in multos ut diximus sur-
culos sese diffundit, frequen-
tes emittens adnascencias,
seu ramos, qui quotannis
sub finem Februarij mensis
teneram proferunt et nigri-
cantem frondem, serratam,
folijs Ribes pene aut Cy-
nosbato (de qua infra cap.
xviij.) similem, sed magis
exiguam & tactu asperiorē,
atque tum demum uetera
decedunt folia. Martio men-
se flores prodeunt, concaui,

exigui, purpurei, quos si singulos per se intuearis, animaduertes illos intus

apiculos quinos tenuissimis quasi capillis suffultos ostendere, campanulamq̃ paruam referre, nec magnitudine Myrtillorum flores excedere. Ex his acini fiunt sublutei coloris, rotundi, nigrum quid in superiori sui parte obtinentes. Maturantur autem illi circa diem D. Ioanni sacrum, gustuq̃ dulces sunt, admixta quadam sed grata acerbitate.

NOMENCLATVRÆ.

Ab acinis suis, frutex hic apud Germanos Grosselbeeren dicitur, Latine Grossularis, nimirum a dura illa membrana, seu cuticula, qua obducuntur acini isti, siquidem manducati crepant, instar membranæ quæ disrumpitur. Meo sane iudicio hic frutex ad tertium Rhamni genus pertinet. Rhamni apud rei herbariæ scriptores hæc leguntur cognomina, Persephonion, Leucacantha, hoc est, spina alba, Cerualis spina, Atadim, inter quæ spinæ quidem albæ appellatio ad eam proprie plantam spectat, quæ a Dioscoride lib. iij. cap. xx. & xij. describitur. Serapioni Haufig, & Aufig cap. ccxxvi. dicitur, Hebræi Rhamnum **רַחַמְנוּ** Ataduocant, ludicum ix.

VIRESCAC TEMPERAMENTVM.

Acini Grossularis, seu Vux crispæ frigidæ sunt qualitatis, cibo quam medicinæ magis accommodati.

INTRINSECVS.

Hij antequam maturuerint prorsus acerbi seu acidi sunt gustus, sicut immaturi botri, quare a prudentibus magis cum carnibus & piscibus concoquantur, quo cibos palato gratiores reddant, & acido sapore appetentiam inuident. Profunt autem hoc pacto usurpati cholericis calidis & ægrotantibus.

Exijs etiam, immaturis inquam Grossularis baccis fassamenta ad intus parari possunt, sicut & ex immaturis uuis Omphacium conficere solemus.

Grossularis acinis tam maturis pueri delectantur. Quidam ut famem compescant, alij voluptatis gratia hos esitare solent.

EXTRINSECVS.

Omniū Rhamnorum folia igni sacro, & serpentibus ulceribus efficaciter illini scribit Dioscorides, quæ quidē ego illū crediderim de prioribus duobus Rhamni generibus intelligere. Addit deinde, Fama est ramos huius

huius ualuis fenestris uel impositos ueneficia depellere. Ego aliud & certius quidem docebo. Nam si ordine multos Grossularis frutices ponas, sepe efficiēs perpetuam & præstantissimam, quam nulla poterunt animalia penetrare, hortisq; nocere.

De Rhamni alia specie.

Cap. XV.

Wegdornbeer.



NASCITVR ET ALIA Rhamni species in tractu Rheni, secus itinera, inter pruna syluestria, & Cynosrhodon, frutice arborecente, aculeato & spinoso, cuius caudex puniceo obducitur cortice, non multo aliter quam uel Cerasus, uel ea arbor quam proximo describemus capite. Cortex interior uiridis est, ipsum uero lignum subluteū. Flores profert hic Rhamnus Maio mense, eosq; exiguos & singulos singulis petiolis dependentes stellatos, quatuor apicibus diuisos. Rami multis & rectis spinis horrent, instar Cynosbati, folijs uestiti molliusculis, Iguibus, pomi syluestris pene similibus, sed quadantenus minoribus. Multos hic Rhamnus & uirides gignit acinos, qui messis tempore leguntur, & sole siccantur, cumq; Autumnum attigerint ac maturuerint molles & nigri euadunt, gustu iniucundo præditi, magnitudi-

ne baccas arboris, cuius iam statim historiam subtexemus, nequaquam excedentes.

NOMENCLATURA E.

Hunc fruticem Germani Wegdombbeer uocant, à uijis proculdubio tracta etymologia, nam nusquam illum maiori in copia inueni quam in dumetis secus itinera & uias sitis. Alij Wersfenbeer nominant. Quo uero loco apud ueteres habitus fuerit, mihi non satis constat. Equidem nisi folia illius hyeme decuti scirem, facile speciem Rhamni alteram apud Theophrastum lib. iij. cap. xviij. esse dicerem. Quamquam id ob stare non possit quo minus Rhamnis accenseatur. Siquidem nec Dioscorides, nec Plinius perpetuo uirentium Rhamni foliorum ullam fecere mentionem. Quapropter praesentem fruticem Rhamni speciem esse dicam, quoad alij certiora de nomenclatura eius docuerint.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

In scriptis medicorum non multa de facultatibus huius Rhamni leguntur. Veteres teste Dioscoride crediderunt ramos ex Rhamnis foribus & fenestris additos, remedio esse contra ueneficia, Folia huius nostri fruticis frigida & sicca sunt naturae.

EXTRINSECVS.

Folia igni sacro & serpentibus ulceribus efficaciter illinuntur.

Quaedam mulierculae uel folia, uel interiorem corticem cum modico aluminis uino decoquunt aduersus oris ulcera & putredines, quibus hoc medicamento gargarissatu singulari experientia succurrunt.

Baccæ huius fruticis messis tempore lectæ, arefactæ & tusæ in aqua & alumine maceratæ, luteum, seu croceum potius reddunt colorem, quo librarij olim libros pingere consueuerunt. At hodie cum auripigmentum usu recipi coepit, repudiati sunt acini isti, quamquam locum adhuc habent apud eos qui chartas depictas, & luforias, necnon coria colore flauo inficere solent.


Autumno cum baccæ istæ maturitatem suam assecutæ nigrae euaserint, leguntur & tusæ in uase aereo asseruantur, & pulchre uiridem exhibent colorem, unde nonnulli eum uiridem colorem ex his parant, quem safft grûn lingua Germanica uocamus, qui pictoribus accommodatissimus est & in magno usu.

Hi acini cum circa Festum D. Martini in arboribus adhuc hærent, legi solent, & ad puniceum colorem conficiendum ab his qui coria inficiunt, & depictas

depictas chartas coloribus illustrant. Ex his quæ hæcenus de acinis huius Rhamni diximus facile liquet eos quam utilissimos esse, ut qui tria genera colorum præbeant, croceum inquam uiridem & puniceum.

De eo Frutice, quem Germani Saubbaum

uocant CAP. XVI.



PRAESENS ISTA frutex, qui in syluis arboreascens, & in altum sese attollere, plurimisq; ramis brachiatus conspicitur (nam inter cæteras sentes in dumetis & frutetis humiliori statu contentus plerunq; gignitur) medullam intus habet spadicei coloris, cortice forinsecus obductus fusco. Folia huius Cerasi sylvestris pene consimilia sunt, sed magis rotunda & nigricantia, iuxta quæ perexigui & expallido albicantes prorumpunt flosculi, singuli singulis nixi pediculis. Hæc progressu temporis in rotundos paruos & uirides abeunt acinos, qui æstate rubescunt, autumno uero plane in nigrum mutantur colorem, adeoq; Myrtillis similes apparent, sed ingrati plane ac maligni saporis.

NOMENCLATURAE.

Si hæc arbor, aut frutex, utroque enim modo appellari potest, ut supra docui.

mus, spinis horridus esset, sane nullum alium in locum illum conijcere possem, quam ad Rhamnos. Quia uero aculeis destituitur, incertus sum quo nomine uocari debeat, audieturus aliorum de hac reseruentiam. Germani quidam Zapfenholz uocant, propterea quod uictiores ex hoc ligno epistomia conficiant. Nostrates Faulbaum & Leußbaum / a foetido tum odore tum sapore.

VIREŚ AC TEMPERAMENTVM.

Frutex hic una cum fructu suo non magni in medicina est usus, praesertim quod ad internarum partium remedia attinet, nam foris tantum imponi consuevit, quemadmodum nunc dicemus.

EXTRINSECVS.

Flauus huius arboris & medius cortex cum aceto tritus, & scabiei illitus, intra paucos dies illam sanat & exiccat. Estq; hoc experimentum singulare.

Idem cortex in aceto decoctus putridis dentibus collutione prodest, nam & dolorem mitigat, & dentes ipsos purgat. Neque quicquam praeter ea quae nunc diximus, de hac arbore compertum habemus.

De Carpino Theophrasti. Cap. XVII.

NTEQVAM AD SPINOSOS ET ACULEATOS RE-
deamus frutices de Carpino nonnihil dicemus, qui & ipse inter ceteras spinosas stirpes iuxta uias plerumq; reperitur. Is quod ad frondem & pallidos flosculos attinet, Rhamno, cuius altero ab hinc capite meminimus, adsimilis existit, nisi quod Carpinus hic noster uno in pediculo plerumque quinos aut senos stellatos flosculos ostendit, quod in praedicto Rhamno non uideas. Ceterum & folia Carpini teneriora sunt, & magis nigricant quam Rhamni. Caudicis cortex incanus cernitur, sed in germinibus anniculis uiridis plane apparet, lignum flauum est & praedurum, pauca medulla refertum. Flosculi in filiquas abeunt quadrangulas, quales fere Lathyrus proferre solet, quae Autumno appetente purpureo tinguntur colore, puerorum fusibus expetita, in quibus grana solida crocata membrana clausa reperiuntur, testiculis auium similia, unde a nonnullis Germanica uoce Hanßödlin / quasi galli testiculus dicitur. Autumni tempore, filiquae sua sponte rumpuntur, & tum semen quod gustatum nescio quid respicit, in terram conijcitur.

Carpinus Theophrasti.
Spindelbaum/Hanhödlin.



NOMENCLATURA.

Theophrastus lib. iij. de historia plantarum cap. xi. inter ceteras arbores, & Carpinum meminit, quem nō Quid uero Acer Acerem ut quidam uole- & Celastrus sit, bant, sed Gallicam, & Græc. suo quoque uoce ce *συϊαρ*, hoc est, Iugalem, docebimus. quod ex ea iuga & uarij generis instrumenta uasa olim conficere solebant, appellandum contendit. Nos eam arborem quam Germani Spindelbaum, hoc est, Fusariam (nam ex ea fusi mulie brinetu celebres apud nos conficiuntur) vñd Hanhödlin, hoc est Galli testiculum uocant, Carpinum esse iudicamus. Ruellius illam sub Ruellius denat. Euonymo quidem descri- *stirp. lib. 1. cap.* bit, sed in fine hæc subiicit 77. uerba. Sed an sit Euonymos, et si multæ delineationes faueant non ausim affirmare.


VIREB AC TEMPERAMENTUM.

Ad quid huius arboris cum folia tum fructus faciunt, nihil habeo in præsentia certi, nisi quod nostri tor

narij eius ligno ad uaria instrumenta & uasa utuntur. His ergo explicatis ad spinosas reuertamur stirpes.

De Cynosbato. Cap. XVIII.

Begendorn.



INTER OMNIA FRUTICUM arborumq; aculeatarum genera, uix elegantior rem Cynosbato reperias. Siquidem ille copioso & cōiunctim posito flore, eoq; Cerasi aut pruni consimili, sed magis exiguo in principio Maij mensis emicat. Singuli flosculi quinis constant foliolis candidis, in quorū medio multi albicci capilli apparent, apices roseos sustinentes, quod in omnibus pomorum floribus uidcas. His decidentibus fructus subsequitur exiguus, oblongus, uiridis, per maturitatē quam Autumno appetente assequitur, rubeus, nucleo oliuæ minor, foris in superiori sui parte nigrum quid obtinens, intus nucleis exiguis et osscis, aspera candidaq; lanugine inuolutis refertus, gustu subdulcis, sed asperior propter lanuginē & flosculos duriusculos. Folijs uestitur Cynosbatospulchre uiridibus, ternis, quandoque quinis aut pluribus fissuris dissectis, ita ut manus explicatæ formam ferè representent. Caudice assurgit hic frutex duro, lento cortice cinereo obducto, ramofo, aculeis firmis & maxime noxijs undique armato.

armato, medulla carente. Gaudet argillosa terra, montibus, sylvisq; & sepius secus itinera positus admodum familiaris. Hoc pacto fere & Theophrastus Cynosbaton suum lib. de historia stirpium iij. cap. xvij. deliniat.

NOMENCLATURA.

Germani hunc arborescentem fruticem *Hagendorn* & fructum eius *Hagäpfel* nominant. Est hic uerus Canis sentis seu Rubus (German. *Bundtsdorn*) Græcis *κυνόβατον* appellatus. Dioscorides libro primo cap. cvij. illū describit, dicitq; quosdam Oxyacantham eum appellare, sed pertinet id nominis ad Berberim uulgo uocatam, de qua paulo post, Cynosbaton Plinius lib. xxij. cap. xij. Cynospaston, & Neurospaston appellat. De Cynosbati appellatione plura supra cap. xi. habes, cum de Rubi generibus ageremus. Sunt qui fruticem hunc, quem Germani *Hagendorn* appellant Arbutum esse contendunt, quod illis per nos quidem licebit, modo Dioscoridē & Theophrastum nobis excutere nolint.

*Rubus canis,
Theodoro Cani
rubus appellatus*

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTUM.

Fructus, folia & flores Cynosbati siccae & astringentis, seu constipatorie sunt facultatis, possuntq; tam flores quam fructus in medicina utiliter usurpari.

INTRINSECUS.

Flores Cynosbati uino ueteri per triduum macerati, deinde in uitro distillati remedio sunt præstantissimo, pleuriticis & quos tormina exercent. Aqua etiam ex solis floribus per artem distillatoriam extracta alui fluxiones sistit, si aliquoties per diem bibatur.

Ad eadem faciunt acini, seu baccæ Cynosbati, arefactæ, inq; uino decoctæ & potæ, exemptis tamen prius interioribus floccis, quod nisi fiat arteriam facile læderet hoc medicamentum.

EXTRINSECUS.

Aqua ex floribus Cynosbati distillata, non tantum refrigerandi uim habet, sed etiam aculeos carni inhaerentes resigit, si linteola in illa madefacta imponantur, adeo attrahendi magna facultate pollet. Estq; hoc singulare experimentum.

Lignum Cynosbati flagellis idoneū est, quo remedio desidia & insolentia seruulorum, & male morigeræ familiæ quam efficacissime emendari possunt.


De Cynorhodo Barbari. Cap. XIX.

Rosa.

Sam Rosen.

Kurigodley. Caninarosa.

Wildheekrosen.



ISI ME ODOR ROSARVM TAM HORTENSIVM
 N quam sylvestrium fragrantissimus recrearet, mirum si non de
 Rose

Rosis scripturum multiplices illæ ac confectæ Poetarum fabulæ opprimerent. Ne uero & nos tempus inutilibus nugis & figmentis teramus, nunc non dicemus quo pacto Rosa non nisi candida per initia, mox uulnerato ueneris pede, dum Adonidi opem laturo præcipiti cursu per dumeta rapitur, adrubucrit, quin potius Rosæ genera tam satiuæ quam syluestriæ, quæ sane multa & uaria in Germania nostra reperiuntur, exponemus, a syluestribus initium facturi. Rosæ syluestris quatuor fastigia constituere licet, quæ omnia idem fere lignum, eisdem aculeos, eisdemq; frondes ostendunt, rursus uero in his aliud grandius, aliud exilius, aliud fortius, aliud tenerius, totaq; substantia gracilius, aliud odoratius, quoddam minus odoratum cernitur. Caudex namque uulgaris syluestris rosæ admodum procerus euadit, asperrimis undiquaq; & uncinatis spinis ab imis ad summas usq; partes armatus. Quanquam autem omnium Rosarum lignum forte & solidum est, tamen in medio fungosam quandam, sicut uitis pene, medullam obtinet, licet huius primi generis, de quo nunc sermonem instituimus, solidius aliquanto atq; durius quam cæterorum omnium sit. Iam ut in historia pergamus, folia eius aliquo modo spinis uncinatis horrent, quina interdum & septena uno pediculo dependentia, per ambitum exiguis incisuris serrata, & qua terram spectant cineracea, Iunio mense appetente tam hoc quam alia quoque omnia fere syluestris Rosæ genera, calyces proferunt, quin asperis & uiridibus corticibus munitos, quibus dehiscentibus, rosæ prodeunt ex purpura diluta albicantes, quarum singulæ ut plurimum quinque constant folijs. Flos interior qui e medio relucet Rosæ multos ostendit capillos eosq; tenuissimos, qui in uertice puncta quædam exigua Milij grano haud maiora sustinent, odoris perquam gratissimi. His non tantum apes, sed & alia insecta, nempe & quæ Germani Goldtferlin/q. d. aureos scarabeos, ab aureo nimirum colore uocant, insidere solent, & inde pastum suum queritare. Cumq; folia Rosæ deciderint, id quod plerunque altero ab ortu die contingere solet, manent nihilominus rotunda & uiridia capitula, quæ Autumno appropinquante rubescunt, intus præduris seminij, quæ dura lana inuoluuntur, referta sunt, foris uero in cacumine nigro quasi operculo aduersus imbrium iniuriam munita. Hac forma ut plurimum omnium Rosarum tam domesticarum quam syluestrium sub Autumnum, apparent fructus.

Alterum Rosæ syluestris genus, tota sua substantia (hoc est, ligno, folijs, aculeis, & rosis) prædicto magis est exiguum, sed spinis & folijs asperioribus, floribus expurpura saturata candicantibus, & odore iucundiore ac uementiore præditis. Quin & folia cineracea odorem spirant suauissimum maxime uento flante,

^{1.}
Vulgare syluestris rosæ genus.

^{2.}
Syluestris rosæ aliud genus.

Tertium

3.
Syluestris Rosæ
genus tertium.

Tertium syluestris Rosæ genus, quancū magnitudine foliorum secundū antecedit, tamen spinas gerit non perinde minaces, & frondem prorsus in odorem, Rosæ quoque huius generis aliquanto sunt maiores, colore magis rubro & elegantiore tinctæ, odoris meo quidem iudicio inter omnia genera suauissimi, tactu pinguiore & magis lentæ. Luxuriat hæc Rosæ plerumque in humectis ac minime fertilibus auenaceis agris, alijsq; nonnullis dumetis, raro supra altitudinem trium cubitorum sese attollens, & quæ intra humum hinc inde serpentibus radicibus subinde iuuenescat, facileq; & nullo negotio plantari queat.

4.
Rosæ syluestris
quarta species.

Quarta syluestris Rosæ species proximæ per omnia respondet, nisi quod rosas profert prorsus candidas, odoris non tam iucundi ut illa. In siccaneis agrorūq; limitibus, iuxta pitinera Iunio & Iulio mensibus in flore suo apparet. Hæc omnium Rosarum utilissima est, & in nostris regionibus non magni est nominis.

NOMENCLATURÆ.

Quamquam ueteres diligentissime Rosarum nomenclaturam uariam distinxerint, tamen omnium siue hortensianarum, siue syluestrium uulgare & usitatum est nomen apud Græcos quidem ῥοζα. Latinis uero Rosa, & Germanis Rosen/Arabes hanc Nard uocant teste Serapione cap. cvij. Hebræi ורד Vered, & ורדא Varda: hinc מרדן Me vardin, aquam rosaceam in scriptis Hebræorum medicorum appellant. Hæc generales omnium rosarum nomenclaturæ sunt, at si partium Rosæ appellationes desideres, paucis quæ subijciemus accipe.

1. Folia Rosarum, Rosenbletter.
2. Vnguis, das vnderst weiß an den blettern/Græci ἵνχα dicunt.
3. Calyx, der oberst rosen knopffsche der auffgangen ist
4. Cortex, die fünff cuffersten schelet/oder rinden desselben knopffsins,
5. Flos Rosæ, die gäle düpflin in der rosen/oder die blüm.
6. Capillamenta, seindt die härlin darauff die gälend düpflin stehen.
7. Caput, der rosen haupt/oder das vnderst am rosenknopff so gegen herbst roht würt.
8. Semen, der samen/nemlich die harten steinlin so im rosen haupt gesunden werden/hoc est, lapilli illi duri qui in capite Rosæ includuntur, ex quo nouæ plantulæ Rosarum proueniunt, sed tarde. Qui Rosarum semen Anthemon uocant, decipiuntur illis, uide Celsum.
9. Lana, seindt die rauhe härlin darinn der steinechre samen verwicklet ist
10. Fructum Rosæ maturum & rubrum, Germani Büttel/Butten/Arßfigeln nominant. Exposui paucis ex sententia ueterum, partium Rosæ nomenclaturam, nunc de appellationibus syluestris Rosæ, quam hoc capitulum

repecuo

tepeculiariter tractandam suscepimus, aliquid dicamus. Primum genus syluestris Rosæ, quod meo iudicio Cynorhodon Barbari fuerit, Germani Wildtheckrosen / Hanbüttel / vnd Büttelrosen nuncupant. His spongiolæ seu pilæ quædam crinitæ, rotundæ & subpurpureæ adnascuntur. Germani Schlaßfunz appellant.

Alterum genus Germanis nonnullis Weinrosen / frawenden / Marien doin / hoc est, si interpreteris, Spina Mariæ nominatur.

Tertium & quartum genus Hanrosen / Haberrosen / vnd feldtrosen *Rosa campestris* Germani uocauere.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Omnia Rosarum tam syluestrium quam domesticarum genera refrigerantis sunt & astringentis naturæ, præsertim uero Rosæ syluestres aridæ, quarum in multis magnus existit usus.

INTRINSECVS.

Syluestrium Rosarum maxime earum quæ Haberrosen appellantur, aquam distillatam nonnulli maioris faciunt, & efficaciorē credunt, quam domesticarum. Ea namque quibusuis calidis affectionibus prodest, refrigerat namq; & reprimi omnes cholericas & acres exhalationes, & cor in deliquio animi confortat. Ad confectiones quas uocant Manus Christi, & Zulapium rosatum, ego primo loco eas quas uocant Haberrosen, secundo quas frawenden / tertio rubras domesticas eligerem.

EXTRINSECVS.

Aqua ex ijs rosis quas nunc commemorauimus distillata, doloribus capitis in linteolis imposita, neque non fronti pari ritu applicata epiphoris oculorum unice prodest. Si quæ uero aliæ sunt Rosæ tam syluestres quam domesticæ facultates, eas statim sequenti capite docebimus.

*De Rosa hortensiana, cuius effigiem proximo
superiori habes capite. CAP. XX.*

ROSAE HORTENSIS MULTIPLEX EST DIFFERENTIA. Alia namq; candida, alia ex purpura albicans, quædam rubra. Rursus inuenias in hoc genere, quæ simplici, deinde et quæ mul-

multiplici foliorum ordine contextæ uideantur. Omnium uero generum eadem facies, quod ad frondem & aculeatas uirgas pertinet, licet candidæ proceritate rubras superent.

Rosarum uaria est electio. Mihi quidem syluestris quas præcedenti capite tertio loco descripsimus, deinde domesticæ rubræ simplices, postea rubræ ex et purpura albicantes, eeq; multiplices, deniq; albæ & ipsæ multiplici foliorum ordine intertextæ arridēt. Rosam recentem a longinquo olere, siccam propius, scripsit Plinius lib. xxi. cap. vii.

NOMENCLATURÆ.

Nomenclaturas Rosæ tam syluestris quam domesticæ, nec non partium illarum superiori proximo capite tradidimus. Quanquam autem ad multos alios flores, præsertim in linguam Germanica uox Rosen/hoc est, Rosæ accommodatur, uidelicet cum dicimus Winter rosen/hoc est hyemis rosas, & Damascener rosen/hoc est, Damascenas rosas, &c. tamen de illis hoc loco non est instituta oratio. Nam in hoc capite de illis tantummodo agimus quas horti nostri nouerunt, quasq; ueteres Puniceas, Milesias, Rubras (Germa. rot rosen) Albas (Germa. weiß rosen) uocauere, Latini multæ fecere huius genera, nempe quasdam prænestinas, alias Campanas, nonnullas cerotinas, aliquas Trachimas, has Alabandicas, illas Spermonias appellantes, ut interim Græcas, Græculas, & Centifolias præteream, quarum cognitionem quisquis exactam desiderat, legat quæ Ruellius uir doctissimus de natura stirpium libro primo cap. cxxvii. annotauit.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Veteres quæcunq; Rosa contineret, tanquam quæ in medicina magni esse possent usus, diligentissime asseruabant. Neque quemquam esse puto, qui omnes Rosæ facultates explicare sermone queat. Ex ea namque non tantum succus & aqua distillata, uerum etiam Serapia, Electuaria, conseruac; & alia id genus conficiuntur, ut interim mel, Saccharum, acetum, oleumq; rosaceum taceam, quæ omnia quanti in medicina momenti sint, neminem ignorare arbitror.

INTRINSECVS.

Quo pacto uero aqua, Saccharum, mel & acetum rosaceum conficiatur, omnibus fere notum est, his enim in calidis affectionibus & febribus magnus & frequens ubique est usus, & maxime probandus. His cum non tantum refrigerantur, sed corroborantur tam cor quam cerebrum

brum, id quod experientia manifestius fecit, quam quod probatione egeat. Veteres non solum recentes Rosas magnifecere, sed & omnem dederunt operam ut semper earum usus esse posset. Quare partim succum folijs exprimebant, defectis forfice unguibus (sic appellantur candidæ foliorum partes) reliquum in pila prementes, & terentes in umbra donec cogeretur, qui ad varios postea usus recondebatur: partim folia Rosarum sic cabant, quibus ad profluuium ventris postea utebantur, hoc quo dicemus modo. Decoquatur manipulus foliorum rosæ rubræ aridorum, in dimidia mensura uini albi, & exhibeatur his qui fluxionibus alui laborant, aliquoties per diem bibendus. Quod si morbo prædicto calor coniunctus fuerit, aqua rosæ decoqui debebunt.

Adeadem faciunt rosarum arida capitula eo quo diximus more parata.

Rosæ recentes earumque succus pro ratione ipsius morbi sumptus aluum durum emollit, id quod experientia confirmat.

Semina dura quæ capitibus rosarum insunt, in puluerem redacta, ac è uino pota, calculeum traduntur pellere.

Easdem facultates nonnulli Spongiolis (Germanis Schlaßcingen uocatis) quæ sylvestribus adnascuntur Rosis, si in puluerem redactæ, aut in uino decoctæ calidè sumantur, tribuunt.

Fructus Rosarum rubeus ubi maturuit, tota sua substantia tundi debet, & succus exprimi, posteaque siccari, demum in puluerem redigi. Hic gonorrhoeæ, & tam rubris quam albis mulierum mensibus singulari experimento medetur.

Possunt rubra ista capita, antequam maturitate mollescant, integra conservari & siccari, & ad prædictas affectiones uino decoqui & potari, quod medicamentum & dysenteriae & cruentis excreationibus unice prodesse experientia non semel docuit.

EXTRINSECVS.

Rosæ rubræ aridæ uino decoctæ tū percolatæ, ac probe expressæ, succus siue decoctum salubriter calidis capitis doloribus, nec non aurium, oculorum, gingiuarum, sedis, & uulvæ, pinnae illitum, siue infusum auxiliatur.

Idem expressus rosarum liquor mediocriter calidus, inflammationibus præcordiorum, humidis stomachi uitrijs, ignique sacro utiliter imponetur.

Ad easdem affectiones non tantum acetum, sed & oleum rosaceum usurari potest, prodestque oleum rosaceum urentibus pustulis, singulariter tempore pestis.

Flos qui in medijs rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter inspergitur.

Breviter


Breuiter quæcunque calidæ & cholericæ passionēs uexant, eæ Rosæ, aut earum aqua distillata, aceto, oleo uel compesci poterunt. Odor namque fragrantissimus Rosæ doloribus & imbecillitati capitis uel maxime prodest. Plura alia Rosæ iuuamenta ex his quæ diximus, quotidie colligi possunt.

De Oxyacantha. Cap. XXI.

S PINAM HANC ACUTAM FACILE IN HORTIS MEIS patior, cum propter elegantissimos quos profert flosculos, tum uero maxime quia racemoso commendatur fructu. Solet autem hæc in asperis & lapidosis agrorum limitibus nullo negotio prouenire, nō enim hanc tantum Olympus, sed & Germaniæ multæ prouinciæ habent, utpote Hassia, Rhenicq; tratus, necnon asperrimi montes ad fluuium die Nabe Germani dictum siti, in his inquam locis Oxyacantha luxuriat. Spinosa hæc arbor sæpe multos ab radice mittit caudices, acutissimis undique spinis, ijsq; stellam pene dimidiam, aut aculeos Vux crispæ referentibus, sed aliquanto asperioribus armatos. Folia Cydoniæ mali haud multum dissimilia apparent, nisi quod angustiora sunt, uiridiora & solidiora, per ambitum aliquantulum serrata, gustu acido & subaustero ueluti Oxalis prædita. Flores profert hæc arbor Maio mense, eosq; speciosos, multiplici foliorum textura stipatos, stellaros insuper, & cærei coloris, quinos aut senos sæpenumero tenuissimis petiolis coniunctim insidentes. Hi autumnō appetente in acinos abeunt oblongos, botris exiguis similes, coralli j rubri colore tinctos, gustum acidum & subausterum obtinentes, intus nucleos suos uti & alia id genus fructus habētes, e quibus plantulæ Oxyacanthæ sed admodum tarde gignuntur, quare surculis potius quam semine hanc arborem feri consultius est. Nam consuevit hæc arbor quorannis e radice quam plurima noua germina protrudere, quod & Cydonia arbor facit quas subinde plantare licet. Radix Oxyacanthæ admodum capillata existit, longisq; fibris luxurians. Lignum eius cærei est coloris, medullamq; obtinet fungosam.

NOMENCLATURAE.

Germani hunc fruticem ab acido sapore acinorum & foliorum *Samerach*/alij *Verfing*/vnd *Erbsal* uocant. Estq; is proculdubio id spinæ genus quod Dioscoridi libro primo cap. cviij. *ἰσχυράνθη*, hoc est, Spina acuta, *Pyrina* & *Pyxanthos* dicitur. Officinæ *Berberim* uocant. *Serapioni* cap. ccxix. *Amirberis*, *Acfa*, & fructus eius *Zaitah* dicitur.

*Oxyacantha, officinis Berberis.**Sawerach.*VIRES AC TEMPE-
ramentum.

Oxyacantha frigida est & sicca, potestq; ad calidas affectiones utrinque, necnō celiacos affectus ulsurari.

INTRINSECVS.

Quidam ex acinis Oxyacanthæ uinum exprimunt, quod per totum asservant annum, Estq; hic liquor alui quibusuis fluxionibus, qui a calore originem trahunt, cuiusmodi eo tempore pleræque sunt, quo dysenteria homines uexantur, utilis, non solum enim sitim immodicam restinguit, sed etiam continuos ac diuturnos alui fluxus cohibet.

Idem abundantiam mullierum sistit, stomachum & hepar corroborat.

His facultatibus acini Oxyacanthæ melle aut Saccharo conditi pollent.

Ad eadem etiam Maio mense aqua e floribus & folijs distillari potest.

Quin & maturos acinos si siccentur, posteaque aqua uiua mollescant, ad ea quæ diximus exhiberi cōueniet.

Qui in calidis morbis uomitionibus continuis infestantur, bilemque euomunt, his Oxyacanthæ usus salutaris est.

Folia tenera Maio mense, acinī Autumno induratis quam accommodatissimi sunt.

EXTRINSECVS.

Tradunt nonnulli acinos Oxyacanthæ maturos tuſos, ac cataplaſmatis inſtar illitos non ſolum abſceſſus calidos lenire dolore mitigato, ſed & illos rumpere & ad ſanationem promouere.

Quodq; mirum uideri merito debet radicem illitam aculeos & ſpicula extrahere quidam aſſerunt. Ego corticem radicis magis probo, nam radicū cortices plerunq; humidioris ſunt qualitatē & efficaciores. Faciant ergo periculum Chirurgi quid iſ cortex poſſit.

De Ribe.

Cap. XXII.

^{1.}
Ribes hortenſe.

A

RBVSCVLA HAEC TENERA ET SVRCVLOSA, qua acinos illos acidos proferit, in hortis hodie plātat. Caudicē, ramosq; habet ſpadiceo cortice uestitos, folia uero nigricantia & ferrata, vitis puſillæ ſimilia, formamq; Groſſularis, ſeu Vuæ criſpæ frondis æmulantia, ſed aliquanto maiora & nigriora. Maio mense pallidi, exigui, & ſtellati emicant ſcoſculi, qui in rotundos poſtea abeunt acinos, eoſq; ſenos aut ſepenos tenuiſſimo pediculo ex ordine dependentes. Hi circa Diui Ioannis natales ferias maturitate rubescunt, guſtu acidi, ſed iucundiores fructu Oxyacanthæ.

^{2.}
Ribes ſylueſtre.

Sylueſtre Ribis geus in littoribus fluuiorum, & torrentum quandoq; reperitur, uirgis, folijs & fructu hortenſi conſimile, niſi quod longe alium baccæ eius ſaporem habet, nimirum iniucundum, guſtatæ namq; uomitiones cient, & ſaſtidia pariunt.

^{3.}
Halimus.

Extat porro alius frutex baccas proferens plane rubras, corallijs rotundis forma ſimiles, acinīs Ribis haudquaquam maiores, easq; plerunq; binas coniuictim inſtar gemellorum uno pediculo ſuſſultas, guſtu ingrato præditas, ut quæ guſtatæ nauſeam & uomitus cient. Caudex huius & ramuli cineraceo cortice uestiuntur, folia altera parte incana cernuntur, forma Cydoniæ mali frondem referentia, ſed longiora, ita quidem ut ad Oliuæ folia accedant, niſi quod illis multo ſunt latiora. Naſcitur hic frutex inter cæteras ſentes in dumetis & frutetis, Aſiatæ admodum familiaris, quæ in regione ſecus itinera, & uiuis ſepibus inuenitur.

NOMENCLATVRÆ:

Si ſpinis armatum eſſet Ribes ueluti Vuæ criſpæ, non dubitarem illud Rhamnis

Ribes.

Sanct Johans treibhel.



Rhamnis accensere. Cum uere aculeis careat, uocabo cum reliquis RIBES, quoad emergat aliquis, qui nobis genuinum eius in Diosco. alijs uere rei herbarie scriptoribus ostendat nomen. Placet autem in praesentia cum bona omnium herbariorum uenia, Grossulam hortensem, siue rubra, hoc est, Germanice *Zamme grossel* / oder rote *Grosselbeer* in nominare. Ruellius de natura stirpium libro primo cap. cvi. quosdam Grossulam transmarinā appellare scribit. Ac fruticem quem tertio loco delineauim⁹, & Alsatiae familiarem esse diximus, Halimum, seu ut alij legunt Alimum Dioscoridis libro primo. cap. cv. descriptum esse existimo.

Scrap. cap. 291.
Auicenn. lib. 2.
cap. 588.

adus.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Arabes rei herbariae scriptores uno ore Ribes frigidum & siccum esse pronunciant. Debet uero ad arduas febres, & calidas alui fluxiones, non aliter atque Berberis usurpari.

INTRINSECVS.

Quae de fructu Oxyacanthae proximo capite diximus, ea de acinis Ribis

RR ij

quoque fere intelligi debent. Exhibendi sunt illi ægris, qui ardentibus laborant febribus, neque non his qui calidas alui fluxiones patiuntur. Namq; hi acini sicut & Serapia & eclegmata, atque Rob (ut uocant) de Ribes, sitim immensam restinguunt, uomitiones sistunt, cibi appetentiam inuitant.

Quidam Saccharo has baccas condiunt sicut & Cerasa, quo pacto pueris uariolis, alijsq; alui calidis profluuijs laborantibus apprime conducit.

Baccæ Ribis in sole siccatae, ad easdem affectiones asseruari poterunt. Reliquas cum Oxyacantha easdem uires obtinet Ribes.

Radicē Halimi conuulsa, rupta, torminaq; mitigare, drachmæ pondere in aqua mulsa potam tradunt. Ego nondum expertus sum utrum sic se habeat nec ne.

Solinus Halimum famem compescere scribit, quod equidem facile crediderim, siquidem ubi baccas illius uel semel degustassem, quamprimum satiatus fui, nec ab eo tempore unquam tanta me inuasit fames, ut prædictū deinceps appeterem fructum.


De Sambuco. Cap. XXIII.

8. AMBVCVM NEMINI IN GERMANIA IGNOTVM esse arbitror, quapropter quo pacto, quo in loco & quo tempore ille gignatur, multis exponere nihil attinet, cum omnibus que

1. *Sambucus uulgaris.* fit Sambuci facies, constet. Vix enim inter omnes arbores aliā quamcumq; reperias uulgiorem, & quæ adeo sine ullo negotio & plerumq; humectis & tenebrosis locis, iuxta muros, sæpes, alijsq; incultis nascatur atq; Sambucus hic noster. Quæ quidem quod ad frondem, flores, fructum & odorē attinet, Ebulo ita similis existit, ut ueteres Sambucum & Ebulum sub uno semper genere comprehenderint. Folia namq; gerit per interualla quinque plerunque, interdum & septem, rarissime autem octo ex uno pediculo dependentia, similitudine fere nucis iuglandis, sed per ambitum minutim serrata, grauissimiq; odoris. Florem fert in umbellis copiosum, & frequentē, ac uno quidem eoq; grandiusculo pediculo subnixum, qui Maio mense gratissimum spirat odorem, & in uirides tandem acinos abit. Hi Autumno appropinquante maturitate nigrescunt, non aliter atque Ebuli baccæ, cibo auicularum, utpote passerum, sturnorum, & turdorum magnopere expetiti, grana intus continentes exigua, sesamacea. Atque hoc Sambuci est semen, ex quo frutices noui prægigni queant si seratur.

2. *Sambuci aliud genus.*

Aliud proin Sambuci genus quibusdam in locis à me obseruatum olim gignitur, quod baccas fert in maturitate sua ex candido luteas, quod ad cætera

*Sambucus.**Bolder.*

tera, hoc est, caudicem, cordicem, folia, flores, & gustum, attinet Sambuco vulgari consimile. Neque tamen ubique locorum hoc Sambuci genus reperias. Accredo equidem non multis usum aut observatum fuisse.

Sunt qui Sambucum medulla carere asserant, cum tamen nulla arbor magis conspicuam, & fungosiore habeat, Sambuco ipsa, maxime quod ad anniculas virgas attinet, quæ multam sane ostendunt medullam. Solent autem pueri non tantum lignum verum etiam iam dictam medullam crepundijs suis usurpare. De Sambuco Theophrastus lib. iij. cap. xij. copiose in historiam illius uniuersam complexus.

NOMENCLATURA.

Quam Germani Bolder oder Bolunder dicunt, Latini Sambucum, ab autore (quemadmodum libro primo de natura stirpium cap. cxxix. annotauit Ruellius) cui Sambyx nomen fuerit, nominant, Galli Sus, aut Suin, Sunt qui non Sambucum sed Sabucum, a Sabu-

co instrumento musico appellatam uelint, inter quos est Serenus poeta, cuius hæc extant uicesimo septimo opusculi eius capite carmina.

Conueniet tenere radix decocta Sabuci

In geminis calidi cyathis potanda Lici.

Dioscoridi lib. iij. cap. clxviij. *αὐτὰ* dicitur, quam alij *διόσκορος* *αὐτὰ*, alij *αὐτὰ*, Galli Scobiem, Daci Sebam uocant.

VIRE S A C T E M P E R A M E N T V M.

Sambucus Galeno exiccandi, conglutinandi, modiceq; digerendi facultatem obtinet. Meo iudicio tam folia quam flores Sambuci recentes refrigerandi uel pollent, porissimum autem earum facultatum est aqua e floribus distillata, quæ utiliter utrinq; usurpari potest.

I N T R I N S E C V S.

Sambucus intro sumpta efficaciter expellendi uim habet. Radix namq; uino decocta & pota hydropem potenter exigit. Cortex medius efficacissimus est, quapropter prudentia & maturo consilio opus est, si quando hisce uti uelimus.

Turiones seu folia tenera vere lecta, modo quo diximus usurpata non perinde sunt efficacia, & imbecillioribus magis conueniunt.

Sambuci turiones in puluerem redacti, ac ex iure pisorum poti duram aluum emolliunt.

Easdem facultates habet aqua e medio cortice distillata.

Coqui ex acinis Sambuci eclegma præstantissimum discoquunt, quod ad supradicta usurpari potest.

Quædam mulierculæ caseos flore Sambuci quasi condiunt, ut alios Sambuci culinarios usus qui apud ueteres olim fuere, præteream. Vide Platina de honesta uoluptate.

Flosculorum conditura Gallos pretiosius acetum facere testatur Ruellius.

E X T R I N S E C V S.

Aqua Sambuci illita calorẽ a sole profectum restinguit, siue is caput, siue que quamcunq; aliam cutis partem tentarit.

Eadem ardentes & subitos capitis dolores & quascunque inflammationes sedat, ad quam rem Fungi incani qui Sambuco prope radicem adnascuntur in aqua florum Sambuci, aut rosacea prius macerati, deinde impositi uel maxime conducunt.

Aduersus ictus serpentium & uiperarum folia Sambuci recentia utiliter imponuntur, quæ si desit, in locum succedat aqua e floribus distillata, quæ

quæ & ulcera in fistulam dehiscencia agglutinat.

Sambucus uulvas emollit insidentium decocto.

Is qui podagra tentantur, cum seuo taurino aut hircino profunt illita folia.

Succus ex acimis Sambuci expressus cœruleo colore inficit uestes laneas. Tradunt etiam nonnulli hunc capillos illitu denigrare.

De Sambuco sylvestri. Cap. XXIII.


IC VERO NOVVM ET INCOGNITVM SAMBVCI
H genus, & elegantissimum quidem habemus, quod ex opacis uliginosisq; sylvis & ferarum lustris proferimus, quo in posterum & ipsum innotescat rei herbariæ studiosis. Ac non dubito si uel in scriptis aliorum uel nostris, hanc Sambucum nostri sæculi Herbarij nonnulli reperire potuissent, quin sibi, ut sunt laudis, & alienorum laborum cupidi, illum magno cum fastu uendicassent. Inuenias enim ex eorum numero quosdam qui cum omniū stirpium cognitionē sibi arrogent, nihil tamen in medium adferant, nisi quod uel ab alijs prius tractatum, aut certe uulgatissimum aliquin extiterit. Quanquam uero non erat cur magnopere sibi in his placerent, aliosq; a quibus ea mutuati fuerant, uel contemnerent, uel cōuictis incescerent, tamen mirū quam alienis plumis superbiant, sibiq; persuadentes a nemine animaduerti posse, quod alienos sibi usurpent labores, & utcumque animaduerratur licere sibi quodcunq; lubet arbitrantur. At quamuis impune hæc illi faciant, summamq; nihil minus inde laudem & gloriam aucupari studeant, non tamen obstare poterunt, quo minus suas quæq; auicula plumas agnoscat. Sed relictis his historiam sylvestris Sambuci prosequamur.

Ea fronde, cortice, ligno, medulla, odore denique & sapore per omnia uulgarem refert, floribus duntaxat & fructu ab eadem dissidens. Flores namq; subluteos, formaq; stellatos, non in umbellis ut illa, sed compactos instar vitis aut Ligustri, & multo etiam celerius, nempe Aprilis mente, profert, qui in acinos abeunt Augusto mense rubescentes, miniq; colore tinctos, racematim ē pediculis dependentes, iniucundi plane saporis, ē quibus nouæ plantulæ si ferantur progignuntur, abeunt.

NOMENCLATURAÆ.

Omnis Sambucus apud Germanos *Bolder* dicitur, quod excauari facile queat, cum habeat medullam fungosam. Præsentem uero Sambucum

Sambucus sylvestris.
Waldtholder.



cum Gallorum cantum nō exaudiat, Wildenwaldtholder, oder Birschholder, hoc est, Sambucum sylvestrem, aut ceruinam appellare necesse fuit, propterea quod in syluis proueniat, & a ceruis magnopere expectatur. Quod si uero Herbarij nostri id minime cognitum habeant, uti non dubito, non grauabor illis quod me experientia docuit indicare. Nam & ego nō parum temporis syluis stirpiū gratia peragrandis impendi, didiciq; Ceruum hanc Sambucum sylvestrem, sicut & Solanum hortense, cuius libro primo cap. ci. meminimus, magno desiderio inquirere. Vbi namque locorum duas eas stirpes prouenire intellexerit, eo se confert. Quodq; mirari subit, solent binæ hæ stirpes plerunque eodē situs occupare. Hisce ceruus unice delectatur, folia utriusque non baccas decerpens, unde intelligi potest, fructus hosce frigidioris esse qualitatis, ac feris, nedū alijs iumētis & hominibus minus salutare, id quod natura bestias docet, quod

idem in Esulis a quarum esu animalia tam syluestria quam domestica abstinere, animaduertere licet. Præterea quod non minus admiratione dignū censeo, obseruauī Ceruum solum folijs harum plantarum uesci, non autem Ceruam,

Ceruum, nisi ea prægnaus fuerit, & ceruum in utero gestauerit, tum enim & ipsa harum stirpium desiderio renetur, & illarum folia degustare solet, aliàs nunquam. Iam licet in Galeno & Auicenna alijs ueterum scriptis pleriq; non legerint, uera tamen sunt. Neque mirum si quotidie multa alia de quibus ueteres nihil scripsere contingant. Est enim natura miraculorum plena, & plura efficit quam ingenium humanum comprehendere queat. Sed quoniam Solani hortensis mentio incidit, dicemus obiter, illud nobis Mandragoram eam uideri quam Theophrastus lib. vi. cap. ij. sub finem describit.

VIREs AC TEMPERAMENTVM.

Sambucum syluestrem frigida naturæ esse iudico, ita quidē ut pro Mandragora si illa desit usurpari queat, quod idem & de Solano hortensi intelligi uolo.

Verum enim uero quia Solanum hoc supra libro primo suis conferre aduersus ardentes febres docui, quemadmodū & rei ueritas habet, nonnulli in malam interpretantur partem, quod iumentorum & pecorum, & quo pacto morbis illorum subuenire possimus; mentionem aliquando faciamus. At suis quidem sua quoque remedia à Domino Deo proposita sunt, siquidem & suum & medicinæ creator & autor est Deus. Præterea uidemus clarissimos quondam uiros, Catonem inquam, Varronem, & Columellam remedia quibus pecorum morbis mederi conueniat, quam diligentissime descripsisse. Cur itaque hinc nostram diligentiam nostrosq; labores tam inique traducunt? Quasi uero tantum peccatum sit, si in hisce commentarijs auxilia quibus morbis iumentorum succurrendum sit, commoremur.

Disimulandum uero non est, baccas Solani hortensis somnum inducere, quod ipse tribus aut quatuor ex eo genere degustatis acinis expertus sum.


Admonendi sunt ergo omnes ut à nimio eorum usu abstineant. Scripsit ad me D. Georgius Ollingerus Norimbergensis ciuis, quosdam pueros per imprudentiam quandam aut certe famem, plures quam par erat Solani hortensis acinos deuorasse, ita quidem ut duo ex illis occubuerint, tertio supersit.

De facultatibus acinorum Sambuci syluestris nihil dum obseruaui, nec quicquam de usu illorum compertum habeo.

De Sambuco aquatica. Cap. XXV.

8 IMIHI HAEC ARBOR IN THEOPHRASTI ET DIOSCORIDIS scriptis tam nota esset, quam est Bonosis auibus in syluis

Sambucus aquatica.
Schwelcken.



cognita, foelicius historiam illius tractare possem. Nunc cum mihi in dumetis et torrentum ripis duntaxat, non autem in libris ueterum reperia sit, quid faciam aliud nescio, nisi ut faciem illius paucis conspiciendam proponam, quoad uerior & certior eorum ueteribus rei herbarie scriptoribus desumpta, cognitio eius arboris nobis manifestetur. Habet caudex & lignum eius fungosam intus medullam, sicut & Sambucus, folia dissecta, Aceris fere aut Tormalis (de quo infra cap. xxx.) similitudine. Flores fert in fine Mai mensis, eosque compactos & stipatos, flori Sambuci quodammodo similes, sed per ambitum violis magnis & candidis, quæ quatuor constât folijs, & cæteros in umbella constitutos flores, quasi custodes defendant, circumualatos, quibus decidentibus baccae subnascuntur Zinnabaris colore tinctæ, magnitudine acinos Sambuci multum superantes, quæ Autumno appropinquante maturantur, ingrati plane saporis, ita ut ei qui illas degustarit, nauseam & fastidia conti-

nua pariant. Has Bonosæ hyemis tempore summopere expetunt, ut non raro etiam illis inescatæ decipiantur ab aucupibus.

NOMEN

NOMENCLATURAE.

Hic frutex quod ad medullam fungosam & flores quos in umbellis gerit Sambuci species, & aquatica quidem censeretur poterat, & Germanice Bachholder appellari, propterea quod plerumque ad ripas torrentum inter alnos proueniat.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Quasnam facultates baccae huius Sambuci obtineant, compertum nihil habeo, nisi quod meo iudicio in eclegmate exhiberi possint ad uomitiones ciendas.

Flores cum suauiter odorati sint, solent æstate uoluptatis gratia legi, & conclauibus inferri. Neque alius eorum apud nos quod sciam existit usus.


De eo Frutice, quem Germani Hartriegel
nominant, CAP. XXVI.

INTER CAETEROS FRUTICES QUI IN DVMETIS nascuntur, & hic in altum assurgit, multis ramulis, surculisque brachiatus, folijs uestitus nigricantibus, Alni fere similibus, flore comans Iunio mense ex pallido albicante, similitudine pene Ebuli, sed magis exiguo, eoque multiplici uno infidente pediculo. Hic in uirides abit baccas, quæ Autumnno imminente nigrescunt, Ligustri, de quo paulo post, acinis pene similes. Stipitem habet durum, terebro caeterisque fabrorum instrumentis contumaciter resistentem.

NOMENCLATURAE.

Quia fruticis huius lignum, maxime cum aridum fuerit, securi & terebro mirum in modum ut diximus repugnat, ideo apud Germanos id nominis sortitus est, ut Hartriegel uocaretur, licet ea appellatio Ligustro quoque a nonnullis tribuatur, sed perperam. Quod si hic frutex arborecens hyeme folia sua non amitteret, uocarem illum Celastrum Germanicum.

VIRES




VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Quæ ex hoc frutice utensilia & rustica instrumenta, potissimum uero ad carros pertinentia conficiuntur, ea diu durant, nec facile corrumpuntur. Quid in medicina possit mihi sane compertum non est.

De

De Ligustro. Cap. XXVII.

Beinhölzen.



LIGVSTRVM IN GER-
mania omnibus fere quam
notissimum est, nihil enim
illo frequētius in uepribus,
dumetis secus itinera & li-
mites agrorum, maxime in
ripis fluuiorum (nam in his
locis inter ceteros frutices
prouenit) reperitur. Lignū
eius durissimum est, cinera
ceoq; uestitur cortice. E ra-
dice Ligustri, potissimum si
humectus locus fuerit, mul-
tæ quotannis & tenues len-
tæq; uirgæ prorepunt, folia
proferentes, oblonga, angu-
sta, uiriditatis saturatæ, Sal-
cis similitudine, quæ uel ad
hyemem usque rigidam ui-
gere conspiciuntur. Ligu-
strum apud nos Iunio ple-
runque mense, florem ge-
rit candidum, racematim
compactum vitis uiniferæ
instar, suauissimi odoris.

Ligustrum
uulgare.

Huius generis nonnulli
frutices subluteo comāt flo-
re, atque nō quidem inuentu
rariore sunt. Cæterum u-
triusq; generis flores Au-
tumno mense in acinos desi-
nunt, nigros, gustu medio-
criter dulces, quo nomine

Ligustri alia
species.

hyeme præsertim rigidiore, nec aliàs ab ausculis magnopere expetuntur.

NOMEN.

NOMENCLATVRAE.

Diosco. lib. 1.
cap. 109.

Non ignoro quosdam hunc fruticem phillyream Dioscoridis interpretari. Mihi uero quidquid hī dicant *phillyrea* est Dioscoridis, quem Latini Ligustrum uocant, Germani *Bartriegel* a duritie ligni appellant, sed perperam, ut proximo capite docuimus, nam genuinum ipsius nomen apud Germanos est *Beinhölzen* / Alij *Reinweiden* a foliorum cum Salice similitudine, nonnulli *Mundtholz* a facultatibus, alij & *Geißholz* appellant. Ruellius officinis *Alcannam* & *Henne* dici testatur lib. de nat. stirpium cap. xciiij.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Folia, flores, & acini Ligustri astringentiam uim habent. Hodie apud nos extrinsecus fere usurpatur.

EXTRINSECVS.

Aqua e' teneris Ligustri folijs, Maio mense, aut e' floribus Iunio mense distillata, gargarissatu exulcerationibus oris auxiliatur, neque non feruidis inflammationibus, carbunculisq; & pudendorum ulceribus ambustisq; igni prodest collutu. Hoc enim remedio ad prædictos morbos Chirurgi pene omnes utuntur.

Flosculi aceto macerati frontiq; impositi capitis dolorem sedant.

Acinis Ligustri maturis quidam rubello uino nigrum inducunt colorem, & ut crassius euadat efficiunt, quo magis sit uendibile.

Solent etiam illi tam nigrum quam uenerum colorem præstare, quo nomine ab his qui chartulas luforias, alias uē picturas coloribus uarijs illuminant, leguntur. Ego ex his atramentum meum olim conficere solebam.

De Ligustro potissimum ad fructum respiciens

Columella lib. x. ita cecinit.

*Per calathis Violam, nigro permixta Ligustro,
Balsama cum casia nectens croceosq; corymbos.*

Nam florum hoc uersiculo Maro meminisse uidetur.

Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur.


De arbore, seu frutice, quem Germani

den Fleinen Mälbaum nominant.

CAP. XXVIII.

Q VAM GERMANI den Fleinen Mälbaum VOCANT, EA IN-

Kleiner Nálbaum,



ter cæteras uepres & senten
in dumetis nascitur, humo
gaudens argillofa & forti.
Frutex est arborefcens &
grandis quandoque, licet in
amplitudinem magis diffun
datur, quam in altum affur
gat. Caudex & uniuerfum
eius lignum fungosam in
tus continet medullã, Folia
gerit alni similitudine, sed
maiora, rugosa, ac farina
quasi aspersa, unde illi nomē
clatura apud Germanos na
ta, & qua terrã spectat prorsus
albicantia. Iunio men
se florem producit hic frus
tex, compactum & stipa
tum, candidum, per omnia
Sambuci similem, odoris
fatīs iucundi, stellatum. Hic
in uirides abit baccas, ali
quantulum latas, ac uelut
conquassatas, per maturita
tem uero prorsus nigras, gu
stu dulces & uiscosas. Quan
quam uero non ubique lo
corum in Germania hic fru
tex gignatur, tamen in Alia
tia & apud Mediomatricos
neque non in monte toni
trui magna in copia reper
itur.

NOMENCLATURAÆ

Cum folia huius arboris farina quasi aspersa uideantur, apud Germanos
der Flein Nálbaum uocata fuit, quo loco notandum, uocem der Flein, hoc
est minorem, differentię gratia adiectam esse. Est enim alia quædam arbor
de qua proximo capite agemus, quam Germani similiter Nálbaum, sed di
scri minis

scriminis causa, den grossen/hoc est, maiorem, appellant. Nonnulli alij hūc fruticem Schwelcken quoque uocant; quę appellatio ad Sambucum aquaticam, de qua supra cap. xxv differuimus proprie pertinet, propterea quod cum illa floribus & baccis conueniat;

VIREB AC TEMPERAMENTVM.

Adquid faciant tam flores quam bacce huius fruticis, nihil certi habeo, præsertim cum quod nomen obtineat ignorem. Audiam ergo & hoc loco doctiorum sententias.

De Fraxinea arbore, quam Germani

den grossen Nalbaum nominant.

CAP. XXIX.

VM HAEC ARBOR QVOD AD APPELLATIONEM attinet ei frutici, quem superiori proximo capite perstrinximus, iungēda uideatur, ideo hoc loco mentionē eius facere uoluim⁹. Solet uero illa in altū assurgere, uliginosis & opacis syluis, & in uallibus, ripis torrentum maxime gaudens, ligno, & nigro cortice alno quadamtenus confimilis existens. Nam folia Sorbo adeo respondent, ut discerni duo illa genera uix queant, licet huius quidem magis sint exigua illius folijs. Iunio mense candidum florem hæc arbor profert, racematum instar Ligustri, sed maiorem & pleniorē, odoratum. Hic Autumno appetente in rubros abit acinos, Sambuci aquaticæ similitudine, saporis plane ingrati, ita quidem ut nimio esu nauseam excitent.

NOMENCLATURAE.

Sed bone deus ubi in Theophrasto, Dioscoride & Plinio huius arboris inueniam nomenclationes? Proinde licet in his quidem authoribus, quo loco mentio huius arboris sit facta nobis non constet, tamen in gratiam nō eorum qui omnia se scire somniant, quoscunq; interim spernentes & calumniantes, sed eorum qui ueritatis & rei herbariæ cognitionis studio tenentur, sententiam nostram in medium adferre non pigebit, qua putamus, putamus inquam, non asserimus, ne Zoili nostri quod calumniētur habeant, eam Fraxini esse speciem, & eam quidem, cuius doctissimus uir Ruellius de natura stirpium libro primo cap. lxxxij. hisce uerbis commemorat:

Vidimus tamen frequenter baccas ex quadam Fraxinea arbore ex rubro nigricantes, quibus per inopiam frugum annonæ rura uescantur.

Grosser Nálbaum.



uescantur. Ea arbor est Fraxino aliquantum humilior, folio serratiore, & per ambitum hispidiore, cætera Fraxinum æmulantur, ideo genus hoc fructiferum apud nos tantum putauerimus.

Hæc ille, quæ omnia eo adduximus, ut rei herbariæ studiosis ansam de hac arbore cogitandi præberemus.

D. Michael Hero piæ memoriæ uir, Lentiscum ueterum per Germanicam uocem Nálbaum in Columella interpretatus est, sed nihil Lentisco, cum hac Fraxinea arbore,

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Si hæc arbor Fraxini species fuerit, facultates eius paulo post descriptas sub Fraxino reperies. Nihil uero de usu eius nobis constat, nisi quod scimus baccas, amerulis, turdis, & bonosis auibz hyeme magnopere quæri.

De Sorbi quarto genere, quod Torminale uocant
 Latini, CAP. XXX.

Wilder Sperwerbaum / Eschrösel.



YL VETREM NVNC NEC OMNIBVS NOTAM PRÆ
 8 manibus habemus arborem, quæ in altissimis syluis humo cane
 6 dida

didā & forti inter Fagos gignitur, licet inter domesticas arbores, siquidem e syluis in hortos translata plantetur, nullo negotio proueniat. Corticem habet, quo caudex uestitur, læuem, & albicantem, folia Sambuci aquaticæ similia, sed magis exigua, & quæ pedem anserinum forma sua representēt. Florem fundit hæc arbor expallido album, coactum, uti fere Sambucus vulgaris, quo decidente pyra subnascuntur exigua, incana, oliuarum magnitudine, aspera, & Mespilorum instar gustu astringentia, quæ tamen non lapideum semen, sed nucleos nigros ueluti pyra syluestria intus continent. Hæc cum Autumno mollescunt, deuorantur non aliter atque alia poma, tum enim gratiora sunt palato & acerbiter deponunt.

NOMENCLATURAÆ.

Quamquam quod ad plantarum stirpiumque cognitionem attinet, maxime eam quæ ex scriptis Theophrasti, Dioscoridis, Plinii, aliorumue percipitur, nullus unquam mihi ductor extiterit, nihilominus tamen non cælabo sententiam meam qualis illa sit, si forte hoc pacto doctissimos illos magistros qui omnia se scire putant, prouocare queam, ut ipsi certiora nos doceant. Dico ergo hanc arborem quam Germani Aressel / oder Eschroselbaum appellant, Sorbum esse syluestre (Germanice wilder Sperwerbaum) nempe eam, quam Plinius lib. xv. cap. xxi. quartum genus Sorbi constituit, Torminale illud uocans. Huic nostræ sententiæ suffragatur excellentissimus noster Ioannes Ruellius, qui hac quoque arborem agnouit. Vide historiam illius de natura stirpium lib. i. cap. cxxxij.

VIRESCACTEMPERAMENTVM.

Fructus Sorbi Tormalis aluum astringit, sicut & Mespila, de quibus altero ab hinc dicemus capite.

De Sorbo. Cap. XXXI.

ORBVS ARBOR EST NON TANTVM PROCERA, sed & amplitudinis magnæ, ut quæ ramos suos longe lateque diffundat, maxime ubi spacio non destituitur. Gaudet assiosis montibus, & lapidosa terra, tractui Rheni, neque non syluis Mediomatricum ad fluuios. Saram, & Blisam dictos sitis admodum familiaris, ut uel hinc luce clarius fiat Sorbum frigidos tractus natura sua, magis amare, quam feruentia loca, quemadmodum & Theophrastus lib. ij. cap. iij. annotauit.

Sorbus.
Sperwerbaum.



Sorbus frondem gerit pinnatam, ita quidem ut uno e' pediculo dena aut
duodena dependeant folia, alæ modo in lateribus emicantia, per ambitum

Theoph. lib. 35. serrata, Lauri folijs teste Theophrasto quadamtenus similia, licet hæc ma-
cap. 120.

gis.

gis sint exigua & breuiora. Flore emicat candido, copioso. Hoc decusso fructus subnascitur, alius orbiculatæ, alius ouatæ figuræ, qui Autumno appropinquante luteus euadit, ex una parte, maxime qua soli appositus fuit, gustu aspero & astringenti præditus, & qui antequam mollescat, esitari non queat, fuscis & latis nucleis quibus prægnat, Sorbus scri posset, mihi tamen insitio magis placet. Inseritur autem malo Cydoniæ, Pyro, Cynosbato, & Sorbo torminali.

NOMENCLATURAÆ.

Fructum Sorbi, Hebræi (teste Aruch Monsteri) שורב Tolech, Græc. Diosco. lib. 2. ci 114, Latini Sorba, Galli Corma, uel Sorba, Germani Sperwel frucht vnd cap. 141. Speirling uocant. Arbor Græcis ἰϋ, Latinis Sorbus, Germanis Sperwerbaum dicitur.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Quemadmodum Sorbi Torminalis, ita & huius fructus astringit, minus tamen q̃ Mespili, teste Ægin. Sunt autē Sorba in medicina utilissima.

INTRINSECVS.

Sorba quocunque modo præparata medicinis aluum sistentibus adhiberi possunt. Quidam autumnō in clibano instar Pyrorum hos fructus torrent. Alij ea poma in quatuor dissecant partes, quas in aëre siccandas suspendunt. Nonnulli melle Sorba non aliter atq̃ mala Cydonia coniungunt.

Alij Sorba recētia in uino dulci cocto seu Sapa cōseruant. Vt ut uero parentur uentris profluuijs accommodata sunt. His ergo in cibo utentur, qui lubricam habent aluum.

Particulæ arefactæ uel in puluerem rediguntur, aut calida aqua molliuntur, uel denique uino decoquuntur ad cohibendam aluum. Breuiter facultates Sorborum pacissimis hic exprimit uersiculus.

Sorba sumus molles nimium durantia uentres.

EXTRINSECVS.

Sorba tusa & cum folijs suis aqua decocta, alui profluuijs & sedi proci-denti profunt in folio aut deffionibus,

De Mespilo. Cap. XXXII

RIA MESPILI GENERA VETERES REI HERBARIÆ scriptores ponunt. Ego in Germania nostra unum duntaxat

Mespilus.
Espelbaum.



genus obseruauit, quod licet in plerisque locis sponte sua profiliat, tamen non ubique nisi inferatur fructum præstantem ædit. Quo uere illum & foeli-
 cius & meliorem reddat, solemus Mespilum inferere Pyro syluestri aut
 Cynosi.

Cynosbato. Folia eius maiorem cum Lauro quam fructus affinitatem contraxisse videntur, licet sint aliquantulum longiora folijs Lauri, & minime serrata. Mespilus flores profert in fine Aprilis mensis, quandoq; & Maio, eosq; candidos, Amygdalæ similes, & singulos singulis pediculis suffultos, instar Cotoneæ mali, sed candidiores, qui progressu temporis in rotunda abeunt & incana poma, quinis superiore sui parte quæ umbilico similis apparerapicibus uiridibus emicantia, tarde maturescunt, & quæ non sint edendo antequam mollescant, propter insignem quam obtinent acerbitatem. Hæc apud nos non tria duntaxat, sed quinque ut plurima ossæ & prædura continent semina, unde vulgatum apud nos factatur proverbum,

Rein Jungstraw ward nie so rein/

Esse sie drey Nespeln/sie geb von jr fünffzeben stein.

Mespilus non magna indiget cura in plantando, nam asperis & incultis locis gaudet. Inter Argentinam & Badenses thermas inferiores in sylva sponte sua luxuriat, ac omnino eos fere tractus amat, quos & Sorbus quærit. Mespilum qui folijs est Apij instar dissectis, ac tribus in fructu ossiculis, nondum uidi.

NOMENCLATURÆ.

Mespilus hæc posterior Dioscoridi libro primo cap. cxxxviii. *μίσπιλον* cap. 109. sub 1101 *ἐκαστὸν* & *ἀγρινίαν*: fructus eius *τριπύκνον* dicitur: alteram uero idem autor ce Zaror, hoc est quosdam *ἐκαστὸν*, alios *σπιδόν* nominare tradit. Sorbo describit.

Nostram Mespilum ego crediderim Cratægum, seu Cratægona Theo Theoph. lib. 3. phraستي esse. Sed nemini nostra præiudicet sententia, nostra enim ita propo cap. 15. nimus, ut interea liberum cuique esse uelimus, ut sequatur quod sibi magis *κράταιον* probabile uideatur. Germani Nespelbaum arborem ipsam, fructum *Nespseln* uocant. Hebrei teste Elia *חמישית* Chamischioth, a quinque nimirum ossiculis. Galli teste Ruellio de natura stirpium libro primo cap. xcviij. Meslierum, & Neplierum nuncupant.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Mespila & Sorba utriusque generis frigida & sicca fere omnia sunt qualitatis, aluo sistendæ utilia.

INTRINSECVS.


Quæ de Sorbis diximus, de Mespilis quoque intelligi uolumus, neque enim opus est ut quæ iam ante dicta sunt hoc loco repetantur.

Solent nostri Mespila melle condire sicut pruna syluestria, quo ritu parata, calidis uentris in æstate profluuijs conducunt.

De Prunofylueſtri.

Cap. XX XIII.

Schlehendorn.



1.
Prunus sylue-
ſtris vulgaris

at; & ipſe ſpinofus, duruſq; quod ad lignum attinet.

PRUNA SYLVE-
ſtria alia magna, alia exi-
gua, nonnulla rotunda,
quædam oblonga ſpectan-
tur. Qui hæc præcedit flos
candidus eſt, ſicut & Pruni
domæſticæ. Arque iſ quidẽ
ante folia erumpit, id quod
ut plurimum in fine Martij
menſis cõtingere uidemus.
Obſeruatum eſt hunc florẽ
quam rariffime frigora effu-
gere etiam exacta iam hye-
me. Singuli uero Pruni ſyl-
ueſtris floſculi quinis con-
ſtant candidis foliolis, in
quorum medio duodeui-
ginti candida capillamen-
ta ſeu ſtamina uiſuntur, api-
cem ſingula ſuſtinentia exi-
guum & luteum. Hac ſe-
re forma omnium pene po-
morum, Ceraſorũ inquam,
Prunorum, Pyrorum, &
Malorum flores præditi
ſunt, niſi quod plura quan-
doq; capillamenta, apicesq;
oſtendant, quam huius ſyl-
ueſtris Pruni flores. Folia il-
lius rotunda ſunt, Teucrij
folijs nequaquam maiora.

Prunus ſylueſtris inter cẽ-
teras ſpinas in dumetis, ſe-
cus itinera affatim luxuri-

Prunus

Pruna sylvestria præstantissima quæ & satis magna apparent, ea sunt, quæ² augusto mense maturantur, quod in pruno sylvestri vulgari non contingit. Illius namque fructus sicut & flos ut ante diximus frigoribus occupatur antequam maturetur. Nisi enim hoc pacto ea pruna mollescant edendo non sunt, propter immensam ipsorum acerbiteriam. Pauperes pruna sylvestria igne quandoque ustulare solent, ut commodius illis uesci queant. Fames ingeniosa certe est, & multos uariosque ostendit cibos, neque quicquam sibi præscribi patitur.

*Pruni sylvestris
altera species.*

NOMENCLATURAE.

Pruna sylvestria maiora Germani *Haberschlehen* (quasi dicas auenaria, a comitatu nimirum eius frugis ita appellata) reliqua *Schlehen* simpliciter nominant. Latinis Pruna sylvestria, Græcis *πρῦνα*, & *ἄγριον κνυῖλον*, Gallis *Prunula*, *Prunelles*, & *Pelouses* dicuntur. Neque eorum sententiæ subscribendum est, qui *Acacia* illa & *Poteria* nominant. Arbor ipsa, *Prunus sylvestris* nonnulli *ἄγρια*, & *Spinus* dicitur, sic enim apud Vergilium legimus. Et *spinus* iam *pruna* ferentes. quo loco de præsentī nostro & arborecente frutice authorem loqui existimamus.

*Dioscor. lib. 2.
cap. 142.*

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Pruna sylvestria refrigerantem & astringentem uim habent, quare alui fistendi facultate pollent. Apud nostros uoluptatis magis gratia quam medicinæ usurpantur.

INTRINSECVS.

Pruna sylvestria melle condita non tantum commestationibus nocturnis proponenda sunt, sed dysentericis etiam, & alui profluuijs laborantibus exhibenda.

Ad eadem facit uinum ex his fructibus confectum, quod ad Iulium & Augustum usque menses diligenter asseruare conuenit, quo tempore dysenteria plurimis molesta est. Earundem facultatum est & decoctum Prunorum sylvestrium.

Aqua e floribus illorum distillata & pota, ad laterum dolorem singulari facit experimento. Ea uero efficacior fuerit, si flores Pruni sylvestris recentes per noctem uino forti & optimo macerati in balneo utuocant Mariæ distillantur. Hac aqua multis profui, ea namque lateris, cordis & stomachi quosuis dolores seu compressiones & puncturas dissolui.

EXTRINSECVS.

Aduersus uini penduli uitia nihil efficacius Prunis sylvestribus reperi-

tur, si hoc quo dicemus modo' usurpentur. Pruna antequam blauo' tingantur colore leguntur, & in mortario tusa, pro magnitudine & exiguitate uasis multa aut pauca uino iniiciuntur, cumq; probe uino agitatione crebra comixta fuerint, obcuratur uas per dies octo aut decem, tum intra paucos dies uinum restituitur. Cæterum possunt Pruna syluestria tusa, & in aëre siccata ad eos usus per totum annum conseruari.

Sunt qui ex immaturis Pruni syluestris fructibus aquam distillatam ad nescio quas artes adhibent, quæ omnia studiose prætereo.

De Pruno. Cap. XXXIII.

QUANQVAM PRUNI VARIA GENERA TARDE ad Gallos & Germanos commigrarunt, tamen hodie ubiq; locorum stullum pomi genus, certe hoc uel notissimum est. Prunorum secundum uaria genera, differentiæ multæ, ita quidem ut omnia enumerari uix possint. Conabimur tamen uel uulgarissima apud nos referre Pruna. Sunt ergo alia magna & nigra quædam cærea, hoc est coloris ex candido in luteum pallescentis, nonnulla purpurea, ut Fici, alia denique exigua, & uiridia Autumno maturescencia. His quasi summis generibus, multæ aliæ subsunt species, magnitudine, forma, gustu, &c. differentes. Sunt enim Pruna alia oblonga, alia rotunda, alia dulcia, alia acida, alia sicca, nonnulla postremo succosa. Quis enim omnia genera discernat? Omnium uero Prunorum caudex intus subruber, & folia nigricant, & minora Mali folijs apparent. Prunus flores profert candidos, maioresq; pruno syluestri. Floret plerunque cum Ceraso Aprili mense. Fructus os non perinde durum arque Persicæ intus continet, in quo nucleus clauditur, quod semen Pruni est, quo seri potest, & intra paucos annos adulescere.

NOMENCLATURAE.

Prunus Latinis, ~~nonnulla~~ Græcis, Pflaumenbaum Germanis, vngprunier Gallis appellatur. Fructum eius Hebraei קשחאפ Kæschæph (teste Elia Leuita) Græci ~~κωνύμυλον~~, Latini Prunum, Germani Pflaumen/Briechen/Galli vne prune nominant.

Multa sunt ut ante quoque diximus Prunorum genera, inter quæ primū apud nos locum obtinent Damascena uocata, Theocrito Brabyla, Athenæo Badrya, & Madrya cognominata, Germani Damascenen pflaumen/vnd Quetschen uocant.

Deinde

Prunus.
Pflaumen.



Deinde ponuntur purpurea, quæ ex Hispania uenerunt, Iberica, & Per
tigna uocata.

Tertias partes sibi uendicant cerea, seu cereola, Germanis gäl Kriechen/
ynd Spilling dicta.

Quarto

4. Quarto ordine collocanda sunt oblonga illa & coerulca, alias Prunida; ctyla, Germani blaw lang Pflaumen / blaw Spilling / vñd Bülsen pflaumen nominant.
5. Quinto loco exigua illa (nec enim nuce auellana maiora sunt) & Autumno prouenientia pruna Germanis Flein Herbspflaumen dicta.
6. Postremo sunt & alia genera, utpote nigra illa quæ uocant groß Rose pflaumen / & rotunda illa, magna & dura Pruna, quæ Autumno appetente maturantur, Germani Schaaffpflaumen / Latini Asinina & Pedicularia nuncupant.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Omnia Prunorum genera tum sunt utilia cum humectare & refrigerare mediocriter uentrem statuemus. Porro ab his minimum alimenti accedit, licet non minus quam Ficus recentes aluum subducendi ui polleant. Æstate itaque, potissimum Augusto mense ab his abstinendum fuerit. De Prunis & eorum natura uide Galenum lib. ij. de aliment. facult.

INTRINSECVS.

Pruna arefacta & tosta aliquanto sunt siccioris naturæ quam recentia, inter quæ Damascena, & Cereola maxime commendantur. Qui sicut in coquinis magnorum dominorum suum quoque iam pridem obtineant locū. Ex his enim tucetæ, & eclegmata comotationibus nocturnis conficiuntur. Seplassarij maiori cum emolumento illis utuntur, ut qui ex his electuariam Diaprunum appellatum conficiant, quod ad omnes calidas & siccas febres unice facit, quippe cum humectandi & refrigerandi ui polleat. Hæc confectio mihi bene placet, nam quæ Scammonium, aut Diagridium recipiunt eas prorsus detestor.

Crediderim Pruna, quorum nunc statim meminimus arida, uino bono & dulci decocta ac usurpata, calido & sicco stomacho prodesse, cumq; si durior sit emollire, licet diuersum sentiat Dioscorides libro primo cap. cxij.

Homines tenuioris fortunæ arida (quæ diximus) Pruna, uino aut uiua aqua molliunt, ijsq; in calidis affectionibus ad restinguendam sitim & calorem utuntur.

Omnia Prunorum domesticorum generalaxant & emolliunt uentrem, contra astringunt eundem syluestria Pruna, quorum precedenti capite mentio facta est. Gummi Prunorum calculos comminuire dicitur.

EXTRINSECVS.

Folia Pruni in uino decocta collutione & gargarisatu uiam, gingiuas, & tonsillas fluxione laborantes reprimunt.

Gummi

Gummi ex aceto illitum (quod idem de folijs quoque intelligas) liehenas infantium sanat.

Ligno Pruni arboris cultorum manubria quidam conficiunt, prius tamen lignum lixiuo decoquunt.

De Myxarijs.

Cap.

XXXV.

Sebesten.



QUANQVAM PEREgrinum hoc pomi genus in Germania nostra haud dū proveniat, tamen in Italiam pridem devenit, ubi, quantum audio, Sorbis inferi consuevit. Nec dubito si cultura diligens accederet, quin ethortis nostris assueferi facile possit. Eius fructus qui intus osse nucleum clausum habet, oliu similis existens, omnibus hodie officinis notissimus est. A iunre candidem arboris candido, ramos uero uirente cortice uestitos, folia esse rotunda ac medio criter magna, fructum candido lentore plenum racematim fundi. Hodie aridus ad nos defertur.

NOMENCLATURA.

Arabes hunc fructum nobilitauerunt, a ueteribus minime descriptum. Seraca. viij. Sebesten, Abahamefa, Moteica, & Mokaita nominat. Græci Myxa & Myxaria a lento succo uocant, nam.

nam ex his in quibusdam regionibus uiscum fit. Galeno quidam Serica dicta uolunt.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Myxa mediam sortita sunt temperaturam, neque nimium calida, neque abunde frigida. Quod ad qualitatem attinet, multum cum Prunis affinitatibus habent, Ægineta & Aëtio testibus. Hodie magnus eorum in medicina usus est.

INTRINSECVS.

Fructus Sebesten per se aut decoctione, in ardentibus febris, potissimum si alius sit astrictior usurpare potest.

Idem uel per se aut decocto infantibus aduersus tinea uentris exhibetur utiliter, maxime his qui alia medicamenta respuunt.

Myxa uel per se deuorata, uel decocta & introsumpta, calidæ & siccæ tussi prodesse, lenire pectus, catharrum denique calidum sedare, ardori item urinae qui fit propter mordicationem cholerae in uesica & in renibus conferre scripsit Serapio.

Rhases cap. xlii. uno uerbo inquit, Seuesten guttur & pectus lenit.


Quod si Sebesten Serica sint Galeni ut quidam putant, exigui sane sunt alimentum & concoctu difficilia. Nonnulli tamen Iuiubas per Serica Galeni intellexisse contendunt. Quare deinceps de illis agemus.

De Zizipho. Cap. XXXVI.

QVAECVNQVE HODIE IN OFFICINIS ADVERSVS asperam tussim & catharrum conficiuntur medicamenta, his Sebesten & Iuiubas (sic enim fructum Ziziphi appellant) non potestremo loco admiscunt. Cum itaque Iuiubae in medicina hoc tempore tam celebres sit, non potui committere quin hoc loco earum mentionem facerem. Sic namque affecti omnes sumus, ut peregrina admiremur, nostra negligamus, cum tamen luce clarius sit, quae nostra tellus fundit, peregrinis saepenumero ac longe petitis anteire. Arborem quae Iuiubas fert nondum uidi. Columella lib. ix. cap. liij. duo eius genera ponit, albam nimirum & rutilam statuens Ziziphum. Tradunt flores utriusque sicut & fructum, oliuae haud admodum absimilem esse.

NOMENCLATURAE.

Iuiubas Arabes primi celebrarunt, sequentibus nomenclaturis apud Serapionem

*Iuiubæ.**Ziustbeerlin.*

rapionem cap. lxxxvii. insignitas, Hunen, Zufaizet. Posterior appellatio a Ziziphu haud multum abludit: uolunt enim omnes Ziziphu Iuiubas proferre, quæ Galeno quidam Serica, alijs Aedestina dicta sint. Germani Ziustbeerlin uocant.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Arabes in Ziziphi facultatibus commemorandis nequaquam consentiunt. Serapio siquidem una cum Rhase Iuiubas calidas & humidasse contendit. Contra Auerrhoes frigidas & humidasse pronunciat. Cæterum potestis fructus pectoris utriusq; adhiberi.

INTRINSECUS:

Ad asperitatem arteriæ, & asperam tussim Iuiubæ profunt. Ex his officinæ potiones, electuaria, & alias confectiones parant.

Serapio ex auctoritate Aben Mesuæ acuitatem cholericæ sanguinis extinguere tradit.


Iuiubæ in cibo usurpatæ

nullius sunt utilitatis, præterquam enim quod difficilis sunt & tardæ concoctionis, nihil etiam nutrimenti corpori humano afferunt. Acque hæc hæc, nunc ad alia progrediamur.

De

De Corno. Cap. XXXVII.

Welsch Kirschen.



C ORNI IN GERMANIA NOSTRA VNVM DVNTA-
 zat genus habemus, nempe id quod rubeas fert baccas. Cornus
 cafre.

ea frequenter in dumetis instar aliarum syluestrium arborum inter Metensium & Treuironum urbes. Atque ad Mosellam & Rhenum fluuios sita sunt loca, & in Alsatia, in his inquam regionibus in hortis seritur, uel semine uel surculo auulso. Arbor ea lignum habet durissimum, omni medulla carens. Rami qui a caudice sese diffundunt folijs uestiuntur nigricantibus, Cotoneę mali aut illius arboris quam Germanis *Bartriegel* uocare supra cap. xxvi. docuimus, pene similibus. Floret Cornus antequam folia erumpant, Martio mense, quandoque & in Februario, flore ex candido in luteū pallescente, stellato, foliato, qui in baccas tandem abit oliuę modo oblongas, eiq; per omnia similes, primum uirides, nam per maturitatē quam Augusto mense adipiscuntur, rubescunt, gustu asperę, ubi uero emolluerint, dulcissimę, seminia seu ossa intus occultantes oliuę instar durissima. Cornum quę cereos serat fructus haud dum uidi, neque baccas eius degustauī.

NOMENCLATURA E.

Quęcunque apud nos peregrina sunt, ea *Welsch* id est, Italica, seu Gallica uocare consueuimus, qua ratione fructum huius arboris *Welsch Firsens* hoc est, Italica cerasa nominare solemus. Arbor ipsa Dioscoridi libro primo cap. cxi. *κρavia*, Cornus dicitur. Fructum Cornum in neutro genere nominant Germani, non inepte *Cornelbaum* / aut *Burbeerbaum* appellare possunt. Quidam *Thierlinbaum* uocant. Galli *Cormier* ou *Cornier*.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Tam fructui quam folijs Corni cum siccitate astringendi & obstruendi inest facultas. Fructus intro sumuntur, folia foris uulneribus recte imponuntur.

INTRINSECVS.

Fructibus Corni, qui ad Mosellam & alia in quibus hæc arbor luxuriat loco incolunt, sues saginare consueuerunt. Non tamen suisbus duntaxat Corna nata esse credamus, quin potius homini præcipue cui aduersus dysenteriam & alui profluuiā profunt uel maxime, nam potenter astringunt, non minus atque uel Pruna syluestria uel Mespila. Ad quęuis ergo alui profluuiā merito adhiberi debent.

Corna uel torrerī uel sale condiri possunt, sicut & oliuę, qua de re uide Columellam. Quidam Saccharo & melle ea condiunt, sicut Cerasa & Pruna syluestria, quo pacto parata & esitata dysentericis magnopere profunt.

EXTRINSECVS.

Folia, aut recentes toriones uino decocti, aut per se impositi quęuis manantia uulnera exiccant, sanantq;.

De Ceraso, Cap. XXXVIII.

Kirßbaum.



Cerasus sativa.

A

THENAEVS MEMORIAE PRODIDIT, LVCILLVM
 Romanorum Imperatorem, posteaq; debellato Mithridate ult.

Storia

floria potius effec, primum arborem hanc a Cerasunte pontico munitio
 pio in Italiam detulisse, fructum q̄ gentilitio nomine Cerasium appellasse:
 Cerasus hodie adeo frequens ubique locorum, nulloq̄ negotio provenit,
 ut etiam sylvarum nonnullæ ea scateant. Facilis est cultura & plantatio eius, *Cerasiorum uar-*
ia genera.
 Cerasia sativa, sylvestria, magna, exigua, oblonga, rotunda, dulcia, acida.
 In colore etiam magna diuersitas eorum deprehenditur. Sunt enim quæ-
 dam candida, alia rubra, nonnulla nigra, quædam punicea, & ex roseo ru-
 bicantia. Cerasus omnis in nostra Germania Aprili mense florem fundit
 candidum ueluti Prunus, copiosum, racematim congestum, qui in medio
 multa ostendit capillamenta quibus lutei insident apices, quod idem in Pru-
 ni sylvestris, Amygdali, Pruni sativæ, Mespili, aliarumq̄ pomiferarum ar-
 borum floribus uidere est, demptis Pyri, & Cynosbati, in quibus capilla-
 menta nō luteos sed rubros, hoc est, Bersilici colore tinctos apices sustinēt.
 Floribus ergo decussis poma sequuntur exigua, uiridia, quæ in suo quæque
 genere, aut rubent, aut nigricant, aut albicant, aut punicei sunt coloris. Cau-
 dex Cerasi quæ dulcia gignit poma cæteris procerior euadit & diutius du-
 rat. Huic si exteriorem & incanum corticem detraxeris nihil detrimenti ac-
 cipiet, sed cum interior & uiridis cortex ad lignum usq̄ ipsi contiguum in-
 cisus fuerit, statim in sequenti anno gummi quoddam medicis usitatum ex
 eo uulnere exudabit. Folia Cerasorum omnium modice serrata, ac Mespili
 aliquo modo similia apparent.

*Theoph. lib. 8
 cap. 13.*

Cæterum in tractu Rheni sylvestre quoddam & humile Cerasi genus re-
 peritur, ripis fluuiorum potissimum gaudens, ligno & fronde satiuo per
 omnia simile. At poma eius longe sunt minora satiuis, nec enim uulgare
 hortense pisum magnitudine excedunt, colore fere nigricante tincta, singu-
 la singulis suffulta pediculis, dulci sed ingrato, & qui nauseam uomitio-
 nesq̄ excitet, gustu prædita,

*21.
 Cerasus sylue-
 stris.*

NOMENCLATURA.

Cerasus Latinis, *κίρσος* Græcis, Kirschenbaum Germanis ipsa arbor dicta-
 tur. Fructum Latini Cerasu uocant, Græci *κίρσος*, Germani Kirschen. Hæc lu-
 dæi גודגאניוֹת Gudgannioth, teste nomenclatura Eliæ Leuitæ.

Iam ut Cerasiorum uaria genera per appellationes, quantum fieri po-
 test distinguamus, primum locum obtinent apud nos Germanos, quæ pu-
 nicei sunt, seu spadicei coloris, & acidi saporis, Amarellen / Wießlen /
 Weinstell / nobis appellata. Hæc forte sunt quæ nonnulli Macedonica, Me-
 rasia, & Guindola uocant.

*1.
 Satinorum Cera-
 siorum uaria ge-
 nera.*

2. *Acida, uero & uulgaria Cerasia Emmerling vnd Bloderfirsen Germanice dicta, forte Aproniana appellari poterunt.*
 3. *Nigra, German, Wildvogelfirsen / Cerasia actiana Latinis nominantur.*
 4. *Quæ iucundissimi sunt saporis & Germanis. Großbuntdfirsen nominantur, Iuliana Latine dicuntur.*
 5. *Rotunda Cerasa, Cessiana & Cecilians: Dulcia plane, cuiusmodi sunt alba (German. Weißfirsen) Duracina & Pliniana, quæ Lauro insita fuere, & amara prorsus sunt Laureæ & Amarassia nuncupantur.*
 6. *Sylvestre Cerasi genus, cuius fructus manducatus nauseam & dolorem capitis parit. Pumila Cerasus, aut Chamæcerasus dici potest, Vide Ruellium libro primo. cap. lxiij.*
- Quo pacto uero Cerasus plantari & inferi debeat, maxime ut fructus officulis careat, Vide Palladium lib. xi. cap. xij.

VIRESC. TEMPERAMENTVM.

Diphilus Siphnius, uir arte & facundia celebris, longis annorum curricula uetustior ipso Lucullo, cuius ab initio capitis mentionem fecimus, uirpote qui Lyfimachi regis successori Alexandri ætate, uixisset, Cerasiorum meminit. Cerasia inquit bonum succum creant, sed parum subministrant alimentum. Stomacho grata sunt, & eidem auxiliantur in frigida sumpta. Sed rubentiora præstant, & mælesia, quod urinam pellant & pituitam incidant.

INTRINSECVS.

Cerasia acida bonum sanguinem creant, cibi appetentiam inuitant, pituitam incidunt, crassosque humores, urinam pellunt, & aluum emolliunt, siquidem recentia fuerint. Quamobrem solent illa Saccharo quandoque condiri, ægris inflammationibus & calore uehementissimo laborantibus gratissimo cibo. Cerasia arefacta, aut in clibanotoستا aluum fistunt; debent ergo ad profluvia alui seruari.

Quidam ex Cerasis nigris sylvestribus aquam distillant, quæ amissam loquelam restituere dicitur.

Garrulitati uero pertinacium mulierum lignum Cerasi meo iudicio unice prodesset.

Gummi quod ex Ceraso destillat, uino emollitum & potum inueteratam tussim sanare traditur.

EXTRINSECVS.

Gummi aceto liquefactum lichenas infantium illitu sanat.

De-

*De Persica arbore. Cap. XXXIX.**Pfersingbaum.*

Q VATTOR PERSICAE POMORVM GENERA ERV,
diti proponunt. Germania nostra, si exactius nostras opes cen-
TT ij

scamus, non minus quam aliæ nationes, quatuor, aut fortasse plura Persicæ mali genera, profert.

1. Est enim quæ uulgare, candidum & succulentum, est quæ luteum plane,
2. est quæ rubrum, & denique quæ exiguum quoddam & præcox gignat pomum, quippe quod circa festum D. Ioannis apparet. Persica arbor quorumcunque tandem generum cum Amygdalo floret, sed florem profert magis rubrum quam Amygdalus, cui caudice, gummæ, folijs & flore satis per

Extat Persicæ arboris aliud genus, ceteris quæ hoc in capite describuntur, per omnia simile, nisi quod fructus eius, quem Augustus mense profert, admodum exiguus est, nulla ut cæterarum lanugine obdus, sed glaber prorsus, ueluti mala, uiridis, ac à sole rubicundus, glandem intus gerens exiguam, nec adeo scabram ut cæterarum, gustu uiridius aut acido, tog; gratissimo præditus, neque abunde succulentus. Hoc genus sum uidetur, cum longe aliter fructum Persicæ describat tum Theophrastus, tum Plutarchus.

Persicus rubescit auctore Didymo, quæ Platanò insita coaluit.

Quo pacto uero Democritus & alij inscripta nasci Persica docuerint, copiose ac diligenter tradidit Ruellius, libro primo cap. cxi.

NOMENCLATURAÆ.

Quæ Germanis Pfersingbaum, & Latinis Persica arbor, & Persica mala, quod ex Perside primum aduecta sit, ea Græcis *περσικὴ μῆλη* nominatur. Poma ipsa quæ ab hac arbore procreantur, Latini Persica, & Persica mala, Hebræi (teste Elia Leuita) אפרסקים Apharsekim, Germani Pfersing, Galli Pesche uocant. Sed cum multa sint Persicorum genera, distinguamus illa suis nomenclaturis, Persicum uulgare, Latini populare, & quod ægre à nuce scabra diuelli se patitur, Duracinum & Doracinum nominant. Sunt & alia Supernatia à Sabinis cognominata, Germanis Sabiner Pfersing. Postrema quæ Germani gäl summer Pfersing, Möllelin, vnd Mölleten uocant, sunt Trecacina doctorum & Armeniaca, ac Præcocia Dioscoridi libro primo cap. cxxxvi. Sunt tamen quidam qui hoc Persici genus ad Persæam Dioscoridis libro primo cap. cl. referendam uelint. Mihi tamen diuersum. Hoc genus sum uidetur, cum longe aliter fructum Persicæ describat tum Theophrastus, tum Plutarchus.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Omnia Persica frigida & humida sunt qualitatis, minime durabilia, & quæ facile putrescant, stomacho non incommodant, modo ante reliquos cibos sumantur, quemadmodum de alimentis secundo libro bene monet Galenus.

Rursus

Rursus flores, folia, & nuclei calidæ & siccæ sunt temperaturæ, & utrinque in medicina utiles.

INTRINSECVS.

In ardentibus febribus Persica mala uel perse uel condita profunt. Sed alioquin continuus eius usus damnatur, propterea quod multa phlegmata generent, & corpus nimium refrigerent, ac putres febres excitent.

Trecacina (Germanis Möllelin dicta) meo iudicio omnibus alijs tanquam præstantissima præponenda erunt.

Quidam conseruas ex floribus cōficiunt, alijs Saccharo condiunt, quemadmodum Rosæ condiri solent. Aiuntq; id conditum stomacho prodesse.

Gummi quod ex arbore Persicæ effluit uino mollitum aut bullitū ac potum, sanguinem excreantibus unice auxiliari dicitur, propterea quod obstructos pulmonis & pectoris meatus purgat, sanatq; & quemadmodum alijs tradunt, calculos uesicæ comminuit hoc medicamentum.

Quod si illi Crocum adijcias, raucedinem iuuare dicitur, nam tumores discutit, & arteriæ scabritiem lenit & emollit.

Folia Persicæ arboris tusa, succo poto, aut umbilico imposito, tinea ventris enecat, teste Galeno. Nuclei esitati tormina sedant.

Serenus cap. xxij.

Est et uis morbi quod telum commemoratur,

Cum subito dolor insanus furit, incitus ictu

Persicon, huic potum ē nucetraditur interiore.

EXTRINSECVS.

Nuclei tusi ac rosaceo aceto temperati ac illiti dolores capitis sedant.

Gummi Persicæ arboris aceto bullitum ac illitum lichenas papulasq; sanat.

De Citrea, seu Medica malo. Cap. XL.

PERSICAE ARBORIS FRIGIDVS HVMDVSQVE

fructus mentionem Citrorum quæ & ipsa frigida sunt temperaturæ, ut faciam me admonet. Quanquam uero Citrea malus in Germania non perinde frequens reperitur atque in Italia, Galliaue, propterea quod partim ignota & peregrina plerisque sit, partim uero rigida illi apud nos obstat hyems, tamen non potui committere, quin elegantissimi, oblongi, aurei & odoratissimi pomi historiam huc nostris commemo-

Citrea mala, Citrinaten.

Limones, Limonen.

Poma Nerantia, Pomeranzen.



tarijs insererem, posteaq̃
tantis, quemadmodum di-
cetur facultatibus pollere co-
gnoscutur.

Medica malus ē Media
primum & Perside in Italiā,
diligentia Palladij, postea in
alias nationes translata fu-
it. Mediæ uero & Persidi,
tantum familiarem olim fu-
isse eam arbore Theophras-
tus de historia plantarum
lib. iij. cap. iij. annotauit.

Per mercatores & Iudæ-
os, quorum singulę quoran-
nis familiæ singula Citrea
mala ad Festum palmarum
(de quo paulo post nō nihil
dicemus) obseruandum &
colendum, magnis interdū
sumptibus comparare co-
guntur) citra apud Germa-
nos primum innotuerunt,
qui factum fuit ut nonnulli
granis satis, Citream arbo-
rem plantare, summaq; dili-
gentia & studio excolere coe-
perint, ita ut hodie quibus-
dam in locis eas arbusculas
uidere liceat.

Habet autem Medica ar-
bor caudicem, Pomorum
nerantiorum pene consimi-
lem, folia Lauri, perpetuo
uirentia, ramulos fastigijs
spinulenti.

spinulendis hispido & aculeatos. Cumq; ea arbor poma ferre occæperit, tanta illi ubertas inest, ut onere prouentus semper grauetur, alijs cadentibus, alijs maturefcentibus, alijs uero subnascantibus malis. Sed hæc fecunditas Medicam arborem comitatur, non in frigidis, sed calidioribus regionibus enatam.

Pomi quod nonnunquam grandius, quandoque magis exiguum apparet, effigies caperata rugis, prælonga, interdum rotundior. Odor plusquam iucundus, & qui Martias violas fere referat, acidus sapor, amara intus grana. Hæc poma seplafijs quam culinis potius nata uidentur. Celebrata hæc arborijs carminibus quoque Matuanis in secundo Georgicon.

Media fert tristes succos, tardumq; saporem
Fœlis mali: quo non præsentius ullum
Pocula si quando sæue infecere nouerca,
Miscueruntq; herbas, & non innoxia uerba,
Auxilium uenit, ac membris agit atra uenena.
Ipsa ingens arbor, faciemq; similima Lauro:
Et si non alium late iactaret odorem,
Laurus erat: folia haud ullis labentia uentis:
Flos apprime tenax: animas, & olentia Medi
Ora fouent illo: & senibus medicantur anhelis.

NOMENCLATURA.

Arbor ipsa *μαλὴ μινδὴν ἢ περσική*, hoc est, Medica, aut Persica, Plinio uero *Ma* Dicitur alijs *Ci*
lus Assyria lib. xij. cap. iij. appellatur. Vnde conijcio ex Assyria ad Iudæos *trus* Citrea *ara*
mala citria fuisse olim allata. Galenus li. de Simpl. med. facult. vij. fructum *bor*.
eius Citrium uocari passim tradit. Theophrastus *μαλὸν τὸ μινδὴν καὶ τὸ περσικὸν κίτριον*.
nominauit. Athenæus memorizæ prodidit Iubam Mauritanorum regem
peritissimum in ijs quos de Libya ædidit commentarijs, scribere Citrum
apud Lybes Hespericum malum dici, & ab Hercule translatum id in Græ- *Citrium malum*
ciam, dictumq; inibi a quadam auri similitudine, aureum malum, quod *Hespericum*.
ædidisse Tellurem nunciato Iouis & Iunonis connubio fabulantur; unde *Aureum malum*.
nuptiale hoc pomum intelligi uolunt. Quo pacto uero Galli Citrorum ua- *Verg. Aeg. 3.*
ria genera suis nomenclaturis distinguere soleant, ex ijs quæ subijciemus *Aurea mala de-*
Ruellijs uerbis patebit. *cem misti, cras al*

Quæ auri colore relucunt poma aurengia uulgo nominat: quæ ex uiri- *tera mittam.*
di in luteum languescunt, citreola & tandem citrula nominant. Quæ ouata *Ruellius de nat.*
specie turbinantur, si luteo colore nitent, citrangula, priuatim citrea uocāt. *stirp. lib. i. cap.*
Si herbaceo colore uirent Limones dicunt: si prægrandia modo Melonum *69.*
orbiculata facie turgent, Ponceria uulgo, quasi cerea, uel potius citrea po-

nia dicunt. Sed hæc omnia fere uernacula specierum nomina a Citro deflexa cognoscuntur. Hæc ille.

Dioscorides Mala citrea *ματινά, κιδί, ῥομάνα, & κίτρου* uocat lib. i. cap. cccxvi. Germani Citrinaten / Juden äpfel / hoc est, Iudaica poma vñnd Limonen uocant.

David Kyberus ad lectorem.

PLACET hoc loco in gratiam studiosorum de Festo Iudæorum, in quo celebrando pomis citri utuntur, neq; nō de appellationibus citri apud Hebræos quædam in medium adferre ex annotationibus Pauli Fagii piæ memoriæ in xxiiij. Leuitici, quas in Thargum Onkelos a se translātū conscripsit. Ea uero sic se habent.

Arboris Citreæ.) Ita uertit author complutensis æditionis, quem hic secutus sum. Hebræi *חֲדָר* Hadar arborem esse uolunt cuius fructus *אֶתְרוֹגִים* Ethrogim, uulgo Citra dicuntur, quam uocem posuithic Paraphrastes noster. Hadar autem proprie pulchrum, formosum, & decorum significat, sicut & septuaginta hoc in loco uerterunt *καρπὸν ἐξ ὧν ὡραίων*, id est, fructum arboris pulchrum. Similiter & uulgata æditio, quæ habet, sumetisq; uobis die primo fructum arboris pulcherrimæ. Quia autem Citrum speciosissimus fructus est, ideo pro Citro arbore Hadar interpretantur, Et ex Massilia prouinciæ hodie defertur.

Et paulo post.

Celebratur etiam octaua eius (Septembris scil. mensis) dies cum magnis solennijs, uocaturq; *חַג אֶרֶב* Chag Arafa, id est Festum palmarum, in quo sumuntur fructus quos *אֶתְרוֹגִים* Ethrogim, id est, Citra uocant, & spatulæ palmarum ad innuendū quod Deus deduxerat eos per desertum ad deliciosam terram. Citra cumeunt etiam septimo die septies altare, portantes palmas, in memoriam depopulatæ Hiericho. Hæc ille.

Ex his quæ adduximus facile liquet Hebræis *חֲדָר* Etz hadar Citrea am arborem, fructum uero eius Chaldæis *אֶתְרוֹג* Esrog seu Ethrog significare. Serapio capite primo Citrum Atrog uocat lingua Arabica, uocem enim mirum nihil quod ad substantiales attinet literas (nam in punctis tantum quæ Hebræis, Chaldæis, & Arabibus uice vocalium inserviunt, aliqua apparet sed leuis mutatio) ab Hebræorum seu Chaldæorum Ethrog differente. Vnde cum Arabica & Chaldaica lingua (quæ Iudæorum a reditu ex Babilone uernacula fuit, ut multis noui testamenti uocibus, ut sunt Tabiç

tha Kumi, Berh abbera, Maran ata &c. patet) in hac uoce consentiant, nemo in posterum dubitare debet, quin Ethrog Chaldaeorum Citrum sit, maxime cum Serapio sub uoce Atrog ea dicat, quæ Galenus & Dioscorides de Citro iam ante perscripserant. Atq; hæc hæc hactenus nunc ad propositum reuertamur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Græci & Arabes in facultatibus Citri recensendis nequaquam conueniunt, ut uidere est epistola tertia lib. xi. Manardi. Nos uero quidquid Arabes, maxime Auicenna dicat, Galenum sequemur, qui Citria mala frigida esse qualitatis testatur, quo loco caro Citri, non nuclei neque cortex intelligendus est, quorum utrumque exiccantem ac non nihil calefacientem uirtutem ut obtineat necesse est. Hæc uero medicis quam coquis potius inferuire possunt.

INTRINSECVS.

Tam succus quam semina aduersus uenenum facere, & appetentiam cibi inuitare prædicantur.

Athenæus, Ruellio referente, longam scribit historiam, in qua ostendit, Citria mala multis aduersus morsus aspidum manducata profuisse. Dioscorides paucis rem absoluens, de Citro hoc pacto scribit.

Semen in uino potum uenenis resistit, aluum mouet, oris suauitatem commendat, decocto eius colluto, aut succo, estur in malacia *Astram quoq; bilem expellit.* mulieribus.

EXTRINSECVS.

Cortices Citrij pomi uestiarijs arcis impositi ab erosionis uitio uestes uendicare existimatur, eisdq; bonum odorem communicare.

De Pomo arantio, seu Nerantzio.

CAP. XLI.

QUANTVM ARBOR QUAE POMA FERT ARANTIA, quod ad perpetuo uirentia & solida folia, ac spinulas quibus horrent rami attinet, Malo medicæ admodum consimilis appareat, meo tamen iudicio longo ab eadem distat interuallo, & ad proprium ac peculiare genus referenda fuerit. Siquidem fructus eius non oblongæ, sed rotundæ prorsus figuræ est, proinde & minime rugosus. Hæc poma ante maturitatem

Duo pomi Arantij genera.

maturitatem prorsus uiridia sunt, corticem habent densum, gustu fertentē, & amarum, qui cum recens compressus fuerit, acre reddit oleum. Caro illorum, quæ in nonnullis dulcis in alijs acida seu uinosa reperitur, candidis & amaris nucleis prægnat, qui sati arbusculas producunt. Inuenias enim ciues quosdam Argentinenses. & Metenses, qui uoluptatis gratia eas plantare soleant.

NOMENCLATURÆ.

Quæ uulgo Poma arantia dicuntur, & Germanice Pomeranzen/ea nō minus quam Citria, Medica Aurea, & Hesperica cognominantur. In libello Nicandri, qui Alexipharmaca inscribitur, ita legitur, τὸ μὲν δὲν μᾶλλον ἐστὶ τὸ μᾶλλον, τὸ πικρὸν ἴσθι, hoc est, Medum malum est medicum, & d Nerantziū (uocāt) Atq; ab hac uoce Germanica appellatio Pomeranzen deriuata uidetur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Quæ de Malis citrijs scripsimus, ea de pomis quoque arantijs intelligi debent. Cortex eorum admodum calidæ est naturæ, quod Simeon Sethi animaduertit, & experientia quoque ipsa testatur. Itaque ad lentos & frigidos stomachi humores facit, nam illos discutit & educit.

Seplasiarj diligentes solent eos cortices Saccharo condiri, cibo sane utilissimo ad qualuis frigidas stomachi affectiones.

Seminum quæ in his pomis continentur, neque non carnis uires proximo capite satis descriptæ sunt. Quare relictis his ad Malum punicam nos conuertamus.

De Malo Punica. Cap. XLII

Mali punici tria genera.

EQVE PVNICA MALVS NOSTRIS REGIONIBVS maxime frigidioribus satis assueuit. Nam licet arbusculæ hæc aliquando assurgant, & prouentus spem aliquam facere uideantur, tamen frigora hyemis apud nos ferre nequeunt, tamen si Autumno appetente in figulina sicut Rosmarinus transplantata, in cellis uinarijs custodirentur, superuicturas putarim. Mala punica trium sunt generum, dulcia, uinosa, ac prorsus acida. Arbos quæ illa profert, multas teneras uirgas spargit, angustis folijs uestitas, ijsq; per omnia Salicis similibus, sed tenerioribus, ac aliquantulus magis exiguis. Cæterum non admodum magna hæc arbor euadit, sed fruticosa, flore comans puniceo, quem poma consequuntur.

Malus punica.

Granat ôpffelbaum.



tur rotunda, per maturitatē undique succulenris & rubris scatentia acinis, quæq; cōtiguīs, & angulosīs instar Granatī pretiosi lapidis. Fructus est sane speciosissimus. Eius Ruellius de nat. stirp. libro primo cap. cxxij. novem genera describit, ubi inter cætera ait, Punicum malum Charchagine laudatissimum, indeq; cognomē Malum Punicum, Granatū aliqui appellant.

NOMENCLATURAE.

Latini Mala punica. Mala granata, a loco natali, & a granis seu acinis, Germani Granatôpffel uocant. Græcis Malum panicum Diosco. lib. 1. in Nicandro & Athenæo cap. 131. idem, Hebræis רימון Rimmon appellatur (licet & arbor sic uocetur uide Ioel ii.) Chaldæis רימון Rimmona, Serapioni cap. cxxix. Kuman, quo loco deprauatam Serapionis lectionem existimo, ac, quod facile uitio librariorum contingere potuit, K pro R scriptum, nam quemadmodum Munsterus in Aruch suotestatur רימון

Rumana, nomen arboris seu Mali punicæ est in secundo Thargum Esther. Proinde uocatur exterior Mali punici cortex *sidop*, Latine Malicorium. Flores *κύττιν* Cytini, quæ nempe qui satiuæ Malo punicæ adnascuntur, nam syluestris punicæ flos *βαλάνης* Balaustium nuncupatur.

VIRES

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Dulcia teste Dioscoride stomacho utiliora habentur, sed aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt, unde in febrī abdicantur.

Vinosa mediam sortiuntur naturam.

Acida astringunt, & refrigerant, eorum usus in ardentibus febribus esse potest.

Cytini sicut & Malicorium, astringendi & siccandi vi præditi sunt.

INTRINSECVS.

Succus & nuclei in calidis affectionibus, cuiusmodi sunt ardentes febres usurpati, os recreant, sitim sedant & æstuantī auxiliantur stomacho.

Ex succo Mali punici, Rob(utuocatur) & Serapia recte conficiuntur ad prædictos morbos.

Nuclei acinorum acidi punici, in sole siccati, & obsonijs insparsi, concoctiue, fluentem aluum, stomachumq; sistunt, ad desessus dysentericorum, foeminarumq; fluxione uulvæ laborantium utiles sunt.

Cœlesti aqua madescunt bibunturq; commode sanguinem excreantibus.

Constantinus

*lib. 4. cap. 18. de
cognos. morbis.
&c.*

Has ipsas facultates tam Cytini quam Balauſtia, & Malicoria obtinent.

Constantinus affirmat Malicorium uino decoctum, ac potum omnes uentris tineas enecare, maxime eas quas Ascaridas nominant, addens omnibus Malis punicis, peculiarem uim tineas uentris enecandi inesse.

Præterea idem Constantinus lib. iij. cap. vi. de cognoscendis morbis refert, flores Malorum punicorum, neque non cortices eorum tusos, inq; puluerem redactos, ac ieiuno stomacho sumptos, unice ad frigidam facere tuſſim & catharrum.

A lepore marino demorsis Malum punicum prodesse, Nicander in Alexipharmacis testatur.


EXTRINSECVS.

Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, uirilicatis, & scdis ulcera, nomas, reduuias, & ea quæ in corpore extuberant, aurium dolores & narium uitia præsertim acidorum Malicorium granatorum siccatum, in puluerem redactum, cumq; melle temperatum ac illitum fluxum uenæ aureæ sistit, eodem Constantino authore lib. iij. cap. xix. de morb. cog.

Flores Punici mali in puluerem redacti herniam prolapsu intestini erumpentem cataplasmate repellunt, Galla addita efficacius hoc medicamentum redditur.

De Malo Cotonea. Cap. XLIII.

Blüthen / oder Quittenbaum.



Sereni, cap. 24.

Aut que poma

YDONIORVM VNVM TANTVM IN GERMANIA GE- Cydon Cretae
 nus exstat, & id quidem passim vulgatum, quod & nullo negotio misit ab oris
 apud

apud nos prouenire solet, licet aliquando nobis quoque peregrinum fuerit, quippe quod primum à Cydone Cretæ oppido, unde illi nomen aduectum & alijs nationibus communicatum fuerit. Quanquam uero nulla fere magna cura in plantatione Cotoneæ mali opus sit, eaq; ut diximus quam facillime proueniat, tamen longos annos ut grandescat requirit. Vt uero augeatur corporis mole, tamen perpetuo humili in statu subsidet, fructu scilicet incuruatos deprimente ramos, prohibenteq; parentem crescere. E radice quotannis nouæ profiliunt quam plurimæ uirgæ, quæ transferri ac plantari queant, qua ratione & Malum punica propagare licet. Folia gerit hæc arbos. aliquanto latiora, & breuiora Mespilo, à terra candicantia. Singuli eius & candidi flores, uulgaris Mali consimiles, seorsim collocati apparent, nec congestim à fronde ut in alijs pomiferis arboribus dependent. Hos subsequuntur poma forinsecus incana & lanuginosa, quæ ante Autumnum nequaquam maturantur, cumq; maturuerunt odoris sunt suauissimi, saporis uero austeri & subacidi. Cæterum continent hæc poma intus fusca semina, eaq; lenta & gummosa, quinque cellulis distinctis inclusa.

NOMENCLATURAE.

Dioscor. lib. 1.
cap. 136.

Germani hæc poma *Bütten*, oder *Quitten*/Latini *Cydonia*, aut *Cotonea mala*, Græci *κυδωνία μάλα* uocant & *χρυσόμαλα*, hoc est, Aurea mala (Germanice *Goldtöpfel*) à colore nimirum, uocant, Arbor, *Cotonea malus* nominatur, *κυδωνία μάλα*.

Veteres multa *Cydoniorum* genera commemorant, quædam *Struthia* (Germanice *groß Bütten*) de quibus *Aëtius*, alia *Mustea*, *Miscella*, *Mellitæ* & *Melimela* uocantes, quibus ea uidentur significare quæ melle condita fuerint. Quo pacto uero melle condiri recte debeant *Cydonia*, *Columella* lib. xij. cap. xlv. & *Palladius* in *Februario*, demonstrant.

Quodnam sit *Cydonij* genus *Phaulium Athenæo* dictum, mihi nihil constat. *Serapio* cap. cxxxij. *Tuffa*, & *Suffargel* nominauit.

VIRE S AC TEMPERAMENTVM.

Cydonia mala tam cibo quam medicinæ accommodata, pauperibus diuitibusq; passim utiliter usurpantur. Sunt eni facultate refrigerante & astringente prædita.

INTRINSECVS.

Rases & *Simeon Sethi* *Cydonia* antecibum sumpta uentrem astringere, postillum uero manducata contrarium agere docent.

Quod

Quod si quis largius biberit, timeatq; ne caput uaporibus & uino obruat, is confestim Cydonium malum tostum, aut electuariū de Cydonijs cōfectum sumat, quo facto, uinum minus nocebit, neq; caput grauiter feriet.

Cydonia probe tosta, nutrimentum magnum adferunt, stomacho haud male conueniunt, urinam ciunt, eructationem, uomitiones & nauſeā cohibent, maxime si a cibo sumantur.

Seplasiarij atque Archimagari succum Cydoniorum exprimere solent, ac admixtis stillatitijs odoratissimisq; liquoribus, alijsq; speciebus, ex illo electuaria & serapia conficere, in multis ægritudinibus utilissima.

Succus Cydonij mali crudi orthopnoicis salutaris est, et his qui cibum retinere nequeunt.

Breuitur Cydonia per se, neque non succus illorum, serapiacq; & electuaria et olea ex his confecta, deinde & semina & flores foliaq; ad multas affectiones uice officinæ, unde medicamenta petat, pauperibus esse queant.

Cydonia melle integra condita ægri, præsertim uero dysenterici plurimum commendant.

EXTRINSECVS.

Cydonia cruda cataplasmaris adijciuntur, ad cohibendam aluum, aut si stomachus æstuet, aut in uomitiones effundatur. Eodem ritu imposita peæstoris & epatis inflammationes sedat.

Decocto foliorum fouentur uuluz & sedes si procidant. Sed & utile est in eo uitio affectas partes decocto colluere. Earumdem quoque uirium Galia & Mespila sunt.

Semina quæ Malis Cydonijs insunt aqua rosacea madefacti ac molliti, lento, crassoq; humore ambustis igni, & linguæ gulæq; ardori (Germani die Breüne uocant) illitu medentur.

Veteres ex Cydonijs oleum teste Dioscoride conficere soliti sunt, quod & Melinum appellabant.

Reliqua si qua desiderabuntur ex his quæ diximus colligenda erunt. Neminē enim tanta eloquentia præditum puto, qui Cydoniorum facultates pro dignitate explicare possit.

De Malo.

Cap.

XLIIII.

QUAM DIVES, MIRACVLISQVE PLENASIT, NATURA rerum parens, cum omnia alia quæ progignit, tum uero Malorū uaria ac infinita quasi genera abunde nos doceat. Quis enim est qui ea tantum Malorum genera, quæ in Germania nostra proue-

μῆλον, *Malus.*

Apffelbaum.



niunt, ut cæterarum regionum poma prætercamus, aut saltem uel unius ex
 illis colores, formam, odorem, et saporem, exponere se posse profiteri aude-
 at. Nemo sane uel Clopius ipse, qui, ut apud Ruellium de natura stirpium
 libro

lib. j. cap. xcvj. uiginti fere Malorum genera enumerauit, singulas pomorum species uel nominibus prosequi poterit. Quamquam autem ut diximus natura in pomorum tam omnium quam malorum præcipue procreatione copiosissima est, conabimur ramen summatum uel uulgatissima Germaniæ nostræ Mala perstringere. Sunt enim satua, sunt syluestria mala. His quasi duobus fastigijs innumeræ fere subsunt Malorum species. Quædam enim magna, alia exigua, nonnulla rotunda, alia oblonga, hæc acida, illa dulcia, alia præcocia, alia ferotina, alia candida, alia lutea, quædam rubedinis aliquid, alia multum habent, rursus hæc foris tantum, illa & intus rubra, ac quædam deniq; rubris & oblongis notis, quæ vibicis formam referant, extrinsecus asperla conspiciuntur.

Hæc omnia quantumuis uaria ac diuersa Mali genera eisdem fere caudices, idem lignum, eisdem ramos, eadem folia, & consimiles flores obtinent, & ut cito occidunt, ita celeriter crescunt. Caudices eorum foris scabro & cano, intus cære i coloris cortice, ex quo luteum colorem conficere solent, uestiuntur.

Malus solum amat lætum, pingue, frigidum & humectum. Folia eius Pyrorum fronde rotundiora, & Cydoniæ mali folijs maiora sunt. Floret post Pyrum, in inijs plerunque Maij mensis, flore in alijs candido, in alijs roseo apparente. Maturitas Malis non eadem. Quædam enim præcocia sunt, & circa diem D. Ioanni sacrum, alia Augusto mense, postrema in Autumno maturantur. Poma seminis nigrore maturitatem fatentur.

Veteres duobus anni temporibus Malum seri docuerunt, vere nimirum *Cato.*
& Autumno, qua de re uide Columellam in libello de arboribus. *Collumel. lib. 5. cap. 10.*

Cæterum danda est opera ut a vermibus Malorum radices afferantur, quod fiet si ueteres imitati, sterus suillum mistum humanæ urinæ, radicibus ostundamus. Vermiosis namque quarumcunq; arborum radicibus, *Palla. in Februario.*
urina humana circumfusa unice prodest.

NOMENCLATURAE.

Malus Græcis *μῆλον*, Germanis *Apffelbaum* nominatur. Fructus eius Malum, Pomum, Græce *μῆλον*, Germanice *Apffel* / oder *Apffel* / Hebræis *תפוח* Tappuach. quod & arborem ipsam significat, appellatur. Germani ut uarias habent Pomorum genera, ita uarias quoque illis indidere nomenclaturas, quarum nonnullas obiter recensebimus.

Quæ apud nos prima maturantur Sancti Johans *Apffel* / Latine Præcocia mala dicuntur.

2. Quæ Augusto mense ueniunt, rubris uibicibus quasi notata & dulcia, Augstöpffel uocamus, Græce Glycymela.
3. Quæ Autumno maturescunt, ac alia quidem incana, alia lutea, alia coloribus uariiegata apparent, omniacq; dulcia, Wurtzöpffel / quasi aromatica mala, a iucundissimo nimirum tum odore, tum sapore nominamus. Capendua alijs dicta.
4. Poma uero ea quæ magna sunt alba & dulcia, in quorum utero semina per maturitatem sonant, Ruellio Passipoma appellantur.
5. Sunt deinde magna quoque & similiter dulcia, rubro colore maculata, quæ Germani Schragenöpffel / oder Bergotsöpffel nuncupant.
6. Alia dulcia candida, & turbinata & oblonga reperiuntur, Orthomastica nuncupata, Germanice Stromelting / vnd Genßöpffel.
7. Sunt & Paradisiانا uocata, Germanice Paradeißöpffel.
8. Acidorum pomorum infinitus est numerus, quorum uulgatissima Germanis his nomenclaturis insigniuntur, Bolöpffel / Weindöpffel / Heißling / Hermelting / Stremeling / Speierling / Heimeltig / Frauenöpffel / &c.
9. Postremas partes syluestira mala, Germanice Holzöpffel / quæ & ipsa non unius sunt generis. Ex his omnibus generibus, tria mihi maxime probantur, nempe ea quæ uocant Graw wurtzöpffel / post hæc, die gälen Heimelting / postremo quæ Hermelting nominari diximus.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Omnia fere Malorum genera, frigide & humidæ sunt naturæ, culinis potius quam officinis nata.

INTRINSECVS.

E uinosis pomis electuarium non aliter atque e' Cydonijs, præstantissimum conficitur, quod & palato quam gratissimum est, & in ardentibus febribus accommodatissimum, nam sitim restinguit, & languescentem appetentiam inuitat, ægris quandoque gratius quam aliæ quæcunque seplasiarum confectiones.

Acida poma uentrem inhibent, urinam pellunt, uomitionesq; & eruptiones stomachi cohibent, id quod syluestribus potissimum ascribendum fuerit.

Dulcia poma uentrem emollire, & uermes expellere traduntur.

De Pyro. Cap. XLV.

Plinius lib. 15.
cap. 15.

LINIVS ET HERMOLAVS BARBARVS PYRORVM
P. quamplurima enumerant genera. In Germania quoque non pauca

Pyrus.
Byrbaum.



pauca reperiuntur, in quibus alia grandia, alia exigua, quædam oblonga, nonnulla rotunda, alia orbiculata, alia rursus dulcia, alia acerba, alia sicca, nonnulla succosa, apparent. Hæc uero ad summa genera referentur hoc

pacto, ut alia satua, alia syluestria, quædam præcocia, nonnulla serotina dicamus.

Pyrus ante Malum cum Ceraso plerunque & Pruno florem fert, eumq; candidum. Folia illius multo sunt solidiora & rotundiora Mali folijs. Pyrus Malo grandior & annosior euadit, lærumq; solum uti & vitis uinifera amat.

Vide Colum.
lib. de arbor-
ribus ca. 24.

- Si languida arbor est Pyri, uel ablaqueata radicem terebras, & ibi lig-
neum palum deprimis, uel in trunco similiter terebrato, exte-
da cuneum si-
gis, uel si hoc desit ex quercu uermes eius arboris & nati necantur, & nasci
prohibentur, radicibus felle taurino frequenter infusis. Autor est Palla-
dius in mense Febuario titulo xxv. Prodest etiam mirum in modum Py-
ro, si quotannis fimum cum cinere illi affundas.

NOMENCLATURA.

Pyrus Latinis, Germanis Byrbaum dicitur. Fructum Græci *ἄμυρ*, Latini Pyrum, Germani cin Byr / Hebræi (teste Eliæ Leuitæ nomenclatura) *עגג* Eggas uocant. Pyrum syluestre cuius & Nicander in Alexipharmacis meminit *ἀγρὰ* Dioscoridi libro primo cap. cxxxvij. dicitur. Germani Wildpyren nominant.

1. Iam ut reliqua ex nostris Germanicis Pyris commemoremus, quæ Germani Mecherling / Alandsbyren / Kochbyren / Schmalzbyren / Sleschbyren / Bocke oder Benzenbyren uocant, forte ad Crustumina & Talerna Barbari referri poterunt. Sunt enim saporis iucundissimi, succosa admodum & fugacia.
2. At Pyra præcocia seu æstiuæ, quæ & ipsa non unius sunt generis, cum in illis succosa, alia exucca reperias, ad Superba Barbari pertinent, quo loco, & ea habenda sunt quæ Germani Gerzen / oder Pfaffen byren / hoc est Pyra dominorum aut sacrificorum uocant.
3. Inter ea uero quæ Autumno proueniunt Regelsbyren uocata, primas obtinent partes. Hæc forte Dolobelliana ueterum fuerint. Sunt & quæ Latini Pomponiana, & Mammosa uocent, ut interim ea præteream, quæ Germanis Frawenbyren / Kirchbyren / Winterbyren / Lenhartsbyren / Schifersbyren / Wallenbyren / Müllingsbyren / Lamlosen / Muscatellerbyren / ic. prætereamus.
4. Postremo loco syluestria Pyra, eademq; quarum generis commemoranda erunt, inter quæ minutissima, quæ dura & lapidosa sunt, Germani Geißbonen uocant.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Pyrorum omnia genera adstringunt, sicut & Cydonia mala. Quaræ quibus

quibusdam Pyris electuaria & Serapia conficiuntur, quibus utimur ad uomitiones, & uentris fluxiones sistendas.

Ligni Pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant: author est Dioscorides.

EXTRINSECVS.

Folia Pyri tam domesticæ quam syluestris in deflectionibus mulierum ad uulvæ procidentias aliæq; mala utilia sunt.

De Moro. Cap. XLVI

VO MORI GENERA IN RHETIIS ALPIBUS INVENIUNTUR, quorum alterū atros, alterum candidos fert fructus. In regionibus uero quæ Rheno adiacent unum duntaxat reperitur, nimirum id quod nigra gignit poma, eaq; succosa, & admodum fragacia. Hæc statim ab ortu candida sunt, cum pubescunt rubra, ubi maturum æra. Tingunt manus sanguineo colore matura, quod Pyrami & Thybes cædi Poëtarum fabulæ, quas Scolis relinquemus acceptum referunt.

Ouidius lib. 4.
Metamorph.

Morus arborum sapientissima ueteribus dicta est, propterea quod nouissima urbanarum, folia sua tenella, & ab ortu statim rugosa producat, nec nisi exacto frigore & pruinis, maxime ijs quæ perniciem adferre possit, quod ipse quoque obseruauit. Folia Mori ubi adoleuerint rotunda apparent, hirsuta ac nigricantia. Ipsa arbor grandis euadit, urbanis hortis & areis, locisq; maxime prope muros, nec procul à vite, cui amica est, teste Palladio in Februario cap. xxv. sitis, nasci gaudet.

Morus sapientiss.
sima arborum.

Morus ut quibusdam placere uideo, Fago, Vimo, Castaneo, & syluestri Pyro inferi potest. Alij asserunt Morum Populo albæ insitam candida progeneri poma.

NOMENCLATURAE.

Morus Latinis, *μωρία* ἡ συνανμία Græcis, *בבא* Bacha Hebræis, Sam. v. (licet Pyri transulerit uulgatus Bibliorum interpretes, sed reclamant omnes Hebræi) aut *שכמך* Schickmah, ut alij sentiunt, Maulbeerbaum Germanis dicitur, Fructum uulgo Mora celsi, Germani Maulbeeren uocant. De Ægyptia Moro, cum nobis ignota sit, nihil dicemus. Qui tamen de illa aliquid cognoscere cupit, is legat Theophrastum lib. iij. cap. ij.

Diosco. lib. 1.
cap. 147.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Mori fructus contrarijs uiribus pollet. Maturus quidem uentrem subducit, immaturus uero ubi aruerit admodum restringit, teste Galeno li. vij. de simpl. facult. Fructus hic & cibo & medicinæ accommodatus est.

Morus.

Maulbeerbaum.



INTRINSECVS.

Qualemcumq; stomachum Moracelli, ut uocant, offenderint, talem san-
 nerelinquunt. Si namq; is bene se habuerit hisce nihil leditur, sin uero alie-
 ter, facile in illo corrumpentur Mora. Inflam.

Inflammationibus hepatis fructus Mori, & quęcunque ex illo conficiuntur, cuiusmodi sunt succi, eclegmata, & aqua distillata apprime conducunt.

Radici cortex, aut radix ipsa in aqua decocta & pota aluum resoluit, his quoque auxiliatur, qui aconita hauserunt.

Folijs Mori recentibus, cibo gratissimo, Seres vermiculi, qui sericeum uellus conficiunt, nutriuntur.

EXTRINSECUS.

Officinę Mori eclegma conficiunt, ad oris & colli ulcera utile, quod uocant Diamoron. Sed ad hanc affectionem eiusmodi quoque medicamentum parari potest, nimirum ut succus Mororum celsi ut uocant, expressus cum melle despumato decoquatur, ac gargarissetur, hoc enim pacto usurpatus facit ad fluxiones, nomas & tonsillarum inflammationes, Sed inolefcit uis eius, adiecto scissili alumine, galla, croco & myrrha: item myricę semine, iri & thure.

Folia trita ex aceto illita, ambustis igni medentur.

Eadem cum vitium, & Fici nigre frondibus in aqua cęlesti cocta tinguunt capillum.

Feruefacti corticis & foliorum iure dentes aptissime in dolore colluuntur.

Quidam in ea sunt opinione ut credant radices Mori messis tempore incisas, gummi quoddam stillare, quod magnopere ad dolorem dentium faciat.

De Ficu. Cap. XLVII.

ALLADIUS IN MARTIO CAP. X. CVM DE FICV
Pageret, inter cętera in hęc scribit uerba. Si genera numerare uellimus immensum est, sufficit, quod omnibus eęua cultura est. Quę cum ita se habeant, neque nos conabimur tot & tam uaria Fici numerare genera, quę si quis exactius cognoscere cupiat, is Theophr. Diosco. Plinium, Martialem Poętam, & Hermolaum Barbarum legat. Si tamen in genere Ficos distinguere placet, duo illorum summa fastigia constituentur. *Fici duo genera.*
 Ficus enim alia satiuā, alia syluestris censetur. Hęc nigra, exigua, & pauciora fert poma, illa candido, grandi, & multo abundat fructu. Ficus in quibusdam Germanię calidioribus locis reperitur, Ea arbor tenerrima est & frigoribus facile leditur, ut intermoriatur. Folia gerit lara & aspera, formā referentia Platani, aut Ricini, quem Palmam Christi cognominant. Caudex

Ficus.
Feigenbaum.



sicut & teneræ ac recens enatæ uirgæ, ad nucem Iuglandem aliquo pacto
forma sua accedunt. Ficus nullum fert florem, sed una cum folijs fructum
turbinatum exiguum, verrucę instar, producit, qui in Ficum tandem abit,
cumq;

cumq; ab initio uiridem, per maturitatem uero uel candidum uel ex nigro fuscum. Nec prætereundum quod Fici folia recentesq; ac teneri turiones lacteum si decerpantur succum destillant.

NOMENCLATURAE.

Tam fructus quam arbor Hebræis תֵּנִיךְ Theenah, Hieremiæ viij. Latinis Ficus dicitur. Arbor Græcis σῦνία, uel σῦνι ἵμυς, hoc est Ficus satiaua, Germanis Feigenbaum/ Fructus isdem σῦνις, Serapioni cap. ccviij. Sin (pro quo fortasse Sycon legendum erat) Germanis Feig nominatur. Fici aridæ Græcis ἱχθυίς, Latinis Caricæ, Hebræis רִבְלֵהּ Defelah, רִבְלֵהּ תֵּנִיךְ De fælaeth theemin, & רִבְלֵהּ Defelim appellantur. Vide j. Samuelis xxx. & xxv. 2. Reg. xx. Quanquam hæ uoces proprie massam ex multis aridis Ficis compactam significant.

Cradas uocant summos ramorum coliculos teneriores, licet interpres Nicandri hoc quoque nomine Ficos ipsos appellet.

Ficaria grana quæ mihi seminis loco Ficis inesse iudico, Galenus Cera chramidas uocauit.

Syluestrem Ficum Latini Caprificum uocant. Græcis ἱχθυία.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Fici ex calefacientium & humectantium fere sunt ordine. Quæ si uel continuo, uel magna copia deuorentur, improbum sanguinem creant, & inflammationes pariunt. Moderatus tamen eorum usus tam in cibo quam medicina receptus est.

INTRINSECVS.

Galenus Ficos in senectute inter omnia poma minime sibi nocuisse testatur.

Fici aridæ Amygdalis impactis deuorant Sycophantas præclaros efficiunt, & ganæ inferuiunt. Quanquam hoc pacto usurpatas uenenis aduersari testetur Simeon Sethi.

Fici recentes aluum laxant, molliuntq; , internum calorem & sitim restringunt, stomacho tamen non usque adeo conueniunt.

Fici siccæ excalefaciunt, uires alunt, sitim stimulant, gutturi, arteriæ, rebus & uesciæ, & ijs quos longa ualitudo decolorauit aptissimæ.

Eadem feruefactæ cum hyssopo, & potæ, thoracem purgant, tussi ueteri, diuturnisq; pulmonum uitijs, hydropicis & comitialibus conueniunt.

Frequens ficorum usus improbum sanguinem & pediculos gignit.

EXTRIN-

EXTRINSECVS.

Ficorum decoctum arteriæ & tonsillarum inflammationibus gargarissatu prodest.

Fici cum Fœno græco, & hordeacea farina cataplasmatibus miscentur, & in muliebres præcipue foras.

Fici cum fermento triti, admixto sale, pestæ aliæque ulcera emolliunt, ac intra paucos dies abscessus rumpunt. Hoc medicamento regem Ezechiam usum fuisse opinor, iiii. Reg. cap. xx.

Fici cum atramento sutorio deploratis fere tibiæ fluxionibus, & cancoëthicis ulceribus medentur.

Quin & cum uino decoctæ addito Absinthio, & hordeacea farina, utilis sine hydropicis illinuntur.

Fici sonitus aurium sanare dicuntur, si crudæ terantur, & sinapi liquoreque aliquo exceptæ auribus instillantur.

Tam sylvestris quam sativæ Fici lacteus succus, coagulimodo lac contrahit, concretumque soluit ut acetum.

Hic internis corporis partibus minime conuenit, nam corpora exulcerat, & meatus nimium aperit. Foris uero illitus lepras, lichenas, uiriliginas, uitia cutis in facie, psoras, ulcera in capite manantia cum polenta expurgat.

Scribit Ioannes Ruellius lib. de nat. stirpium ii. cap. lxxxv. Taurum quantumcunque ferocem adalligatum Fico domari.

De Palma. Cap. XLVIII.

QVAMQVAM PALMA APVD NOS GERMANOS MINIME proueniat, tamen dactyli seu palmulæ quæ durum intus ac quasi lapidosum nucleum continent, ad nos deferuntur, hic enim eius arboris fructus est. Ego palmæ nucleos olim terræ commisi, e qua folijs angustis, digitalis longitudinis, Gladioli exiguis folijs similis erumpabant. Neque deinceps alios progressus faciebant, sed ut angusta, & exigua, ostenderant folia, ita nihil postea augeri uidi.

Palma Aegypto, Syriæ, Palestinæ, & Hierichunti admodum familiaris est, in ijs enim locis dactylis pascuntur porci, sicut apud nos glandibus & fagi fructibus saginantur. Veteres quinquaginta fere palmæ genera numerant, nullum tamen ex his apud nos reperitur. De Palma uide Plinium lib. xii. cap. iiii.

Palma.

Dactelbaum.



NOMENCLATURAE.

Hæc arbor Hebræis תמר Thamar, תומר Thomer, & תמורה Thimorah dicitur, uide Canticorum vij. Ioel j. Iudicum iij. Ezechielis xli. Græcis uero *πάλη*. Latinis Palma, Germanis Dactelbaum nuncupatur. Fructus eius Latinis palmula. Serapioni cap. lxi. Rorab & Hayron, Germanis Dacteln appellatur. Immatura palmula Græce *πύμα*, Matura uero *πυμνολάανος*, Galeno uero *ἰγνίαν* & *νόμι* natur.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Palmula humida est primo, & calida secundo gradu teste Simeone Sethi. Nos eiusmodi fructus diuitibus relinquemus, qui ijs maxime rebus delectantur, quæ magni uerneunt. Aduersa sane ualerudo meo iudicio pretio non est redimenda, cum per se etiam non optata mortales affligere soleat.

INTRINSECVS.

Dioscorides libro primo cap. cxxix. sicciore phenicobalanos sanguinæ excreantibus, stomachicis & dysentericis utiles esse testatur.

Frequens eorum usus minime tutus existit, siquidem continuo escit ventrem.

Galen. lib. 2. de
alimentis,

uentrem inflant, concoctu difficiles sunt, capiti obsunt & stomacho, hepar
& lien obstruunt, ac quemadmodum Simeon Sethi testatum reliquit, diu-
turnas ac frigidas febres adferunt.

Flectuarius Diaphoeniconis appellatum semuncię pondere sumptum,
pituitam & bilem ducit, teste Mesua. Atque hoc siquidem palmulis seu da-
ctylis uti uoluerimus, præstantissimum & rutissimum est meo iudicio.

EXTRINSECVS.

Ruellius de nat.
stirp. li. 1. ca. 108.
Plinius lib. 16.
cap. 42.

Palma, ut Aristoteles & Theophrastus tradiderunt, non cedit oneri
quamlibet ingenti, nec intra flectitur pandaturue, sed contra pondus resur-
git. Quapropter ut inquit Plutarchus, in certaminibus signum est uicto-
ria, quando huiusmodi ligni ingenium est, ut prementibus urgentibusq;
non cedat, sed contra pondus renitens fornicetur, Hinc uictoria Græcis *vine*
quasi *μη ἀνέχω*, id est, non cedens dicitur. Ideo, ut inquit Pausanias, certamini
bus coronarijs non aliud fere premium dabatur quam Palma, quod laetos
primus in equo sessor, & dextra manu termitem gerens Palmæ, Olympiæ
uicisset, Quamuis Græcia quatuor tantum, Oleastro, Pinu, Lauro, & Apio
coronare uictores maluerit: Olympiæ oleastro, Delphis Lauro, in Isthmo
Pinu, Nemeæ Apio: reliqui omnes fere certatores corona e Palmis contex-
ta donabantur: sed dextris gestata, uictoriæ erat indicium. Hinc ut idem re-
fert ductū, quod e Creta reuectus Theseus, cum in Delo cum Apolline cer-
tamen inijisset, palmam deportauit, inde tracta primum origine, ut in certa-
minibus uictores palma coronarentur &c. Hæc Ruellius.

Nuclei Palmarum, cæterorum more, cremati in crudo fictili, & uino re-
stincti, cinere loto, spodiij uicem efficiunt, miscenturq; in callibephara, qd si
non iustam uestionem acceperint, denuo cremandi, Hæc Dioscorides.

Ego crediderim nucleos palmarum in fictili crudo calcarię fornaci im-
positos commodius posse cremari.

De Passulis. Cap. XLIX.

V

T PASSVLAE QVIBVS HODIE PRINCIPVM AC
magnorum dominorum culinis nihil frequentius, gignantur,
mihi non constat, nisi quod conijcere facile possum, calida illas
opus habere terra. Galenus lib. ij. de aliment. facult. minimas
nempe eas quę acinis carent, in Cilicia prouenire scribit. Hę partim fulgę,
partim subnigrę apparent. Dulces palato gratiores sunt, reliquę ad uino-
sum

sum accedunt saporem, utraq; in Germaniam magna copia deportantur, suntq; nonnullæ compactæ, ac in massam quandam compressæ, aliæ uero non item.

N O M E N C L A T V R A E.

Germani Klein Roseinlin / Latini Passulas uocant, ad discrimen vuæ passæ maioris, quam Germani Meertreibel oder Rosein nominant. De vuæ passæ ut suspendatur, constringaturq; Palladius in Octobri cap. xxi. his uerbis describit.

Vuam passam græcam sic facies, Melioris acini & dulcis, & luti botryones in ipsa uite torquebis, & patieris sponte inarescere, deinde sublato in umbra suspendis, & Vuam constrictam cum ponis in uasculis, subternis pampinos sicco algore frigen-tes, et manu comprimis, et ubi uas impleueris, item pampinos addis nihilominus non calentes, & operculabis, ac statues in loco frigido sicco, quem nullus fumus infestet. Hæcille.

V I R E S A C T E M P E R A M E N T V M.

Passulæ culinæ dominorum ut diximus cognitæ sunt, in quibus ad uarias & multas dapes adhibentur. Vuæ passæ cum alijs uuis eandem habent rationem (teste Galeno) quam Caricæ cum Ficubus.

Quæ maximæ dulces sunt ex stomacho optime conueniunt, bonum alimentum adferunt, ciboq; & suauiores & utiliores sunt Ficubus. Vide Galenum de alimentorum facultatibus.


De Vite uinifera. Cap. L.

Q UANQVAM VITIS VINIFERAE NON OMNIA, TAMEN permulta eius genera in varijs Germaniæ nostræ regionibus gignuntur, ita quidem ut ea omnia & singula persequi perquam difficile sit, & nullius fere utilitatis. Si quis tamen illa disquirere desiderat, rei rusticæ scriptores Pliniumq; lib. xiiij. cap. ij. & Dioscoridem lib. v. cap. v. legat, qui omnes diligentissime, vitium & vini genera descripsere. Nos quoque ne nihil fecisse uideamur, paucis uulgarissima uitium genera nobis quidem cognita obiter recensebimus.

In tractu ergo Rheni plerumq; ex vites plantantur, maxime calidioribus locis, quas Muscateller / & Traminer a loco Traminij dicto, uulgo uocant,

Vitis uinifera.

Weinreb.



uocant, licet posterius genus Rhetiae superiori & Alsaciae familiare quoque sit. Praeterea & eas quoque habent haec regiones, quas uocant Germani Groß vnd klein frenckisch/oder Edel vnd lautter trauben, hoc est vitem nobilem.

Ad Mo.

Ad Mosellam, Rhenum, & in agro Vormatiensi vites procreantur ^{2.}
Rieling appellatæ.

Quæ uero uas *Hynschtrauben* uocatas proferunt uites, eæ in omni- ^{3.}
 bus prope regionibus uulgatissimæ habentur.

Est & aliud vitis genus quod uas facit, *Drutsch vnnd Albich trauben* ^{4.}
 nominatas, hoc in montanis Landoiæ oppidi Imperialis nascitur.

Iam & in agro qui Neopoli, Germanice *Niewenstat* uocant, oppido pa- ^{5.}
 latinatus celebri, adiacet, vitis genus habetur quod *Gensfüßel* incolæ di-
 cunt.

Aliud deinde vitis genus *Barthinsch* uocatum prope Turckheimium & ^{6.}
Vuachenheimium prouenit.

Prope *Vueissenburgum* denique (quis enim reliquarum prouinciarum, ^{7.}
Austriæ inquam & *Franconia* &c. uicium innumera pene genera persequi
 queat) vites plantantur, quæ uas *Stüschwarz* oder *Fleber* appellatas, neq;
 non quæ *Grünfranchisch* dictas, & quæ *Schwarz lamperstrauben* nomi-
 natas procreant. Atq; hæc hætenus.

Cæterum formam vitis depingere superuacaneum puto, cum nemo sit,
 qui illam perspectam ac cognitam non habeat. *Theophrastus* lib. ij. cap.
 iij. vitem absque folijs fructum produxisse scribit. Qua ratione uero vi-
 tes germinant, & plantentur manifestius est q̃ ut declarari a nobis de-
 beat. Præterea nulla est prouincia quæ non peculiarem vites plantandi ratio-
 nem sequatur, ita ut nihil certi tradere possimus. Quisquis uero hæc fufius
 cognoscere cupit, *Columellæ* quartum librum, & *Palladij* lib. iij. & quartū
 & undecimū legat.

NOMENCLATURÆ.

Hoc loco non generum uicium appellationes explicabimus, sed partiū
 vitis nomenclaturam exponemus.

Vitis ipsa Græce *ἀμύντις*, Germanice *Rebstock* / Hebraice *עץ גפן* ^{1.}
Gæphæn, dicitur.

Palmes Latine, *ἐμπόρ* Græce, die rebe am stock / so: *עליהם שוכח* ^{2.}
Semorah, Hebraice *ענבים*.

Gemmæ, die augen. ^{3.}

Pampinus, das blat am rebstock. ^{4.}

Capreoli, seindt die gäbelin / oder heffelin darmit sich die reben allent- ^{5.}
 halben was sie begreifen anbinden.

Racemus, der draub. ^{6.}

Scopium, der samm des draubens daran die beerlin wachsen. ^{7.}

Beere, *Vua uel acinus*, Beer. ^{8.}

9. *Membrana*, die haut vber den beeren. Hebræis מֵמְבְּרָנָה Sag.
 10. *Caro*, das dick inwendig in der hülßen/oder haut.
 11. *Humiditas*, die feuchtigkeit oder safft in beeren.
 12. *Nucleus*, der kern im beer. Hebræi תַּמּוּזָה tam uuz quam aliorum fructuum nucleos גַּרְעִינִים Gareinim uocant.
 13. *Mustum hornum*, der new süßwein. Hebræi תִּירוֹשׁ Thirosh.
 14. *Merum uinum*, der verjaren wein. Hebraice יַיִן Iayn. Poëtis uarijs nominibus appellatur, Bacchus, Dithirambus, Dionysius, Liber.
 15. *Ipes*, die würmlin an den reben.
 16. *Hircus*, volucrum. der reben sticher.
 17. *Fæces*, Flores, die heffen oder trüßen, Hebraice שֶׁמֶר Schæmgr.
 18. *Vua passa*, gedöte meer treübel.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

De uino eiusq; facultatibus in præsentia nihil dicemus, tractationem eius rei in alium librum reſcientes.

Quæcunque uero in vite sunt, ea ad medicinam accommodari possunt.

Vuæ maturæ, humidum & calidum, immaturæ humidum & frigidum sortitæ temperamentum. Nuclei acinorum astringendi uim obtinent.

INTRINSECVS.

Vuæ probe maturæ corpus mediocriter alunt, instar Ficuum fere. Albæ uentrē uehementius mouēt nigris, præsertim uero eæ quas Germani Hinfchtrauben uocāt, quæ etiam a nonnullis, quod aluum adeo celeriter turbent, Scheißtrauben nuncupantur. Maximumq; id ipsi inest commodum quod uelociter subsideant. Simeon Sethi generalem tradit regulam, docens omnis generis fructus, maxime eos qui tenui inuoluuntur cortice, ut sunt Vuæ, Cerasia, Pruna, Persica, ante reliquos cibos sumendos, ut cito exigantur, neq; uentrē inflent, Germani, ut sunt in cibis incōditi & ualitudinis prosperæ minus studiosi, Poma semper post cibum apponunt, qui mos cum rationi & placitis probatissimorum medicorum aduersetur, mihi maxime improbatur.

Vuæ passæ cuta Ficibus exiguis, pinguibus & succulentis, quæ ex Masilia deferuntur, easdem fere facultates obtinent, & a Galeno libro de alimentis secundo plurimum commendantur.

Vuæ immaturæ aluum astringunt, stomacho utiles sunt, & cholicos ardores æstusq; restinguunt. Iisdem facultatibus pollent & nuclei acinorū.

Capi eoli tusti, succoq; expresso poti dysentericis auxiliantur. Eadem succus foliorum expressus efficit, neque non aqua ex utrisq; distillata.

Succus

Succus & aqua stillatitia, culus nunc meminimus stomachicis, cruenta excreantibus, & malaciæ grauidarum apprimè conueniunt.

Liquor qui quotannis è vitibus putatis effluit, potu calculos comminuere dicitur.

EXTRINSECVS.

Folia vitium, & tritici capreoli, capitis dolores illitu mitigant, ardorem & inflammationem stomachi, capitis & oculorum sedant.

Lachryma vitium, quæ ueluti gummi in caudicibus concrefcit, oculis caliginosis instillata, nubeculas eas obducere incipientes remouet, caliginem discutit, & claritatem adiuuat.

Eadem illita lichenas & psoras, leprasq; nitro prius perfrictas sanat.

Cinere vitium & fæcum uini, exustarum quidam uictum suum quærant. Nam cum fæces distillatæ fuerint, quod reliquum est ficcatur, & post in cinerem redigitur, quo ad colores, & ad saponem conficiendum utuntur. Vterq; cinis Chirurgicis quoque magno usui esse potest, nam detractis in sede condylomatibus, & thymijs medetur, ad quam rem perficiendam ex co cinere unguentum parari potest.

Quid possit vitis, neque non vinum, & alia quæ fundit vitis, sermone explicare nemo potest. Nos quoque uela contrahemus, nam reliqua ex ijs quæ diximus facile colligent prudentes.

De Labrusca. Cap. LI.

E QVIS HANC VITEM SYLVESTREM CVM EA, quam lib. ij. cap. xciiij. descripsimus confunderet, cum eandem appellationem habere uideantur, uolui hoc loco vitis syluestris quam Labruscam Latini cognominant, priuatim differentię gratia inter hanc & illam constituendæ, mentionem facere. Neque erimus prolixi in re adeo manifesta. Est enim syluestris vitis seu Labrusca, viti uiniferæ, satiuæ per omnia quod ad caudicem, palmites, folia, flosculos, & fructus attinet fere consimilis, nisi quod fructus eius nunquam maturatur, semperq; durus manet. Proinde raro uuas profert hæc vitis, easq; per paucas, multoq; satiuæ vitis fructu minores. Nonnullæ ex hoc genere lunio mense ut satiuæ vitis florem ostendunt, sed fructum raro ædunt. Vitis syluestris seu Labrusca inter Spiram & Argentinam frequenter occurrit, altissimas plerunque scandens arbores.

NOMENCLATURAE.

Ab hac vite syluestri ea est diuersa, quam Dioscorides lib. iij. cap. clxxv.

Dioscor. lib. 5.
cap. 2.

& nos supra lib. ij. cap. xciiij. descripsimus, quod admonitionis gratia ingeminare non piget. Nostra quam nunc describimus sylvestris vitis, Græcis *ἄμυρ* & *ἄμυρα*, Latine uero Labrusca dicitur, cuius & Vergilius in Ægloga v. his numeris meminit;

aspice ut antrum

Sylvestris raris sparsit Labrusca racemis.

Diosco. lib. 5.
cap. 4. & 5.

Germanice Wildwein reben. Fructus eius Græce *ἄμυρα*, Hebræis *בוסר* Bosar & *בוסר* Beuschim, Germanis Herling trauben dicitur, ex his uero expressus succus, Omphacion *ὀμφάκιον*, uulgo Agres uel Agrestis nūcupatur.

VIRE S. AC TEMPERAMENTVM.

Vuæ vitis sylvestris quemadmodum pampini vitis viniferæ uentrem astringendi & omnis generis scabies sanandi uim habent, sed efficaciorum folijs & capreolis uiniferæ vitis. Omphacion ex tertio resiccantium est ordine, stomacho lubrico utile. Qui Rhenum accolunt acetum ex fructu Labruscæ faciunt.

De Olea, Cap. LII.

OLEA SYLVESTRIS ET SATIVA IDEM FERÉ LIGNUM habent, eademq; folia. Quamquam uero satiuæ Oleæ multa numerantur genera, quemadmodum paulo post dicemus, tamen uix ea discerni queunt, nisi fructibus. Folia Oleæ utriq; pallida, cinerea, angusta, solida, Salicis prope confimilia, sed magis exigua, & solidiora, ac angustiora. Flos Oleæ in Germania nostra circa diem D. Ioanni Baptistæ sacrū, ex pallido luteus apparet, qui in oliuas abit amaras, forma sua fructum Corni referētes. Olea exquisitum cultum minime requirit, loca amat fabulosa, nec nimum macra. Vineis maxime gaudet, vites diligens. Altero plerunque anno alternis fructum fert, medianq; coeli temperiem expetit. Olea quercum detestatur, eiq; ijs duabus arboribus perpetua antipathia. Vergilius tria oliuæ seu oleæ genera secundo Georgicorum statuit, his numeris.

Nec pingues unam in faciem nascuntur oliuæ,

Orchites, & radij & amara Pausia bacca:

Columella lib. 5. cap. 7. Palladius in Februario, cap. 18. Columella decem genera commemorat his uerbis. Olearum sicut vitium, plura genera esse arbitror, sed in meam notitiam decem modo perueniunt, Pausia, Algiana, Liciniana, Sergia, Neuia, Culminia, Orchis, Regia, Circites, Murtea. Ex quibus bacca iucundissima est pausiæ, speciosissima regia.

Olea.

Oelbanm.



tur) postquam aquæ subsidissent, ramum oliuæ, tanquam certissimum pacis symbolum in ore ad Noam detulit.

ma regiæ. Oleum optimum Licinia dat, plurimum Sergia, omnisq; Olea & maior fere ad elcam, minor oleo est aptior. Optime uapores sustinet Pausia, frigus Sergia. Hæc ille.

Sergia in calidioribus Germaniæ locis, cuiusmodi extractus Rheni, plantari, et ad frugem peruenire possit, si a caprarum iniuria asseratur. Oleam enim (ut Plinius dicit) si lambendo capra contigerit, depauperitq; primo germinatu, sterile scire, autor est M. Varro.

De mirabili illa Olea cuius Aristoteles in libro de mirabilib⁹ auscultationib⁹ meminit, mihi nihil cōstat.

Oleay luestris, satiuæ præfertur, propterea quod pacis symbolum, & uictoriæ, uirtutisq; præmium, a ueteribus semper existimata fuerit. Olim .n. Olympico certamine uincētib⁹ corona ex syluestri olea dabatur, in rei perpetuam memoriā, quod Vergilius li. v. Æneidos hoc uersiculo innuit.

Accipient. Flauaq; caput neq;
ætur oliuæ.

Columba etiam (ut primo Mosi libro cap. viij. scribitur)

NOMENCLATVRÆ.

Olea, seu Oliua fatiua, Græcis *ελαια*, Hebræis *איל סאית* Saith, Germanis *Ölbaum*/Syluestris uero *אגרוס* Agrestis olea, Oleaster, Cotinus, Germanice *Wilder Ölbaum* appellatur. Serapio cap. v. Zaiton nominauit. Oliuæ conditæ *ελαιον ελαιον* Græce dicuntur. Dioscorides lib. j. cap. cxxlij.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Oliuæ maturæ mediocriter calidæ, immaturæ frigidæ sunt naturæ, cibis magis quam medicina expetitæ. Olei uero quod uocant oliuæ, sicut & uini facultates, nemo puto quamtumuis disertus explicabit. Plinius lib. xiiij. cap. xxij. paucis duos hos liquores commendat, cum dicit. Duo sunt liquores corporibus humanis gratissimi, intus uini, foris olei, arborum è genere ambo præcipui, sed olei necessarius. Hæc ille.

Hinc apud ueteres Romanos lex lata fuit, qua cautum erat, ne quis olea stringeret, propterea quod illa Mineruæ sacra sit. Plinius lib. xij. cap. j. Et adhuc hodie ad ordinandos suos sacerdotes Episcopi oleo oliuæ utuntur.

INTRINSECVS.

Nemo omnes Olei facultates describere potest. Quisquis tamen earum rerum cognoscendarum studio tenetur, legat Galenum lib. ij. de simpl. facultatibus cap. v. vi. vij. & viij. Item lib. vi. de Olea.

Nostris quoque Germani iam pridem assueuerunt in cibis oleo, & oliuis uti, sed quanto cum ualitudinis commodo quisque iudicare potest. Me sane consultore Gallis & Italis relinquemus cibos, nostrisque Germanicis contenti uiuemus, quod si fecerimus non dubium est, quin plerique quod ad ualitudinem bonam attinet, melius haburi sint.

Oliuæ ante cibum deuoratae uentrē mouent, & os uentriculi roborant.

EXTRINSECVS.

Humiditas quæ currit ex ligno uiridi (ut Serapionis uerbis utar) quando ipsum accenditur in igne, facto linimento cum ea, confert furfuribus capitis, & impetigini & scabiei, Serapio cap. v.

Colymbades tritæ & ambustis illitæ, pustulas gigni prohibent, asserens & Dioscoride.

Muriæ succus collatus gingiuas contrahit, & motus dentium firmat.

De

De Lauro.

Cap.

LIII.

Loosbeerbaum.

Plinius lib. 15.
cap. 30.

TIBERIVM PRINCI-
pem tonante cœlo coronari
Lauro solitum, contra ful-
minum metus nonnulli pro-
diderunt. Ex ijs enim quæ
terra gignuntur, Lauri fructi-
cem, fulmen non icere uete-
rum superstitio credidit, qd
idem de aquila & vitulo ma-
rino affirmant, qua de causa
pauidi olim tabernacula e-
pellibus belluarum, quas
Vitulos marinos uocant,
Plinio teste conficere soliti
sunt. Nostri sacrificuli com-
modiori compendio usi, cõ-
tra fulminum metus, in die
palmarum (ut uocant) Bu-
xi, Sabinæ, Aquifoliæ, & id
genus fruticum germina be-
nedicere & consecrare so-
lẽt, quibus accensis, fulmen
ea loca minime percussurũ
superstiosulis suis auditori-
bus pollicentur. Quod si hi
scripturæ testimonio freti
ista pronunciarent, fide dig-
nos utiq; censerem. Sed quia
imposturæ potius q̃ uerita-
tis studio hæc conficta es-
se memini obscurum est,
relictis illis ad Laurum no-
stram reuertamur. Ea tem-
poribus Augusti Cæsaris

Plinius lib. 2.
cap. 55.

Romæ in magno pretio fuit. Non enim tantum Lauro triumphantes coro-

nabantur Romæ, sed etiam folia eius principibus à populo & caricę prima die Ianuarij mensis donabantur. Quippe cum nec sacer morbus, nec malus genius negotium exhiberet, ubi Laurus adfuisset. Quemadmodum nemo igitur fulmine, ubi & Ficus & Laurus assideant. Præterea testantur ueterum scripta, Lauro poetas olim & pontifices, quos Vates nominabant, coronatos in honorem Appollinis, quod illi uim diuinationis, præteritorum presentium, & futurorum inesse crederent. Olea ergo Mineræ, Laurus Appollini sacra fuit, ob eam nimirum causam quam dicemus. Appollo quippe ignis ipse est, ut potest sol. Laurus uero non solum ab igni cœlesti tuta est, sed etiam quosuis ignes manifesto abdicat crepitu. Hęc igitur ratio forte est, cur Appolini Laurus consecrata fuerit, aut certe ob eam causam, quod ex ea ignis attritu Hedera excutitur. Sic enim scribit Ruellius libro primo cap. xcij. Si Lauro teratur hedera, laurumq; terat eadem, ignis excutitur, itaque teritur lignum ligno, flammamq; concipit attritu, excipiente materia aridi fomitis, fungi uel foliorum facillime conceptum, exploratores hos usus in castris, & pastores reperiunt. Hęc ille. Siue uero quę narrata sunt hactenus ita se habeant, sin minus, sane pleriq; hodie pastores coacto isto igne (sic enim à Germanica uoce *Notsewer* / dicere possumus) ad multas ueniunt superstitiones, quę seductę & misere plebi longe magis arrident, quam uerbum domini & ueritas ipsa. Atq; his præfationis loco dictis historiā Lauri aggrediamur.

Laurus non in omnibus Germaniæ locis nota est, quanquam non dubito quin progressu temporis pluribus innotescere possit. Siquidem baccis recētib; uerno tempore in humo pingui, digiti altitudine depositis, Maio mense erumpit Laurus, quæ si diligenter colatur, ac Autumno in figulina transplantetur, in arbusculam euadit mediocrem, folijs saturatæ uiriditatis, solidis, Malo medicæ aut Lauri Alexandri similibus, sed magis nigricantibus, boni odoris, hyeme quoque uirentibus uestitam, quod & Ouidius ijs uersibus testatur.

Viq; meum intonsis caput est iuuenile capillis

Tu quoque perpetuos semper gere frondis honores.

Laurus ubi eam ætatem attigerit, quæ ferendis fructibus idonea est, quotannis multos & coniunctim emicantes flosculos, per omnia floribus Hederae respondentes producit, qui in baccas tandem abeunt amaras, cortice, non aliter atque glandes inclusas.

Laurus & surculis seritur, quos uere terra obruere cōuenit, qua ratione & Lauendula propagatur. Habet hæc arbor corticem leuem ac tenerum, quo nomine diligentem curam requirit.

Multa Lauri genera traduntur, Delphica æquali colore, uiridior, maximis.

mis baccis atq; e uiridi rubentibus, dicta quod ea uictores Delphi corona-
ri solebant, Hæc regia & Augusta dicitur.

Cypria folio breui, nigro, per margines imbricato crispatur. Hanc syl-
uestrem Laurum esse aiunt.

Mustax folio maximo flaccidoq; albicat.

Vulgarissimam Laurum Taxam uocant, & Baccaliam, quod sit baccarū
fertilissima.

Delphicam Lactantius grammaticus Tripodem quoque uocari tradit,
quoniam ut ait, radices ternas habeat.

2.
Cypria.

3.
Mustax.

4.
Baccalia.

NOMENCLATURAÆ.

Lauri nomina aliqua nunc in descriptione annotauimus. Superest ut ge-
nerales quoq; explicemus appellationes: Laurus germanice Loibeebaum/
Græce *Δάφνη* dicitur. Folium Laureæ & Loreæ Cætoni nuncupatur. Baccæ
Δάφνιδες, & Daphnococci appellantur, Germanice Lo:beer/. Oleum Lauri,
num *ἔλαιον Δάφνης*, Germanice Lo:öl. Syluestris Laurus Ruellio teste libro
primo de natura stirp. cap. xcij. Tinus dicitur, alias Laurus agria & nonnul-
lis Aquifolia dicitur. Serapio cap. cccxxiij. Laurum Gaur & Gar uocat,
Lignum Lauri Aegardchaar Auerrhoi dicitur.

Diosco. lib. 2.
cap. 91.

Diosco. lib. 1.
cap. 40.
Tinus.

VIRESCIT TEMPERAMENTVM:

Baccæ Lauri, & folia eius calidam & siccam obtinent temperaturam. Ma-
gis tamen baccæ calfaciunt & exiccant folijs. Proinde usurpantur utraq;
in medicina.

INTRINSECVS.

Baccæ Lauri decorticatæ in eclegmate tritæ cum melle, uel passo pro-
sunt tabi, orthopnœæ, & omnibus thoracis rheumatismis.

His quoque quos interdum tormina uentris exercent, nō inutile est iam
dictum eclegma.

Rases compositionem insignem de baccis Lauri docuit, quæ mirifice tor-
minibus uentris medeatur. Vide Iacobum Manlium in electuario de baccis
Lauri.

Baccæ Lauri tritæ contra scorpionum ictus bibuntur.

Cortex radicis calculos rumpit, parrus necat, hepaticis prodest, tribus
obolis in uino odorato potus. Sed sciant mulieres ab huiusmodi medica-
mento sibi abstinendum.

Baccæ Lauri decorticatæ, uinoq; maceratæ ac potæ puerperis a partu

purgandis conueniunt, non solum enim id uinum potum dolores & tormina uentris, qui a partu mulieres sæpe uexāt, sedare solet, sed & reliquias partus expellit.

Palumbes, graculi, merulæ, Lauri folio, annum fastigium purgare dicuntur.

EXTRINSECVS.

Decoctum foliorum Lauri in muliebres infessus additum, uulux & uiscæ uitis conuenit.

Folia uirentia trita illitaq; uel sparum, apiumq; ictibus medentur.

Baccarum succus illitus uiliginis emaculat. Idem utilissime aurium doli & grauitati instillatur cum uino uetere & rosaceo.

Veteres tradunt fruges a rubigine quod uicium Aprili & Maio mensibus frumentis plerunque molestum est, asseri, si surculum Lauri agro deposueris.

Iam & Laurinum oleum longe utilissimum est, Chirurgis, & his qui malas pustulas curant, magnopere expetitur. Siquidum neruorum resolutio nem, omnemq; dolorem a frigidityte ortum sedare ac mitigare dicitur, quo nomine & ad coxendicum dolores ex frigida humiditate ortos usurpatur.

Hoc oleum neruorum perfrictionibus apprimere conducit.

Palladius lib. ij. cap. xxij. olei Laurini confectionem breuibus ita tradit.

Item ex Lauri baccis oleum conficitur hoc modo. Lauri baccas quamplurimas, & maturitate turgentes in aqua bullire facies, & ubi diu ferbuerint, olei quod ex se dimiserint, supernatantis undam pennis leuiter cogentibus in uasa transfundes. Hæcille.

De Aquifolia Ruellij. Cap. LIIII

1.
Aculeigerarum
stirpium primum
genus.

2.
Secundum spinosarum
stirpium genus.

3.
Aculeatarum
stirpium tertium
genus.

1.
Aquifolia arbor.

CVLEATARVM ARBORVM FRVTICVMQVE TRIA
reperiuntur genera. Quædam namq; caudices ramosq; habent
aculeigeros spinososq; uidelicet, Rhamnus altera (de qua nos supra cap. xv.) Cynosbatus, Prunus syluestris, Grossularis, Oxyacantha, Malus syluestris, Pyrus syluestris, & ea quæ poma fert, uulgo Arantia dicta.
Aliorum fruticum caudices, simul & folia spinis horrent, nempe Rubus Idæus, Rubus alter, Rosa agrestis. Sunt postremo arbores, fruticesq; quorum folia duntaxat spinis aculeisq; armantur, utpote Ruscus, Iuniperus, & quam hoc capite tractamus Aquifolia. Hæc in quibusdam syluis, nimirum ea quam den Ydar uocant, prope arcem Veldentiam, e regione Mossellæ fluminis, ita arborefcit, ut reliquas arbores magnitudine & proceritate æquet.

Aquifolia.

Wald disteln/ Stechpalmen.



æquet. Quanquam in hoc genere uideas, quæ humili statu contentæ, frutices potius quam arbores apparent. Hoc genus Aquifoliæ in saltu Haganoienſi inter cæteras sentes & frutices luxuriat. Cortices exteriores ramorum Aquifoliæ uirides sunt, caudicum uero præsertim magnorum cineræci. Folia aculeata solida sunt, nec inepte Laureæ frondi conferri poſſunt, perpetuo & ipsa uirentia. Baccæ quas Autumno appetente Aquifolia proferet, miniꝝ colorem repræſentant, fructu Cynosbati haudquaquam maiora, ſed ſingula ſingulis pediculis nitentia, guſtu prædita iniucundo.

²¹
Aquifolia frutex

NOMENCLATVRÆ.

Quo in loco apud ueteres hæc arbor, frutex uel deſcriptus ſit mihi ſane non cõſtat. Neq; docti quicquam de illa cognouiſſe uidentur, niſi quod excellentiſſimus uir Ioannes Ruellius lib. 1. de nat. ſtirp. cap. cxi. Aquifoliam appellat. Neque uero Aquifoliam hic inteligaſ

uelim, de qua Theophraſtus lib. iiij. ca. xv. ſcribit, ſylueſtri Meſpilo tam accenſens. Neque etiam ad Illicem (cuius Theophraſtus eodem libro cap. xvi. meminit)

meminit) hanc nostram arborem referre possumus. Ego existimo illam syluestrem Lauri speciem esse, Latine Laurum spineam, seu aculeigeram appellandam. Sed nemini tamen nostra sententia præiudicatum uolumus, quin sequatur quisque quod sibi maxime uideatur. Nos nostra ita proponimus, ut meliora & certiora docentes facile simus admissuri, uti par est. Germani Waldrdistel, ynd Stechpalmen uocant.

VIRES AC TEMPERAMENTVM

De usu huius arboris nihil compertum habeo. Aniculæ eius folia ulno aut potu injecta, aduersus laterum dolorem, morbumq; pleuriticum polle re tradunt. Experiatur qui uolet.

Sagminibus etiam frondes Aquifoliæ adijciuntur. Vulgus diuturna superstitio seductum ac fascinatam, consecratas eas frondes supra fores, tam ædium quam stabulorum suspensas a fulminibus ea loca tuta seruari credit.

Ruellij uerba.


Fit & apud quosdam uiscum ex Aquifolia hoc modo. Huius cortices detrahunt, & facto humi scrobe uliginosis maxime obruunt, frondibus arborum inuoluentes, & inibi putrescere patiuntur, quod fere duodenis diebus fieri solet: tum marcidos eruunt, & tantisper pila tundunt, dum in uiscum lentescant: demum in profuente, ut obhærentes corticum reliquæ fordesq; fluitent, proluunt, & adiecto olei nucum momento sicilibus recondunt ad aucupia.

De Buxo. Cap. LV.

Buxus uulgaris. **B** VXVS PERPETVA ET MYRTACEA FRONDE uirens, sagminibus stulte & superstiose plebis, anicularumq; quam medicinæ, in qua nihil de laudibus eius legimus, natus uidetur, præsertim cum omnibus animantibus inuisus sit. Theoph. quoque lib. iij. ca. xv mel insuaue esse, quod e flore Buxi apes colligant, testatur. Buxus Februario mense subluteum seu herbaceum profert florem, forma sua Coriari semen Saccharo obductum referentem, qui in siliquis tandem abit conclusas, quæ appetere Autumno semen ostendunt atrum, uulgaris Dictamni simile, iniucundi saporis. Buxus frigidis locis gaudet, in Sabaudia frequens, maxime Strolzatti prope Laufannam.

Lignum Buxi durissimum, spissum, densumq; & ponderosum, ideoque in aquis non fluitat, nec flamma nec carbonibus utile. Medulla constat exigua, ideoque ex eo tibiarum multiforatiles, pectines, coclearia, & pyxides, quæ

Buxus.
Buxbaum.



rum materia medica conseruanda usus est, & si qua alia instrumenta & uasa
 lignea ad longos & diuturnos usus experimus, conficiuntur.

Buxi tria nonnulli statuunt genera, mihi unum tantum, nempe uulga-
 tissimum.

tissimum quod in Germaniæ hortis passim uoluptatis gratia plantatum cognitum est.

2.
quæritur.

Proinde in altissimis Vualgoiæ syluis non procul a Cæsareo luthra, humo arenosa exigua stirpis species Erica haudquaquam maior reperitur. Hæc folia habet Buxo aut Myrtillis quamssimilima, humiq; magis procumbit, q; in altum sese attollat. An uero ea Champyxos fuerit, affirmare non ausim.

NOMENCLATURAE.

Hæc arbor Græcis *βύξ*, Hebræis *WUN* Theaschur, Esaïæ xli. Latinis Buxus, Germanis Buxbaum appellatur. Semen eius Plinio teste libro xvi. capite xxx. nonnulli Carthegon, Viscum & Hiphear uocant. Proinde cum Buxus omnibus animantibus inuisus sit, abstinerebo & ego ab illo, nec prolixius historiam eius tractabo. Vnum hoc addere liber, quod folia eius cum coliculis lixiuio decocta capillos rufant.

De Taxo. Cap. LVI.

TAXVM VENENATAM ARBOREM POST BVXVM describere placuit, non tantum quia perpetua coma uiret, sed etiam quod tam iumentis quam hominibus haud multum commodat. Prodiderunt namq; ueteres, eos qui sub Taxo florente dormierint, præterea & iumenta si baccas rubras degustauerint, necari. Facile ergo in Germania nostra arbore tam noxia tanquam uenena caremus.

NOMENCLATURAE.

Taxus, quam Germani Eibenbaum uocant Dioscoridi li. iij. ca. lxxviij. & lib. vi. cap. xij. *quina*, Thymion & Milos dicitur. A latina porro appellatione Taxi, Taxica uenena nominantur, quæ nunc Toxica dicimus, cuius origo talis traditur. Vasa siquidem e Taxo facta bibentibus ex illa fuisse mortifera ueteres rei herbariæ scriptores testati sunt. De Taxi & Fraxini appellationibus, uide Manardum lib. vij. epist. iij.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

De Taxo Theophrastus lib. v. cap. viij. ita scribit, Taxus tenuisætilia conglutinamenta capsis, scrinijs, subsellijs, atque in totum similibus præstat. Mihi in uniuersum Taxus minime probatur.

In medicina nullum usum inuenio præterquam ut suffitu mures enecet.

Si quis

Si quis deceptus de hac arbore quid uel edisset uel bibisset, is e' uestigio uinum fortissimum & multum ebibat, consulente Nicandro in Alexipharmacis.

De Sabina. Cap. LVII.

Euenaum.



SACRIFICVLIS, ET
 vetulis meretricibus maximo emolumento est Sabina. Illi namq; in Festo palmarum Sabinam cum anis non paucis stirpibus consecrare cōsueuerunt, pollicentes hīs ædibus neq; fulmina, neque Satanam nocere posse in quibus huiusmodi consecratæ reperiantur stirpes. Hac uero ratione prouentus istorum hominum crescunt, pauperumq; pecunia decrescit. At vetulæ illæ sagæ & meretrices magna diligentia animaduertunt quæ frondes de Sabina herba, primæ ad crucem (sic enim fert superstitio illius Festi) uel a sacerdote, uel ab alijs cōijciuntur. Eas namque iuncta gladijs & mucronibus quo minus feriant, gestantes asserere, & aduersus ueneficia & ludibria Satanae amuleta esse. Multa insuper per hos ramusculos diabolica exercent, nam de nouo consecrari, missa super illis (ut uocant) celebrata patuntur. Præterea iuuenulis
 mere-

meretricibus in puluerem redactam Sabīnam, potandam exhibent ad excutiendos foetus. In quæ sane flagitia carnificem animaduertere conuenit.

Cæterum est Sabina sua natura non inuicilis, modo recte ea utaris. Gaudet illa humo cui e parietibus lateres tui admixti fuerint. Seritur furculo auulso, terræq; immisso, & facileradicatur, processu temporis in uiridem & elegantem arborem, quæ tamen sese magis in latitudinem diffundat, quam in altum erigatur, euadens. Folia Sabinae perpetuo uirentia, copiosa, & plurimum dissecta, Tamarisco aliquantum sunt maiora, tactu aspera, aculeata, grauiter olentia, gustu acria & feruentia. Sabina cum in arborem grandiusculam excreuerit, quotannis teretes & nigras, Iuniperiq; similimas baccas producit.

2.
Selago.

Altera Sabina (duo enim eius genera Dioscorides proponit) mihi non est cognita. Verum crispam illam herbulam, Sabinae quam simillimam, quæ in altissimis prouenit syluis, sæpenumero reperi. Eam mulierculæ quædam *Harschar* nominant. Ac fieri potest ut ea sit Selago Ruellij lib. de nat. stirp. j. cap. lix.

NOMENCLATURAE.

Diosco. lib. 1.
cap. 89.

Ephedra Græcis, Herba Sabina seu Sauina Romanis, *Seuenbaum* Germanis appellatur, Alij Nerion, alij Barython, alij Cupressum Creticam nominant, quidam Sauimeram teste Ruellio. Serapio hanc arborem Abel uocat cap. ccxlv.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Sauina excalfacit & desiccatur tertio gradu, respondetq; temperatura Cupressi fere, uide Galenum de Simpl. lib. vi. & Manardum epist. xi. cap. v.

INTRINSECVS.

Sabina herba uino decocta & pota sanguinem per urinam elicit, morbum regium & partus mortuos expellit.

Est & Sauinae herbae in medicandis iumentis haud contemnendus usus, ea enim purgari consueuerunt iumenta. Sed prudenter medicamentis e Sabina petitis uti conuenit, propter strenuas eius in exiccando & calefaciendo facultates.

EXTRINSECVS.

Sabina herba in puluerem redacta, ac ex melle illita, fluentibus ulceribus medetur, nomas sistit, & collectiones mitigat.

Folia Sabinae herbae in puluerem redacta, ac cum pinguedine lacti supernatante

pernatante (Germani *milofraum* uocant) temperata scabiei capitis puerorum unice profunt.

Quidam prædictæ lactis pinguedini Sabinæ folia concoquunt, capita puerorum scabiosa, eo postea unguento illinentes.

Sabinæ recentia folia tusa ac phagedenæ (Germanice den trurm uocant) imposita, eam enecare dicuntur.

Aqua e' folijs Sabinæ distillata maculas faciei abstergit, & ut quidam asserunt, uertigini conducit.

Gallinacei generis pituitas fumo huius herbæ sanari produnt.

De Iunipero. Cap. LVIII

IAS PROPHETA CVM ISABELIS CRVDELITA- J. Regum 19.

Etem fugiens, in desertum deuenisset, sub Iunipero tantisper dormiuit (ut sacra refert scriptura) quoad secundo ab angelo excitaretur. Ac ex his facile intelligimus Iuniperum uastis desertis, altissimisq; montibus, frigidaq; limosa & lapidosa terra ut plurimum nasci, nam in eiusmodi locis apud nos quoque Germanos frequentissime occurrit, maxime uero apud Mediomatrices, Vuasgoia, & Creichgoia, in quibus partibus perpetua uirens coma luxuriat Iuniperus. Maio mense tenuissimus ac luteus puluis e' Iuniperis in auras auolare conspicitur, quod semen illius esse animaduerti. Post hunc quem diximus puluerem baccae prorumpunt exiguae, utrides, quæ altero demum anno Autumno appetente, quod illi tempus maturitatis est, coeruleo tinguntur colore, gustu quadamtenus dulces, admixta amaritudine, odorem gratissimum spirantes. E' nucleis lapidosiss, qui in hisce baccis continentur, nouæ Iuniperi plantulae fruticant. Folijs uesititur Iuniperus angustis, oblongis, aculeatis, acutis, & ad Rosmarini folia forma sua accedentibus, sed magis exiguis & acuminatis. Radices Iuniperi multifidæ, corticeq; puniceo obductæ, per summa terræ sparguntur, quod & Theophrastus lib. iij. cap. vij. annotauit. Baccæ Iuniperi non unius sunt generis. In quibusdam enim grandes, in alijs exiguas, in his dulces, in illis prorsus amaras, alias denique plane rotundas, quasdam oblongas, & acuminatas uideas.

Quaecunque in Iunipero cernuntur, odorata sunt. Primum namq; humor qui e' Iunipero, si lædatur, dum in succo suo fuerit, effluit, deinde radices & caudices aridi, tertio baccae recentes & maturæ, postremo folia aculeata gratissimum spirant odorem. Iuniperi arbor Maio mense cum pluuiosa fuerit tempestas, luteam e' corticæ sudat lachrymam, quæ magna in

Iuniperus.

Weckholterbaum.

2.
Iuniperus ma-
tor.

copla tanquam fungi exi-
guit arbori adhæret, nec ma-
gnopere odorata est, sicut
supra de altera gumma, quæ
uulnerata arbore profluit,
audiuimus. Hæc lachryma
pluujs cessantibus euane-
scit.

Alterum Iuniperi genus
apud nos haud nascitur. Per-
uenerunt autem ad manus
meas baccæ rotundæ & ru-
bræ, quæ dicebantur Iunipe-
ro maiore procreatæ.

NOMENCLATVRÆ.

Iuniperū Germani Weck-
holdterbaum/ baccas uero
Weckholdter beer/ vñd Fra-
metbeer/ à turdis (quos Ger-
mani Bramet vögel nomi-
nant) qui hyeme cibos suos
in arboribus Iuniperorum
quærunt & inueniunt. Iun-
perus Græce ἀμυρίδι, Hebræ-
is יונן Rothæm dicitur.
Reliqua cognomina uide
apud Dioscoridem lib. pri-
mo cap. lxxxviij. Serapio
cap. cclxx. Habhagar uocat.

VIRE AC TEMPE-
rumentum.

Iuniperi baccæ calidæ sunt in tertio, & siccæ in primo ordine. Nemo ue-
rò utilitates eius quibus scater satis explicare potest.

INTRIN

INTRINSECVS.

Baccæ Iuniperi maturæ ad multas affectiones profunt, meoq; iudicio piper salubriores. Nam in cib oſcitata ſtomacho frigido utiles ſunt, pituita- tamq; quæ in illo coñt digerunt, contra inflammationes, & tormina faciunt, uicia pectoris purgant, tuſſiq; medentur, urinam efficaciter ducunt, uenenumq; a corde repellunt.

Apud Germanos ſingulari remedio, ad graſſantia peſtilentiæ contagia depellenda uſurpantur.

Eadem menſes & coxendicum uiſcoſos humores expellunt. Et quid multa? ad quamplurima hæ baccæ utiles ſunt, quapropter coqui illas ad culinas uocarunt, condientes his cibos. Dioſcorides ramenta ligni deuorata interficere ſcribit, quod equidem miror. Nam lixiuium e' uino & cinere Iuniperi uſti factum ac potum urinam potenter trahit, ita equidem ut eo remedio multi hydropici liberati fuerint.

E' baccis Iuniperi oleum pretioſiſſimum, & ad Baſamum fere accedens elicitur. Præterea & ex arido ligno oleum odoratiſſimum ac efficaciſſimū, adq; multa utiliſſimum diſtillatur.

Multi multa de Gummi quod vernix dicitur ſcribunt. Sed oleum Iuniperi longo illud poſſe quod ad facultates attinet interuallo relinquit.

EXTRINSECVS.

Corticis cinis cum aqua illitus Dioſcoridi lepras eximit.

Idem uiperarum morſibus prodeſſe dicitur.

Oleum ad hæc uel maxime conducit, nam omnis generis malas ſcabies ſanat, necnon quaſuis pedum manuumq; rimas.

Suffitu Iuniperi, ſerpentes & quæuis uenenata fugantur. Et ut ſemel finiamus, facultates Iuniperi nemo facile explicabit omnes. Vnum eſt quod in Iunipero fugiendum & deteſtandum fuerit nimirum, umbra quæ noxia eſt, ſi Vergilio credimus, qui Ægloga x. ita ſcribit.

Surgamus, ſolet eſſe grauis cantantibus umbra

Iuniperi grauis umbra. nocent & frugibus umbra.

De Vitice. Cap. LIX.

HANC STIRPEM PVDICIS AC CASTIS ILLIS COE-
nobitis, qui perpetuam caſtita-tem uouerunt (ſic enim hi loquuntur) donabimus, ut illam ſubſternant, quo poſſint iuramēto ſuo

Diosco. lib. 1.
cap. 120.

latisfacere. Folia namq; huius arboris, quæ Salicis aut oliuæ similia sunt, neque non nigri & rotundissimi acini quos gerit, Piperi adsimiles, veneris stimulos inhihent, genituramq; exoluunt, quod Dioscorides testatur cum ait, Agnum, quasi dicas castum, uocant Græci, quoniam matronæ in thesmophorijs Atheniensium castitatem custodientes, folijs huius cubitus sibi sternunt. Hæcille. Equidem crediderim steriles & infœcundos fratres Francisci, qui ex mundo prognati, genus humanum prole non augent, folijs huius arboris toros sibi sternere. Nam iactant illi se in nullis plumatis lectis decumbere, nisi forte id in peregrinationibus suis extra cœnobja contingat. Sed ut missa hæc faciamus, gaudet Vitis fluminum ripis, ac torrentium alueis. Acini eius uinosum habent gustum. Vitis hodie in plerisque locis Germaniæ ignotus est.

NOMENCLATURA.

Vulgo agnum castum uocant utraque uoce idem significante. Germani hanc arborem fruticem uel Reischbaum / Schaffmüll / semen uero eius Kloster / oder Münch pfeffer / hoc est, Piper monachorum uocant. Græce ἄγνυς, ἄγνυς, Latine Vitis dicitur. Viticem ut Dioscorides refert, alij Agynon, alij Amictomixœon, alij Tridactylon, Magi Semnon, alij Hæmaideos. Aegyptij Sum, Romani Salicem marinam, alij Piper agreste, alij Lecristicum nominant. Serapio cap. ccxcix. Famamchest, & Arborem Abrahæ dicit, Semen uero Piperellam, & Piper eunuchorum uocat, quod Auerrhoi Pentasiler, & Granum sterilitatis appellatur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Piper Monachorum, excafactorias vires & astrictorias habet. Nonnumquam in medicina usurpatur.

INTRINSECVS.

Semen Viticis drachinæ pondere e uino potum menses ciet, flatu discutit, genituram exoluit.

Ad ictus & morsus uenenatorum hi acini ualent. Præterea & lactis copiam faciunt.

Semen Viticis potum aquæ quæ cutem subijt, lienosis & hepaticis prodest. Idem sinimum assumas caput tentat, & soporem affert.

EXTRINSECVS.

Foliorum succus expressus araneorum moribus medetur.

Folia cum melle in uino decocta oris et gingiuarum ulcera collutione sanant.

Rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat. Idem in essu mulicbrium locorum inflammationibus prodest.

Virgam.

Virgam Viticis qui manu teneat dum iter facit, negatur intertriginem sentire, teste Dioscoride.

Reliqua ex his quæ diximus colligi poterunt, quis enim scribendo omnia perlequantur.

De Salice. • Cap. LX.


Salix, Weidenbaum.



HACTENVS MVLTAS & varias arbores in hortis nostris conseruimus, superest ut illas aduersus iniuriam ferarum aliarumq; bestiarum, sepe muniamus, ad quam rem recte perficiem Salicem primum, dein populo, alijsq; id genus arboribus fruticibusq; opus est. Quod uero Salicem, Populumq; albam præ cæteris eligimus ea est ratio, quia binæ hæ stirpes auctu faciles sunt, & breui in altum assurgunt. Ac licet caudices senio confecti ancipitis sint uitæ, quotannis tamen nouas uirgas protrudunt, quæ plantatæ nullo negotio proueniunt. Sic enim decrescen-
tibus hisce arboribus, nouæ subinde succrescunt solumboles, ut inter mori non possit maxime Salicum genus, cum resurgere ac reuiuiscere perpetuo soleat. Sed de his uide Aristotelē de iuuentute & senectute cap. iij.

Salicum multa sunt genera, quæ omnia ubiq; terrarū

Seilweiden,



uliginosis & aquosis utplurimum locis nascuntur. Quædam ex his uirgas proferunt rubras, tenues, lentas, & flexiles, quas omnium præstantissimas iudicamus. Aliæ Salices candido uestiuntur cortice, frangi faciles, ad ligamenta inutiles. Tertij generis Salices luteo obducuntur cortice, ad ripas plerumque enatæ fluminum, ad ligamenta commodiores proximis. Postremum genus Salicum, id est, quod verno tempore paniculas incanas ostendit, quodque nonnulli stulta superstitio, ne ducti aduersus fulmina consecrare solent, Paniculæ uero quas diximus florem seu nucamentum squamatum compactile, luteum sicut omnia genera Salicum adipiscuntur. Flos omnium Salicum boni est odoris. Cumque Salices deflouerint, oblonga nucameta decidunt, inque pappos incanos conuersa, in auras a uento dispelluntur, quod in flore Tamarisci quoque uideas. An uero ea lanugo semen Salicis sit ignoro, dempto quarto genere in quo

auolans lanugo seminis uscem implet, quam ipse colligens cum seruissimè, erumpere suique generis Salices procreare uidit.

NOMEN

NOMENCLATURAE.

Salicum commune nomen apud Germanos est Weiden / Selbinger / Diosco. lib. 1. apud Græcos *ἰλιά*, Latinos Salix, Hebræos *אֵשֶׁל* Araf Psal. cxxij. Arabes *cap. 121.* Bulef. Homero Salix *ἄλκιναρος*, hoc est, Frugiperda dicitur. Iam ut ea Salicis genera quæ proposuimus Germanicis saltem distinguamus appellationibus, primum Bandrweiden / secundum Bruchweiden / Weißweiden / tertium Gälweiden / vñnd Bachweiden / quartum Seilweiden / oder Sellen uocant. Hæ Salices (de postremo loquor genere) ad sepes, uinctus, suppellectilem uillicam utiliores ac firmiores cognoscuntur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Salicibus, maxime uero corticæ earum & folijs exsiccandi, spissandi & astringendi inest facultas.

INTRINSECVS.

Trita folia cum exiguo pipere & uino pota, ileosis subueniunt, teste Dioscoride.

Salignum semen (hoc est, nucamenta dependentia) in potu sanguinem expuentibus prodest. Cortex eisdem præbet effectus, Dioscoride docente.

Ego crediderim tam nucamenta quam corticem ulno decoquendum, & ad prædictas affectiones exhibendum.

EXTRINSECVS.

Quidam succum Salicum dum in flore fuerint, colligere solent, rubentibus & caligantibus oculis adhibent. Hic enim succus claritatem oculorum adiuuat, caliginemq; amouet.

Ex folijs & cortice succus cum rosaceo in calyce punici mali calfactus, aurium doloribus inditus auxiliatur, furfures purgat in corpore illitus, & uicia cutis emendat.

Corticis cinis admisto aceto maceratus, illitu clauos & callos tollit.

Alios usus Salicis tum quotidianos tum uillicos, nihil attinet hic recensere, cum multi sint qui texendis e cortice corbibus & piscatorum nassis uitum suum quærant, quæ omnia abunde cantilena illa Germanica de confectione Buxi & Salicis confecta, docere potest.

Castor animal in aquis degens Salicibus gaudet, his enim habitationē sibi ædificat in ripis fluminum.

De Populo alba.

Cap. LXL.

Bellen/Sarbaum.



1.
Populus vulgaris.

P.

OPVLVS ALBA AVCTV PER QVAM FACILIS BRE
 ui tempore in altum sese attollit, maxime secus amnes, in pratis,
 & uli-

& uliginosis campis plantata. Aprili mense appetente, cum odorati & mucronati oculi prorumpunt aureum lentum & pingue, simulque odoratissimum gummi compressi reddunt. Hi in folia tandem cordis figuram obtinentia abeunt, Hederæque similia, sed molliora. Populus alba prima quoque eruptione incanos suos iullos præfert, qui, ut aliarum quoque eius generis arborum iuli, decidere solent. Hæc arbor ex albo incano cortice obducta est, Quod si illam propagare uelis, rami deputandi sunt, ac verno tempore uliginosæ ac humectæ terræ mandandi. Ac omnino eadem illis quæ & Salicibus cultura conuenit, sic enim nullo negotio prouenit.

Vergilius
Populus Alcide
gratissima, uitis
lacho.

Alia uero Populi albæ species in partibus ad Rhenū sitis reperitur, quæ ligno, cortice, formaque tota uulgari Populo quam similima apparet, nisi quod folia habet latiora, grandiora, & teneriora, ac qua terram spectant, niuea. Hæc in humectis & uliginosis tractibus, pratisque nasci gaudet.

2.
Populi albæ alia
species.

NOMENCLATURAE.

Hæc arbor Germanis Bellen/Pappelbaum/ Sarbaum/ Græcis λευκή, Hebræis לִפְתָּח Lifnæh Genesis xxx. Serapioni ca. xxx. Haur, Italis Albarâ uocatur. Altera Populi albæ species in hoc capite a nobis secundo loco descripta, Germanis ut plurimum Sarbaum appellatur.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTUM.

Utraque Populus alba medium obtinet temperamentum, humidæ & terree substantiæ, ad refrigerantem potius quam excalfacientem uim accedens, nisi quod oculi odoratissimo illo gummi prægnantes aliquantulum calefactoriæ facultatis habent, qui ad pretiosissimum ac decantatissimum unguentum populeon, seu myracopium adhibentur.

INTRINSECVS.

Potus albæ Populi cortex in puluerem (uti iudico subintelligendum) redactus, uncie unius pondere, Ischiadicis, ac urinæ stillicidio prodest. Hæc Dioscorides. Reliqua prudens omitto.

EXTRINSECVS.

Tepens foliorum succus utiliter oculorum dolori infillatur. Pilulæque primo foliorum partu exiliunt illitæ cum melle oculorum hebetudini medentur.

Oculi Populi albæ gummi aureo ac odorato prægnantes, in magno apud Chirurgos sunt usu. Hos enim antequam in folia se explicent legunt, suilloq; adipemacerant, seruantq; quoad herbæ passim erumpant. Tum ubi illæ enatæ fuerint, accipiunt Sedum maius & minus; Scrophulariam (qua de nos lib. i. cap. cxxij.) Hyoscyamū, Papaueris folia, Lappam maiorem (de qua nos supra li. ij. cap. ci) Bryoniam; auriones Rubi tam eius quod Germani Brombeeren/quam quod Hymbeeren uocant (de quibus nos hoc iij. lib. cap. xi.) neque non Solani herbam. Has omnes plantas tundunt, succumq; expressum cum maceratis illis ac gummosis oculis (quanquam aliqui & uinum addant) discoquunt super carbones, cumq; probe decoctum fuerit hoc uiride unguentum, tum purissimum quod supernatat cogunt, usuiq; reponunt. Solet uero id unguentum ad multas calidas affectiones, & Inflammationes usurpari, calorem namq; repellit & dolorem mitigat.

De Populo nigra. Cap. LXII

ACHRYMAM NARRANT QVÆ. IN ERIDANVM
L amnem e' Populis distillet durari ac coire in electrum, hoc est, succinum, quod Germani Zugstein uocant. His repugnant Manardus Ferrariensis & alij, quibus ego facile subscripserim, Succinum enim lōge alia res esse uidetur, quam quæ ex arboribus exudare soleat. Quin potius in mari nasci existimari possit. Sed de rebus nobis ignotis, nō est quod multa uerba faciamus. Quare relictis illis historiam Populi nigre aggrediamur. Ea arbor uliginosis syluis, interq; Betulas potissimum provenire gaudet cortice, iulis, folijs, uniuersaq; forma Populo albæ consimilis, nisi quod coloris est nigricantioris, & folia gerit Hederaceis prope similia, quod & Theophrastus lib. iij. cap. xiiij. de historia plantarum annotauit. Folia Populi nigre semper tremunt, etiam nullo mota aëre. Lignum utriusq; Populi candidum est, ac cum aruerit leuissimū. Populus uero alba cum annosa fuerit, ædificijs comodissima existit, eaq; mirifice ornat, propterea qd crispum habeat lignum, ac fluuiorum fluctus, cursumq; mentiat. Ditiore ex eo ligno mensas, & spondas suas conficiunt. Ex ligno uero Populi nigre quoniam leuissimum fit arefactum, calopodia parantur, in eoq; imagines sculpuntur, qua de causa à nonnullis Heilgen/oder gözen hölz/ hoc est, Sanctōrū, seu ut rectius appellemus imaginū, siue Idolorum (non enim hī sunt sancti qui os habent & non loquuntur, pedes & nō ambulant &c. sed Idola potius, & materies superstitionis impie) lignum appellatur. Populus nigra e' semine suo, quod Salicis quarti generis simile cernitur, reuiuiscit.

Populus nigra.

Aspen.



NOMENCLATURAE

Græcis hæc arbor *αἰγυπῖος*
 Latinis Populus nigra, Tre-
 mula, Gallis Trambula,
 Germanis Alpenbaum/Se-
 rapioni Haur romi dicitur.
 Idem autor gummi seu suc-
 cinum, quod ē Populo ef-
 fluat, Karabe, & Kakabre uo-
 citat. Diximus autem iam
 ante nobis, sicut plerisque do-
 ctioribus succinum nequa-
 quam ē Populo arbore de-
 manare. De hac re maxime
 quod ad Arabum sententi-
 as spectat, uide Manardum
 lib. primo epistola quinta.

VIRES AC TEMPE-

ramentum.

Tradunt Populum nra-
 gram calidæ ac nonnihil sic-
 cæ qualitatibus esse. Hodienō
 magni in medicina est usus:
 Succinum Serapioni calefa-
 cit, & sanguinem retinet, un-
 decunque fluat.

EXTRINSECVS.


Populi nigræ folia cum
 aceto illita (ita tamen quem
 admodum suspicor, ut ace-
 to prius decoquantur) mag-
 na utilitate podagricis do-
 loribus illinuntur. Diosco.
 Memoriae prodiderunt cor-
 ticem albæ Populi & nigræ

particulatim cæsum, & sulcis stercoratis mandatum, omni tempore anni
 edules fungos proferre. Hæc Dioscorides. An uero sic se habeant expertus
 non sum, experiatur qui uolet, ego enim Fungis minime delector.

De

De Alno. Cap. LXIII.

Erlenbaum.



VM AD VLGINOSO TRACTVS ET AMNIVM RI
 C pas deuentum sit, age Alnum quoque proceram, & rectam illa
 arborem

arborem contemblemur. — Hæc ubi adoleuerit longe latèq; ramis suis sese diffundit, caudicem habet incana & muscosa barba (ut ita dicam) obductū, non aliter atq; uetulæ Betulæ. Lignum Alni molle & fungosum quasi cernitur, rami quoque fracidi sunt, nec inflecti se patiuntur uti alia aquatica ligna & Salices. Hinc apud Germanos uulgo iactatum prouerbiū passim auditur, *Rot haar/Ærlenbogen/thûst du güt/man soll dich loben* / hoc est, *Rufi*, id est, qui capillos habent rufos, & arcus ex Alni ligno confectus: si probe se gesserint, laudem sane merentur, q. d. fieri uix potest, ut rufi fideles sint, sicut & uersiculus ille sonat. *Raro breues humiles uidi, rufosq; fideles:* & arcus Alneus non rumpatur. Sed ut pergamus, Lignum Alni cortice spoliatum, & ipsum ruffum apparet. Folia Alni rotunda sunt, neruosa, Coryli folijs aliquo modo similia, sed nigricantiora, læuiora & gummosa, non aliter ac si uisco seu pinguedine quadam oblita forent. Alnus præsertim adultior fusco vere emicat flore, eoq; Betulæ & Fagi pene consimili. Quamquam Alno iuli seu flores non decidunt, uti in Fago contingere uidemus, sed durantur, cogunturq; ita quidem ut forma oliuas imitentur. Atque hic Alni est fructus, qui Autumno appetente maturatur, ac decidens sese ipse serit, unde nouæ postea nascuntur Alni. Alnus uliginosis ac humidis locis gaudet, potissimum uero frigidis & opacis uallibus, ad ripas torrentum & amnium quam lætissime provenit.

Poëtæ multa de Alno fabulantur, fingentes tres sorores Phaërontis, Phaëntusam scilicet, Phæben & Lampetiam, cum per quatuor menses fratrem in Eridanum præcipitatum, quod currum Solis male duxisset, defleuissent, in Alnos tandem conuersas. Vide Ouidium *Methamorph. ij. fab. ij.* Huius fabulæ Vergilius quoque *Ægloga vi.* meminit.

*Tum Phaëthontiadæ musco circumdat amara
Corticis, atq; solo proceras erigit Alnos.*

NOMENCLATURAÆ.

Quo nomine hæc arbor, quam Germani *Ærlenbaum/oder/Ællernbaum* dicunt, apud Dioscor. appelletur, mihi non constat. Latinis certe Alnus dicitur, Grecis *αἰνός* teste Theophrasto lib. de plant. hist. iij. capite xliij. quo in loco idem author sterilem dicit Alnum. Aristoteles uero inter naturæ miracula retulit, Alnos in sola Creta non esse steriles. Existimo autem hunc fusca & rotunda illa capitula, in quæ florem Alni definere iam diximus, intellexisse.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTVM.

In medicina Alni exiguus est usus. Proinde possunt folia recentia ad calidas affectiones usurpari.

EX.

EXTRINSECVS.

Folia Alni uiridia imposita, tumores discutunt & inflammationes re-
ringunt.

Hæc tabellarij, alijsq; si quando in æstu defatigati fuerint, ut commode
pedibus incedere non queant, calceis imponent, hac enim ratione dolor
mitigabitur, & calor ac lassitudo extrahetur.

Folia Alni uiridia, roreque mane madentia conclauius inspersa, ac post
horæ spatium rursus amota, purgato conclau, pulices fugat, nam hisce fo-
lijs hærentes exigi possunt.

E cortice Alni color ater conficitur. Infectores namque & pilearij corti-
ces Alni & ferrum uetus, aqua per aliquot dies macerant, hinc color efficitur
niger, atramenti similis.

Lignum Alni uasis culinarijs, sutorumque formis, neque non cotum qui-
bus messores utuntur receptaculis conficiendis utile est.

Ruellius de nat.
stirp. lib. 1. cap.
50.

In palustribus locis infra fundamenta ædificiorum palationibus crebre
fixa, permanet immortalis ad æternitatem, & sustinet immania pondera
structuræ, & sine uitij conseruat, quod aëre sit & igni plurimo tempera-
ta, non multum terreno, humore pauco. Itaque non potest extra terram pau-
lum tempus edurare, sed in humore obruta permanet, ad diuturnitatem.
Nam multa ædificia sub fundamentis, eius generis habent palos. Hæc ille.
Obseruatum est ut quidam testantur, & ego ipse uidi, eiusmodi palos lapi-
descere, tantum abest, ut pereant humo obruti.

De Vlmo. Cap. LXIII.

VO IN GERMANIA NOSTRA MAXIME EA QVÆ
D Rheno fluuio cōtermina est, Vlmi genera reperiuntur, quorum
alterum latius sese diffundit, alterum procerius euadit, utrunque
1. Vlmius proceræ, uero agro Vormatiensi perfamiliale, nam ijs in locis nullæ fere aliæ arbo-
res plantantur quam Vlmius, Populus alba & Salices. Ex his Vlmijs perque
proceræ euadit, nullo fructu prægnans, in humectis ut plurimum pratis, ad
2. ripas fluminum, & in circuitu pagorum proueniens, ædificijs construendis
Vlmius lata. expetita. Alterius uero generis Vlmius & ipsa in altum attollitur, sed
plurimis ramis in latitudinem magis diffunditur. Gaudet agris ædito lo-
co sitis. Florem suum hæc arbor profert, qui & fructus eius est, antequam folia
producat. Hic Atriplicis maioris seu hortensis foliatum refert semen, nam
singuli flosculi per se spectati oboli latitudinem obtinent, & a maturitate
in auras auolant. Theophrastus lib. de historia plant. iij. cap. viij. Vlmius
uuas

Vlmus.
Küstholz.



quas & folliculos quosdam ferre scribit. Id genus Vlmī mihi ignotum est.
Folia utriusq; Vlmī iam a nobis descripti complicata quodammodo ap-
parent, crispacq; ac Orni folijs longiora, quæ cum Aprili aut Maio mensē
pluuīæ

Vergil. Geor. 4.
Ille etiam seras
in uersum distul-
lit Vlnos.

pluujijs, subitoq; calore solis insequente infestata fuerint, corrugantur pro-
 tinus, ac tum ex illo humore in corrugatis folijs uermiculi exigui culicum
 formam gerentes nascuntur, qui progressu temporis euolant. Pari ratione
 & Chamæcissi tenella folia uitiantur. Quomodo uero Vlnus serenda sit,
 Columella lib. v. cap. v. docuit.

NOMENCLATURAÆ.

Theoph. lib. 3.
cap. 14.

Germanica.

Diosco. lib. 1.

cap. 96.

Theoph. lib. 2.

cap. 9.

Cnipes.

Pfenes.

Plinius lib. xvi. cap. xvij. quatuor Vlmi genera ponit, Montosam scilicet, seu ut Theophrasti habet interpres Montiummum, Campestem (Germanice Jeldrüster hæc, fructum fert) Attineam, quæ excelsissima est (Germanice der hochlang Vlmerbaum) syluestrem (Germanice der wild Rüsterbaum) Vlnus Hebræis מלח Thidehar, Esaiæ xli. Græcis *μαλιν*, Germanis Rüstholz, Vlmerbaum, Yffenholz, Ylman, vnnnd Lindbast nuncupatur. Semen Vlmi Samara dicitur, teste Plinio. Vermiculi qui in folijs Vlmi nascuntur *uittas* uocant, sicut eos qui in Ficis gignuntur *uittas* nominant Græci.

VIRES AC TEMPERAMENTVM

Galenus de Vlmo lib. de simpl. facultatibus scribit. Vlmi folijs quandoque recens uulnus glutinauimus, confidentes astringentem pariter & abstergentem inesse illis facultatem. Hæc ille. Chirurgis ergo hæc folia inferuire poterunt.

INTRINSECVS.

Dioscorides crassiores Vlmi corticem in uino aut aqua frigida undatim potum, pituitam trahere scribit. Ego id minime expertus sum. Quamquam id testatur Columella lib. ix. cap. xij. apes ubi se post hybernæ famem famera, hoc est, flore Vlmi impleuerint profluvio alui interire, nisi succurratur, sicut & Tithymallis. Eamque esse causam, cur in regionibus Italiae, quæ sunt eius generis arboribus confitæ, raro frequentes durent apes.

EXTRINSECVS.

Vlmi folia uiridia & corticis tilia uulnere glutinant, quod non solum Dioscorides affirmavit, sed & Galenus obseruans, experientia ita se habere didicit.

Folia recentia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur.

Fracta ossa celerius solidescunt, si decocto foliorum, corticis aut radice foueantur.

Ligno Vlmi ad ædificia & fabrilis instrumenta utuntur.

*De Amygdalo. Cap. LXV.**Mandelbaum.*

R EDEAMVS NVNC AD CAMPESTRES ET FRVGL
feras arbores, à quibus digressi, montosas et aquaticas nonnul

ZZ

las stirpes hæcenus explicuimus. Ac ante omnia ad Amygdalum nos con-
feremus, cuius tria ad minus genera in tractu Rheni non paucis locis, utpo-
te ann der Hart circa Diedesheim/ & Niewenstat/ & Wachenheim oppida,
1. reperiuntur. Sunt enim quæ Amygdala dulcia proferunt, eaq; alia du-
2. ro ligneoq; putamine, alia uero molliore, ut quæ facile dentibus comminut
3. possint, obducta. Tercium genus amara prorsus fert Amygdala, gustuq;
nucleos Persicæ mali referentia. Omnia uero Amygdala puluinati caly-
cis operimento protegentur, quod non citius abijciunt, quam maturen-
tur, id quod in Autumno fieri solet. Amygdalus omnis vere cum Persica
arbore candido emicat flore, admixta modica purpura. / A flore angusta
subsequuntur, Salicisq; haud dissimilia folia. Quo pacto uero Amygdalus
feri, transferri, inferi & ferax effici possit diligenter cap. xvi. lib. ij. Palladius
docuit.

Amygdalus gummi quoddam ueluti Prunus exudat, quod in medici-
na suum quoque usum habet.

NOMENCLATURAE.

Amygdalus Latinis, Mandelbaum Germanis, *amygdali* Græcis, *W*
Schaked (Hieremiæ j.) Hebræis hæc arbor dicitur. Cato Amygdala, quæ
Germani Mandeln interpretantur, Græcas nuces primus uocauit, quæ uer-
ba quidam de amaris Amygdalis priuatim intelligunt. Vide Ruellium li-
bro primo cap. li. Serapio Amygdala laum uocauit cap. lxxxij.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Amygdalæ amaræ natura sua sunt calidiores dulcibus. Proinde tam
medico quam coquo utraq; inferuiunt.

INTRINSECVS.

Amygdalæ in cibo usurpatæ, præsertim si pulres exijs conficiuntur adhuc
bita aqua in qua candens chalybs extinctus fuerit, aluum lubricam astrin-
gunt.

Quæ qualitatem amaram (inquit Galenus lib. ij. de alimentis) habent
præpollentem: æ ad pus & succos crassos ac lentos ex thorace & pulmonib;
bus expuendos plurimum conferunt.

Dioscorides docet Amygdalas in cibo contra sanguinis reiectiones as-
sumi.

Amygdalæ in cibo usurpatæ, thoracis, pulmonumq; uitijs, hepatisq; &
lien-

lienis obstructionibus, renumq; & uelicæ affectionibus cōferunt, earumq; partium meatus aperiunt. Iuscula ergo Amygdalina suspiriosis & tussientibus prosunt, neque non pulmonibus, hepati, lieni & renibus commodāt, id quod omnes uno ore pronunciant medici.

Ex Amylo & Amygdalis seplasiarū magnis dominis placentas Marci pan uulgo uocatas conficiunt, quas consultius erat ægris exhiberi, quam nocturnis comotationibus inferuire.

Amygdalæ in cibo assumptæ humido uentriculo, ileosis & calculosis utiles sunt.

Succus Amygdalæ amaræ expressus, coxendicum dolores lenit, teste Sereno.

Gummi quod ex Amygdalo arbore defluit, sanguinis excreationibus mederi Serapio tradit.

Sunt qui asserant ieiuno stomacho sex aut septem Amygdalas amaras deuoratas ebrietatem temulentiamq; arcere.

Scribunt etiā ueteres uulpes si cum quadā esca Amygdalas amaras deuorauerint emori, quod superioribus annis in sefe quodam in Italia obseruatum, qui cum aliquot amaras Amygdalas degustasset, miserabiliter extinctus fuit, testis est Marcellus Vergilius.

EXTRINSECVS.

Amygdalæ capitis dolori auxiliantur illitæ fronti aut temporibus cum aceto uel rosaceo, omnis generis pustulas in facie subortas sanant.

Epynictidas sanant ex uino, item putrescentia ulcera & quæ serpunt, & morsus canum cum melle.

Gummi impetigines quæ summum corpus occuparunt illitum cum aceto tollit.

Amygdalinum oleum ad aurium, capitis, coxendicum, & renum dolores efficacissimum est.

Amygdalæ amaræ radicum tritarum decoctum, uitia cutis in facie corrigit.


Lixiuum e cinere ligni & putaminum ligneorum Amygdalæ confectum, corrosiuum est efficacissimum.

De Nuce iuglande.

Cap. LXVI

N VX IUGLANS MULTOS ANNOS SUPERVIVIT AC mirum in modum grandescit, Cariem uetustatemq; non sentit.

Nux iuglans.
 Welschnußbaum.



quare materies eius ampla, nigricans, undatimq; crispa. Mensis & utensilibus lautis dicatur, neque non instrumentis ad torcularia Autumni tempore necessarijs, alijsq; operibus. Iuglans tenera est arbor, in calidioribus regionibus

gionibus locisq; apricis feliciter proueniens. Nucibus suis eo more quo Amygdala feritur, & eisdem mensibus, nec inferi uult ut aliæ arbores, proinde eo quo diximus modo sata, quamprimum adolefcit. Nucis iuglandis multa sunt genera, quædam enim magnæ, aliæ exiguæ spectantur, alia putamine sunt duro, alia fragili, quæ differentia in Amygdalis quoque consideratur, ut superiori proximo capite docuimus. Sed mirum est quod proditur a ueteribus, quercum & iuglandem tam pertinaci odio dissidere, ut iuxta iuglandem depacta moriatur, quum mutari in quercum senio nonnulli tradant.

Nux iuglans statim quam folia tenera ac rubicantia, suauiterq; odorata facere cepit, panicula quoque prælonga, callo squamatim compactili protracta ordine nucis pineæ protuberat, quæ ubi nutans caducaq; prolabitur, nuces prorumpunt exiguæ calloso herbaceoq; cortice inuolutæ, sæpe senæ aut denæ, interim plures, quandoque pauciores uno petiolo contractæ. Folia, cum adoleuerint, lata apparent, & sena aut septena seque mutuo respicientia, uno pediculo dependent, quorum odor capiti molestus est. Caudex cinereo cortice, eoq; per senium hiulco, & in rimas altas dehiscente uestitur. Omnis autem nux primum unam mittit radicem, et simplici stylo prorepit: cum ad scrobis solum radix peruenit, duritia humi coercita recuruatur, & ex summo duorum ramorum ambas radices emittit.

Nuces nudas & sine putaminibus ædent iuglandes, ut pollicetur Africanus, si fractis utrinque carinis, integer nucleûs illæsa prorsus carne, lana, uel uitigineis folijs recentibus, aut Platani frondibus obuoluitur, quominus a formicis enucleatus erodatur fructus: dein terræ mandetur.

Si nodosa uel prædura nux gignatur, cortex in orbem uulnerandus, ut noxium exigat humorem. Vafoniæ, qui locus ad Rhenum situs est, iuglans reperta est, quæ ante diem D. Ioanni sacrum neque folia, neque nuces ostenderet. Cum uero id tempus adesset, par reliquis Nucibus erat, quod ad fructum & folia attinebat, id quod singulari naturæ miraculo fieri credo.

Eiusmodi arbores Gengenbachinae hodie etiamnum exstant.

NOMENCLATURA:

Nux iuglans ex Perside primum allata traditur, unde illi nomen, Nux Persica, regia, Græca, Euboica, græce *καρυὴν βασιλικήν*. Caryon uero Græcis a capitis grauedine uocatam ambigit nemo, & arborum ipsarum foliorumq; uires in cerebrum penetrant, hocq; in cibis earum nuclei minori momento faciunt.

Diosco. lib. 1. cap. 146.

Latinis Iuglans, Iouis glans, & Diuglans, Hebræis *אגגוס* Aeggos (Canticorum vi.) Germanis *Welschnußbaum* / *Nußbaum* / Serapioni cap. clxij.

Leum, Gallis Noireus appellatur. Nuces tarentinae eae uocantur quae tenerae & mollia habent putamina, Duræ uero & nodosae Germanis Grubelnuß dicuntur.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Nuces siccae calidioris sunt qualitatibus quam uirides, quae uentrem manducatae subducunt. Sicca ardentes in lingua excitant pustulas & exiguum praebet corpori alimentum, uti Galenus lib. ij. de alimentis testatur. In Sueviae nuces magni fiunt. Qui Rhenum accolunt, in quibus partibus agros sepe totos nuxiuglans obsidet, oleum ex ea facitur.

INTRINSECVS.

Nuces iuglandes non cuique in cibo conueniunt. Stomachum enim grauant, difficilis sunt concoctionis, dolorem capitis inferunt teste Dioscorido, bilem in stomacho augent, tussimque & uomitiones pariunt. Plinius lib. xxij. cap. viij. in hunc modum scribit.

In sanctuarijs Mithridatis maximi regis deuicti, Cn. Pompeius inuenit in peculiari commentario, ipsius manu scriptam compositionem antidoti, duabus nucibus siccis, item ficis totidem, & Rutae folijs uiginti simul tritis, addito salis grano, & qui hoc ieiunus sumat, nullum uenenum nociturum illo die. Hæc ille.

Plinius eodem in loco.

Contra rabiosi quoque canis morsum, nucleis a ieiuno homine comenducati, illitique, praesenti remedio esse dicuntur.

Quidam guliocam (sic enim callosum illum herbaceumque ac exteriorem nucis corticem uocari tradunt) arefaciunt, inque puluerem redactam, piperis loco in condiendis cibis usurpant. Quod si huic pulueri folia Saluiae siccata ac tusa admisceas sane non contemnendi saporis condimentum habebis. Pari ratione prima ac tenera rubraque foliola siccata ac tusa usurpari possunt.

Nuces iuglandes exiguae immaturae circa Festum Diui Ioannis lectae ac Saccharo aut melle conditae aegris exhibentur a mulierculis, quarum concoctionem ipsis relinquemus.

EXTRINSECVS.

Nuces iuglandes illinuntur mammarum inflammationi, abscessibus, luxariisque, cum mellis exiguo & Ruta, cum cepa autem sale & melle, canis hominisque & simiarum morsui proficiunt, liuoresque in corpore illitu tollunt.

Aqua

Aqua ex immaturis nucibus circa diem D. Ioanni sacrum distillata in inflammationi mammarum, abscessibus, & luxatis conducit.

Tormina, cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ sedant teste Dioscoride.

Putamen combustum tritumq; in oleo & uino, infantium capite peruncto, nutrit capillum, alopecias replet.

Nuclei usti ex uino triti & illiti carbunculis medentur.

Oleum quod è nucibus tuis exprimitur, ad eadem facit.

De Auellana nuce. Cap. LXVII.

CORYLVS QVÆ ET AVELLANA NVX DICITVR,
in Germania syluis plerunque uliginosis, ut in Vualgoia, partibusq; Rheno finitimis, alijsq; locis luxuriat, ita ut Corylo montes uestiantur, & integra nemora scateant. Corylus alia magnas, alia exiguas, quædam oblongas, nonnulla rotundas largitur nuces. Satius Corylus quæ rubras & oblongas fert nuces, dysentericis utiles (qua de causa Germanis Rburnuß uocantur, alias Rothaselnuß, oder Römisch haselnuß dictæ) in hortis passim plantatur. Huius fructus Augusto mense, alterius Autumno maturatur. Omnia Coryli genera exiguos ac rubros flores, Croci staminibus perbreuib; similes, antequam folia fundant, ostendunt. Februario mēse, cum iuli quos nonnulli coryli florem sed perperam statuunt, colorem luteum acquirunt. Floris Coryli Theophrastus lib. de historia stirpium iij. cap. vi. meminit, licet Leonhartus Fuchsius & Ioannes Ruellius alijsq; nonnulli constanter negent Corylum florere, quod proculdubio non erant facturi si in naturæ libro hunc florem unquam uidissent. A flore corrugata, rotunda, & suauiter odorata folia erumpunt, Alni frondi similia, sed asperiora & per ambitum modice serrata. Caudex Coryli quotannis multis stolonibus, seu uirgis fruticat, quæ si non lædantur, intra paucos annos ita crassescunt, ut ex his circulos doliares elegantissimos conficere queas. Caudex ubi annosus fuerit, cortice obducitur incano, & uiscum nonnunquam producit. Radix longe lateq; se diffundit, nodosaq; ac undatim crispa efficitur, ex qua uasa & suppellectilia uaria fabricantur, quæ ad longos annos durant, nec facile corrumpuntur.

1. *Corylus syluestris.*

2. *Corylus sativa.*

Coryli flos.

NOMENCLATURA.

Nuces auellang. uel. Auellinæ, alias Prænestinæ, & Heracleoticæ Latinis Dioscor. lib. 1. dictæ, Græcis *ἀνρύα πεινικὰ*, & *ματινάρνα*, Germanis *Haselnuß* / Hebræis *ע.פ. 146*;

*Auellana nux.**Baselnuß.*

𐤀𐤋𐤁 Lufim, Gene. xxx. di-
 cuntur. Arbos ipsa Cory-
 lus Latinis uocatur. Villus
 nucis auellanae qui compae-
 stili callo dependet Theo-
 phrasto lib. iij. cap. viij. in-
 dicitur. Germani Baselnuß
 fen/oder das getreid uocāt.
 Cortex exterior nucis auel-
 lanae Calyx dicitur, Germa-
 ni die eüsserst schelet / oder
 leiffel uocant, Est autem ca-
 lyx omnē putamen, in quo
 aliquid includitur, & in nu-
 ce iuglande & auellana, &
 quercu &c. neque non folli-
 culus qui florem & semen in
 plantis concludit.

Quod circa radicē agna-
 scitur Germanis. Maser di-
 ctum Theophrastus ἀμφύρι
 & ἀμφύριον uocat, Gaza cir-
 cumauktionē, & circumag-
 nationem interpretatus est.

VIRES AC TEMPE- rumentum.

Nuces auellanae stoma-
 cho tenuioribusq; intesti-
 nis infestae sunt, maxime si
 non satis maturae fuerint, id
 quod non solum uersiculus
 Macri.

Ex minimis nucibus nulli datur
 esca salubris.

sed etiam experientia docet, Pueri namq; cum Augusto mense nuces auella-
 nas auide deuorant, facile in dysentericum morbum incidunt. Simeon Se-
 thi calidas & siccas esse statuit,

INTRIN.

INTRINSECVS.

Nuces auellanae probematurae, tritae, & in aqua mulsa potae tussi ueteri mederi, tostae & cum exiguo piperis potae destillationem concoquere traduntur. Oleum nucum auellandarum ad eadem efficacissimum.

EXTRINSECVS.

Crematarum cinis cum axungia aut adipe vrsi perunctus alopecij capillum reddere dicitur.

Plutarchus scriptum reliquit, quoties Coryli nucula laquearibus appensa cohaerebit, scorpium in domicilia non irrepet.

Non est omittendum (inquit Ruellius de nat. stirp. lib. j. cap. lv.) quod simplex rusticitas obseruauit, serpentem obtorpescere, quae Coryli caudice uel furculo fuerit icta, & tandem emori.

Ego uero non dubitarim fustes, quas ex Coryli radicibus rustici desumptas hinc inde secum gestant, id nullo negotio efficere posse, quibus uel canem rabiosum interficere difficile non sit.

De Nuce Vesicaria. Cap. LXVIII.

VX VESICARIA QUOCVNQVE IN LOCO PLANTATA facile prouenit. Seritur autem nuculis, neque non furculis, seu stolonibus, qui quotannis e radice prosiliunt, sicut & uirgae Cotoneae mali & Coryli in singulos annos fruticare consueuerunt. Hii stolones seu uirgulae tenellae Autumno aut vere appropinquante, euulsae transplantari possunt. Folia nucis vesicariae Fraxini similia sunt, aut Sambuci, sed uiridiora ac teneriora. Maio mense candidi, rotundi, & multiplices, ac saepe quatuor aut quinque coniuncti emicant, qui in cauas tandem abeunt uescas. Autumni uero tempore, per maturitatem binae aut ternae ut plurimum, fuscae & dulces nuculae in his uescis reperiuntur.

NOMENCLATURA.

Germani has nuculas Pimpernüsslin uocant. Quidam illas sub Pistacis Dioscoridis libro primo cap. cxlv. comprehensas uolunt, arboremque ipsam Staphylodendron, quo de Plinius lib. xvi. cap. xvi. uocant. Verum cum Plinius Staphylodendron siliquas ferre dicat, haec uero uescas ut diximus gerat, non uideo quo iure ex Nuce vesicaria Staphylodendron hi faciat.

Nux Vesicaria.
Pimpernuſ.



nisi forte per filiquas, uesticas intelligere uelint, quod per nos quidem illis licebit. Nos tamen in praesentia Nuxces uesticarias & folliculares nuncupabimus, quoad emergat aliquis qui certiorē nos doceat nomenclaturam.

Pistacia Germaniae incongnita sunt, & ut ueteres docent in Syria gignuntur. Oficinæ hodie Fistica, & Fisticorum grana uocant. Serapio cap. lix. Pistech uocent, mirum à Pistaciae nomenclatura deflexa nominauit.

VIRES AC TEMPERAMENTUM.

Arabes Pistacia calida et sicca esse statuunt, & ad obstructions epatis facere, pulmonum & thoracis uisitia purgare, sanguinemque subtiliare (ut uulgo dicere solent) Quæ omnia de Pistacijs intelligo, nihil enim de nostris Vesicarijs nuculis affirmare uolo.

INTRINSECVS.

Pistacia pituitosis, & his qui multo phlegmate abundant, conueniunt, pituitam namque incidunt, extenuantque, quo nomine epati pulmonibusque, & renibus apprimè conducunt, teste Serapione,

Diosco-

Dioscorides Pistacia stomacho amica, tritaq; contra serpentium ictus siue edantur, siue bibantur, prodesse pronunciat, quæ an de nostris quoq; Vesicarijs nuculis intelligenda sint necne, aliorum esto iudicium.

E nuculis istis apud nos orbiculos precatorios conficiunt, qui preces numeratas Deo offerunt.

De Castanea. Cap. LXIX.

EDEAMVS NVNC AD NVCES GRANDIORES, AC
 R de Castaneis nonnihil dicamus, quæ magno quæstu ex Alsatia in Thuringiam & inferiorem Germaniam conuehi solent. Castanea siccano, excelso & sabuloso gaudet solo. Luxuriat hæc circa Vveissenburgum imperiale oppidum, non procul a pago Dörienbach uulgo uocato, neq; non in Alsatia superiori, ita ut magna nemora illa scateant. Grandescit temporis progressu, quercuumq; annosarum crassitudinem adipiscitur: Folia gerit longa, serræ instar incisa, angusta & aliquantum rugata, seu plicata. Fructum præcedunt nucamenta propendentia, eaq; longa & lutea, Nucis iuglandis iulis quamsimilima. Calyx echinatus quo fructus inclusus latet, Erinacei animalis pelli forma respondet, intus uero uilloso se rigi instar tactu mollis est. Hoc inuolucro plerumque binæ aut ternæ includuntur nuces puniceo cortice obductæ. Autumno appetente echinati calyces rumpuntur, ac tum maturæ decidunt Castaneæ. Quidam tamen præ longis uirgis Castaneas, sicut & nuces iuglandes arboribus decutiunt.

Castanea nuce seritur, sed tardius prouenit, quare consultius est furculis illam ferere, eosq; effosos transferre. Virgas primum fert tenues & phœnicei coloris, quibus olim Iacob soceri sui spem, quam de multiplici accopioso fœtu conceperat, ingenioso dolo elusit, Gen. xxx.

NOMENCLATURÆ.

Castanea Latinis κάστανά Græcis, ארמון Armon Hebræis, Bestenbaum / Diosco. lib. 2. oder Castanienbaum Germanis hæc arbor dicitur. Fructus Nux castanea, cap. 126. διὰ τὰς ἀλάνες, ἢ σαρκινὰς ἀλάνες, ἢ λίπινες, Iouis glans, aut Sardiana glans, & κάστανά appellatur, a Castano Magnesiæ oppido, unde primum aduecta dicitur, Germani Besten vnd Castanien uocant. Serapio Sadianalach, & Stebulos uocauit cap. xcvij. Ruellius de natura stirpium lib. 1. cap. lxi. multas Castanearum species proponit, quarum alias populares seu coctiuas, hæ sunt uulgares, alias Tarentinas, alias Balanitides, qualdam Corellianas, nonnullas Meteranas, & quasdam Triangulas nominat.

Castanea.

Beechendaum.



VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Castaneæ natura sua non nihil calidæ & siccæ sunt, aluiq; quasuis fluxiones fere inhihent, ac inter omnes glandes Galeno teste, principatum tenent.

INTRIN

INTRINSECVS.

Caro Castaneæ his quiephemerum biberunt, ut refert Dioscorides conueniens est.

Castaneæ in cibo usurpatæ difficilis sunt concoctionis, crassos humores generant, caput tentant, uentrem inflant & obstruunt. Quanquam tostæ in nocentiores ac salubriores esse tradantur, auctor est Simeon Anthioçenus medicus. Quod ad me attinet Castaneas Sueuis & Thuringis lubens concesserim.

Aquâ in qua cum suo cortice decoquuntur, coeliacis, dysentericis, sanguinemque excreantibus bibenda haud inutiliter propinatur, auctor est Plinius Valerianus.

De Quercu. Cap. LXX.

VENIADMODVM POMIFERAE ARBORES OMNES pene, uaria pomorum genera ferunt, ita Quercus, quæ & ipsa non unius est generis, glandes magnitudine forma, & maturitatis tempore differentes producit. Alia enim magnas, alia exiguas, hæc oblongas, illa rotundas profert, quarum omnium aliæ circa diem D. Bartholomæo sacrum, aliæ Autumni tempore maturantur. Quercus quæ solis beneficio in uniuersum priuata fuerit, quod ad lignum ipsum & fructum attrita est, durior est, deterior & minus tractabilis, ita quidem ut lignum quercus a sole auersæ, difficile sit findere, quod nostri rustici Winter schlegig holz, quasi dicas lignum rigidum uitioque hyemis induratum, ac intractabile, instrumentisque renitens, interpretantur.

Folia quercus cuiuscunque in initijs tenerissima sunt, quæ comitantur oblongæ & luteæ cachryes. Hæc uero circa diem Diuo Georgio sacrum Quercus ostendit. Porro folia quercina quæ primum quidem lutei sunt coloris, (licet nonnulla rubicunda appareant, maxime ea quæ e nouellis quercubus erumpunt) subinde uiridiora ac solidiora euadunt. Post cachryas quas diximus, perexigui prorumpunt & rubri flosculi, qui in glandes tandem abeunt, quarum non raro tres aut quatuor unico eoque tenuissimo insident pediculo. An uero glandes eæ ad frugem sint peruenturæ, circa diem D. Iacobo sacrum obseruari solet, tum enim e calycibus prorepere consueuerunt.

Cæterum duplici cortice glans ipsa contegitur, quorum exterior, durior & densior est, alter puniceus & acerbus deprehenditur, hic membranæ tenuissimæ instar nucleum glandis acerbum circumuoluit,

Quædam

1.
Folia.

2.
Cachryes seu
amenta.

3.
Flos.

4.
Fructus.

1.
Glans:
Calyx glandis,
das schiffelin
darin die eich-
el sitzt.

Putamen duplex

Quercus.
Eichbaum.



Onicicide.

Quædam quercus vere rotundas & fungosas, boletisq; similes ferunt pilulas, acerbæ humiditate plenas, in quibus uermes creantur, quæ in culices tandem abeunt.

Autumno

Autumno uero appetente in foliorum ea parte quæ terram spectat, pilulæ rotundæ & fungosæ apparent, senæ aut denique nonnunquam unico adhærentes folio. In his similiter uermes procreantur, quæ si Autumnus calidior fuerit, & ipsi in muscas & culices mutantur. Quanquam autem duo hæc pilularum genera, Gallæ uideri possent, non tamen sunt, nam quæ uera sit Galla, altero ab hinc dicemus capite.

Præterea non raro contingit, ut querna folia Autumno appropinquante sinistro in latere rotundas & candidas ostendat squamulas, easque caducas. Cumque hi flosculi (sic enim a rusticis ex squamulæ nominantur) apparent, spem omnes concipiunt, copiosi subsequente anno glandium prouentus.

NOMENCLATURA.

Vulgaris Quercus Germanis Eichbaum, Græcis *Quercus*, Hebræis (ut nonnulli sentire uidentur) *אֵלָא* Ela, & *אֵלֹן* Elon dicitur. At dura illa quercus, quam Latini Robur nominant, apud Germanos *Bageichen*, vnde *Eichholtz* nominatur. Theoph. & alij rei herbariæ scriptores, multa quercus, seu ut Gaza trāstulit Roboris genera commemorant, primo loco Quercum, quæ maximas ferat glandes (nam reliqua genera exiguas procreant, & Cerrus quidem calyce echinato uti Castanea incluso fructu Galla uocato prægnat) secundo Esculum, tertio Robur, quarto Cerrum, quinto Illicem, quæ spinis horret, sexto Suber collocantes. Glandes Hebræis, uti Elias Leuita in nomenclatura sua testatur *אֵלֹן* Allonim Græcis Balani, Serapioni Kullot cap. xcvij. dicuntur. Pilulæ illæ inutiles quas folijs & ramis quercus adnasci docuimus, Germanis *Eichpffel* indicuntur. Galeno Onicicidæ, hoc est, pilulæ asininæ appellatæ.

^{2.}
Pilula asinina.

^{3.}
Squamati quercus flosculi.

Quidam hæc uocabula de Terebintho interpretantur, alij generales arborum omnium apud Hebræos appellationes esse contendunt.

Theoph. lib. 3. cap. 9. Ruellius lib. 2. de na. stir. ca. 83. 2. 1. 1. 1.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Quæcunque in quercu spectantur, omnia ea glutinandi ui pollent, præsertim liber qui cortici & ligno intercedit, quin etiam tunica putamini glandis subiecta. Hæc inquam omnia calefacientem & astrictoriam habent facultatem, glutinandis uulneribus, sanguinisque fluxionibus sistendis utilissima.

INTRINSECVS.

Decoctum libri qui cortici & ligno intercedit, & tunicæ putamini glandis subiectæ quasuis alui & uulnæ fluxiones inhibet efficaciter, neque non gonorrhœam, datur & sanguinem excreantibus.

Aqua è tenera ac recens prorumpente quercus fronde, aut immaturis glandibus.

glandibus distillata ipsdem donata est facultatibus, pueris maxime in commemoratis affectionibus exhibenda.

Hij qui à uenenatis animantibus aut serpentibus morfi uel icti fuerint, qui uenenum hauserunt, uel Cantharidas biberunt, ita ut sanguinem mingant, quod ipsi aliquando uidimus, glandes in puluerem redactas bibant, ac sentient opem.

Der gutt Foch
Hunger ge-
nant,

Quidam glandes aridas aduersus calculum exhibent, quod medicamentum diuitibus minime conuenit. Illi namque sua pharmaca ex India & Arabia petere solent, dictitantes, glandes cibum esse porcorum, quod illis damus. Atqui testantur ueteres, olim panis loco glandes escitatas à mortali- bus, quam rationem inire fames quæ non solum optimum est condimen- tum, sed etiam optimus coquus ut Germanicum habet prouerbium procul dubio illos docuit. Galenus quoque de glandibus lib. de alimentorum fa- cult. ita scribit.

Glandes æque nutriunt, ac frumentaceorum eduliorum ple- raque. Atque olim quidem (ut aiunt) homines ex ipsis duntaxat ui- uebant; Arcades autem, cum reliqui Græci fructibus cerealibus uescerentur, eas diu in cibo retinuerunt.

EXTRINSECVS.

Galenus folijs quercus, quum nullum aliud medicamentum ad manum esset, uulnus securi inflictum glutinasse se testatur. Manifestum proinde est, ac plerisque compertum folia querna uulneribus esse utilissima, eaque recen- tia conseruare, præterea lauamenti uulnerum commodissima.

Folia quercus tenera & rubicunda uino decocta, collutu ac gargarissatu- dentium dolorem sedant, qui à frigidis fluxionibus ortus fuit, sed sæpe hoc decocto calido os colluendum erit.

Vsum corticum quercus coriarij. alijque opifices norunt.

Ligni uero usum & utilitatem nemo facile explicabit. Siquidem inter omnia alia lignum nullum perennius, nullum etiam ad plures res, hoc est, ædificia, utensilia & instrumenta, tam ea quæ in terra, quam quæ in aquis usui esse possunt, adhibetur, querno. Ex eo n. utensilia ut diximus, & dolia uinaria, ac ea etiã quibus pisces ad nos conuehuntur apud nos cõficiuntur.

De Galla. Cap. LXXI.

VM ARBOS EA QVAE GALLAM FERT, PECVLI-
C are Quercus sit genus, uolui seorsim mentionem eius facere.
Proinde

Galla.

Gallöppfel.



Proinde in Germania nostra nusquam hæc brevis ac fruticosa quercus prouenit, nisi peculiariter plantetur.

Cæterum Illicem quæ folia habet aculeata, & grana coccifera, quorum pretioso succo diuites lanæ inficiuntur cum peregrina sit, & nostræ Germaniæ incognita consulto hoc loco præterimus. Si quis tamen desiderio cognoscendi eius teneatur, is legat Theoph. cap. ix. lib. iij. de historia plantarū, & cap. lxxxviij. lib. j. de nastirpium Ruellij.

NOMENCLATURAÆ.

Quanquam omnes quercus Gallam ferant, ut placet Theophrasto lib. de histo. plantarum lib. iij. cap. ix. tamen pilulæ quæ nostris quercubus adnascuntur nullius sunt momenti, quo nomine recte illas Galenus *ironnidæ*, uocauit, hoc est, pilulas asininas (Germanice *Eselsöppfel*.) Nos hoc loco de ea loquimur, quam Latini Gallam, Germani Gallöppfel uocāt, cuius usus est in atramento, & atro colore conficiendo.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Gallæ facultates sub glandibus fere explicatæ sunt. Eius usus est cum uel

obstruere uel astringere necesse sit. Ex ea etiam color fit niger.

INTRINSECVS.

Aqua in qua Galla decocta fuerit, si illa cibi parentur, quæuis alui profluuiâ, præsertim uero dysenteriam cohibet. Quidam aduersus eas affectiones Gallam in puluerem redactam, in uino rubro præbent.

Reliquas facultates cum libro qui cortici & ligno quercus intercedit communes obtinet Galla.

EXTRINSECVS.

Galla in puluerem redacta prodest fluxionibus gingiuarum & uuæ.

Galla cremata carbonibus dum excandescat, tum uino, aceto, uel acida muria restincta sanguinis proluuiem supprimit. Sistit menses uuluasque proidentes, earumque fluxiones, insidentium fotu. Macerata aceto uel aqua capillos denigrat, quod equidem mirum uideri non debet, cum ex Galla & uitriolo atramentum scriptorium conficiatur, quod & infectores & scribe probe norunt.

De Fago. Cap. LXXII.

AGVS ADMODVM CRASSO ET MAGNO CAV DICE
F assurgit, proceraque euadit, multis in amplitudinem diffusis ramis brachiata. Senio confecta cauatur, sicut & quercus nonnullæ, ita ut si aliud domicilium non suppetat commode in eiusmodi cauernis arboreis habitare queas. Memoria quoque proditum est Æsculapium in caua Fago Draconem nutrisse. Fagus Germaniæ per familiaris est, acin altissimis syluis humo pingui gignitur. Lignum habet solidum & spissum, & ad multa ac uaria usurpatur. Fagus glandes fert triangulas, exiguas & dulces, asperis ac echinatis calycibus inclusas. Circa diē D. Georgio sacrum quotannis & folia, & flores apparent, qui nihil aliud sunt quam rotundi iuli, lutei, ac his quos Betula profert magis exigui, caduci, ut & nucis iuglandis. Folia ab ortu ex luteo uiridia sunt, mox saturata uiriditatis, quorum averse partes si pluuia, solis estu continuo adurente (quæ Germani den *Miltau* uocant, perniciosum sane pluuie genus, quippe quod omnia quæ attingit corrumpat) infestata fuerint, e guttulis illius pluuie rubicantes ac concauæ pilulæ subnascuntur, in quibus uermiculi procreantur.

Fagea glans Autumni tempore cum Castanea maturatur, quæ si porcorum & murium gulam effugerit, perque hyemem illæsa durauerit, vere appetente e terra erumpit, binis per exortum latis & pinguibus folijs, quæ subinde plura alia consequuntur, donec in arborem tandem adolescat. Fagus olim Troiæ magno in honore habita fuit.

NOMEN

Germanice büch
inßlin.

Fagus.
Büchbaum.



NOMENCLATURAE.

Fagus Latinis, *φάγος* Græcis, *Faus* Gallis, *Büchbaum* Germanis appellatur. *Diosco. lib. 2.*
 Alterum *Fagi* genus, quod *Sciifimam*, *Oxyam*, et *Myson* uocant, apud *cap. 126.*

AAa η

nos minime prouenit. Vide Ruellium de natura stirpium lib. j. ca. lxxvii.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Fageaglans nonnihil calidæ obtinet qualitatis, porcis, muribus & turdis hyberno cibo gratissima. Rarus eius in medicina usus est.

EXTRINSECVS.

Folia recētia tusa et imposita calidis tumoribus profunt eosq; discutunt.

Multa uero utensilia ex ligno Fagi confici solent; ut sunt capsæ, scrinia, aliaq; uasa & instrumenta. Fagus in aquis durat incorrupta, madefactaq; firmior redditur; ædificiis aquaticis accommodatissima.

Aqua quæ in cauīs Fagis & annosis quercubus quandoque reperitur, singulari remedio ad omnis generis scabiem, & impetigines lichenasq; facit, quod ipse in pecoribus & hominibus expertus sum.

Vipera teste Ioanne Ruellio lib. de nat. stirpium ij. cap. lxxxv. faginei ramuli iactu uel oblatus cohibetur. Quod si ita est mirandam sane naturam Fagus obtinet.

De Orno. Cap. LXXIII.

Vergilius Aegl.

6.

quibus ille solebat.

Cantando rigidas deducere mōtibz Ornos.

INTER OMNIA LIGNORVM GENERA QVAE NOstræ syluæ proferunt, nullum durius ligno Orni reperias. Hoc candidum est, & Buxi instar, spissum solidissimūq; & quod non faci-

le findi sepatitur, unde ad rotas molares, cochleasq; neque non trochleas, & alia instrumenta quæ pondus magnum sustinent, expetitur uel maxime. Folia Vlmi similia gerit Ornus, perq; ambitum modice serrata. Semen Orni, quod florem tilia pene refert, nisi quod durius est, in medicina suum habet usum ut dicemus.

NOMENCLATURAE.

Ruellius lib. 1. cap. 105.

Quam Germani *Sänbûchen* / oder *Bagenbûchen* uocamus, ea Latinis ut nonnulli asserunt, Ornus dicitur. Huic sententiæ quidam reclamāt, dictitantes Ornum Fraxini esse speciem, quibus ut assentiar adduci non possum. Semen Orni officinae Linguam auis uocant. Græci Orneoglossum (uide Ioannem Ruellium de nat. stirp. lib. j. ca. xxxvij.) Arabes, ut Serapio capite cccxvi. Lifen Hāsafir, quod corrupte scriptum esse, omnes qui Hebræam & Chaldæam linguam, quibus Arabica cognata est, intelligunt, fateri cogentur. Sic ergo emendabitur *לשון חזזאפיר* Lischen Hazzaphir. Hebraei paucis mutatis uocalibus, manentibus omnibus cōsonantibus efferunt *לשון חזזאפיר* Leshon Hazzippor, hoc est, lingua auis.

VIRES.

*Ornus.**Banbüchen.***VIRES AC TEMPERAMENTVM**

Lingua auis calidæ est naturæ, urinam ciet, venerem defatigatam reparat, stimulatq; nam genituram auget, ut Arabes testantur.

AAa iij

De Tilia. Cap. LXXIII.

Lindenbaum.



Tilia sativa.

S

ED AGETILIAM NVNC CONTEMPEMV, CV
 ius duo apud nos extant genera. Tilia sativa elegantissima est,
 quod

quod ad frondem flores & fructum attinet, & plurimum grandescit, folijs Populi albæ, aut ut Theoph. scribit, Hederæ, sed maioribus, tactuq; mollioribus & tenerioribus, cernitur. Hæc quotannis circa diem Gertrudi sacrum, hoc est, æquinoctij tempore erumpunt. Flosculi Tiliæ rotundi, ac ex luteo albicantes, qui forma sua Periclymeni florem imitantur, plerunq; circa diem D. Urbano sacrum apparent. Ac solent ut plurimum terni odoratissimi flosculi uno tenuissimo petiolo dependere, qui in extremitate sua anteriore in tres diuellitur partes, cui etiam tenuissimum ac luteum adhæret foliolum ligulæ similimum. Flos ubi deciderit, fructus subsequitur rotundus, similis acinīs Hederæ, quo rupto (rumpitur autem Augusto mense) semen teres, nigrum, dulce, Raphaniq; semini magnitudine par excidit.

Caudex Tiliæ satiuæ mirum in modum grandescit, multosq; superuivit annos, cortice uestitur nigro & scabro, inter quem & lignum tunica uisitur, quæ tenuis est, obsequentissima, humoris lentore mollitiaq; flexilis, succosa, & dulcissima. Lignum uero molle est, unde illi proculdubio apud Germanos nomen inditum est, *Lindenbaum*/quasi dicas Mollis arbor. Rami adnati præsertim tenuiores fracidi sunt, non flexiles, ita ut facile frangi possint. Solent uero nostrates ramos Tiliæ ordine quodam in amplitudinem distribuere, ac palis suffulcire, ut sub umbra eius æstatis tempore homines sese recreare queant.

Tilia syluestris, satiuæ per omnia respondet, nisi quod folia & flores gerit magis exiguos, præterea & frondem nigriorem. Florem ædit tardius satiuæ Tilia, qui nullo post se relicto fructu aut semine decedit. Hoc Tiliæ genus in tenebrosis ac latissimis Vualgoiæ syluis prouenit, Theophrastus lib. iij. cap. x. in hunc fere modum suam quoque Tiliam delineauit.

2.
Tilia sylvestris.

NOMENCLATURAE.

Quamquam magnis laboribus stirpium nomenclaturas ex authoribus rei herbariæ hinc inde colligere, ac in gratiam studiosorum herbarum in commentarios istos referre bono animo studuerim, tamen quæ nostri sæculi est corruptio non magnam apud plerosq; inij pro laboribus meis gratiam. Cum namq; quidam, non solum stirpes omnes, sed & nomenclaturas earum probe cognitas se habere, alios uero nihil scire sibi persuadeant, nullius diligentiam æqui boniq; consulere possunt, quin ceu omnia tenentes, nulloq; doctore opus habentes, quoscunque alios magno fastu præ se contemnunt. Atqui prudens lector facile deprehendet, quæ auis alienis peninis, quod uē animal alieno uellere uestiatur. Sic enim natura fert quorundā animalium, ut alijs cibum subtrahant, ac suffurentur, interim uero ipsedem insidias struant. Quam iniuriam si quisquam alius, certe hortuli nostri non

Et pinguem Tiliam, & ferrugineos hyacinthos. Tilia Hebraeis (ut placet Eliae in nomenclaturis) אשכנח Ascherah dicitur.

sine dolore magno experti fuere. Sed ut relictis his pergamus, quam Germani Lindenbaum uocant, eam cum Theodoro Gaza & Vergilio Tiliam nuncupare placet. Siue ergo *φίλυρα*, siue *φίλυρρα* Theophrasto dicatur, nihil nos offender, cum & ipse Ægyneta Philyrada non Philyram uocare uoluerit, quæ Dioscoridi Philyrrea dicitur. Nam quas Philyrreæ suæ uires Dioscorides, eas Philyradi Ægyneta quoque assignat.

VIRESCENTIA ET TEMPERAMENTVM.

Columella lib.
9. cap. 4.

Tilia omni sua substantia mollis est, pinguis, folia habet mollia, succum lentum, glutinosam tunicam, nempe eam quæ cortici & ligno intercedit, dulcem. Quare ad ambusta maxime hæc usurpantur. Quanquam uero semen Tiliæ & ipsum dulce sit, tamen ab omnibus animalibus tutum est, quod & Theophrastus annotauit. Ego quod ad me attinet, crediderim florem Tiliæ apibus, licet ab illis maxime expectatur, minime conducere.

INTRINSECVS.

Quidam aquam distillatam, aduersus uentris tormina exhibent, & non sine ratione, nam intestinis a dysenteria erosio illa conuenit.

Alij aduersus morbum comitalem usurpant.

Tilia usta, aceto carbonibus restinctis, cum oculis cancerorum tritis sumpta, concretos sanguinis grumos exigit, his qui ex alto delapsi fuere, ita ut sanguinem excreent.

EXTRINSECVS.

Tunicæ seu libri medij qui cortici & ligno intercedit aqua macerati, lenit uiscosusque humor ambustis singulari remedio prodest, quod experientia multos docuit.

Ex ligno Tiliæ Idolatræ imagines, quas pro dijs & sanctis uenerantur, conficere solent.

Rursus ex carbonibus Tiliæ, quo pulueri Bombardarum parando adhibetur, præsentissima mors multis creatur, ita ut Tilia & salubria medicamenta præbere, & necem asferre possit.

De Betula. Cap. LXXV.

ET VLA PRISCIS TEMPORIBVS MAGNO IN HONORE HABITA FUIT, PROPTEREA QUOD UETERES ANTEQUAM PAPYRI USUS ESSET INVENTUS, LIBRO BETULÆ, HOC EST, CORTICI CANDIDO OPERA SUA INSCRIBERE.

Betula.
 Birckenbaum.



scribere soliti fuerint. Vidimus nos Curia oppido Rhetia superioris non
 nulla carmina in cortice Betulae exarata. Verum cum iam papyri confici
 endae ratio inuenta fuisset Bibliothecis abdicati sunt hii cortices, seu libri, ad

officinas eorum qui balistas conficiunt, & scholas relegati, in quibus uni olim magistratum uirgis terribilis fuit Betula, ita & hodie uirgeis pædagogorum sceptris pueros terret.

Betula in tenera sua ætate fuscum ostendit corticem, qui cum illa adoleuerit subinde candidior apparet. Folia quæ primo exortu plicata ac crispa prorumpunt, uiridi pulchreque herbaceo tinguntur colore, singula singulis ipsæque tenuibus dependentia pediculis, scuto exiguo forma similia, saturati uiridis. At iuli seu amenta rotunda, Fagis aut alneis respondent paniculis, nec decidunt ante Autumnum, sunt enim illa Betulæ loco seminis, ex quibus nouæ progignuntur Betulæ, quæ frigida ac arenosa terra cuiusmodi in altis & umbrosis plerunque montibus inuenitur, præcipue gaudent in eaque foelicius adolescunt. Inter omnes uero arbores uix aliam quamcumque reperias, quæ uere tam cito tantaque copia humorem & succum suum a terra hauriat, atque Betula. Nam in initijs ueris, antequam folia prodire, iam dulcem suum succum eumque adeo largum recipit, ut si arbor uulneretur limpidissimus liquor copiosus effluat, quem siti pressi pastores in syluis sæpenumero potare solent, quemadmodum & nos non semel eo liquore recreati fuimus, cum herbarum gratia uastas peragremus syluas.

NOMENCLATURA.

envidat
Theoph. de hist.
plant. lib. 3. cap.

14.

παιτυλ

Plerique ex doctioribus uno ore eam arborem, quam Germani Birkenbaum uocant, Betulam Theophrasti esse asserunt. Ego uero nihil istorum sententiæ detrahens, quod ad me attinet Papyri illam speciem esse dicam. Ut uero sic sentiam & forma arboris uniuersa & facultates me admonent, neque tamen hoc loco eam intelligo papyrum, cuius in historia plantarum lib. iii. ca. ix. Theophrastus meminit, qui longitudine super dena cubita non uenit. Apud nos equidem alijs quoque arboribus, ut quercubus &c. non una est facies, hæc enim procera & in magnam simul amplitudinem diffusa, illa breuiuscula, ac frutex potius quam arbor euadit, etiam centum annos nata. Quod in quercu fieri uidemus, quid obfiaret quo minus idem in reliquis contingat.

VIRESCERE AC TEMPERAMENTVM.

Quamquam Betula ad multos morbos utrinque faciat, tamen hodie ad seruilia opera potius quam medicinam adhibetur.

INTRINSECVS.

Succus Betulæ dulcis uerno tempore collectus, aduersus calculum & morbum regium potu auxiliari dicitur.

Quidam

Quidam eum succum destillant, & aduersus uaria macularum genera usurpant.

EXTRINSECVS:

Succus Betulæ, præsertim si distillatus (ut uulgo dicunt) fuerit, exulcerationes oris papulasq; sanat, & maculas exterit, collum. Eadē efficit & aqua e uiridibus folijs distillata.

Cortex Betulæ in cineres redactus, si ex his lixiuium paretur, ad eautia efficacius faciet.

Ventriculi pecorum, quibus coagulum lactis nostri parant, succo Betulæ conditi seu macerati, caseos omnes qui eo coagulo coeunt, a uermibus asserunt, certo id attestante experimento.

Ligni Betulæci usus uariis est. Nascitur enim Betula uirgis, quibus puerorum ignauia & lasciuia emendetur coerceaturq; deinde & scopis optimis apud nos præcipue nata uidetur.

Rustici etiam tempore messis uirgis teneris Betulæ mergetes colligare consueuerunt, sicut alia quoque, ad quæ hæ uirgæ commodissime adhibentur.

E papyro quoque Antigonus in re nauali funes fecisse proditur, ut scriptum reliquit Theophrastus.

Cortices Betulæ balistarijs, duri uero & crassiores caudices carpentarijs (ex his enim illi axes & absides conficiunt) relinquuntur.

De Pinu.

Cap. LXXVI.

ED REVERTAMVR IN ALTISSIMAS SYLVAS, ET montium iuga scandamus, Pinum quoque contemplaturi. Pinus nobilissima illa arbor, quæ pineas nuces toto orbe in medicina decantantissimas, in nucamentis turbinata effigie cōpactilibus, profert, in altissimis superioris Germaniæ Alpibus prope Valesiam, his maxime quæ Italiâ spectant, gignitur, caudice assurgens procero, recto, ramis folio capillamenti modo, prætenui longoque, copioso, cineraceoque uestitis.

At Pinaster in Germania uulgaris est notitiæ, & facile prouenit quocunque loco plantata. Vuasgoia admodum familiaris est, præsertim uero opido Cæsareo Luthræ. Folia gerit multo quam Pinus crassiora, duriora et nocentioribus aculeis armata. Conos quoque acquirit, sed breuiiores & duriores, exiguis prægnantes nuculis. Multam hæc arbor resinam destillat uulnerata. Qua uero ratione Pinus feri, excoli & plantari debeat, copiose docuit Palladius lib. xij. cap. vij. In quibusdam locis ut in Valesia, citra cul-

turam

Pinus.

2.

Pinaster.

Pinus.

Harz/oder Byfferbaum.

turam sponte sua Pinus pro
creatur.

NOMENCLATVRAE.

Quam Germani Viech-
tannenbaum / oder Harz-
baum / oder Förenbaum uo-
cāt, quæ oblongas & dulces
nuces Pineas profert, meo
iudicio uera est Pinus, quæ
Hebræis *אֵרֶן* Oren Esaia
xliiij. Græcis *πῖνος* (Dioscori
des libro primo cap. lxxvi.)
Serapioni cap. lxiij. Sono-
bar & Arz (quæ uox ab *אֵרֶן*
Eres, mutatis duntaxat pun-
ctis uocalibus distat, quam
Cedrum ubique interpre-
tatur) appellatur. Sed quam
Germani den Wilden Bin-
baum / oder Byfferbaum / &
in superiori Germania Fö-
renbaum / oder Holz nomi-
nant, mihi Pinaster est. Nu-
camenta quibus Pineæ nu-
ces insunt Græcis Coni, Nu-
clei, Strobuli, officinis Pi-
neæ, Hippocrati Coccali di-
cuntur. li. iij. de Peripneum.
uictus ratione.


VIRES AC TEMPE-
rumentum.

Pineæ nuces in medicina usitatissimæ sunt; natura sua ut dicit Auerrhoe
calidæ & siccæ phthisicis & languescensibus commodissimæ,

INTRIN-

Kimhi ait quos-
dam Oren He-
breorū, per Al-
zinobar (quæ
uox a Sonobar
non multum ab-
ludit) Arabum
interpretari.
Sunt uero plu-
res alia uoces
tam Hebrææ
quam Chaldaicæ
quas pro Pinu
reddunt, sed non
uacat illas adscri-
bere.

אֵרֶן
עֵרֶן



INTRINSECVS.

Nuces Pinæ & cortex Pinus astringentis sunt facultatis, conducunt assidue tussientibus & phthisin metuentibus. Per se namq; aut ex melle sumptæ excalfaciendi & corroborandi ui pollent teste Dioscoride.

Nuces Pinæ cum repurgatæ manduntur, aut cum passo aut cucumeris semine bibuntur, urinam cient, acrimonias in uelica & renibus hebetant, stomachi rofiones leniunt, datæ cum Portulacæ succo, uirium infirmitatem roborant, corruptorum quoque humorum labem obtundunt.

Cortex Pinus medius tritus ac potus, aluum sistit, urinam mouet.

Pinus folia (quod & de cortice intelligas) hepaticis utilia sunt, drachmæ pondere in aqua aut mulla pota.

EXTRINSECVS.

Oleum Pinearum, si Auerrhoi credimus, curat paralyfim, si illo membrâ inungantur.

Cortex aut folia in puluerem redacta intertriginî medentur. Cortex tritus & illitus ulceribus summum corpus occupantibus prodest inspersu,

Folia trita & illita inflammationes potenter leniunt.

Folia trita & decocta in aceto feruenti collutione, dentium dolores mulcent.

Teda earum particulatim secta si in aceto coquatur & decocto dens collatur dolores leuat.

De Abiete, Larice, & Teda Cap.

LXXVII.

VO ABIETIS GENERA, NIGRVM NIMIRVM, SEV

D rubrum & candidum nostra agnoscit Germania. Vtriusque folia latiora sed & breuiora sunt, Pineis folijs, Rosmarini pene consimilia. Ramuli Abietis crucis formam omnes obrinent. Vtrâq; Abies resinam puram ac odoratissimam, Thuris fere instar, quod ad odorem & formam attinet sudant.

Candida Abies, rubræ per omnia similis existit, nisi quod folia habet ex una parte cineracei prorsus coloris, & corticem candidiorem, & teneriorem. Hoc Abietis genus in Valesiæ Heluetiorum montibus gignitur.


Larix in censu Abietum habetur, ea ædificijs adhibita diutissime durat. Lignum eius adustum non in carbones sed cineres statim redigitur. Luxuriat in Silesia,

1.
Abies rubra.

2.
Abies candida.

3.
Larix.

At

*Abies.**Thannbaum.*

4.
Teda.

At pinguis illa arbor, quæ hyernas in quibusdam locis faces præbet
ad Abietē quoq; tanq̃ species eius, refertur. Omnes uero Abietes hyeme
quoque uirent, Maio uero & Iunio mensibus folia uetera, nouis succrescen-
tibus.

*Larix.**Lerchbaum.*

tibus, abijciunt. De Abiete
Picea, Larice, Tedaq; plura
Plinius lib. xvi. cap. x.

NOMENCLATURAÆ.

Cum Plinius ipse innue
re uideatur in Abietum no
menclaturis non unā apud
omnes esse sententiam (cum
aliqua hic isto nomine, ali
bi alio appelletur) quis quæ
so certi aliquid de appella
tionibus earum proferre po
terit? Ego, ut ab his me ex
pediam, primum Abietis
genus, quod cortice uestitur
rufo, Piceam uocabo (Ger
mani *Schwartz*, oder roht
Thannen nominant) alterā
uero, hoc est, candidiorem
Abietem simpliciter nuncu
pabo. Hanc Germani *weiß
Thannen* dicunt.

Tertia mihi *Larix* appel
labitur, Germanis *Lerchen
baum*. Hæc nimirum ea est
ex qua *Terebinthina* Ger
manica effluit.

Quartum Abietis genus
quod Germani *Tälle* no
minant, *Tæda* quibusdam
appellatur, a quibus in præ
sentia non discedo, diligen
torem & exactiorem nomi
num inquisitionem ociosis

Abies Hebræis
שׁוֹרֵב *Berosch*
Osee ultimo di
citur, secundum
alios *שׁוֹרֵב*
res.

relicturus. Hinc proculdubio si *Valesiæ* alpes perlustrarint, maxime eas in
quibus *S. Bernhardus* habitat, discrimina Abietum addiscent.

Liquor



gummi. Liquor uel gummi (ut ita mihi liceat dicere) quod ex Abietibus defluit Resina Latinis, *Harz* Germanis: quā uero Larix exudat Pix liquida, & Larigna, *Teiitſcher* Terpentini uocatur. Resina est ea quæ ex arboribus distillat, Germanice *Weiß Harz* / sed combusta resina pix sicca, Germanice *Bech* dicitur. Reliqua Resinæ & picis genera Seplassiarijs committimus.

VIRE AC TEMPERAMENTVM.

Natura omnibus Resinis calfacere, mollire, discutere, expurgare. Apud nos Mastiche primo, Terebinthina secundo loco, cæteris Resinis & picis generibus præfertur.

Dioscorides libro primo ca. lxxvij, ita scribit, Terebinthina resinas omnes antecedit, proxima lentiscina, & Pinu & Abiete, has sequitur & picea & pineis nucibus resina. Proinde ad multa Resinæ & Terebinthinæ usus maximus est.

INTRINSECVS.

Resina Terebinthina lota mensura quatuor cochlearium, aut circiter, in potu uel cibo sumpta, ueneno hausto aduersari strenue, illudque ne nocere queat, expellere dicitur.

Eadem leniter purgare, uitijque pectoris pulmonum & hepatis mederi traditur.

Inprimis uero si probe parata & lota fuerit Terebinthina aduersus tabitudinem, tussim inueteratā, suspiria, purulentasque excreationes, unde phthisis oritur illam facere docent.

Mastiche ipsidem pollet facultatibus uel per se sumpta, uel ex melle, ut elegma ex his fiat.

Breuitus Mastiche, & Terebinthina resina pectoris exulceracionibus & capitis destillationibus factis, unice conducunt. Mihi ergo ex pilulæ maxime placent, quibus Mastiche miscetur, nam & stomacho accommodata est, teste Dioscoride lib. primo cap. lxxvj.

EXTRINSECVS.

Mastichæ, Resinæ, Terebinthinæ & picis facultates nemo pro dignitate laudauerit. Chirurgi nulla ex his carere possunt. Mastiche commanducata oris halitum commendat, gingiuas contrahit firmatque, & earum tumores reprimat. Additur in illitiones faciei, ad nitorem cuti conciliandum.

Terebinthina & candida resina ad uaria adhibentur unguenta & emplastra, quæ Chirurghi differenda relinquemus.

Sed ut tandem hanc absoluamus tractationem non solum Terebinthina, sed etiam Resina, tam recentia quam uetera purgant uulnera, duos ubique in corpore suboriantur abscessus emolliunt, scabiesque qualis in iumentis & hominibus persanant, quæ omnia quotidiana testatur experientia ut superfluum sit plura addere. Itaque de his hactenus.

De Fraxino. Cap. LXXVIII.

FRAXINUS IN ALTIS TENEBROSIS ET HYMECTIS
prouenit syluis, nonnunquam & in lapidosis quibusdam agrorum limitibus. Duum quoque est generum. Vtraque dissecta gerit folia instar Sorbi, eaque ex utroque pediculi latere sibi inuicem opposita. Fraxinus utraque proceritatem insignem adipiscitur, recto assurgens caudice. Neque uero ullum unquam in his arboribus fructum uidi.

NOMENCLATURAE.

Latinis hæc arbor Fraxinus, Græcis *μυμλία*, Bumelia, Polymelia, Germanis *Eschernaum* dicitur. De Fraxinea arbore cuius Ruellius quoque meminuit, nos supra cap. xxxix. scripsimus.

VIRESCACITATE ET TEMPERAMENTUM.

Fraxinus ueneno aduersatur, eoque nomine plurimum ab authoribus commendatur. Quare aduersus serpentium uenenum ligno & cortice Fraxini uti possumus.

INTRINSECUS.

Aqua e corticibus Fraxini distillata unice ac singulari remedio ad calculum & morbum regium facit.

Folia uino decocta & pota hepaticis & splenicis conducunt.

Eadem præstat oleum e ligno Fraxini confectum ac potum tradente Manardo Ferrariense super Mesuam. Si serpens præsertim uipera aut iumentum aut hominem momordit, præsens esse remedium, memorie proditum est, tenera Fraxini cacumina terere, expressumque succum bibendum præbere ex mero, si febrim non sentiant: febre uero tentatis, ex dilutissimo uino. Item tritas huius arboris frondes læsæ parti imponere. Sic enim periculo liberari demorsos.

Idem medicamentum hydropicis meo iudicio non inutile fuerit.

BBb

Serenus.
Fraxineum semen cum Bacchi rore bibendum est.

Pocula quidam ex ligno Fraxini parant, pollicentes si quis ex eiusmodi poculis assidue bibat, eum lienem extenuare hoc pacto posse.

Quidam tradunt Fraxini folia tusa, quibusdam temporibus succo ex ui-
no poto pingues homines macros reddere. Ego expertus non sum, proinde
nec opus habeo quod ad me attinet, eiusmodi medicamentis, quin potius
cum extenuatus sim ualde contrarijs uti conueniret.

EXTRINSECVS.

De Fraxino Plinius lib. xvi. cap. xiiij. in hunc modum scribit.

- ” Tantaq; est uis, ut ne matutinas, occidentes uē umbras, quam sunt longif-
” simæ, serpens arboris eius attingat, adeo ipsam procul fugiet. Experti pro-
” dimus: Si fronde ea gyro claudatur ignis & serpens, in ignem potius quam
” in Fraxinum fugere serpentem. Hæc ille. Ex quibus conijcere licet suffi-
tu ligni Fraxini serpentes fugari.

Cortices Fraxini in cineres redacti illitu lepras eximere dicuntur.

E ligno Fraxini mensæ, ac alia culinaria utensilia apud nos conficiuntur.

Commendatur & ad hastarum usus, quas e Fraxino Achilles primus
parauit, Vide Homerum.

De Acere. Cap. LXXIX.


CER FOLIA HABET ELEGANTISSIMA SATVRA

A tæ uiriditatis dissecta, Saniculæ similia, cortice uestitur duro &
facano. Neque in omnibus locis grandescit, sed humili statu contenta, fru-
tex potius quam arbor spectatur, maxime ea quæ iuxta itinera, & in littori-
bus aquarum enata est. Verum in quibusdam tenebrosis Vualgoiæ syluis,
ac in comitatu Bidiscensi tantæ magnitudinis reperitur Acer, ut ædificijs
uel maximis inferuire queat. Ac quia lignum eius, maxime cum annosum
fuerit undatim crispatur, plerunq; apud nos lautioribus dicatur suppellecti-
libus, utpote orbibus mensisq;. Est autem lignum perennis durationis. Fru-
ctum suum fert messis tempore Orneoglossio, hoc est flori Orni cōsimilem.

NOMENCLATVRÆ.

1. Quidam tria Aceris genera statuunt, Campestre enim caudidum esse
2. nec crispum ~~nam~~ uocant, Montanum crispus duriusq;. Tercium ue-
3. ro subluteum, quem Carpinum nominant. De quibus uide Ruellium
libro primo capite xlvij, & lxij. Quidam inter doctiores Acerem Ger-
manice

Acer.
Maßholder.



manice *Aborn* interpretantur, propterea quod *Acer* non in' omnibus locis *Maßholder* sed *Aborn* uocatur, cum tamen *Aborn* alia sit arbor, ut sequenti docebimus capite. Alij uocem *Maßholder* quam nos *Acer* adiun

BBb ij

gimus, ad eam arborem referunt, cuius in hoc libro cap. xxv. à nobis facta est mentio. Sed utur hæc se habeant, sciant omnes hanc arborem Latine Acerem. Germanice uero *Maßholder* recte uocari. De tribus Aceris generibus uide Theophrastum lib. iij. cap. xi.

VIRE S A C T E M P E R A M E N T V M.

Non multa de Acere quod ad medicinam attinet, in ueterum scriptis legimus. Ruellius Aceris radicem, contusam iocineris doloribus utilissime imponi testatur.

De Acere apud Serenum hñ leguntur uersiculi.

Si latus immeritum morbo tentatur acuto

Accensum tinges lapidem stridentibus undis

Hinc bibis, aut Aceris radicem tundis & una

Cum uino capis, hoc præsens medicamen habetur.


Qui uenationi student, hñ accipitres quos ad prædam instituerunt, ad baculum seu uectem ex Acere assuefacere solent ut illi insideant, qua uero hoc faciant ratione ipsi norunt procul dubio.

De Platano. Cap. LXXX.

E M O C R I T V S A C V T I S S I M I I N G E N I I P H I L O S O

D phus uniuersam naturam indagare conatus est, ita quidem ut in terna animalium uiscera contemplari uoluerit, ac in commentarios redigere. Quam considerationem theoricamq; sub expansa (uti testatur Hippocrates) Platano Abderæ exercuit. Hic si superstes esset, non dubito quin suis coloribus ad uiuum Platanum nobis depingere posset, præsertim cum nec omnibus nota sit arbor, nec passim locorum in Germania nostra proueniat. Humectis uero & altissimis montibus gaudet, interq; Fraxinos prouenit, qui sicut à rusticis incolis Vualgoiæ & Mediomatricibus Fraxinis accenseatur Platanus, sed perperam. Alijs namq; quam Fraxinus tam folijs quam ramulis est Platanus. Siquidem folia gerit. Viris uinifere aut Ricini similia, pediculis suffulta rotundis, longis, tenuibus & rubicantibus. Quædam in hoc genere arbores Maio mense florent, aliæ non florent, nullumq; ferunt fructum. Quod si queras unde ergo Platanus procreetur, responderi primum Diogenes multas plantas & arbores commixtione putris tantum aquæ & terræ gigni. Anagoras uero omnes tum stirpes tum animalia ab aëre & aqua originem suam trahere asserit, ita ut aër seminis.

Platanus.
 Thorne/Waldesfern.



feminis rationem habeat, terra matris, ac ita quodq; secundum genus suum
 progigni. Moses Geneleos ij. significantius de his differit, cum ait nihil e
 terra prodijisse cum dominus Deus coelum & terram creasset, subditq; ra

tionem, non enim pluerat dominus Deus super terram. Ex his colligere licet aquam & terram principia esse stirpium, quod quotidie animaduertere licet. Nihil enim terra ædere potest nisi humectetur. Quod si humor illi de super accesserit, multa sane producit etiam sine semine, quæ etiam nullum nec fructum nec semen unquam uel fecere uel faciunt, ut est Scolopendria, plantæ nonnullæ murarriæ, polypodium, Muscus terrestris (de quo lib. j. ca. 189. egimus) nonnulli Satyriones, Populi albæ, & Platani quædā. Præterea quotidie, si animaduertamus, frutices arbores herbæq; ipsi in locis reperiuntur ad quæ semen earum nondum deuenit, ut in muris quibusdam, & excelsis turribus. Hæc uero naturæ occulta & secreta sunt mixteria, quæ ut admirationem magnam pariunt ita inuestigari ac certo cognosci non possunt. Quis enim quantumuis ingeniosus, naturæ miracula omnia, rerumq; ortus occasus, causasq; omnes ingenio comprehendere ualeat? Quæ cum ita se habent neque nos altius quam par est & homini concessum sapere contendemus, quin potius nostro munere perfuncti sub Platano ista elegantissima quiescemus, reliquum doctioribus commissuri, si prius nomenclaturas, & facultates Platani pro more nostro exposuerimus.

NOMENCLATURAE.

Diosco. lib. i.
cap. 92.

Platanus Latinis, Græcis pariter *πλάτανος*, Germanis *Thorn/vnd waldes-
eschern/vnd Bücheschern* dicitur. Syluestre eius genus nonnulli Germani-
ca lingua *Leinbaum* uocant.

VIRES AC TEMPERAMENTVM.

Folia, & si quæ alia in Platano uidentur, frigida & humida sunt qualita-
tis teste Galeno. In medicina suum quoque usum habent.

INTRINSECVS.

Serenus.
Aut Platani pilu-
las acri infunde-
re in aceto.

Folia uino decocta ac pota ueneno serpentium aduersantur.
Eadem cum aceto decocta ac sumpta, uomitiones inhibere dicuntur.

EXTRINSECVS.

Cortex aceto decoctus ac ore retentus dolores dentium sedat.
Tenerrima Platani folia in uino albo decocta, mox illita, oculorum flux-
iones sistunt.
Decoctum corticis, neq; non folia tenera, uel per se tusa, aut adipe exco-
pta ac imposita tumores & inflammationes leuant, ambusta aut igni aut
frigore

frigore sanant. Plura alia ex his quæ diximus colligi poterunt. Nos enim
 ut diximus hic subsistemus, operisq; finem imponemus. Domino DEO
 Opt. Max. Patri cœlesti gloria sit in perpetuum, qui per Filium suum &
 Spiritum sanctum suum largiri dignetur, ut hij nostri de stirpibus
 commentarij, quemadmodum auspicijs illius bene fauentibus
 & suscepti, & ad umbilicum perducti sunt, ita deinceps ad
 gloriâ sanctissimi ipsius nominis & proximi emolu-
 mentum, qui omnium nostrorum operum sco-
 pus esse semper debet, legantur,
 & usurpentur.
 AMEN.

HIERONYMI TRAGI DE STIRPIVM
 COMMENTARIORVM LIBRI TER-
 TII ET VLTIMI FINIS.

ברך נותן ליעת בך

BBb 1127

STIRPIVM DIFFERENTIAE**EX DIOSCORIDE SECVNDVM LOCOS****communes, opus ad ipsarum plantarum
cognitionem admodum con-
ducibile.***Authore Benedicto Textore Segustiano.*

BENEDICTVS TEXTOR

SEGVSIANVS CANDIDO LECTORI

salutem dicit,



INTER TAM FOEDAS TAMQVE MONSTRASAS
 labes, quibus conspurcatus & adulteratus est aliquot iam seculis
 priscus ille Medicinæ decor ac splendor, ut non alia pertinacius hæ-
 ret eorum medicamentorum maximeq; stirpium, quæ tanto studio
 tantoq; honori ueteribus non modo medicis, uerum regibus quoque
 ipsis fuerunt, ignorantia & neglectu: ita nihil est homini medico ma-
 gis pudendum. Quibus quidem inuestigandis cum hodie doctissimi quiq; mirum in mo-
 dum sese torqueant, nec quicquam ferè obscuratum sit in tota Medicina, quod illis plus
 faceat negotij, quodq; deplorare sit æquius, quidnam euenisse putandum, si non extarèt
 præsertim Dioscoridis illius (qui uel Galeni sententia omnium absolutissime rem tracta-
 uit) monumenta, ad quæ ceu sacram (quod aiunt) ancoram confugas? Proinde quando
 hunc unum propemodum habemus sarcinæ rei longe præstantissimæ, ac nobilissimæ
 tantopere commendatum, præceptor ille noster Iacobus Syluius præter summam erudi-
 tionem publicæ utilitatis studiosissimus sæpenumero me hortatus est tota ex illo autore
 historia per partes plantarum digesta, rursus singula membra disseccare per locos com-
 munes, ille inquam magno usui id fore affirmans. Quid quæso tantæ doctrinæ uiro dene-
 gare, adeoq; de omnibus benemerito? Ego itaq; non ignarus quam ineptus essem ei pro-
 uinciæ, aliquandiu meam excusans infantiam, tandem parere sum coactus. At non mul-
 to post tanquam desperabundo (ut qui rem nullius aut parui momenti futuram existima-
 rem, quæ alioquin magno mihi constaret) in animo fuit desistere. Ille contra: Nam, in-
 quit, hoc adeo leue uidetur ac friuolū, cum cuius proclius sit id ueluti filium sequito pri-
 mo statim occurſu deprehendere stirpem nec antea uisam? Ita res obeunda fuit pro uiri-
 bus. Quod ni ille ipse quoque sedulo obstitisset, ne alijs parum consulens id ipsum patere-
 tur apud me diletescere ceu quod emitteretur indignum, per me quidem in lucem pro-
 diisset nunquam. Hoc igitur quale quale est amice lector tuum erit æqui boniq; face-
 re, quoad (si quando suppetet otium) ex Theophrasto & alijs accesserit, quod ad præ-
 sens negotium pertinere uidebitur. interim quicquid hinc percipies emolumenti, id ac-
 ceptum feras uelim uiro illi clarissimo, cuius impulsu hoc operis susceptum, eiusdem au-
 xilio confecti, eiusdem opera gulgatum est. Vale Lutetia ex ædibus Ioannis Tagautij
 doctoris Medici doctissimi. Ad Idus Iunias. Anno Christianæ salutis, 1534.

EX MARCELLI VERGILII COM-

MENTARIIS IN IPSVM DIOSCORIDEM, AD EO-
rum quæ hic tractantur dilucidiorẽ intelligentiam.

CUBITVS, QVANTVM A flexura cubiti usq; ad summum medium digitum patet. Credimusq; nos extrinsecam cubiti flexuram intelligendam.

Spithame Græcis, Latinis authore Plinio libro septimo capite iij, dodrans, longitudo, & quod capit spatium humana manus a summo pollice usque ad summum minimum digitum extensa, quæ mensura quoniam in tres quartas humani pedis partes incurrit, dodrans dicta est.

πάλμης, Palmus, mēsurā est simul coniunctorum, & cohærentium quatuor digitorum.

Liquor, humor, qui secta, terebrata, castrata uel planta, aut aliqua eius parte quasi sanguis aperta uena per se fluit.

Succus, ex tota materia, parte uel eius aliqua concisa tusa uel, adpersis aliquando aqua uino uel, aut humore alio, tum manibus tum torculari, aut igne expressus exudatusq; humor.

DE QVIBVS DAM PLAN-
te partibus ex eodem.

Vitriculas uoco, Plinij Palladijque uerboutens, non vitium palmites & sarmenta, sed ex eorum similitudine in alijs plantis, ueluti flagella, qualia in cucurbitis, cucumeribusq;

cunctis passim uidentur per terrā iacentia, aut si prope arbores & frutices sint, eos scandentia, suisq; clauiculis quasi manibus vitium modo hærentia.

Sunt nobis adnata & adnascencia, quæ græcis *μαχαλάς*, quod adnascantur, & super accedant, sic appellata quæ dicuntur eodem modo in caulibus & ramis plantarū super terram, & in radicibus aliquot sub terra, a principio suo, ueluti matre quadam, noua generatione prodeuntia. quæ naturæ & nascendi ordo in bulbosis radicibus plerumq; est, & in Lillio maxime, una radice, ut ait Plinius, quinquagenos sæpe remittente bulbos. Sunt autem ea olerum & herbarum propria, quemadmodum in arboribus priuatim, ramis appellantur.

Græci translata ab humano corpore appellatione *μαχαλάς* dicunt ea, quæ aliquando bina, aliquando singularia, & ex interuallo semper in plantis uidentur humanis alis similia, in quibus ueluti lacuna est. Sunt autem hominī alæ quæ parte brachium humero coniungitur ex interiore parte, in quibus non aliter quam in pectine pubes aliqua nascitur uirosi plerumque odoris. Earum similitudine concavos geniculos, quales in harundinibus & plerisque alijs sunt, *μαχαλάς*

αα Græci, Romani alas dixerunt: ab adnatis eo differentes, quod ex alis noua semper germinatio prodit, adnata uero nullam habent certam partem unde emergant.

ἑλὶξ ἀνὰ τὴν ἰνίαν, id est, a circumagendo & inuoluendo se, Latine a capiēdo capreolus, item clauicul⁹ dicitur. Sunt autem clauiculi, siue clauiculæ viticularū in plantis extremæ partes & colliculi intortiquibus aduoluendi et implicandi se propinquis stirpibus natura est.

Nucamentum in quibusdam arboribus pro flore est, ueluti in piceis, pinis & corylis. Quale autem id sit quotannis licebit obseruantib⁹ uidere.

Sunt Græcis & Latinis pappi lano: sæ uillositates caudarum in animalibus forma, quæ decidentib⁹ floribus in plantis aliquot remanent, ut in utraq^{ue} Soncho, in Carduis multisq^{ue} alijs sit: quos solent aliquando pueri ludentes, spiritu oris per aërem pellere leuitate sua uolucres & quantumuis paruo ueluti flabro diffluentes. His etiam ad uentorum tempestatumq^{ue} præfagia in agro agentes quasi certissimis nuntijs utuntur.

καρπός, id est, fructus & si aliquando in scriptore hoc semen significat, propria tamen eius significatio est in his quæ causa seminis a natura fiunt. Verbi causa in pomis propriè semina dicuntur interiora granæ, *καρπός* autem tota cum semini-

bus poma declarat, id est, claudentem ea exteriorem illam carnem. In leguminibus itidem semina, quæ siliquis clauduntur, *καρπός* uero, id est, fructus cum seminibus integras siliquas. Et ne longiores simus quodcunque seminis causa factum est, id propriè *καρπός* Græci uocant. Miscentur tamen hæc quoniam alterum alterius causa est. Nec male penitus *καρπός* fructū scilicet aliquis semen appellet, uerum tamen in aliquibus distingui ea oportet.

Epiphyllis a Græcis dicitur ultimus in summo vitis palmitē racemus, qui plerunque paruus rarissq^{ue} acinis sero maturescit, quoniam postremus conceptus est, ideoq^{ue} inutilis & in uindemia plerunque neglectus.

Cachrys pilula est, quam arbores alii quot præter proprium fructum proferunt. Hanc poterit aliquis, si alias non liceat contemplari arbores, in Pino & Iuglāde nuce quotannis per hyemem uidere. caret Latino nomine Cachrys hæc, quemadmodum & Libanotis semen, quod interposita una littera Canchryn Græci uocant.

Dixerūt in floribus antiqui calyces inuolucra illa qualia in rosis sunt, quibus dehiscentibus in sua folia se flores pandunt.

Cytini flores sunt punicæ a tumore Græcis appellati, qui *κύτος*, quod ambitu & tumore suo aliquid capit & in se claudit, dixerūt. Nam

Cytini

Cytini caput & ambitu suo futurum pomum iam tunc intra se continent, & quasi conceptos acinorum foetus ad maturitatem complectuntur.

Umbellam Latini, *ωνιδιον* Græci, ab umbra utriq; appellant in aliquibus plantis floris ueluti pedamentum in plures diuisum longiores pediculos, qui singuli florem sustinent & in orbem circummatum: qua floris figura Foeniculum, Anisum, Sambucus, pluraq; alia sunt. Quod quoniam umbellæ, qua solem a uultu mulieres arcet, forma est oblatitudinem circinationemq; suam, ideo Græci primum eam floris formam *ωνιδιον*, mox Græcos imitati Latini Umbellam dixerunt.

Sunt Græcis pericarpia cuncta illa quæ semen aliquod ambientia a cœli & animalium iniurijs id seruant & tuentur. Quod licet in leguminibus priuatim siliqua, in frugibus spica, in castaneis echin⁹ sit, in alijs uero, alijs appellationibus indicentur, communi tamen nomine cuncta hæc pericarpia dicuntur.

DE IIS AD QVÆ HIC fit collatio.

Maioris plantaginis folium *χωνιδιον*, id est, oleraceum dicitur, non tamen simpliciter ad omnia olera id referendū est, falsum enim id esset, sed ad ea tantum quæ latiore sunt folio, qualis Brassica & Beta est.

Petalsus, .i. Galerus græca uox est, quæ Mercurij & Augusti Cæsaris usu in antiquis scriptoribus celebratur. Vterque enim petalsus describitur, sed alter dum coelo præcipitem semittit aui similis: alter dum per diem in sole est, radiosq; eius munito capite, petalo hoc, toto anno uitat.

Coryledon facta est a coryla Græcorum in poculis & conuiuio mensura uini & uasculo, quam Plinius aliquando heminam, nonnunquam sextarium ex Græcis uertit. Eius forma erat qualis nunc etiā in fictilibus poculis uidetur, quibus in paupertate & coenobijs utuntur, & corylam nostra gens ad huc uocat. Fuitq; hoc eius nomen primum semperq; in poculis & liquidorum mensura. Quoties autem seruata eiusdē uasculi forma in aliū transferebatur usum, oxybaphum uocabatur, quod in coena aceto plenum ad intinctus ponebatur. Et hæc græce corylæ & oxybaphi prima ratio & usus fuit. Romani in priore illo poculorum usu, & liquidorum mensura sextario & hemina usi sunt. Cum uero ad intinctus uterentur, ab aceto acetabulum dixerunt, cuius forma orbicularis esset, profunda & sine marginis latitudine. Ab his deinde utraque gens suum nomen ad alia, quæ similem haberet concauitatem, transtulit, in quorū numero est Coryledon herba.

Spondylia Græcis sunt in animalium spina uertebrae seu nodi eodem nomine

mine dicti, quo mulieres in fuffis
fuis verticillos nominant, quibus
in ducendo filo grauiore eorum
pondere fufos fuos librant.

Sunt Latinis ricini, & Græcis *ρικινος*
infecta quæ animalibus alijs cani
busq; præsertim inhærent sine mo
tu cum semel hæserint. Quibus
cibi nullus exitus est, colore liui
do, nullis discretis membris, in
globum continue crescentia, do
nec plenius saginata post aliquot
dies sponte sua decidant.

Echinus marinus. ex testaceorum ge
nere piscis dicitur, cui natura est
spinis quasi pedibus & earum
in orbem uoluatione ingredi.
Quem facile nouerit is qui in ca
stanea summum fructus eius acu
leatum, & in orbem circumuolu
tum operimentum uiderit.

PLANTARVM DIFFERENTIAE PRIMVM A

toto, deinde etiam ab ipsarum
partibus fumentur, idq; per
locos communes.

LOCI COMMVNES.

Substantia

Numerus.

Quantitas

Magnitudo.

Qualitas
uisibilis { Fulgor.
Color.

Odor.

Sapor.

Tactilis
qualitas

Figura.

Similitu
do

{ Vnius.
Duorum aut
plurium.

Ortus

Occasus.

Maturi
tas.

PLANTARVM DISCRIMEN A TOTO acceptum.

ARBORRES, Ricinus, Smilax
quæ Latinis Taxus dicitur,
Cornus, Oxyacantha, Sabina,
Tilia, Lyciū, Arbutus, Sycomor
rus.

Arbusculæ. Rhu, Sabina altera.

Fruticosa arbor, Erace.

Arborecentes plaræ. Cynobatos,
id est, Sentis canina, Agnos Lat
nis uitex, Sambucus, Abrotonū
fœmina, Anagyris, Oenagra,
Sonchi, id est, Cicerbitæ tertium
genus, Tithymalus sextus, unde
Dendrodes, id est, arborecens co
gnominatur.

Herbæ fruticosæ. Sion, Seriphium si
ue Absinthium marinū, Stichas,
Maron, Acinus, Baccharis, Sefeli
Creticum seu Tordylon, Mya
gron,

- gron, Artemisia, Capnos, id est, In latitudinem magis se explicat Saffum, seu fumaria herba, Borealis altera.
- trys, Chrysanthemon, Chamæpitydys secunda, Eupatorium, Crithmon Romanis Batis uocatur.
- Herbæ quæ arbori similior est Chamæactæ quasi dicas sambucum humilem, Latini Ebulum appellat.
- Aculeatæ stirpes. Acanthus sylvestris, Paliurus, Capparis, Dipsacos, Latinis Veneris labrum, Lycium, Rhænus, Poterium, Eryngium.
- Breuis spinis asperatus est Rubus Idæus: idem aliquando tamē spinis deficit.
- Stirpes hirsutæ. Marrubium, Alysson, Verbascula duo.
- Quadamtenus pilosum est Polypodium.
- Lanuginosæ plantæ. Ranunculi alterum genus, Hyoscyami quod Altercū Latinis & Apollinaris herba dicitur tertium genus.
- Multa lanugine & tenui Poterion.
- Capillatum est Bryon thalassion, id est, Muscus marinus.
- Ceu muscum habet Phyllon Thelygonon.
- Plantæ liquore aut succo abundantes. Lathyrus, Peplos, Peplium, Tithymalus, Sycomorus, Chelidonium maius, id est, Hirundinaria maior, Glaucium.
- Densæ plantæ. Chrysogonon, Hippophaës Romanis Lappago siue Lappula minor.
- Totæ glaciæ. Muscus marinus, Polium montanum,
- Candidæ plantæ. Polium montanum, Mandragoras mas, Androsaces, Ornithogalon, Pappauer spumeum, Cythus.
- Lacte liqueore Tithymali, Peplos, Peplium, Lathyrus Sycomorus.
- Albescunt Marrubium, & Tithymalus secundus qui myrtites, id est, Myrtaceus dicitur.
- Lutea est Botrys.
- Chelidonium maius, & Glaucium succum diluti aqua croci colore remittunt.
- Rubet Alypon.
- Ascyron Hyperici species puniceo colore rubet.
- Rubescunt Ruta sylvestris, Erigeron, id est, Senecio, Hypericum.
- Vndique herbacea est Chamæpeuce.
- Niger est Mandragoras foemina cognomine Thridacias, id est, Lactucinus.
- O Doratæ stirpes, Asarum, Symphytum petraeum, id est, Solidago saxatilis, Narcissus qui probatissimus montibus nascitur, Coris, Serpyllum sylvestre.
- Odoratissimæ Sampsuchū, Botrys, Acinus.
- Tetri odoris Partheniū Latinis Solis oculus, Ruta omnis, Sabina altera, Ranunculus tertius & quartus, Conyza maior.
- Grauitè odorato succo pollet Chelidonium maius.
- Aliquantulum ingrati odoris est Albrotonum foemina.

- G**rauiſſime olent Scrophium, Anagyris & Aloe.
Aromatum odore eſt Daucus ſecundæ ſpeciei.
Adſtringentes plantę Hemionitis, Tribulus uterque, Clematis daphnoides, utrumq; Polygonum, quæ Sanguinalis herba dicitur.
Egregie aſtringit Muſcus marinus. Acerba eſt Phyllitis.
Grato ſapore Coris.
Symphyrum petræum dulce eſt & ſaliuam prouocat.
Salſæ Empetron & Anthyllidis primum genus.
Amaræ plantæ Aloe, Abrotonum, Cucumer ſylueſtris, Androſaces, Parthenium.
Amaritudine quadam participat Scrophium & Abſinthium Santonicum.
Empetron quo magis ad aridam a mari proceſſit eo amariuſ.
Acræ & feruidæ plantæ Sabina altera; Papauer agreſte, Dictamnus, Pſeudodictamnus, Coris, Anemone ſylueſtris utraque, Secunda Dauci ſpecies.
Efficaciſſimæ acrimoniæ Grateogonium, Ranunculus ſecundus.
Scandix amara eſt & ſubacris.
Acris & modice amara Stichas.
Acric & ſubamaro ſucco Chelidonium maius.
Mollis eſt Rumex agreſtis.
Teneræ plântæ Chryſanthemon, Altercum tertię ſpeciei, Polygonum ſcœmina, Myriophyllum, id eſt, Millefolium, Sonchi tertium genus.
Egrediæ teneritudinis eſt Capnos, Pingues plantæ Artemiſia altera, Siſon, Altercum tertię ſpeciei.
Durus eſt Paliurus.
Fortis arbor Cornus.
Non ſine liuore eſt Dictamnus.
Rhodia radix inæqualis eſt.
Scaber eſt Daucus ſecundus.
Aſperitate aliqua oblitum eſt Alyſſon.
Aparina ueſtibulæ tenaci nexu adhæreſcit.
Specioſæ Cornus & Artemiſia altera.
Tragoriganus quaſi dicas Hircinam Origanum ex locorum bonitate elegantior euadit.
Serpyllum hortenſe quum ex ſaxibus prodiſt, auctius ſit & pulchrius.
In ſummo cacumine eſt acutus qui ob id Oxyschoenus, hoc eſt, Acuminatus luncus uocatur.
Totum lignoſum eſt Symphyrum petræum, id eſt, Solidago ſaxatilis.
Hippuris quam Latini Equiſetum uocant ex uicinis ſtirpibus pendet circumpoſitis multis nigrisq; comis ceu equina cauda, unde ei inditum hoc nomen.
Aromum ex ligno uuæ inſtar in ſeipſum circumuoluitur.

PLANTARVM INTER
 ſe ſimilitudo & diuerſitas eo ordine qui in elementis Græcis cernitur.

ABROTONI.

Minori

- Minori Abrotono simile est Seriphi
 um siue Absinthium marinum. Pirum simulat, minor tamen et spinosior.
 Agrosteos. Graminis. Absinthij.
 Gramine in cunctis est maior Calamogrostis, id est, Harundinaceum
 gramen. Fruticosum est similiter Absinthio
 Anchusæ. Abrotonum mas.
 Tertia Anchusa secundam refert. B. Ati. Rubi.
 Acalyphes. Vrticæ. Capparis non aliter ac Rubus ha-
 matis horret spinis.
 Galiopsis tota cum caule & folijs Vrticam mentitur. Rubo longe maius Cynosbatum,
 hoc est, Sennis canina.
 Altero Vrticæ genere minus aspera est quæ ea de causa Vrtica mollis
 nuncupatur. Tenerior. Rubus Idæus.
 Acanthi. Batrachij. Ranunculi.
 Satiua Acantho breuior sylvestris est. Primo Ranunculi genere lanuginosius
 secundum.
 Actes. Sambuci. Tertius & quartus Ranunculus pri-
 mo & secundo sunt minores.
 Sambuco minor est quæ proinde Chamæactæ quasi Sambucus hu-
 milis, Ebulum Latinis dicitur. GLycanis. Pulegij.
 Amaraci. Pulegium imitantur Dictamnus
 Serpyllum hortenſe odorem spirat. Calminthe secunda quam idcirco
 aliqui agreste Pulegium dixerunt.
 Amaraci, Andrachnes, Portulacæ. Calamintha secunda Pulegium re-
 dolet, sed eo maior est.
 Portulacæ non absimilis est Cepæa. DAuci. Pastinacæ agrestis.
 Anemones. Gingidium simile est Dauco den-
 sius tamen & tenuius.
 Anemone sylvestris, cultis nascentem in totum excellit. Daphno, dis. Laureolæ.
 Sylvestri Anemone acrior sylvestris altera. Laureolam respicit gustu Tithymalus
 secundus.
 Anisi. Delphinij.
 Meon Aniso est crassius. Delphinio æquale est alterum.
 Arnoglossi. Plantaginis. ELates. Abietis.
 Plantagini proxima est Rumex agrestis. Smilax ea quæ Latinis Taxus di-
 citur magnitudine Abietis est affinis.
 Maior Plantago minorem crassitudine uincit ac specie. Elæx. Oleæ.
 Achradis. Piri agrestis. Dorycnium nuper nascentem oleam
 refert.
 Oxyacantha quasi dica acutam spi-

Helxines, Muralis.

Muris auricula, quam priuatim Al.
finem nominant Græci, Helxinē
æmulatur, humilior tantum.

Epithymi.

Epithymo similis est Saxifraga.

Herpylli, Serpylli.

Serpyllum syluestre non hortensis ri-
tu per terram serpit, sed rectū stat,

Hedyosmi. Mentæ.

Sisymbrium æquale est Mentæ
hortensi.

Tertia Calaminthæ species ad Men-
rastrum accedit.

Thridacis. Lactuæ.

Agrestis Lactuca satiuæ est simi-
lis.

Thymi.

Thymo non dissimilis est Thymbra
seu Satureia, minor tantum &
mollior.

Isatidis. Glasti.

Syluestris Isatis satiuæ proxima
est.

Calami. Harundinis.

Polygonon femina Harundinis
figuram ostendit.

Cichorij. Ambubeiæ, Intybi agre-
sis.

Condrylla Cichario tota est tenuior.

Cissi. Hederæ.

Clematis altera Hederæ Smilacis
modo arborescendit.

Cnici.

Chico similis est Attractylis quam
Latini rusticam colum uocitant.

Conyza. Pulicariæ herbæ.

Parua Conyza magnam superat o-
dore.

Maior Conyza quam minor latior

ris est ambitus.

Tertia Conyza nequaquæ, quem-
admodum maior & minor, pin-
guis est, at multo graueolentior.

Corij. Coriandri.

Capnos, hoc est. Fumus siue fumus
ria herba similis est Coriandro.

Costi.

Rhodia radix Costi quidem est æmu-
la, ueruntamen maioris leuoris.

Cydoniæ. Coroneæ mali.

Cotoneæ malo proxima Arbutus.

Cyparissi. Cupressi.

Cupresso spinosior Sabina altera.

Cypri. Ligustri.

Tilia Ligustrum æquat magnitudi-
ne.

Libanotidis. Rosmarini.

Libanotidi foecundæ priori alte-
ra omnino respondet.

Nec ab his abludit sterilis.

Lichnidis.

Lichnis agrestis satiuam in cunctis
refert.

Mali.

Exigui mali magnitudine appa-
ret catanance altera.

Mecanis. Papaueris.

Agresti Papaueri nō est dissimilis Ar-
gem, neutraque.

Alijs Papaueribus longius est ter-
tium, nec non syluestrius, & medi-
camentosius.

Myrices. Tamaricis.

Eræcead Tamaricem proxime acce-
dit, sed multo breuior.

Narthecis. Ferulæ.

Thapsia totam ferulæ speciem ex-
hibet.

Nymphææ.

Alterā

Altera Nymphæa radice modo & Sifymbri.

flore a' priore diffentit.

ORigani.

Origano simile Ageratum.

PEpli.

Paronochia non diuerfa a' Peplo,

longitudinetamen minor.

Pityos. Piceæ.

Tithymalus quintus cognomine cy

pariffas in uniuersum nuper na-

scentem Piceam æmulatur.

Chamæpitys tertia Piceæ est ha-

litu.

Poli.

Alterum Polium montano quidem

fruticosius, sed non tam ualido est

odore.

Prafi Marrubij.

Stachys Marrubium simulat, uerū

oblongior.

Ptereos Filicis.

Trichomanes & Dyropteris ad Fi-

licem quidem accedunt, multo ta-

men breuiiores.

Rhamni.

Halimos Rhamnum repræsentat,

sed spinis caret.

Cytisus tota Rhamni modo albet.

Rhodi. Rosæ.

Rhodia radix trita Rosam exhalat.

Selini. Apij.

Hipposelinum hortensi Apio ma-

ius est & candidius.

Procerius Eleoselinum, id est Palu-

stre Apium.

Daucus secundus agresti Apio est

proximus.

Sicyos hemeri. Cucumeris satiui.

Solo fructu differt a' satiuo Cucu-

mer syluestris.

Mentastrium Sifymbrio undecun-

que maius atque grauiore odore.

Scolymi. Cardui.

Carduo similis est syluestris Acan-

thus.

Syces. Ficus.

Sycomorus Ficum æmulatur.

Ricinus est paruæ Fici magnitudi-

ne.

Triphylli. Trifolij.

Medica recens nata ad pratense

Trifolium proxime alludit.

Hyperici.

Ascyron ab Hyperico magnitudi-

ne discrepat, eodemq; fruticosus

est.

Hyssopi.

Origanus onitis Hyssopo, quam

Origanus Heracleotica est simi-

lior.

Phaci. Lentis.

Aphac est Lente excellior:

Phlomi. Verbasci.

Verbascū imitatur Tithymalus

septimus cognomento platyphyl-

los, hoc est, Latifolius.

Nigrum Verbascum candidis om-

nino est affine.

Phylli. Folij herbæ.

A folio herba semine duntaxat

diffidet alterum peculiariter ar-

rhegonon appellatum.

Chamæleonis.

Nigrum Chamæleonē refert Cro-

codilium.

Chamædryos. Trixaginis.

Teucrium Trixagini non est abss-

mile.

Chamæpityos. Aiugæ.

Anthyllis secunda. Chamæpity
breuior est, hirsutior ac asperior. furiosum.

Ocimi.

Acinus ab Ocimo non uariat.

Nivalibus, Astragalus.

Cluosis, Chamæleon niger.

Collib⁹ nascitur Cymini syluestre.

AD BINAS PLANTAS

collatio.

Candidius est Argemone & syluestri Anemone Papauer erraticum.

Sesamoides maius Senecioni aut Rutæ est simile.

Centaurium minus Hyperico Origanouæ æquale est.

Androsæmos ab Hyperico & Ascyro differt.

Plantæ apricis locis crescētes. Centaurium maius, Daucus Creticus, Delphinium, Anthyllidis prima species, Satyrium alterum cognomine erythron, id est, rubēs.

Apricis præcipue uenit Cīrcæa.

Quæ umbrosa amant. Dracunculus uterq; Myosotis, id est, Muris auricula peculiari uocabulo Alfine.

Hippofelinum, id est, Apium grande, Latini Olusatrum uocitant, Cræteogonon, Medium, Chrysocoma, Gentiana, Adiantum, Trichomanes, Cyclaminus quæ Orbicularis, Rapum siue umbilicus terræ Latini nuncupatur, Helenium

Latini Inulam siue Enulam Campanam nominant, Ephemerum, Mandragoras tertius qui priuatim Morius dicitur, Ionmelan, id est, Viola nigra quæ purpurea & matronalis uocatur.

Æditis locis prouenit Lithospermum Vento perflatis, Astragalus, Strychnon manicum, id est, Solanum

Plantæ montibus familiares. Acantha leuce, id est, Spina alba, Cactilia, Asclepias, Polygonatum, Thymalus mas priuatim characias, id est, Vallaris, Thymelæa, Pteris Latinis Filix, Enula campana, Parmice, id est, Sternum taria: Apium montanum, Alysson, Stachys, Polemonia, Tragium, aliud Solanum furiosum, Aizoon maius, id est, Semperuiuum maius, seu Sedum maius, Empetron, Oenagra, Scordium Romani Trixaginem palustrem uocant, Laurus Alexandrina, Daphnoides, id est, Laureola, Elleborum album Latinis ueratrum album, Satyrium, alterum priuatim erythron, id est, rubens.

Altissimis montibus gaudet Glycyfida siue Pæonia.

Altissimis montium uerticibus, Gentiana, Ligusticum.

Asperis montibus, Lygusticum.

Umbrosis, Asarum, Peucedanum, Ligusticum.

Iustinis montibus in Italia inueniuntur est præcipue Aconitum alterum.

Promontorijs surgit Pæonia.

Præruptis locis nascitur aliud Tragium.

Præruptis rupibus, Myrtus syluestris, Latini proprie Ruscus.

Saxatiles plantæ. Cistus, Rhus, Batis, Parmice, Acanthus, Apium montanum, Daucus Creticus, Libanotis.

- tis sterilis, Clinopodium, Cham
 drys, Testiculus, Hemionitis,
 Pycnocomon, Filix, Medium, Si
 deritis, Chrysocome, Chamæsy-
 ce, Semperuiuum tertium, Asple-
 non, Oenanthe, Paronychia, Sem-
 peruiuum minus, Saxifraga, Ti-
 thymalus sextus, quid drodes, id
 est, arborefcens dicitur, Folium,
 Symphytum petræum.
 Lapidosis locis præsertim nascuntur
 Thymus & Cyrcæa.
 Roscidis saxi adhæret Lichen qui
 muscus est.
 Muscosis. Polypodium.
 Aquosis conuallibus ortum habet
 Heliochrysum.
 Plantæ locis campestribus emergen-
 tes. Eryngium, Calamintha Lati-
 nis Nepeta, Lycopsis, Verbascū.
 candidum scemina, Chamæleon
 niger, Buglossum, Buphthalmos.
 In campestribus plerunque reperi-
 tur Thalictrum.
 Stirpes cultis locis amicæ, Telephi-
 um, Condrilla altera, Ruta sylue-
 stris Hypericum, Elatine, Cype-
 rus, Artemissa tenui folia, Chamæ-
 cissos, id est, humilis Hedera.
 Pinguibus ac fecundis nascētes. Cle-
 matis daphnoides, Condrilla al-
 tera, Anchusa, Seseli peloponne-
 siacum, Xanthium siue Phasgani-
 um, Achillea, Centaurium mai⁹,
 Ruta alia syluestris aliquibus sic
 dicta.
 Viginosa accōlit Plantago maior.
 Quæ aruis prodeunt. Psyllium id est
 Pulicaris herba, Aphace, Phoenix
 Leontopetalon, Papauer erraticū
 cum, Peryclimenum, Hypecoon.
 Aruis potissimum gaudet Xiphion,
 id est, Gladiolus.
 Agris asperioribus. Stratiotes mille-
 folia.
 In segetibus erumpunt Elatine, Le-
 ontopetalon.
 In triticea segete. Hypecoon: Hedy-
 sarum, id est, Securidaca.
 In hordeacea, Papauer erraticum, He-
 dysarum.
 Inter legumina prouenit Oroban-
 che, id est, Eruangina.
 Vinetis gaudent, Telephium, Helxi-
 ne, Peplos, Sideritis tertia.
 Quæ in hortis nascuntur aut circa.
 Acāthus, Erysimum, Latinis Irio,
 Peplos, Lotus satiuus.
 In hortis aliquando inuenitur Sem-
 peruiuum tertium.
 Hortorum umbrosis locis Phyllitis.
 Hortorum arsis. Lagopus, id est pes
 leporinus.
 Plantæ inculta amantes. Vitex, Hi-
 beris, Sifymbrium, Coronopus,
 id est, pes cornicis, Onobrychis,
 Clematis, Daphnoides, Psylliū,
 Smyrnum.
 Tenui ac sterili solo ueniunt Thym-
 bra, Capparis.
 Sterili solo præcipue crescit Thy-
 mus.
 Pratis gaudet Limonium.
 Plantæ aspera & dumosa loca colen-
 tes. Tilia, Vitex, Lycium, Cyclas-
 minus altera, Capparis, Eleispha-
 cos Latinis Saluia, Eryngium,
 Calamintha, Baccharis, Veratrū

- album, Thymbra, Ruta sylvestris, Sefeli peloponnesiacū, Delphinium, Libanotis sterilis, Alysson, Chamædrys, Stachys, Onosma, Anthemis seu Chamæmalis, Lithospermum, Lonchitis, Hypericum, Polemonia, Saxifraga, Heliochrysum, Viola nigra, Sesamoides, Smilax aspera, Ruscus, Tithymalus mas qui characias, & foemina quæ myrtites dicitur, Thymelæa, Heliotropium maius, Papauer Corniculare.
- Stirpibus & arboribus confecta amant Centaurium maius, Crocodilium.
- Nemorosa, Muris auricula ob id Alfine uocata, Acantha leuce, id est, Spina alba.
- Inter fruteta plerumque reperitur Crataegonon.
- Quercera amat Ephemeron.
- Sub arboribus precipue nascitur Cyclaminus.
- Verustis arboribus hæret Polypodium.
- Muscosis uetustarum quercuum partibus, Dryopteris.
- Plantæ siccis ac squalentibus prodeuntes, Chamæscice, quasi humilissicus, Lonchitis, Enula campana, Baccharis, Smyrnum, Chamæleon niger, Vetratrum nigrum.
- Sabulosa habitantes. Orchis id est, Testiculus, Anchusa altera, Buglossum, Anthyllidis primum genus, Cynoglossum, Hippophæston, Cucumer sylvestris, Hippophæes.
- Aquatice stirpes. Gentiana, Centaurium minus, Calamintha, Apium palustre, Cyperus, Spondylium, Bechion, id est, Tussilago, Alisma uel Damasonium, Polygonon foemina, Epimedium, Pentaphyllon, Hippuris Latinis Equisetum, Peristère, non orthos, id est, Verbena ca recta, Siō, Potamogonon id est, Fontinalis herba, Scordium, Plātago maior, Ranunculi primum genus, Acanthus, Onobrychis, Conyza tertia.
- Aquis supernatat qui ob hoc aquaticus Stratiotes dicitur.
- Aquis stagnantibus, Myrice, Nymphaea utraq, Typha, Lens palustris qui muscus est Lenti similis.
- Aquas accolunt Vitex, Chelidonium minus, Lyfimachia.
- Profluentibus aquis finitimæ sunt Botrys, Erinus, Ranunculus primæ speciei.
- Eisdem plerumque accolit Ligusticum.
- Stantibus aquis, uelleniter fluentibus uicinum est Hydropeperi, id est aquaticum Piper.
- Aquarum scatebris, Tussilago.
- Aquarum canalibus. Artemisia tenuifolia, Pentaphyllon.
- Non procul a fontibus nascuntur Centaurium minus, Adiantum, Trichomanes, Erinus.
- Plantæ paludibus prouenientes. Fabæ Egyptia, Oxylapathon, id est acuta Rumex, Hippolapathon, Spondylium, Lyfimachia, Limonium, Gallium, Adiantum, Trichomanes, Typha, Smilax aspera, Nymphaea utraq. Myriophyllon id est, Millefolium.
- Siccatis æstate paludibus oritur Xanthium.
- Palus

- Paludibus adjacent Myrice, Helio-
 tropium minus, Hippocelinum.
 Fluuijs & lacubus gaudent Potamo
 geton, Tribulus aquaticus, Helio
 tropium minus.
 Amnibus & lacubus adnascuntur
 Chelidonium minus, Plantago
 maior, Vitex, Tribulus terrestris,
 Nerium siue Rhododaphne.
 Lapidibus fluminum confectis pro-
 uenit Asplenon.
 Profluentibus torrentibus propin-
 quus est Vitex.
 Circa torrentes præsertim inuenitur
 Botrys.
 Mediterranea colit Artemisia aliqua.
 Stirpes maritima loca sortitæ. Cha-
 meleon niger, Hippopheston, Hip-
 pophaes, Rhododaphne, Tithy-
 malus tertius qui ideo Paralios,
 id est, maritimus dictus est, Aly-
 pon, Empetron, Papauer cornicu-
 lare, Batis, Tragus, Tripolium,
 Glaux.
 Maritima plerunque tenent Artemi-
 sia, Peplium.
 Etsi maritimis pullulat Tripolium,
 non tamen in arida, neque in ma-
 ri crescit, sed quo fluctus peruenit
 & regreditur.
 Maritimis tumulis nascitur Enula
 Aegyptia.
 Maritimis sepibus gaudet Halim⁹.
 Littoralibus petris crescunt Solanū
 somnificum & furiosum, Doryc-
 nium.
 Propemare in lapidibus & piscium
 testis gignitur, quod ideo Bryon
 thalassion, id est, Muskus marin⁹
 uocatur.
- Amant insulas Capparis & Seselepe
 loponnesiacum.
 In semitis nascuntur Cornicis pes &
 Thlaspi.
 Vias & itinera accolit Anthemis seu
 Chamæmalum.
 Secus uias maxime conspicitur Stra-
 tiotes, id est, millefolia.
 Passim secundum itinera se offert Ga-
 liopsis.
 In fossis aut circa proueniunt Thla-
 spi.
 Equisetum, Mandragoras tertius co-
 gnomento Morius.
 Quæ tumulis gaudent. Centaurium
 maius, Ruta alia agrestis aliquib⁹
 sic dicta, Sefeli peloponnesiacum,
 Phalangium, Olostium.
 Umbrosis tumulis exilit Semperui-
 uum minus.
 Asperis. Veratrum nigrum.
 Petrosis. Smyrnum.
 Aquosis. Poterion.
 Inter rudera aut circa crescunt Mar-
 rubium, Erysimon, Cucumer syl-
 uestris, Alterci tertium genus.
 Venit inter ruinas Altercum tertiu.
 In ruinarū ruderibus inuenitur præ-
 cipue Tithymalus quartus.
 In aggeribus se promit Pes cornicis.
 Quæ in sepibus aut circa emergunt.
 Thlaspi, Periclymenum, Latinisa
 Inuolucrum maius, Rhamnos,
 Helxine, Artemisia tenuifolia.
 Plantago maior, Erigeron, id est,
 Senecio, Dracunculus uterq.
 In sepibus ubiq^{ue} est obuia Galiepsis.
 Circa domos prouenit Thlaspi.
 Tectis apparet Semperuiū maius.
 Recens confectis regulis, Phoenix

quam Latini Hordeum murinū
appellant.

In parietibus nascuntur Helxine, Si-
deritis tertia, Semperuium mi-
nus.

Parietibus opacis. Asplenon.

Humentibus muris gaudent Adian-
tum, Tricomanes.

In murorum coronis emicat Sem-
peruium minus.

In aggeribus murorum. Senecio.

Plantæ in domorum areis aut circa
prodeuntes, Capparis, Cucumer
sylvestris, Tribulus terrestris, Ery-
simon, Marrubium.

In domorum areis ubique deprehen-
deret Galiopsum.

Ex fistilibus uasculis se profert Sem-
peruium maius.

Circa urbes & oppida nascuntur E-
rysimon, Bupthalmos, Chrysan-
themū, Thymalus quartus qui

Heliocopos, id est, Solisequus uo-
catur.

Plerumq; circa eadem loca crescit Se-
necio.

Vere prodeunt Telephium & Papa-
uer erraticum.

Æstate, Abrotonum.

C Coronariæ herbæ. Serpyllum hor-
tense, Sampsuchum, Acinus, bac-
charis.

STIRPIVM DIFFEREN- tia à partibus ipsarum petite.

Stirpium partes præcipuæ.

Radix.

Caulis.

Cortex.

Ramus.

Folium.

Flos.

Fructus.

Semen.

P L A N T A R V M D I F F E- rentia à radice ductæ.

R Adicibus alijs adnascantibus.
Phu.

Quæcunque pars quæcunque terram
contigerit radicatur Serpyllū hor-
tense.

Veluti adnatis alijs. Filix.

Adnatis multis, nigris, duris, adstrin-
gentibus, cornu soliditate sibi in-
uicem implicitis, Astragalus.

Præter radicem nihil habet Tuber.

Radice pilosa, Polygonatum Chry-
socomæ, Polypodium, Dryopter-
is, Plantago maior.

Multis capillamentis fibrata. Muris
auricula altera.

Tuberculum habente, Asparagus.

Numerosis rotundis capitulis, Oenan-
the.

Ceu glandibus circiter septem aut
octo, ut in Hastula regia, inhaeren-
tibus, Pæonia foemina.

Radice fistulosa ac concaua, Cicuta,
Solanum furiosum.

Muscosa. Acanthus.

Succosa. Centaurium malus, Smyr-
nium.

Per messem succum fundente, An-
chusa.

Liquore plena, Peucedanus, Scam-
monia, Argemone, Poterion, Hip-
pophæes.

popphaes, Apios, Alypon, Condrilla altera, Pityusa, Colchicon, Vbi eruta est se contrahente, Phalangium.

Tithymalus tertius.

Citra radicē uiuit Stratiotes aquaticus.

Radice numerosa. Asaron, Lycium, Asclepias, Hemionitis, Veratrū album, Thelypteris, id est, Foemina Filix, Aethiopis, Panaces herculeum. Singulari, Aloe, Ephemeron, Peptos, Peplis, Millefolium.

Fere unica. Verbenaca recta.

Duplici Testiculus, Gladiolus, Hibebis.

Bina aut terna, Mandragora foemina thridacias dictus.

Triplici, quadruplici. Circaea, Barts.

Quina aut sena. Gramen Parnasi, Alcea.

Vnica in superiore parte, pluribus in inferiore existentibus, Chelidonium maius.

Grandi radice, Asparagus, Capparis, Dracunculus maior, Oenanthe, Thlaspi alterum, Solanum somnificum, Thapsia, Mandragoras foemina qui Thridacias, id est, Lactucinus uocatur, Arcion Latinis Lappa, Cucumer syluestris.

Prægrandi. Astragalus.

Exigua. Gingidium. Primū Ranunculi genus, Chelidonium minus, Centaurium minus, Moly, Panaces, Asclepium, Onobrychis, Libonotis cum Erice nascens, Leonotopetalon, Phalangium, Catananthe altera, Onosma, Anthyllidis primum genus.

Crassa. Gentiana, Chameleum niger, Carduus, Peucedan, Periclymenum, Papauer corniculare, Solanum furiosum, Aethiopis, Smilax aspera, Hippophaes, Centaurium maius, Pityusa, Hippophæston, Tithymalus mas qui Valla ris dicitur.

Crassitudine digitali. Plantago maior, Batis, Orobanche, Muris auricula altera, Aristolochia longa, Pastinaca erratica, Elaphoboscus Latinis Cerui ocellum, Daucus creticus, Polygonatum, Symphytum petraeum, Anchusa, Gramen Parnasi, Dorycnium, Ephemeron, Verbascum candidum foemina, Chamæacte quasi Sambucus humilis Latinis Ebulum.

Digitali fere crassitudine, Pæonia mas.

Policem crassa, Eryngium, Pyretrū, Mandragoras tertius qui morius. Minimum digitum crassa, Polypodium, Papauer erraticum, Enula Aegyptia.

In superiore sui parte minimi digiti crassitudine. Phu.

Crassitudine baculi. Medion. Crassi corticis. Aristolochia clematis quasi fermentaria panaces herculeum, Mandragoras foemina cognomine thridacias, id est, Lactucinus, Thapsia.

Gracili, Olusatrum, Meum Lathyrus Asarum, phalangium, Condrilla

- altera, Anemone sylvestris, Aristolochia clematidis, Origanum sylvestris, panaces Chironium, Apium montanum, Libanotis foecunda prior, Asclepias, Heliotropium maius, Atractylis Latinis Colus rustica, Trifolium, Alypon, Echion, id est, Thussilago, Ambrosia, Onosma, Pes cornicis, Hemionitis, Anthyllidis primum genus, phalaris, Cepaea, Britannica, Epimedium, Anchusa altera, Ocimum, Tragium aliud, Heliochrysum, Verbenaca supina, Chamæcissos, id est, Hedera humilis, Phyteuma, Alisma uel Damasonium, Veronica, Peplium, Veratrum utrumque, Sesamoides utrumque, Catananche prima, Chamæsyce, quasi humilis & terrestris Ficus.
- Supra digitum gracili, Echion.
- Tenuis libri. Dracunculus uterque, Satyrion alterum quod priuatim erythron, id est, rubens nuncupatur.
- In pingui & campestri solo crassa, in montibus graciliore, Chameleon albus.
- In inferiore sui parte tenui, superiore uero crassiore, Gladiolus, Enula Aegyptia.
- Longa, Meon, Enula, Asparagus, Tragopogon, i. Barba hirci, Acanthus, Pyrethrum, Gentiana, Glycyrrhiza, i. dulcis radix, Eryngium, Seseli massiliense, Trifolium, Rubia, Aethiopis, Polygonarum, Symphytum petraeum, Xyris, Nerium, siue Rhododaphne, Ephemerum, Crocodilium, Verbalcum candidum foemina. Myrrhis, Oenagra, Phyteuma, Scammonia, Ebulum Thelypteris, id est, Foemina Filix.
- Inter multas tribus quatuorue tantum in longitudinem progressis, Chelidonium minus.
- Oblonga. Asphodelus, Latinis Haestula regia, Orchis, hoc est, Testiculus, Onosma, Filix, Anchusa altera, Pentaphyllum, i. Quinquifolium, Verbenaca supina, Papauer erraticum.
- Longissima. Aristolochia Clematidis, Tres digitos longa. Elaphoboscus. Longitudine quatuor digitorum. Olosteum.
- Dodrantali. Paeonia mas, Cirsaea, Daucus Creticus.
- Pastinaca erratica, Medium, Aristolochia longa.
- Dodrantalem magnitudinem aliquando superante. Aristolochia longa. Paulo dodrantem eccellente. Mandragoras tertius qui morius.
- Duos dodrantes longa. Ambrosia.
- Cubitali. Alcea, Polemonia, Scammonia, Dorycnium, Solanum furiosum.
- Bicubitali. Centaurium maius.
- Bicubitali aut tricubitali. Poterium. Breui. Britannica.
- Lata. Tragacantha quasi hircina spina, Lycium, Eryngium, Alcea.
- Aliquantulum lata. Cyclaminus, Crocodilium.
- Alba radice. Dracunculus maior, Plantago maior, Aron, Arctium, primum Ranunculi genus, Ononis, uel Anonis, Panaces Herculeum, & Asclepium, Ligusticum, Elapho-

- Elaphoboscus, Libanotis fœcunda prior, Spondylium, id est, Verticillus, seu Verticillaris herba, Circæa, Nymphæa altera, Pæonia mas, Alcea, Cucumer sylvestris, Scamonia, Polygonatum, Polemonia, Gramen Parnasi, Tragium aliud, Papauer spumeum, Solanum furiosum, Pityusa, Mandragoras tertius cognomine morius, Oenagra, Tripolium, Olosteum, Laetis liquore. Condrilla altera, Pityusa, Tithimalus tertius cognomine paralios, id est, maritimus. Subalbida, Acorus, Gingidium, Papauer erraticum. Buxei coloris, Glycyrrhiza. Ruffa. Xyris. Subruffa. Phu, Symphytum petreum. In nigro ruffa. Thelypteris. Flauescente, Condrilla altera, Turber. Lutea. Pycnocomon. Diluti aqua croci colore liquorem ex se remittente. Argemone. Rubente. Acanthus. Rubia, Anchusa altera, Lycopsis. Per æstatem sanguinea ac sanguineum succum fundente, Anchusa. Subrubra. Onosma, Pentaphyllon. Subrubra & succi rubescentis. Centaurium maius. Quum ex terra foditur uirente, Phalangium. Ara, Cyperus, Scolymos, id est, Carduus, Alia Ruta sylvestris, aliquibus sic dicta, Cyclaminus, Pycnocomon, Filix, Chamæleon niger, Epimedium, Peucedanus, Leon-
 topetalon, Nymphæa, Papauer corniculare, Aconitum alterum, Veratrum nigrum. Nigricante. Echion. Ruffa ac purpurascens. Pancrati-
 on. Superficie ruffa, intus candida. Saryrium utrunq. Corticis in nigro ruffi intus niuea. Colchicon. Decorticata albescente, foris insecus rubra, Enula campana. Rubentis corticis. Solanum somnificum. Foris atra intus alba, Apios, Lappa, Hippofelinum, Mandragoras fœmina, Eryngium, Thapsia Libanotis fœcunda altera, Symphytum alterum. Summa facie nigra, buxæ colore intus. Vitis nigra. Nigra ubi dissecta fuerit Fulua, Chamæleon niger. Extrinsecus nigra, cortice exuta rubente. Chrysogonum. Corticis foris nigri, intus uiridis pallescentis u. Smyrnum. Nigro cortice uestitus. Bulbus uonmitorius. Intus candida. Chamæleon albus, Althæa, Narcissus. Intrinsecus pallida. Enula Ægyptia. Interna parte Buxei coloris, Aristolochia rotunda & longa. Dersa herbaceo colore. Polypodium. Radice iucundi odoris. Iris, Acorus, Meon, Cyperus, Asarum, Enula, Batis, Eryngium, Ligusticum.

- sticum, Pastinaca erratica, Sese-
 lida, Massiliense, Olusatrum, Smyrniū
 Foeniculum erraticum, Asclepi-
 as, Cirsia, Alisma, Ephemerum, Corticis subamari. Panaces Hercu-
 leum.
 Myrrhis Tripolium, Laurus alex-
 andrina.
 Odorati corticis, Aristolochia clema-
 titis.
 Odoris asperi. Crocodylium.
 Grauius odorata. Chamæleon alb⁹,
 Panaces Herculeus, Peucedanus, Liquoris acris, Argemone, Alypon.
 Polygonatum, Epimedium, Aristolochia rotunda & longa. Maxime feruida: Pyrethrum.
 Non sine aliquo uiroso odore. Phu. In dulci leniter austera, Chrysocome.
 Grauius odoris liquorem funden-
 te, Scammonia. Subacerba sed dulci. Glycyrrhiza.
 In dulci acerba. Dryopteris, Polypo-
 dium.
 Terram olente, Pycnocomon. Acerba, amarescenteq⁹, Myrtus syl-
 uestris. Latinis Roscus.
 Vini halitu & odore siccata, Oen-
 ogra.
 A Distictoria radice, Pæonia mas,
 Ephemerum, Verbascula duo. Saporem acrum adstrictione dulce-
 dineq⁹ aliqua, Centaurium maius.
 Gustum quadamtenus astringente, Feruida simul & amara. Pancration.
 Filix. Mollis radice. Smyrniū, Polygo-
 natum, Gramen Parnasi, Hippo-
 phæa Romanis Lappago, Hippo-
 phæstion.
 Acerba, Verbascum candidum fœ-
 mina, Medium.
 Lenti saporis, Æthiopsis.
 Insuper, Epimedium.
 Gustu suauis. Batis, Myrrhis, Satyri-
 um, Chrysocome.
 Dulci. Gramen, Barba hircina, Cha-
 mæleon albus, Elaphobosc⁹, Gera-
 niū, Satyrium, Arctium, Gramen
 Parnasi,
 Cortice nudata dulci. Colchicon.
 Salsa, Nerion.
 Amara. Gingidium, Primum Ranū
 culi genus, Gētiana, Aristolochia
 rotunda & longa, Centaurium mi-
 nus, Leucacantha, id est, Spina al-
 ba, Papauer erraticum, Hippo-
 phæa.
 Subamara. Cyperus.
 Corticis subamari. Panaces Hercu-
 leum.
 Acri. Acorus, Asaron, Dracunculus
 uterque, Aron, Arisaron, Meon,
 Enula, Asphodelus, Chamæleon,
 niger, Panaces Chironium, Smyr-
 niū, Alisma, Tripoliū, Thapsia.
 Liquoris acris, Argemone, Alypon.
 Maxime feruida: Pyrethrum.
 In dulci leniter austera, Chrysocome.
 Subacerba sed dulci. Glycyrrhiza.
 In dulci acerba. Dryopteris, Polypo-
 dium.
 Acerba, amarescenteq⁹, Myrtus syl-
 uestris. Latinis Roscus.
 Saporem acrum adstrictione dulce-
 dineq⁹ aliqua, Centaurium maius.
 Feruida simul & amara. Pancration.
 Mollis radice. Smyrniū, Polygo-
 natum, Gramen Parnasi, Hippo-
 phæa Romanis Lappago, Hippo-
 phæstion.
 Tenera, Plantago maior, Mandra-
 goras tertius priuatim morius
 nuncupatus, Arctium, Myrrhis.
 Cortice spoliata tenera. Colchicon.
 Aliquatenus pingui, Alisma.
 Glutinoso lentore molli, Acanthus,
 Enula campana, Althæa siue Ebi-
 scus, Symphytum alterum, id est,
 Solidago altera.
 Dura, Centaurium maius, Smilax
 aspera, Hippuris Latinis Equise-
 tum.
 Solida & tenaci. Iris, Poterion, Tri-
 folium, Chamæleon niger, Leuca-
 cantha.
 Infirma

- Infirma, Onofma.
 Aspera, Nymphæa utraq.
 Inani & leui. Condrilla altera.
 Ponderosa, Centaurium maius:
Radice inferiore uegeta distenta
 que, superiore languida & rugo-
 fa. Testiculus.
 Rotunda, Asparagus, Condrilla alte-
 ra, Dracunculus uterq., Argemone,
 Periclymenum, Astragalus,
 Myrrhis, Narcissus, Pycnocomō,
 Tuber.
 Aliquando rotunda, Cyperus.
 Modice rotunda, Geranium.
 Tereti, Asphodelus.
 In acumen desinente, Condrilla, Nerium.
 Quibusdam ceu geniculis interfecta,
 Anemone omnes cultis nascentes.
 Geniculata, Iris, Acorus, Asarum,
 Gramen.
 Crebris geniculis dissecta, Xyris, Polygonatum.
 Condylorum modo tuberculis quibusdam
 excrecentibus, Leontopetalon.
 Aliquando corrosa, Chamæleon niger.
 Multifida, Oxyacantha.
Radice polyporum ritu cirrhis
 prædita, Polypodium, unde nomen inuenit.
 Cirrhis marinarum squillarum simili,
 Aconitum alterum.
 Minimorum testiculorū figura, Orchis,
 id est testiculus ita idcirco appellatus,
 cognomine serapias.
 Scorpionis caudam representante,
 Aconitum.
 Capilli in modum tenuissima, Olosteum.
 Iuncea, Catanance prima.
 Pomi speciem exhibente, Satyrion.
 Exiguum malum æquante, Pycnocomon.
 Coroneum malum referente, Lotus
 Egyptia.
 Ad piri figuram accedente sed rotundiore,
 Apios inde nomen sortita.
 Oliuam æmulante, Cyperus, Anemone
 omnes cultis nascentes, Cotentidion
 Latinis Acerabulum siue Veneris
 umbilicus, Catanance altera,
 Arisaron, Testiculus.
 Aliquanto quàm oliua maiore. Anemone
 omnes culta amantes.
 Glandis effigie, Asphodelus.
 Ad tritici formam coaceruata, Chelidonium minus.
 Liqueoris gummi referentis. Poterion.
 Thuris odore, Libanotis foecunda
 prior.
 Linosa, Lycium, Capparis, Tragacantha.
 Equisetum, Nerion, Tithymalus
 mas qui characias dicitur.
 Similiter alabastris nitente, Aconitum.
 Clauæ alicuius modo nodosa, Nymphæa.
 Pali instar in terram defixa, Aloc.
**RADICVM INTER SE COL-
 latio iuxta Alphabeti Graeci seriem.**
A Grosteos, Graminis.
 Radice

- Radice gramini proxima. Asarum, Veratri gracilitate, Chrysocome, Ruscus, Veronica.
- Lōge graciliori. Asarum. Nigrum Veratrum exprimente. Baccharis, Alisma.
- Althææ, Ebiscî, siue Hibiscî. Crassiore. Pentaphyllon, id est Quinquifolium.
- Althææ simili. Cannabis sylvestris, Anemones, Iridis.
- Anemones culta amantis radice numero flore, sylvestris. Ari. Radice Iridis specie. Acorus.
- Maiores quam Ari acrimonia, Arisa- C Alami, Harundinis.
- ron. Aristolochiæ. Harundinis radice crassiore. Fabæ Egyptia.
- Longæ Aristolochiæ radicem æmulante. Gentiana. Cardami. Nasturcij.
- Asphodeli. Hastulæ regiæ. Nasturcium simulante. Hiberis.
- Asphodeli radicem simulante graciliori tamen. Nardus montana. Nasturcij odore. Crocodilium.
- B**olbi. Bulbi. Cinnamomi odorati.
- Radice bulbosa. Ornithogalon, Dracunculus minor, Moly, testicul⁹, Cinnamomo odorato proxima. Baccharis.
- Satyrium, Narcissus, Bulbus vomitorius, Hyacinthus Romanis, Vaccinium. Cichorij. Ambubeiæ.
- Grandi Bulbo simili. Pancration, Hemerocallis Latinis Liliū sylvestre. Ambubeiam seu agrestem Intybum æquante. Chamæpitys, Anthillidis secunda species.
- Exigui Bulbi figura. Gladiolus. Croci.
- G**entianæ. Radice Gentianæ æmula. Glycyrrhiza. Croci radici non diuersa. Chelidonium maius, hoc est, Hirundinaria maior.
- Congylidis. Rapi. Ciperi. Quadrati odorati Iunci.
- In globum Rapi modo rotundata. Gustum, qualis in Cypero est, obtinente. Chysocome.
- Aristolochia rotunda, Chrysogonon, Cyclamin⁹, Leontopetalō. Mandragoræ fœminæ.
- D**Auci. Pastinacæ sylvestris. Radice ad Mandragoram fœminam proxime alludente, maiore tamē candidioreq; Mandragoras mas.
- Radice sylvestrem pastinacam imitante. Lonchitis, id est, Lanceola. Myrsines agrig. Myrti agrestis Latini proprie Ruscum uocant.
- Dracontij. Dracunculi. Ruscii æmula sed maiore & molliore, Laurus Alexandrina.
- Ad Dracunculi radicem accedente, sed minus acri. Aron.
- H**ellebori. Veratri. Panacis Heraclei.
- Veratri modo adnascentibus alijs radicibus, Ranunculus primus. Radice Panacis Herculeo simillima, Ligusticum.

Raphani, Radiculæ.

Radice Raphanum imitâre. Dracunculus minor, Spondyliū, Astragalus.

Agrestem Raphanū effingente. Tragicum aliud.

Scolopendri, seu Asplenii.

Radice in uniuersum Scolopendrium referente, maiore tantum & leuorem maiore habente. Muris auricula altera.

Spondylii verticilli seu verticillaris herbæ.

Quæ Spondylis est æqualis. Apios. Struthii Radiculæ, seu Lanariæ herbæ.

Struthium representante, Polemonia.

Teuth. Betæ.

Radice Betæ figura. Alypon.

Hyperici.

Radice quam Hyperici maiore. Cotyledon altera.

Odorati rotundi Iunci aut nigri Veratri in morem sibi ipsi implicita. Phu.

Radice idem principium sortita. Chelidonium minus, Æthiopis, Panaces Herculeum.

Ex ceposo capite exiguo & oblongo exorta. Veratrum utrunq.

In partes distracta. Meon.

Altius descendente. Oxyacantha. Nō profunda. Cicuta, Panaces Chironium.

Quæ in superficie terræ hæret. Acorus, Filix, Phyteuma, Papauer corniculare & spumeum.

Supra terram emergente. Tragacantha.

Obliqua. Acorus, Asarum, Thelypteris, id est, scemina Filix.

Alijs obliquis, alijs rectis, Meon.

Alijs adnascentibus quæ transuersæ feruntur. Phu.

Alteri alteri insidente. Gladiolus.

Mutuo contactu sibi inuicem coherentibus, Cyperus, Testiculus.

Sibi inuicem implicitis. Mandragoras scemina.

Superiore altera, altera inferiore, Testiculus.

Inutili radice. Daphnoides, hoc est

Laureola, Lathyrus, Chamæsyce

quasi dicas humilem & terrestrem

Ficum, Heliotropium maius, Cy-

claminus altera, Centaurium mi-

nus, Origanus sylvestris. Omnes

Calaminthæ species, Chamæcis-

sos, id est, humilis Hedera, Serpil-

um sylvestre, Attractylis, Bechi-

on, Conyzam minor, Phalaris, Po-

lygonon scemina, Ocimastrum,

Adiantum, Senecio, Peplos, Pe-

plium siue Peplis.

PLANTARVM DIFFERENTIA à caule tractæ.

Veluti colliculis diuicatis utrinque ex summo ramulorum emergentibus, Lithospermum.

Caule glabro ac folij experte. Cyclaminus, Narcissus, Satyrium, Orobanche.

Qui præterquam in ca cumine folio nudus est, Attractylis Latinis Colus rustica.

Spinosa, Dipsacos Latini Veneris labrum apellitant, Hieracium maius La-

- tinis Lactuca erratica maior. Liquorem exudante, Condrilla altera, Erinus, Tithymalus mas cognomine characias.
- Spinis inter folia ex interstitio emicantibus, Hippophaes Romanis Lappago siue Lappula. Qui commanducatus succo irrigat, Semperuium tertium.
- Hirsuto, Marrubium nigrum, Orobanche. C. Aule uacantes plantæ, Tuber, Chelidonium minus, Chamæleon albus, Libanotis sterilis, Phyllitis, Hippophæstion, Onosma, Asplenon, Chamæscice quasi humilis Ficus, Hemionitis, Mandragoras tum mas, tum foemina, Bryon thalassion, id est, Muscus marinus, Cynoglosson, Filix, Adiantum, cui tamen tenuissimi sunt coliculi.
- Cacumine hispido, Cirsium. Interdum non emissio, Arcion Latinis Lappa.
- Leniter hirsuto caule, Caucalis, Verbascum candidum foemina. Aliquibus locis non erumpente, Eleonium Romani Enulam siue Inulam dicunt.
- Lanuginoso, Panaces Herculeum, Papauer erraticum, Symphytum alterum, id est, Solidago altera, Anemone omnes culta amantes, Geranium alterum, id est, altera Gruina herba. Multis caulibus, Marrubium nigrum, Muris auricula altera, Eryngium, Phalaris, Semperuium minus & tertium, Echion.
- Capillamentis quibusdam spicarum forma, Tribulus aquaticus. Simplici caule, Apium montanum, Alysson, Polygonon foemina Latini Sanguinalem foeminam nominant, Millefolium, Alisma, Ageratum.
- Alii simile quiddam in summo habente, Moly. Per totum densum, Myriophyllum, hoc est, Millefolium. Plerumque unico, Peristere non rectus Latinis Verbenaca recta.
- Exiguus ueluti lingulis in summo secus folia exeuntibus, Hippoglosson. Tribus quatuorue, Alcea.
- Apicibus quibusdam annuentibus in cacumine promptis similitudine gruini capitis, aut caninorum dentium, Geranium alterum. Decem aut duodecim Solanum furiosum.
- Per totum densum, Myriophyllum, hoc est, Millefolium. Grandi caule, Gentiana, Cicuta, Poterion, Oenagra, Foeniculum erraticum.
- Quum siccari coeperit corticem ceu tunica dimittente, Veratrum album. Aliquibus locis grandi, Pityusa.
- Intus concauo, Sonchus tum agrestior & aculeator, tum tenerior & qui edendo est, Gentiana, Hieracium maius, Hippocrepis Latinis Olusatrum, Hippuris utraq; Latini Equisetum uocant, Veratrum album, Narcissus, Muris auricula altera, Acantha leuce, id est, Spina alba, Phu, Cannabis satiua, Lathyrus. Plantæ coliculis præditæ, Coryledon

Ied, nutraq; Cynocrambe, Cau- Aliquando crassiore. Acantha leuce-
 calis, Cyminum sylvestre, Buph- Baculum crasso. Dracūculus uterq;
 thalmos, Polygonon foemina, Tenui, primum Ranunculi genus,
 Coccus baphicus, Tragus, Tha- Smilax hortensis, Thlaspi, Orni-
 lictrum, Thymus, Polium mon- thogalon, Chelidonium maius,
 tanum, Leontopodium, Litho- Panaces Asclepium, Cyminum
 spermum, Ligusticum, Chrysoco sylvestre, Peucedanus, Nymphaea,
 me, Plātago minor, Senecio, Hel- Phyllon, id est, Folium cognomi-
 zine, Echium, Erysimum Latinis ne Thelygonon, Alisma, Vcroni-
 Irio, Viola nigra, Millefoliū, Mu- ca, Lysimachia, Limonium, Arte-
 ris auricula altera, Geranium alte- misia altera, item quæ hoc nomi-
 rum, Adiantum, Semperuium ne nonnullis appellatur, Eruum,
 minus, Item tertium, Ambrosia, Acetabulum alterum, Buphthal-
 Anem, næ omnes cultis gauden- mos, Echion, Ligusticum, Ane-
 tes, Asparagus, Aphace, Erythro mæ omnes cultis nascentes, Sem-
 danum, id est, Rubia, Alysson, A- peruium minus, Muris auricula
 stragalus, Am, mum, Arisaron, altera, Geranium alterum.
 Pes cornicis, Barba hircina, Pe- Extremæ gracilitatis, Adianthum.
 plos, Scorpoides, Staphis sylue- Qui minimo hominis digito est gra-
 stris, Solanum uesicarium, Sesa- ciliior, Hyacinthus Latinis Vac-
 moides minus, Sion, Tragoriga- ciliū.
 nus, Hippoglossum, Hieracium Longo, Cannabis sativa, Rubia, Ly-
 minus, Hippuris, Thlaspi, Strati- copsis, Arction, Solanum furio-
 tes millefolia, Chamæpitys, Tor- sum.
 dylon seu Creticum Sefeli, Arte- Oblongo. Scolymos id est, Cardus-
 misia quibusdam appellata, Pha- us, Eleliphacos, Latinis Salvia,
 laris, Orchis serapias: Oroban- Pes cornicis.
 che, id est, Eruangina, Ornithoga- Oblongo nō tamē grandi. Tragus.
 lum, Eruum, Ruta sylvestris. Digitali. Napus, Leontopodium.
 Crasso: Cyclaminus altera: Oenan- Palmi altitudine. Cyclaminus, Vera-
 the: Symphytum alterum, Æthi- trum album.
 opis: Altercum. Longitudine duorum palmorum.
 Satis crasso, Xyris. Phalaris,
 In summo quam in profundo crassi Dodrantali. Orchis uterque Adian-
 ore, Tribulus aquaticus. tum, Sesamoides, Cynocrambe,
 Crassitudine digitali. Faba Ægy- Polypodium, Tussilago, Aron,
 ptia, Gentiana, Chamæleon ni- Caulalis, Chamæleon niger, Cy-
 ger, Acanthus, Lathyrus. minum sylvestre, Apium monta-
 Humani pollicis crassitudine. Acan- num, Oenanthe, Onobrychis, Le-
 tha leuce, Semperuium maius. ontopetalon, Sideritis prima &

- tertia, Hyacinthus, Chrysocome, Hypericum, Coris, Anthyllis prima, Trixago, Polium montanum, Papauer spumeum, Aconitum, Colchicon, Tripolium, Tithymalus quintus priuatim cyparissias dictus, Stratiotes millefolia, Agerratum, Linozostis Latinis Mercurialis herba, Pseudobunium, Polygalon, Verbenaca recta.
- Fere dodrantali, Tragus, Semperuium minus.
- Qui dodrante est maior. Centaurium minus, Narcissus.
- Aliquando dodrantem superante, Sideritis, Tithymalus quintus, Leontopetalon, Caucahis, Stratiotes millefolia, Mercurialis, Verbenaca recta.
- Interdum dodrantem paulo excellentem, Tragus.
- Duos dodrantes longo, Thlaspi, Geranium alterum, Clinopodium.
- Altitudine duorum fere dodrantum. Paeonia.
- Trium dodrantum magnitudine. Ambrosia.
- Semipedali. Daucus Creticus, Orobanche.
- Fere semipedali. Ornithogalon.
- Semipedem aliquando excedente. Orobanche.
- Pedali. Melanthium Latinis Nigella, Conyza minor.
- Pedalem longitudinem nonnunquam supergresso. Melanthium.
- Altitudine quantum protensa hominis utrinque brachia ab altero summo medio digito ad alterum, tracta per perfectus longitudine, patient, Solanum furiosum.
- Dimidij cubiti magnitudine, Ormis non satiuum.
- Cubitali. Cyperus, Phu. Faba Aegyptia, Plantago maior, Ranunculus primus, Chelidonium maius, Baccharis, Cnicus, Panaces Asclepium, Libanotis fecunda prior, Spondylium, Satyrium, Althea, Vetonica, Lyfimachia, Gladiolus, Xyris, Semperuium maius, Senecio. Laureola, Hiberis, Aconitum alterum, Verbascum candidum fecmina, Xanthion, Lathyrus.
- Paulo minus quam cubitali, Rhubarbarum, Papauer erraticum.
- Qui aliquando est cubito minor. Hiberis.
- Cubitum eccellente. Batrachion secundum, id est, Ranunculus secundus, Pityusa, Alisma, Polygonatum, Equisetum alterum, Tithymalus mas cognomine characias.
- Qui interdum maior est cubito. Cyperus, Phu, Chelidonium maius, Libanotis fecunda prior, Spondylium, Vetonica, Lyfimachia, Verbascum candidum fecmina, Aconitum alterum, Semperuium maius.
- Bicubitali. Dracunculus uterque, Gentiana, Myagros, Centaurium maius, Acanthus, Conyza maior, Symphytum alterum, Lotus syluestris.
- Plerumque duum cubitorum. Meon.
- Propemodum bicubitali. Cirsium.
- Duobus

- Duobus cubitis maiore. Ifatis sati- Cum rubore albescente. Sideritis ter-
ua, Acantha leuce. tia.
- Duobus cubitis aliquando altiore, Purpurascente. Aron.
Symphytum alterum, Lotus sylue Colore in pupura albicante. Phu-
stris. Viridi. Hieracium minus.
- Tricubitali, Medium. Viridissimo. Semperuium maius.
- Tres aliquando cubitos longo. Cen Nigro. Marrubium nigrum, Nym-
taurium maius. phæa, Adiantum, Staphis sylue-
stris.
- Longitudine ad quatuor cubitos. Nonnunquam subrubro. Sonchus
Moly. tum agrestior & aculeator, tum
Brevi. Ladanum, Epimedium, Phil- tenerior & esculentus.
- lon priuatim thelygonon, Solanū Versicolore, ut angui similis uidea-
satiuum, Cistus, Cotyledon, Bar- tur, abundantibus & euinentib⁹
ba hirci, Oxalis, Britannica, Ana purpureis lituris, Dracunculus
gallis, Paronychia, Sium, Ptar- uterq̃.
- mice, Astragalus, Epipactis, Stra- CAule astringendi uiribus efficaci,
tantes millefolia, Rumex agrestis, Limonium.
- Glycyrrhiza, Periclymenum, Tra- Dulci. Phalaris.
- goriganus, Melanchium, Trixa- Liquoris acris, Tithymalus mas pe-
go, Ambrosia. culiariter characias, id est, Valla-
Nitente caule, Adiantum, Gentiana. ris nuncupatus.
- CAule candido. Moly, Chamæpi- Gustu nō iniucundo cum adstrictio-
tys tertia, Cacalia, Ornithoga- ne aliqua. Sideritis.
- lon, Typha. Vliginoso & salso, Semperuium
Albæ lanuginis. Panaces Herculeū. tertium.
- Liquorem lacteum remittente, Con- Mollī caule. Arction, Staphis syl-
drylla altera, Erinus, Tithymal⁹ uestris.
- mas cognomine characias. Tenero. Phu, Hieracium minus, Hip-
Albicante, Lappa, Acantha leuce, poselinum, Sideritis tertia, Buph-
Cynocrambe. thalmos, Ornithogalon, Millefo-
Spinis subalbidis. Hippophaes. lium, Cirsium, Cynocrambe, O-
Rubro. Chamæleon niger, Hieraciū robanche.
- maius, Semperuium tertium, Pingui. Semperuium maius, Xan-
Orobanche, Tithymalus characi thion, Orobanche.
- as & Cyparissias. Duro. Equisetum.
- Rubescente, Plantago maior, Ifatis Duri spinis prædito. Hippophaes.
syluestris, Senecio, Millefolium, Firmo. Hydropeperi.
- Helxine, Equisetum. Enodi & æquali. Thypha, Equisetū
Aliquatenus ab imo rubente. Muris alterum.
- auricula altera.

- Cui inest leuor. Phu, Asphodelus, Acanthus, Typha, Nymphaea, Symphytum alterum, Sideritis tertia, Dracunculus, Chrysanthemum, Hyacinthus.
- Veluti arte expolito. Millesfolium.
- Scabro. Pastinaca erratica, Hieracium maius, Chamæpitys tertia, Lycopsidis, Papauer erraticum, Aethiopsis, Rubia, Veratrum nigrum.
- Asperæ lanuginis. Symphytum alterum.
- Subaspero. Baccharis, Equisetum.
- Anguloso caule. Cyperus, Plantago utraq.
- Sonchus tum qui aculeator, tum qui tenerior et edendo est. Centaurium minus, Baccharis, Symphytum alterum, Xanthium.
- Spinis angulosis. Hippophaes.
- Triquetro. Cirsium.
- Quadrangulo. Marrubium, Ormion satium, Clymenum, Anagallis, Marrubium nigrum, Scordium, Veronica, Pycnocomon, Sideritis, Rubia, Aethiopsis, Napus, Ebulum.
- Cacumine circinato. Cirsium.
- Geniculato. Phu, Hydropeperi, Cyclaminus altera, Gëtiana, Elaphoboscus, Ligusticum, Phalaris, Equisetum.
- Multis geniculis præcincto. Pityusa, Ebulum, Polycnemon, Polygonon foemina.
- Veluti lineis intersecto, Hipposelinum.
- Secus angulos eminentibus productionibus quibusdam à singulis alarum cauis, Symphytum alterum.
- Alis concauo. Hydropeperi, Murtis auricula altera, Orchis serapias.
- Alarum cauitatibus multis. Libanotis foecunda prior, Aethiopsis, Lotus syluestris, Leontopetalon, Xanthion, Solanum satium, Botrys.
- Binis alis in singulis geniculis foliorum excauatis. Telephium.
- Diuisionibus multis. Ifatis syluestris.
- In summo se diuidente. Tripolium.
- Caule fruticoso. Lysimachia.
- Glabri pediculi æmulo. Aconitum.
- Lignoso. Aster atticus.
- Geniculistubarum modo in seipsos fæctis. Polygonon foemina.
- Thyrsum simulante. Alisma.
- Pisilli figura. Aron.

CAVLIVM INTER SE AFFINITAS & DISSIMILITUDO SECUNDUM GRÆCARVM LITERARVM ORDINEM.

- A** Nagallidis.
- Caule Anagallidem referente. Anthirrinum.
- Andrachnes. Portulacæ.
- Portulacæ proximo. Telephium.
- Anethi.
- Anethum æmulante. Ligusticum.
- Anisi.
- Qui Aniso non dissimilis Meon.
- Aparines, seu Philantropi.
- Aparinen imitante, undiq; tamen maiore & ualidiore. Rubia.
- Asphodeli, seu Antherici Albuci.
- Asphodeli seu Hæsulæ regiæ æmulo.
- Aloe.

Ballotes,

- B**allotes, Marrubij nigri. **A**egyptiæ Fabæ æmulo, Nymphææ.
Caulē Marrubio nigro simili, Melys. **L**otus Aegyptia.
 sophyllon Latinis Apiastrum, Cans. Cicutę.
 uel Citrago. **C**icutam mentiente. Myrrhis.
Zex. **L**Apathi. Rumicis.
Zex culmis æquali sed graciliore, **C**aulē ad Rumicem proximę accē-
 Phalaris. **d**ente. Centaurium maius.
Thridacis. Lactucę. **M**arathri, Foeniculi.
Caulē lactucę satiuę ampliore, agre **C**aulē Foeniculum referēte, Spon-
 stis. **l**ium, Peucedanum.
Isatidis, Glaſti. **F**oeniculi in modum geniculato. Cis-
Isatidis satiuę caule tenuiore sylue- **c**uta:
 stris. **C**raſſiore. Sefeli Maſſilienſe.
Calami. Harundinis. **M**ecanis. Papaueris.
Caudicę Harundinis inſtar conca- **A**greſtis papaueris ſequaci, Papauer
 uo, Ricinus. **c**orniculare:
Calaminthes. Nepetę. **N**arthecis. Ferulę.
Caulē qui montana Calamintha & **F**erulaceum caulem æquante. Laſer-
 ea quę Pulegiū reſert maior eſt, **p**itium, Sefeli Peloponneſiacum
 Calaminthę tertię ſpecies. **F**erulę in morem altiffimo, Panaceę
Cannabis. **H**erculeum:
Corticis Cannabi ſimilis. Alcea. **G**raciliore. Thapſia:
Ciſſi ſimilis. Hederę ſmilacis. **P**egani. Rutę.
Smilacis Hederę figura. Vitis nigra. **R**utacę caulis craſſitudine, Thall-
Cichorij. Ambubeię, ſeu agreſtis In **c**trum.
 tybi. **P**teridis. Filicis:
Ambubeię proximo, Condrilla. **F**ilicem ſimulante. Aconitum alte-
Conyzę. Pulicarię. **r**um.
Maioris & minoris Conyzę caule **S**elini. Apij.
 craſſiore & molliore. Conyzę ter **C**aulē apij æmulo, Smyrnum:
 tium genus. **S**efeleos.
Crini. Lilij. **M**aſſilienſis Sefeleos caule maiore,
Lilium imitante. Ephemeron, Heme **S**efeli Peloponneſiacum.
 rocallis quam idcirco Latini ſylue **S**onchi. Cicerbitę.
 ſtre Lilium dixerunt, **S**onchi modo concauo. Symphytū
Tenuiore. Ephemeron. **a**lterum.
Altitudine Lilij, Limonium. **S**choeni. Iunci odorati rotundi.
Cyami. Fabę. **O**doratum rotundum Iuncum re-
Fabaceum caulem referente, Clyme **p**reſentante. Cyperus.
 num.

Tithymali. Lactariæ herbæ.

Caule incisuris prædito quales in ual-
lari Lactaria herba. Semperuiuū
maius.

Triphylli, Trifolij.

Trifolium pratense imitante, Medi-
ca herba.

Phlomi. Verbasci.

Verbasci candidi foeminæ caule gra-
cilior, Verbascum candidū mas.

AD BINOS CAULES COM- paratio.

CAule Libani, idem aut Foenicu-
culum mentiente, Elaphobo-
scus.

Apiastrum aut Arction referente,
Æthiopis.

Agrestis Dauci & Foeniculi figura,
Pyrethrum.

CAule ex una radice toto prolato,
Peplos.

Ex medijs folijs emergente, Xyris,
Viola nigra.

Coliculis ex alarum cauis prodeun-
tibus, Muris auricula altera.

Ex medio proficiscente caule, Sem-
peruiuum minus, Cacalia, Cory-
ledon.

Humi serpente, Anagallis, Sampsu-
chum, Chamæpitys, Ageratum,
Tragus, Pes cornicis, Rumex a-
grestis, Astragalus, Verbascula
duo.

Vbi adoleuit in terra sparso, Solanū
uiscarium.

In gyrum per terram strato. Cappa-
ris.

Propinquis arboribus palmicū in

uitibus modo se inuolvente, Cy-
claminus altera.

In sublime, uicinas stirpes scandens,
se attollente ac ex illis pendens,
Equisetum.

Recto, Dracunculus uterq, Pastinaca
erratica, Lymoniū, Lycopsis, Ca-
calia. Equisetum alterum, Anthyl-
lis prima, Staphis syluestris.

Incuruo, Chamæpitys.

In terram proclui, Plantago minor,
Semperuiuum tertium.

CAule qui cum flore quamprimū
amittitur, Tussilago.

PLANTARVM DIFFEREN- tie à ramulis desumptæ.

RAmulis in quibus foliola acu-
leos operiunt. Tragacantha.
Acuminatas spinas succulorum mo-
do habentibus, Ononis.

Hirsutis. Aparine, Ocimastrum, Ru-
ta syluestris.

Subhirsutis. Scammonia.

Veluti gummi mastiches fabæ mag-
nitudine in ima parte reperto, Cō-
drilla.

Copioso liquore madentibus, Ti-
thymalus tertius qui paralios, id
est, maritimus, & quartus qui He-
lioscopos, id est, Solisequus nomi-
natur, Chamæfyce quasi humilis
ficus.

RAmosæ plantæ, Elelisphacos,
Marrubium, Stachys, Ambro-
sia, Solanum somnificum, Tithy-
malus dendrodes, id est, arborea
scens, tertium Sonchi genus, Na-
pus, Aristolochia rotunda, Præ-
mi ce,

- mice, Laureola, Sampfuchū, A- prodeuntibus longi, Sideritis se-
 parine, Thelypteris, id est, fœmi- cunda.
 na Filix, Polygonon mas, Solanū Longitudine digitorum quatuor.
 somnificum, Scamonia, Ruscus, Chamæfyce.
 Cistus, Ladanium, Asparagus. Sedigitalibus, Phoenix Latinis Hor-
 vno ramulo, Artemisia aliqua. deum murinum.
 In duos ramulos diuisa est Batis. Semipedalibus. Origan⁹ sylvestris.
 Binis aut ternis ramulis, Apios, Pha Dodrantalibus, Ononis, Sefeli Æ-
 langium. thiopicum, Anthemis seu Chamg-
 Aliquando pluribus quam ternis. malum, Ocimastrum, Erinus, Ela-
 Phalangium. tine, Quinquefolium, Psylliū Lat-
 Ternis quaternis uē aut quinis, He- nis Pulicaris, Glaux, Laurus Ale-
 liotropium maius. xandrina, Chamæcissos, Tichy-
 Quaternis aut quinis. Tithymalus malus tertius & quartus, Chamæ-
 quartus. læa, id est, Oleastellus siue Oleago.
 Quinis aut senis, Erinus, Chamæcis- Fere dodrantalibus, Aristolochia
 sos, id est, humilis Hedera, Glaux, longa.
 Elatine, Tithymalus tertius. Dodrante aliquando maioribus,
 Senis aut septenis. Telephium. Ononis, Laurus Alexandrina.
 P Aruis ramis, Ptarmice, Aparine, Duos dodrantes longis & aliquan-
 Tragacantha, Hypecoon, Apios. do maioribus, Delphinium.
 Gracilibus, Aristolochia longa, itē Cubitalibus, Enula Ægyptia, Cha-
 Clematidis, id est, sarmentaria. Po mæpitys secunda, Cytisus, Batis,
 terion, Lithospermum, Melan- Ruscus.
 thium, Origanus sylvestris, Ser- Cubito breuioribus. Dorycnium.
 pyllum sylvestre. Acinus, Andro Cubitum quandoque superantibus,
 fæmos, Polygonon mas, Polemo Cytisus.
 nium, Symphytum petræum, Si- Bicubitalibus, Glycyrrhiza, Sideri-
 deritis secunda, Elatine, Tricho- tis secunda.
 manes, Anchusa altera, Apios, Ti Trium & nonnunquam quatuor cu-
 thymalus quartus. bitorum magnitudine, Scammo-
 Alijs ex superioribus alarum cauis nia.
 prolatis gracilibus, Sideritis se- Quinq; tantum non cubitos longis,
 cunda. Rhamnus tertia.
 Breuissimis. Artemisia aliqua qui- R Amis nitentibus, Trichomanes;
 busdam sic dicta. C Andidis spinis, Tragacantha.
 Longis. Vitex, Poterion, Asclepias, Lactis liquore. Tertius & quari-
 Tragacantha, Thelypteris. tus Tithymalus, Chamæfyce.
 Alijs ex superioribus alarum cauis. Rubentibus ramis. Tithymalus ter-
 tius quartus & sextus, Apios.

Nigrescentibus, Trichomanes.

Ramis acerbis, Elatine.**M**ollibus ramis, Poterion.

Teneris, Polygonon mas.

Pinguibus, Scammonia.

Firmis, Tragacantha, Lithospermum.

Solidis aculeis & ad uulnus infestis, Ononis, Tragacantha.

Ramis lentore suo fractu contumacibus, Ruscus, Solanum somnificum.

A medio in superiorem partem iuncto lentore flexilibus, Laureola.

Corticis egregie lenti, Laureola.

Teretibus ramis, Parmice.

Angulosis, Calamintha montana.

Quadrangulis, Aparine.

Geniculatis, Polygonon mas, Gramen.

Qui numerosis geniculis dissecti, Ononis.

Qui geminatis intercepti geniculis, Linozostis.

Numerosis alarum finibus, Ononis, Linozostis, Anthemis, Androsæmos, Heliotropium maius.

Pennatis ramis, Polemonia.

Fruticosis, Ononis, Chamæmalum.

Cremiorum in modum lignosis, Serpyllum sylvestre.

Vitilium instar lentore suo infragilibus, Vitex, Poterium, Ruscus.

Festucarum ritu gracilibus, Pentaphyllon.

Iuncorum figura, Apios.

Lignosis, Lithospermum.

Ancorarum modo inflexis, Chamæpitys secunda.

RAMORVM INTER SE
comparatio.**A** Brotoni.

Ramis Abrotono similibus, Parmice. Agrosteos Graminis.

Graminis exemplo per terram serpētibus, Polygonon mas.

Alijs Graminibus multo ramosius Gramen Parnasi.

Artemisiæ.

Crassioribus ramis altera est Artemisia.

B Vnñ, Napi.

Ramis Napo, similibus, Pseudobuni.

D Elphinñ. (on.

Ramis Delphinio multo gracilioribus, Delphinium alterum.

E Rebinthi, Ciceris.

Ramulis Ciceri proximis, Astragalus, Herpylli, Serpylli.

Serpylli specie in terra iacentibus, Enula Ægyptia.

Qui non hortensis Serpylli modo serpiūt, sed recti stāt, Serpyllū sylvestre.

Eryngij.

Eryngij æmulis, Nardus montana.

C Alami, Harundinis.

Ramis Harundinis in morem concauis, Ricinus.

Calaminthæ, Nepetæ.

Calamintha montana, & ea quæ pulgum refert maioribus, Calaminthæ tertia species.

O Rigani.

Ramis Origanum referentibus, Serpyllum, Symphytum petraeum.

Origano tantum candidioribus, Serpyllum hortense.

Oxyſcheni, acuminati Iunci.

Oxyſcheni crassitudine, Lithospermum, Præſij.

P Rasi, Marrubij. In cacumine editis, Cicuta, Lathyris,
 Ramis Marrubij effigie, Verba In diuersa tendentibus Phalangium.
 scum syluestre. Humi repētibus, Chamæcissos, Tra-
 gacantha, Glaux, Botrys, Laurus
Marrubio candidioribus, Stachys. Alexandrina, Chamæsyce.
R Hamni. Rectis, Lithospermum, Gallium,
 Ramulis prima Rhamno spinosi Tithymalus tertius.
 oribus, in quibus infirmiores ca-
 dem nec penitus integræ spinæ, Inflexis, Chamæpeuce.
 Rhamnus tertia. In orbem circumactis, Chamæsyce.
Sisymbrij. Orbiculati circa radicem ambitus,
 Sisymbrio maioribus. Dictamnus Phoenix.
 altera.

Tragacanthæ. Spinæ Hircinæ. **STIRPIVM DIFFERENTIAE**
 Tragacantham æmulantibus, Pote- ab ijs trasta quæ caulium uel ramo-
 rium. rum rationem habent.

Hyperici. **SUNT AUTEM HAEC.**
 Ramulis Hyperico maioribus, Ascy-
 ron.

Phaci, Lentis. 1 Virgæ. 6 Adnata.
 Lenti non dissimilibus, Anthyllidis 2 Viticulæ. 7 Germinatiões quædā:
 primum genus. 3 Pediculi. 8 Festucae.
Chamæpityos, A iugæ. 4 Culmi. 9 Cirri.
 Chamæpitym exprimentibus, An- 5 Surculi. 10 Capreoli.

thyllidis secundum genus.
BINIS RAMVLIS
collati.
 1 Virgatum est Teucrium.
 Virgis folio uacantibus, Spartum.
 Spinosis, Cinosbaton, id est, Sentis
 canina.

O Rigano agrestie Serpyllo pro- Pilosis, Eupatorium.
 ximis, Tragoriganus. Inanibus, Sambucus.
R Amis ab radice statim exeunti- **P** Luribus uirgis, alia agrestis Ruta
 bus, Glaux, Heliotropium ma- aliquibus sic dicta.
 ius, Telephium, Ruscus, tertius Singulari, Eupatorium, Heliochry-
 & quartus Tithymalus, Apios, sum, Chamædaphne.
 Thelypteris, id est, foemina Filix, **V**irgis tenuibus, Arabis, Oxyris,
 Batis, Delphinium. Libanotis coronaria Latinis Ros
Scammonia, Stachys, Aristolochia marinum, Trifolium, Eupatori-
 rotunda, Marrubium, Elatine. um, Thymelæa, Chamedaphne.
 Qui ex uirgis erumpunt, Verbascū Breuib. Heliochrysum, Spartum.
 syluestre. Longis, Apocynō, Sambucus, Ver-
 Qui ex alarum cauis oriuntur, La- bascum syluestre.
 thyris.

- D**odratalibus et maioribus nonnunquam, Achillea.
- C**ubitalibus. Arabis, Eupatorium, Verbenaca supina, Cannabis syluestris, Chamædaphne.
- C**ubito maioribus, Triphyllon qd & Oxiphyllon dicitur.
- C**ubito aliquando maioribus. Eupatorium, Verbenaca supina.
- B**icubitalibus fere. Thymelæa.
- T**ricubitalibus, & maioribus quandoque. Lycium.
- A**lbescentibus uirgis, Eleliphacos Latinis Saluia, Sambucus.
- P**uniceo colore rubentibus, Androsæmos.
- V**irentibus. Heliochrysum.
- N**igris. Trifolium, Eupatorium.
- V**irgis in odore grauib. Apocynon.
- D**uris uirgis. Spartum.
- D**urissimis spinis. Sentis canina.
- S**olidis uirgis, Trifolium, Heliochrysum.
- N**atiuo lentore in fragilibus, Spartum, Apocynon, Oxyris.
- L**euore præditis. Chamædaphne.
- S**peciosis uirgis. Thymelæa.
- Q**uadantenus rotundis. Sambucus.
- A**ngulosis. Verbenaca supina.
- Q**uadrangulis. Eleliphacos.
- A**rborefcentibus uirgis. Verbascum syluestre.
- V**itilium modo lentis. Apocynon.
- L**ignosis. Eupatorium.
- F**usorum figura. Achillea.
- VIRGARVM INTER SE SIMILITUDO & DISCREPANTIA.**
- A**gni, Viticis.
- V**irgis Viticis equalibus, Anagyris, Althææ, Ebisci uel Hibisci.
- A**lthææ propinquis, cæterum minoribus, asperioribus & nigrioribus. Cannabis syluestris.
- C**alami. Harundinis.
- H**arundinum formam præferentibus, Sambucus.
- O**xyacanthæ.
- S**imiliter Oxyacanthæ aculeatis. Rhamnus.
- S**chini. Lentifici.
- L**entisco similibus breuioribus tamen, Tragium.
- V**irgis ab una radice surgentibus, alia agrestis Ruta.
- R**ectis. Rhamnus, Eupatorium, Heliochrysum, Chamædaphne.
- V**irgis ad ligandas vites in usum receptis. Spartum.
- S**armentosum est Abrotonum mas,
- V**eluti paruas viticulas profert, Idæa radix.
- V**iticulis spinas acerbæ habentibus. Tribulus terrestris.
- R**imosi corticis. Vitis syluestris.
- N**umerosis viticulis, Smilax tum aspera tum lenis.
- S**implici. Periclymenum Latinis inuolucrum maius.
- G**randibus viticulis. Sefeli Æthiopicum.
- P**aruis. Olostium, Clematis daphnoides.
- T**enuibus. Hedera helix quasi clauicula dicta, Smilax aspera & lenis.
- L**ongis. Vitis syluestris, Aristolochia rotunda.
- Q**uæ tribus quatuorue digitis supra

- pra terram se extollāt. Olosteum. bus, Olosteum.
 Dodrantalibus. Tithymalus secundus cognomine myrtites. Viticulis a radice missis, Tithymalus secundus cognomine myrtites.
 Fere bicubitalibus, Seseli Æthiopiacum. Per terrā serpentibus, Gramen, Tribulus terrestris, Colocynthis.
 R Vbentibus viticulis. Clematis altera. Propinquas stirpes apprehendenti, Periclymenum, Clematis altera, Vitis alba & nigra.
 Viticulis asperis, Vitis sylvestris. Dum vicinis arboribus implicatur, infra supraque se circumagentibus, Smilax utraq.
 Duras spinas producentibus, Tribulus terrestris. P Ediculis caulium uitcem sustinentibus, Filix, Chelidonium minus.
 Geniculatis viticulis, Agrostis Latina Gramen. Pediculo pollicem crasso, cubitali & aliquando maiore, Petasites.
 Viticulis utilium modo lentis, Clematis altera. 4 PLuribus culmis. Cratægonon.
 Iunci crassitudine. Clematis daphnoides. Crassioribus. Oxyschoenus alter semen proferens.
 Lignosis. Vitis sylvestris. Geniculatis. Bromos Latinis Hauena.

VITICVLARVM INTER
se affinitas & dissimilitudo.

- A Mpelihemeræ aut œnophoræ, Vitis satiuæ seu viniferæ. Numerosis geniculis. Cratægonon.
 Viticulis satiuæ seu cultæ viti respondentibus, Vitis sylvestris & alba. Carnosioribus, Oxyschoenus alter qui fecundus est.
 Pilosioribus, Vitis alba. Ab una radice promptis, Cratægonon.
 Sicyi hemeri. Satiui cucumeris. Oxyschoeni.
 Viticulis satiuo cucumeri proximis sylvestris, & Colocynthis. Culmis ambos Oxyschoenos crassitudine longe præstantibus asperioribusque, Holoschoenus.
 Smilacis asperæ. S Vrculosæ plantæ. Chamelæa Latinis Oleastellus, Hippopharæ, Latini Lappagines uocant, Alypon, Thymus, Ruta sylvestris, Polycnemon, Clinopodium, Hypericum, Androsæmos, Saxitragæ, Ageratum, Coccus baphicus, id est, Granum quod tingendo est.

AD GEMINAS VITICVLAS
affinitas.

- P Aliuri aut caninæ Sentis instar spinosis viticulis, Smilax aspera. Cornicis pedi aut Gramini simili.

Sucus.

Surculosis ramulis. Solanum somni-
ficum.

Singulari surculo, Ofyris.

Gracilibus surculis. Alypon.

Nigro surculo, Ofyris.

Totum sceni modo surculosum est
Pŷllium.

6 Aliquibus adnatis, Elaphobo-
scus Latinis Ceruicellum.

M Vitis adnatis, Smyrnum, Pæo-
nia, Lycopsis, Chelidonium ma-
ius, Baccharis, Cîrcæa, Centauri-
um maius, Trifolium.

Paucis. Thlaspi.

Tribus quatuorſe, Ornithogalon.

C Vbitalibus, Lycopsis.

T Eneris, Lycopsis.

Asperis, Ornithogalon.

A Dnatis undique se prominentibus,
Trifolium.

Protinus a radice exeuntibus, Cēn-
taurium maius.

In caule pullulantibus, Smyrnum,
Pæonia, Lycopsis.

Exuirga pendentibus, Trifolium.

I Vnceis. Trifolium.

7 Germinationibus quibusdam se
cus folia emicantibus, Periclyme-
num.

8 Paruis festucis in summo appa-
rentibus. Stratiotes millefolia.

9 Tenuibus cirris, Androsaces.

10 **C** lauculis nitet Vitis nigra.
Smilax hortēsis clauiculis præ-
dicta est tanto undique incremen-
to, ut scenas etiam & tentoria in-
umbrent.

Quæ in caulibus se promentes pro-
pinquis fruticibus aduoluuntur,

Smilax hortensis.

Clauiculis sativæ viti similibus pi-
losioribus tamen Vitis alba.

PLANTARVM DIFFEREN- tie à folio mutuate.

F oliolis solis insigne est Hippo-
phæston.

Spinoso folio, Dîpsacos Latinis ve-
neris labrum, Hippoglosson, Ti-
thymalus secundus, Acantha leu-
ce, id est, Spina alba, Anchusa,
Nardus montana, Eryngiū, Cni-
cus.

In extremitatibus aculeato. Cirsîū,
Acanthium.

Ab inferiore parte caulis, aculeatis
per intervalla folij angulis sed
mollioribus aculeis, Cirsium.

Ex obliquo utrinque spinulis prædi-
to curtis, per rara intervalla dispo-
sitis, Aloe.

Veluti bullis spinosis, Veneris la-
brum.

Aculeis brevibus, exilibus & hirsu-
tis asperato, Echion.

H irto folio. Cistus, Caucalis, Sama-
psuchum, Marrubium, Ballote, id
est, Marrubium nigrum, Stachys,
Conyzatum maior, tum minor,
Scammonia, Chamæpitys pri-
ma & tertia, Symphytum alterū,
id est, Solidago altera, Anchusa,
Papaver corniculare, Helxine, E-
latine, Pŷllium, id est, Pulicaris
herba, Potamogeton, id est, Fon-
tinalis herba, Verbaſculum tertium
cognomento lucernare, Hyoscy-
amus Latinis Altercum, Semper-
uium tertium, Modis.

- Modice hirsuto. Cirsium.
 Valde hirsuto. Æthiopis.
 Lanuginoso. Althea, Cynoglosson.
 Tomētoſa lanosaq; pube obducto,
 Dictamnus.
 Aspera lanugine supercurrente. Symphytum alterum.
 Ad radicem lanoso, Leontopodiū
 Quod auicularum pennis simile erup-
 tionem habet admodum breues, In singulis geniculis bino, Telephium, Veneris labrum.
 Stratiotes millefolia.
 Quod liquoreſcatet, Erinus Latinis
 Ocimum aquaticum, Apocynon. In singulis pediculis terio folio, Trifolium.
 Quod confricatum liquorem remittit, Androsæmos.
 Plantę folio carentes. Orobanche, Tribus quatuorū. Aconitum.
 id est, Eruangina, Tragus, Tubus. Verbaſcum tertium quod
 ber, Androsæces. Lucernare uocatur.
 Raro folio. Sion, Othonna, Stachis. Tribus quatuorū aut quinque, aut
 Folioſæ ſtirpes. Scolymos, id est, sex, aut ſeptem. Sambucus.
 Carduus, Asparagus, Thymus, Quatuor aut quinque. Cyminum
 Anthemis, ſeu Chamæmalum, ſylueſtre.
 Lonchitis, id est, Lanceola, Sideritis ſecunda & tertia, Asplenon, Quinque raroq; pluribus in ſingulis
 Tragacantha, Semperuium minus, Millefolium, Enula Ægyptia, Prarmi-
 ce, Lycium, Equiſetum. Æthiopis, Glycyrrhiza, pediculis, Pentaphyllon ideo dictum.
 Libanotis coronaria, Romanis Quinque aut ſex numero, Phyllitis.
 Roſmarinum, Ciſtus, Ladanum Sex ſeptem uſe. Bechion, id est, Tuſſi-
 Ariſtolochia clematidis quaſi ſarmentaria, Nymphaea, Hippophaes, Peplium. lago.
 es, Peplium. Decem & aliquando pluribus, Li-
 monium.
 Folijs undiq; numeroſis. Baris. Decem fere aut duodecim. Epimedium.
 Folio circa radicem denſo. Acetabulum alterum, Peucedanus.
 Ad radicem maiore, Ceſtrum Latinis Veronica.
 Superiore ſui parte folioſus eſt Thymalus ſextus.
 Exiguo, Hedera helix quaſi clauicula, Rhamnus, Anagallis, Poterium, Melanthium, Thymus, Alypon,
 In ramulis frequentiffimo, Ruſcus, Ononis,
 Elatine, Solanum ſomnificū, Cha-

- Ononis, Anthemis, Adiantum, cum, Aster atticus, Tithymalus
 Chamædrys, Scorpioides, Ascy- tertius qui proprie paralios dicta-
 ron, Senecio, Peppis, Chelidoni- tur.
 um min⁹, Clematis daphnoides, Oblongo in caule. Lathyrus.
 Hippophysson. Glaucium, Tithy Quibusdam foliolis sub ipsum usq^{ue}
 malus tertius. uerticem oblongis, Acanthus.
 Productionibus quibusdam exiliū Prælongo. Enula Campana, Delphi-
 foliorum, Symphytum alterum. nium.
 Ab inferiore parte exiguo. Circium, Longo ad unum digitum. Thlaspi.
 Ambrosia. Duobus digitis multo longiore, Elaphoboscus.
 Minuto in cacumine. Cyperus. Tres quatuorūq^{ue} digitos longo. Le-
 Minore & decrecente continue ad ontopodium.
 summū caulis cacumen, Echion. Longitudine quatuor digitorum,
 Minimo. Epipactis, Papauer spume- Onosma.
 um. Ferme dodrantali, Mandragoras
 Pollicis humani magnitudine, Sem tertius peculiari nomine morius,
 peruium maius. Cubitali. Filix.
 Crasso, Telephium, Tripolium, A- Lato. Tribulus aquaticus, Nardus
 loc, Verbasculum tertium quod montana, Sium, Eryngium, Hip-
 Lucernare uocant. poselinum, Artemisia altera, Gra-
 Tenui Hippuris, Pityusa, Chamæfy men, Altercum, Thlaspi alterum,
 ce, Rosmarinū, Arbutus, Aphace, Mandragoras mas, Semperuiū
 Tragoriganus alia, Teucrium, tertium, Sonchus tertius.
 Gnaphalium, Parthenium, Tra- Quod ex locorum bonitate est lati-
 gacantha, Delphinium, Anthe- us, Tragoriganus.
 mis, Chamæpitys tertia, Achil- Digitum lato. Onosma.
 lea, Echion, Napus. Duos digitos lato. Elaphoboscus.
 Graciliore cōtinue quo summo cau- Angusto, Eruum, Leontopodium,
 li propiore. Ligusticum. Thlaspi, Muris auricula altera,
 Longo. Asparagus, Lithospermū, Thymus, Symphytum alterum,
 Vetonica, Catanance prima, Sesa- Heliochrysum, Tithymalus ter-
 moides maius, Hippophaes. tius.
 Oblongo, Nardus Gallica, Rham- A lbo folio, Delphinium, Stachys,
 nus, Rhu, Condrilla altera, Ptar- Gnaphalium, Chamæpityster-
 mice, Muris auricula altera, Ceta- tia, Mandragoras mas & tertius
 taurium maius, Veneris labrum, cognomine morius, Papauer cor-
 Sefeli æthiopicum, Rosmarinū, niculare, Verbasculum candidum
 Testiculus alter priuatim Serapi- foemina, Capnos, id est, Fumus
 as dictus, Cnicus, Onosma, Sym- siue Fumaria herba, Cacalia.
 phytum alterum, Echion, Alter-

- L**aetei liquoris, Erinus.
Albicante, Batis, Ranunculi primū
 genus, Abrotonum foemina, Ele-
 lisphacos, Calaminthemontana,
 Periclymenū, Echion, Leontopo-
 dium, Cirsium, Verbenacarecta, Ex
 Cynocrambe.
Pallido, Myagron:
Subflauo, Nardus Gallica.
Colore ad luteum inclinato, Smyr-
 nium.
Lutei liquoris, Apocynon:
Aureo, Heliochrysum.
Rubro, Chamæleon niger, Satyrīū,
 Lonhitis, Coris.
Quod confricatum sanguinis colo-
 re liquorē reddit, Androsæmos.
Leuius rubente, Rhu, Gentiana,
 Rhamnus tertia.
Cum puniceo colore aliquo, Hippo-
 selinum, Latinis Olusatrum.
Herbacei coloris, Panaces Hercule-
 um, Veratrum nigrum. Apios.
Cinereo, Ononis, Capnos.
Ceruleo, Telephium.
Ad cæruleum uergente, Chelidoniū
 maius, Verbenaca supina.
Nigro, Cistus, Sium, Anemone alia
 syluestris, Echium, Altercum, So-
 lanum satium, Equisetum.
Subnigro, Muris auricula altera, Eu-
 patorium, Acanthus.
A principio atrii coloris, sed paula-
 tim mutato rubescente, Oxyris.
Albefcentibus maculis, Dracuncu-
 lus minor.
Aliqua parte rubro, Elleborus al-
 bus.
Ex inferiore parte sanguineo, Pepli-
 um.
- V**ario, purpureo nimirum & supra
 infraque maculis albicantibus, Cy-
 clamynus.
Auersa parte candido, superna her-
 baceo, Glaux, Rosmarinum.
Ex inferiore parte flauido, superiore
 uiridi, Asplenon.
Superne à terra candicante, inferiore
 autem sui parte herbaceo, Bechi-
 on, id est, Tussilago.
Odorato folio, Sium, Ligusticum
 Libanatis secunda prior, Sta-
 chys, Vetonica, Ononis, Pana-
 ces Asclepium.
In mandendo odorato, Eryngium.
Cum acrimonia odorato, Aristolo-
 chia rotunda:
Viroso odoris, Cicuta, Mandrago-
 ras foemina cognomine thridaci-
 as, Marrubium nigrum Cannæ-
 bis satia, Apocynon, Sambu-
 cus, Ebulum, Glaucium, Rosma-
 rinum.
Quoniam teritur grauem odorem red-
 dente, Galioipsis.
Grauitate aliqua odorato, Filix.
Perquam iucundo odore, sed graui,
 Elelisphacos.
Non sine acrimonia aliqua medica-
 toque odore odorato, Smyrnum.
Multo non iniucundo sed medicamen-
 toso odore, Achyllea.
Per autumnum hircum olente, Tra-
 gium aliud.
Astringente folio, Britannica, Ly-
 simachia.
Polygonatum, Olosteum, Stoebe,
 Elatine, Cotyledon altera.
Subacerbo, Polygalon.
Gummoso glutinosoque, Thymelea,
 Salsò.

- S**alfo, Batis.
Amaro, Lactuca agrestis, Glaucium,
 Chamædrys, Marrubium.
Subamaro, Achillea, Pastinaca erratica.
Amaro simul & adstringente, Scordium.
Feruido, Aristolochia rotunda. Omnes Calaminthæ species, Pseudobunion.
Acerrimo & exulcerante, Clematis altera, Daphnoides.
Sapore ceu piperis acri non tamen odorato, Hydropeperi.
Amaro & gustum erodente, Chamelæa Latinis Oleastellus.
Molli, Ricinus, Rhamnus, Gnaphalium.
Onosma, Anthyllis prima, Vetonia, Caranance altera.
Mollibus aculeis, Cirsium.
Carnoso, Telephium.
Tenero, Chelidonium minus, Aristolochia rotunda, Semperuium tertium.
Pingui, Batis, primum Ranunculi genus, Aloe, Smyrnium, Conyzarum maior, tum minor, Semperuium maius & minus, Glycyrrhiza, Testiculus serapias, Echium, Solanum somnificum, Acanthus, Verbasculum tertium quod lucernare nuncupatur, Coryledon altera.
Modice pingui, Rhamnus, Thlaspi, Chelidonium minus.
Glutinoso, Telephium, Glycyrrhiza, Achillea.
Paululum glutinoso, Apocynon.
Squalido, Othonna.
Duro, Oxylapathon, Gramen, Stachys.
Firmo nec facile fragili, Tithymalus secundus qui myrtites, Smyrnium, Laureola.
Vitilium & corij instar lento, Bulbus uomitorius.
Leuorem habente, Acanthus, Millefolium, Mandragoras mas.
Quod interiore sui parte natiuo leuore niter, Phyllitis.
Aspero, Acantha leuce, id est, Spina alba, Baccharis, Panaces Herculeum, Buglossum, Anchusa utraq, Echium, Papauer erraticum, Sideritis, Pycnocomon, Cnicus.
Ex inferiore parte aspero, Asplenon.
Per ambitum scabro, Nardus montana, Eryngium.
Asperæ lanuginis, Symphitum alterum.
Subaspero, Ononis, Aconitum, Elaphoboscus, Veratrum nigrum.
Asperrimo, Dorycnium.
Exoletæ attritæq, uestis modo aspero, Elelispacos.
Concinniore folio, Hedera helix.
Circinato, Capparis, Poterium, Verbascula duo, Alysson, Semperuium minus, Sium, Peplium, Cistus, Sampsucum, Coryledon.
Subrotundo, Anagallis, Aristolochia rotunda & clematidis, Marrubium, Ballote, id est, Marrubium nigrum.
In rotundo modice lato repandoq, Aloe.
Anguloso, Hedera helix, Tussilago.
Triangulo, Scammonia.
Mucronato, Gramen, Pityusa.
Acumi.

- Acuminati fastigij.** Xyris, Oxylapathon, Ruscus, Tithymalus secundus, Muris auricula altera, Semperuium minus.
Venoso. Gladiolus.
Gibboso. Hyacinthus, Latinis Vaccinium.
Dorsi elati & eminentis. Muris auricula altera, Cytisus.
Per medium dorsum ueluti bullas foris & intus habente, Veneris labrum.
A tergo pendentibus ueluti tenuibus uermiculis. Phyllitis.
Rugoso. Marrubium.
Concauo quae se in geniculis coniungit sinu quo rores & imbres continentur. Dipsacos Latinis Veneris labrum.
Sensim leni & ut sensum fallat in concauitatem descensu. Cotyledon.
Cribri nodo foraminibus multis et continuis pertuso. Othonna.
Veluti circumrolo. Cōdrilla altera.
Inciso. Staphis syluestris, Colocynthis quae syluestris Cucurbita est, Filix, Polypodium, Cnicus, Verbenaca recta, Coronopus, Ranunculi secundum genus, Argemone, Delphinium, Geranium, Chrysanthemum, Xanthium, Papauer erraticum, Altercum, Catanance altera.
Eruptionibus diuisis. Stratiotes milie folia.
Pluribus fissuris dissecto. Ligusticū.
Ex obliquo crebras incisuras habente. Achillea.
In partes diuiso quinq; fere, aliquando tamen plures. Eupatorium.
Maiores incisuris diuiso. Sambucus.
A medio caule praesertimq; in summo cacumine breuib; diuisuris inciso. Gentiana.
Tenuissimis incisuris fisso. Anemone omnes, Abrotonum foemina.
In summo incisuris diuiso. Thlaspi, Erinus.
In summo utrinque incisuris diuiso. Sideritis secunda.
Per ambitum secto. Verbenaca supina, Ebulum, Sonchus tum agrestior & aculeator, tum tenerior et qui edendo est. Hieracium minus Latinis Lactuca erratica minor, Vetonica, Adiantum.
In extremitatibus serrato. Rhu, Eupatorium, Centaurium maius, Pentaphyllum, Papauer corniculare.
Raris diuisuris per circuitum scisso. Hieracium maius.
Quinque per ambitum diuisuris inciso. Panaces Herculeum.
Rotundo a primo ortu, cum creuerit, deinde in incisuras, quales in Erucæ folijs sunt, diuiso. Sisymbrium alterum.
Folio Lunæ nondum tumentis in globum effigie. Hemionitis.
Scolopēdrum uenenatum insectum simulante. Asplenon unde & Scolopendrium uocatur.
Delphini figura. Delphinium.
In capite folio concreto quod oculi specie globum conformat. Semperuium maius.
Lingulae imaginem presentante. Co

tyledan altera.

In summo linguæ figuram exhibente Semperuium maius.

Bubulam linguam referente. Buglossum, idcirco ita appellatum.

Humanum pollicem imitante. Mar rubium.

Auri muris propinquo. Muris auricula ideo dicta.

Alæ auis similiter pennato. Echium, Ebulum.

In summo alæ auis instar pennato. Androsæmos.

In modum alæ uolucris explicito. Filix.

Auiculæ pennas imitante, Stratiotes millefolia.

Totum sceni modo foliosum, Psyllium.

In Phasiolorum clauiculas torto in cacumine. Hopyron ob id Phasiolum nominatum.

Sub ipsum usque uerticem foliolis ueluti nucamentis aculeatis. Acanthus.

Odore Citri. Melissophyllon Latini Apiastrum, quin & Citraginem ea de causa uocarunt.

Corymbaceo. Chrysocome.

Quod confricatum resinofum odorem reddit. Androsæmos.

Fungi in modum superposito. Petasites.

Vbi adoleuit bituminis odorem diffundente. Triphyllon quod & Oxytriphylon dicitur.

Galeri æmulo. Faba Ægyptia.

Petasi figura. Petasites.

Lanceæ figuram ostendente. Ruscus.

Tanquam cultello in mucronem de-

sinente. Gladiolus ideo nomen sortitus.

Acetabili forma. Cotyledan ob hoc nominata.

Vestigij humani. Cynosbati. Plin.

FOLIORVM COGNATIO

inter se & discordia iuxta Græcarum literarum seriem.

A Brotoni.

Folio Abrotonum referente. Heliochrysum.

Agni. Viticis.

Viticem æquante. Anagryris.

Agrosteos. Graminis.

Graminis sequaci, sed latiore. Moly.

Aæzui, Semperuiui.

Semperuium maius seu Sedum maius effingente, maiore tamen, Stratiotes aquaticus.

Sedi maioris in morem ueluti oculis describente. Acetabulum alterum.

Ad minus Sedum accedente. Chamæpitys, Aristolochia clematidis quasi farmentaria.

Multo tenuiore. Chamæpitys.

Acalyphes. Vrticæ.

Vrticæci folij æmulo, sed maioris leuoris. Galiposis.

Vrticæ mollis folio hirsutior & agrestiore, latiore & nigriore. Vrtica altera.

Acanthæ leucæ. Spinæ albæ.

Spinæ albæ cognato. Acanthion.

Acanthi. Spinæ uulgaris.

Acanthi figuram imitante. Solanum furiosum.

Amaraci. Sampsuchi.

Amaraci æmulo. Panaces Chironium, Ama-

- Amaraci odorem, ubi confricatur, reddente. *Artemisia tenui folia.*
 Ampeli hemeræ. *Vitis sativæ seu cul*
tæ.
 Vid cultæ simillimo uerum pilosio-
 re. *Vitis alba.*
 Ampeli agriæ. *Vitis sylvestris quam*
Labruscam proprie Latini appel-
litant.
 Ad Labruscam accedente. *Staphis*
sylvestris.
 Ampeli leucæ. *Vitis albæ.*
 Vitem albam exprimente. *Anem. m.*
 Amygdalæ.
 Amygdalini folij figura. *Oenagra,*
Nerium, Ebulum.
 Longiore, *Nerium, Ebulum.*
 Latiore. *Oenagra.*
 Asperiore. *Nerium.*
 Quod ex caule prodit Amygdali-
 num folium referente, latiore ta-
 men et maioris leuoris. *Lathyris.*
 Anagallidos.
 Anagallidos sequaci. *Antirrhinon.*
 Andrachnes. *Portulacæ.*
 Portulaceum folium æmulante. *Ti-*
thymalus quartus cognomine so-
lisequus, Pepliū, Batis, Telephiū.
 Tribulus terrestris. *Semperuiū*
terrium.
 Graciliore. *Tithymalus quartus, Tri-*
bulus terrestris.
 Longiore & latiore. *Batis.*
 Nigriore. *Cepæa.*
 Circinatore. *Tithymalus quartus,*
Anemones.
 Anemone non dissimili. *Argemone,*
Geranium.
 Longiore. *Geranium.*
 Latiore & duriore, *Anemone sylue-*
stris.
- Anisi.
 Anisi similitudine, *Meū, Isopyron.*
 Anchusæ.
 Anchusam referente. *Onosma.*
 Ad Anchusæ ruborem aliquem ac-
 cedente. *Echium.*
 Anchusæ modo per terram strato,
 Onosma.
 Anchusæ folio minore. *Anchusa alte-*
ra, Echium.
 Aparines seu *Philantropi.*
 Aparing simillimo. *Gallium.*
 Aristolochiæ rotundæ.
 Aristolochiæ rotundæ longiore fos-
 lio. *Aristolochia longa.*
 Arnoglossi. *Plantaginis.*
 Plantaginis maioris æmulo. *Isatis sa-*
tiva, Alisma, Clymenum, Cynos-
glossum.
 Minore. *Plantago minor, Cynos-*
glossum.
 Tenuiore, molliore & maioris leuo-
 ris. *Plantago minor.*
 Angustiore. *Alisma, Plantago mi-*
nor, Cynoglossum.
 Nigriore & pinguiore. *Isatis sativa.*
 Minoris *Plantaginis folio latiore:*
Plantago maior.
 Atraphaxios. *Atriplicis.*
 Atriplicis proximo. *Xanthiō siue Phas-*
ganion.
 Absinthij.
 Absinthij folio maiore & pinguiore.
 Artemisia.
 Absinthij *Seriphij siue marini in mo-*
dum circa ramulos diuiso, Abro-
tonum foemina.
 Ballotes. *Marrubij nigri.*
 Folio *Marrubium nigrum repræ-*
sentante, maiore tamen, tenuiore

- & minus hirsuto. Apiastrum. Dracunculum æquante. Hemion-
 Batrachij, Ranunculi. tis, Aron.
 Ranunculum mentiente teneriore ta- Minore & minus maculoso. Aron,
 men, Chelidonium maius. Dryos. Quercus.
 Primi Ranunculi folio pluribus in- Querni folij æmulo. Vetonica, Ver-
 cisuris diuiso, secundus. benaca supina, Chamædrys, Chry-
 Bolbi, Bulbi. sogonon.
 Bulbum simulante. Colchicon, Hya Minore & angustiore. Verbenaca su-
 cinthus. pina.
 Longiore & lentiore. Bulbus uomi- E Latēs. Abietis.
 torius. Folio Abietem omnino exprimē-
 Pinguiore. Colchicon. te. Smilax Latinis Taxus.
 Buglossi. Eleæ. Oleæ.
 Buglossum repræsentante, Cirsium, Oleaginum folium imitante. Cata-
 Symphytum alterum. nance altera, Conyza & maior et
 Longiore. Cirsium. minor. Halimus, Ligustrum, Ti-
 Bunij, Napi. lia, Vitex, Lithospermum, Chamæ-
 Napi figura, Pseudobunion. læa Latinis Oleago, Parmice, id
 G Gingidij, est, Sternutamentaria, Hippopha-
 Folio Gingidio simili, sed latio- es, Orchis.
 re, Pastinaca erratica. Colore ad oleaginum accedente, sed
 Gingidij instar serrata. Cuminum minore. Dorycnium.
 sylvestre. Tenuiore. Chamelæa.
 Glichonis. Pulegij. Longiore. Lithospermum, Orchis.
 Pulegij folio maiore. Dictamnus, Latiore. Halimus, Ligustrum, Tilia,
 D Aphnes. Lauri. Lithospermum.
 Folio lauro finitimo. Polygonæ Angustiore. Dorycnium, Hippo-
 tum, Daphnoides, Chamædaph- phaes, Orchis.
 ne, Clematis Daphnoides. Pallidior. Phyllon thelygonum dictum.
 Breuiore multo. Clematis daphnoi Magis herbaceo. Ligustrum.
 des. Nigriore. Tilia.
 Latiore. Polygonatum. Molliore. Hippophaes, Ligustrum.
 Viridior. Chamædaphne. Tenuiore. Vitex.
 Molliore & ualidior. Laureola. Circa uirgas oleaginum referente
 Leuoris maioris, Chamædaphne, longiore tantum & angustiore. Ti-
 Polygonatum. thymalus mas, cognomine cha-
 Delphinij. racias, sed est, vallis.
 Delphinij prioris folio multo gra- Alijs foliolis oleagino similibus mul-
 cilior. Delphinium alterum, to tamen numerosioribus & mi-
 Dracontij, Dracunculi, noribus. Semperuium tertium,
 Eleæ.

- Elælisphaci. Saluæ.
 Saluæ propinquo. Verbascum syl-
 uestre.
 Helxines.
 Helxinen æmulante, Elatine, Ana-
 gallis, Linozostis Latinis Mercu-
 rialis.
 Minore. Elatine, Linozostis, Muris
 auricula priuatim Alfine uocitata.
 Rotundiore. Elatine.
 Erebinthi. Ciceris.
 Ciceri respondente. Astragalus, Teu-
 crium, Securidaca.
 Saporem nondum maturitate siccis ci-
 ceribus simili; Cytisus.
 Eræces.
 Eræcen æquante, æterum minore &
 pinguiore. Coris.
 Erigerontis. Senecionis.
 Senecionis figura sed multo tenuio-
 re. Melanthium.
 Herpylli. Serpylli.
 Serpyllo simili. Clinopodium.
 Eryngij.
 Eryngij æmulo sed minore. Nardus
 montana.
 Erythrodani. Rubiæ.
 Ad Rubiam accedente. Myagron.
 Per ambitum Rubiæ modo ramu-
 lis circumposito, Aparine.
 Euzomi. Erucæ.
 Erucam simulante, Othonna, Sola-
 num furiosum, Pycnocomon,
 Sion.
 Erucæ ritu per ambitum incisuris di-
 uiso. Acanthus, Senecio.
 Maiore. Solanum furiosum.
 Longe minore. Senecio.
 Crassiore & acriore. Pycnocomon.
 Quum digitis teritur Erucam fra-
 grante. Cytisus.
 Syluestris Erucæ effigie. Erysimum.
Hedyosmi. Mentæ.
 A Menta non diuerso, Hydrope-
 peri, Pentaphyllum.
 Pilosiore. Mentastrum.
 Maiore. Sium, Hydropeperi.
 Latiore & odoratiore. Sifymbrie
 um.
 Candidiore & teneriore. Hydrope-
 peri.
 Mentastrifolio tantum oblongiore,
 Calaminthæ tertia species.
 Heliotropij. Solaris herbæ.
 Solaris maioris æmulo, sed rotun-
 diore. Heliotropium minus.
Thridacis. Lactuæ.
 Lactucaceum folium exprimente,
 Isatis syluestris, Anchusa, Inty-
 bus satua altera, Veneris la-
 brum, Lycopsis, Mandragoræ
 scemina ob hoc thridacias, hoc
 est, Lactucinus dictus.
 Minore & angustiore. Mandagoræ
 scemina.
 Crassiore. Lycopsis.
 Graciliore, candidiore & asperiore,
 agrestis.
 Lōgiore & latiore. Lycopsis, Acan-
 thus.
 Lactuæ agrestis affinitate, candi-
 diore tantum & asperiore. Liba-
 nis cum Eræce nascens.
 Thymi.
 Thymum æmulante sed longiore.
 Stichas.
Ierodin. Olusatri.
 Folio Hipposelinum representan-
 te uerum minore.

- Hippuris. Equiseti.
 Prioris Equiseti folio brevior, candidiore, molliore. Equisetū alterū.
 Iridos.
 Iridi cognato. Acorus, Gladiolus, Xyris.
 Breuiore. Gladiolus.
 Latiore. Xyris.
 Angustiore. Gladiolus, Acorus.
 Isatidis. Glasti.
 Isatidis satiuæ æmulo. Tripolium, Isatis sylvestris.
 Maiore tantum. Isatis sylvestris.
 Latiore. Tripolium.
 Itæ. Salicis.
 Salici respondente. Lyfimachia.
 C Alami. Harundinis.
 Folio parvæ Harundinis figura.
 Gramen.
 Calaminthæ. Nepetæ.
 Nepetæ tenuifoliæ propinquo. Samolus, Cannabis.
 Cannabis satiuæ sequaci, nigriore et asperiore tamen. Cannabis sylvestris.
 Cardami. Nasturcij.
 Nasturcium mentiente, uere tamen speciosiore. Hiberis.
 Cardami odore. Xanthium.
 Cissi. Hederæ.
 Hederacei folij æmulo, Asarum, Smilax hortensis, Cyclaminus utraque, Dracunculus minor, Chelidonium minus, Aristolochia rotunda, Asclepias, Sefeli Æthiopicum, Viola nigra, Chamæcissos, Tusfilago, Epimedium, leuis & sine aculeis Smilax, Gramen Parnasi, Periclymenum, Apocynon, Vitis nigra.
 Maiore. Tusfilago.
- Minore. Cyclaminus altera, Viola nigra, Chelidonium minus, Asarum, Sefeli Æthiopicum.
 Tenuiore. Viola nigra, Chamæcissos, Smilax leuis.
 Longiore. Chamæcissos.
 Nigriore. Viola nigra.
 Rotundiore. Asarum, Chelidonium minus.
 Acutiore in cacumine. Apocynon.
 Molliore. Smilax hortensis, Apocynon, leuis Smilax.
 Maioris leuoris. Ienis Smilax.
 Smilacem Hederam referente. Altercum primæ speciei.
 Ad Hederam Smilacem magis accedente, sed maiore. Vitis nigra.
 Cisti.
 Cisti folio longiore & nigriore. Ladanum.
 Cichorii. Ambubeiæ.
 Ambubeiæ siue Intybo agresti non dissimili. Condrilla, Botrys.
 Latiore. Intubus satiuæ.
 Cnici. Cartami.
 Cnici folio multo minore. Atractilis Latinis Colus rustica.
 Colocynthæ. Cucurbitæ.
 Cucurbitæ simili, minore tamen, nigriore & duriore. Arcion Latinis Lappa aut Personacia, Conyza quæ multis Pulicaria est.
 Conyza maioris folio minore, Conyza tertia.
 Conyza minoris maiore. Conyza tertia.
 Conyza maior.
 Corni seu Coriani. Coriandri.
 Coriandri æmulante, Napus, Thalictrum, Ranunculus primus, Panchenium

- thenium, Anemone omnes culta Fabæ Egyptiæ simili cæterum mi-
 amantes, Sideritis tertia, Adian- nore & oblongiore, Nymphaea.
 tum, Daucus tertius. Cydoniæ mali, Cotonæ mali.
 Coriandri in modū inciso, Achillea. Cotoncam malum referente, Sola-
 Latiore, Ranunculus primus. num somniferum, Elelisphacos,
 Candidiore, Fumus. Capparitis.
 Pinguiore, Thalictrum. Crassiore paulo, oblongiore & an-
 Coronopodis, Cornicis pedis. gustiore, Elelisphacos.
 Cornicis pedi propinquo, Pysyllium, Cyclamini. Orbicularis herbę seu ra-
 Catanance prima, Sefamoides mi pi terræ.
 nus. Cyclamini instar circinato, Althæa.
 Hirsutiores et minores, Sefamoides mi Cymini sylvestris.
 nus. Cuminum sylvestre breuitate asperi-
 Longiore, Pysyllium. tateq; maxime æquante, Strati-
 Cotyledonis, Acetabuli. tes millefolia.
 Acetabuli seu Veneris umbilici fo- Cyparissi, Cupressi.
 lio latiore, Acetabulum alterum. Cupressum simulante, Sabina altera.
 Crambes, Brassicæ. Cyperidis.
 Brassicam imitante, Leontopetalon. Cyperidi propinquo, Typha.
 Verbascum candidum fœmina. Cytisi.
 Colore, ut in Brassica, uiridi, Centau- Cytisi, Glaux.
 rium maius. Cynni, Cicutæ.
 Hirsutiores & multo latiores, Verba- Cicutæ effigie, Sefeli Peloponnesia-
 scum candidum fœmina. cum, Myrrhis.
 Crites, Hordei. Crassiores & latiores, Sefeli Peloponne-
 Hordei æmulo, breuiore tantum & siacum.
 angustiore, Phoenix, propterea La- L Apathi, Rumicis.
 tini Hordeum murinum nuncu- Folio Rumicis æmulo, Dracunculus
 parunt. maior, Aron; Phyllitis.
 Crini, Lilij. Oblongiore & speciosiore. Phillitis.
 Lilium representante, Pancration, Sylvestri Rumici respondente, Bri-
 Ephemeron, Oenagra, Hemero- tannica, Rumex alia peculiari no-
 callis Latinis ideo Lilium sylue- mine Oxalis.
 stre dicitur. Hirsutiores & nigriores, Britannica.
 Tenuiores, Ephemeron. Lachani, Oleris.
 Longiores, Pancration. Oleris speciem exhibente, Plantago
 Croci. maior.
 Croci figura, Tragopogon, id est, Lepidij.
 Barba hircina. Lepidij figura, cæterum candidiore
 Cyami Egyptij, Fabæ Egyptiæ, & molliore, Arabis.

Libanotidis.	Apiaſtri ſiue Citraginis æmulo,
Libanotidē referente, Hippofelinū.	Marrubium nigrum.
Lini.	Mecanis. Papaueris.
Lini æmulo, Oſyris, Tithymalus tertius.	Papaueris in morem incifuris diuiſo, Leontopetalon.
Linozſteos, Mercurialis.	Papauer agreſte ſimulante, Argemone altera.
Mercuriali herbæ ſimili, Helxine.	Papaueri agreſti ſimiliter per ambitum ſerrato, Papauer corniculare.
Loti pratensis.	Papauer cornutum exprimente, ſed pinguiore. Glaucium.
Ad pratensem Lotum propius accedente, Ononis.	
Loti arboris.	
Loto arbori proximo, Triphyllon.	Meleæ. Mali.
quod Oxyphyllon quoq; uocat.	Ad malum proxime accedente, Canabis ſatiua.
Malaches, Maluæ.	Moreæ. Mori.
Folio maluaceum mentiente.	Mori æmulo. Ficus Ægyptia proprie Sycomorus.
Geranium alterum.	Myrſines, Myrti.
Mandragoræ.	Myrtum referēte, Myrtus ſylueſtris
Mandragoræ candido ſimili ſed minore, Mandagoras tertius qui morius.	Latinis Ruſcus, Tithymalus ſecundus ea cauſa myrtites uocatus.
Marathri, Fœniculi.	
Fœniculum referente, Aſparagus.	Maiore, Tithymalus ſecundus.
Libanotis fœcunda prior, Panaces.	Minore, Ruſcus.
Aſclepium, Buphthalmos, Millefolium, Sefeli Maſſilienſe, Thapſia, Daucus Creticus.	Longelatiore, Cynosbatum.
In ſummo Fœniculi ritu pluribus incifuris diuiſo, Caucalis.	Ruſcum mentiente, Laurus Alexandrina.
Hirſutiore & maiore, Panaces.	Idæa radix, Hippogloſſon, Tithymalus ſextus.
Aſclepium.	Minore, candidiore & molliore, Laurus Alexandrina.
Minore & exiliore, Daucus Creticus.	Narthecis, Ferulæ.
Crassiore & latiore, Libanotis fœcunda prior.	Folio ferulaceum referente, ſed anguſtiore, Cicuta.
Melampyri.	XIphij. Gladioli.
Melampyrum imitante, Crateogonon.	Folio Gladioli æmulo, Iris, Sparganium.
Meliloti, Sertulæ Campanæ.	Maiore, latiore, & pinguiore, Iris.
Sertulæ Campanæ cognato, ſed tene-riore Liguſticum.	Anguſtiore & in terram magis inclinato, Sparganium.
Meliſſophylli. Apiaſtri.	ORigani.

- Folio Origanū æquante. Origanus Piceæ affinitate. Polygonō fœminā,
 syluestris, Tragoriganus, Serpyll Pityusa, Tithymalus quintus.
 Ium hortense, Polycnemon. Piceam fragrantē; Chamæpitys ob
 Origani Heracleoticæ folio candi id nomen sortita.
 diore, Origanus onitis, Maron. Tenuiore. Tithymalus quintus.
PAnacis. Platanū.
 Folio panacis figurā imitante, Spon Platanum simulante, uerum nigriōs
 dylum. re, Aconitum alterum, Veratrum
 Pepli. nigrum, Ricinus.
 Pepli similitudine. Chamæfyce qua Platanum quadantenus æmulante,
 si humilis Ficus. Spondylium.
 Maiore. Paronychia. Maiore et insignioris leuoris. Ricin^a
 Periclymenī, Inuolucris maloris. Minore & pluribus incisuris diuiso.
 Periclymenī longitudinem referen Veratrum nigrum, Aconitum al
 te. Sefeli Æthiopicum, Smilax terum.
 aspera. Polypodij. Filiculæ.
 Peristere, nis. Verbenacæ. Polypodij instar incisuris diuiso, A
 Verbenacæ in modum incisuris di splenon.
 uiso. Alcea. Prasi, Porri.
Pegani, Rutæ. Ad Porrum proxime accedente. Cy
 Rutacei folij æmulo. Ruta syluestris, perus, Narcissus, Orchis serapias.
 Ambrosia, Hypecoon, Serpyllū Porri in modum uiridi. Hemerocal
 syluestre, Hypericū, Polygonon lis.
 mas, Peplos, Apios. Minore & angustiore. Narcissus.
 Quod Rutam mox natum olet. Tri Graciliore. Cyperus, Narcissus.
 phyllon priuatim, Oxyphyllon, Longiore. Cyperus.
 Paulomaiore. Polemonia. Latiore. Orchis Serapias.
 Triplo quadruploue maiore. An Grandis Porri effigie. Asphodelus.
 drosæmos. Porro platycarpo, id est, latioris fœ
 Longiore & molliore. Polygonon minis & fructus simili, sed latiore,
 mas. Lonchitis.
 Oblōgiore. Polemonia, Apios, Ser Prasi, Marrubij.
 pyllum syluestre. Marrubij æmulo, Sideritis, Marru
 Latiore, Peplos. bium nigrum, Orminon satiuū,
 Angustiore. Serpyllum syluestre, Numerosiore. Stachys.
 Apios. Maiore. Marrubium nigrum.
 Duriore. Serpyllum syluestre. Longiore. Sideritis,
 Rutæ syluestris folio multo longio Pteridis. Filicis.
 re & teneriore, aliqua agrestis Ru Filici propinquo. Thelypteris, Dry
 ta. opteris, Adiantū, Sideritis secun
Pityos, Piceæ. da, EEc v

- Non adeo ut Filicis minutas incisuras habente. Polypodium. & tenuiore, Chamæleon niger. Scorodii, Allij.
- Multo minoribus quam Filicis incisuris prædito. Dryopteris. Allij odorem aliquæ exhalante, Scorodium.
- Quod nõ uno singulariq; pediculo, ut Filicis, hæret, Thelypteris. Smyrniij.
- Pyxi. Buxi. Smyrnio similiter secto, Pæonia foemina.
- Buxum referente. Lycium. Spondyliij, Verticilli.
- Pyri. Tritici. Verticilli siue Verticillaris herbæ figuram ostendente, Veratrum nigrum.
- Ad triticum alludente sed molliore, Ægyptops Latinis Avena. Staphylini. Pastinacæ.
- Rhamni. Primæ Rhamni folio latiore & nigriore, tertia. Pastinacæ proximo, Oenanthe.
- Rhodi. Rosæ. Struthij, Radiculæ quam proprie Lanariam Latini nominant.
- Rosacei folij, ab inferiore parte, imaginem conformante, Cirsium. Radiculæ non diuerso, Papauer spinosum.
- Ælini. Apij. Phyteuma.
- Folio apium representante, Caulicis, Laserpitium. Minore, Phyteuma.
- Latiore. Smyrniium. Strychni, Solani.
- Ad radicem Apij figura, uerum multo tenuiore, Napus. Solano hortensi æquali, sed latiore, Solanum halicacabum, Vitis sylvestris.
- Seridis. Intybi. Longiore. Vitis sylvestris.
- Intybi æmulo, Medium. Satium halicacabum, id est, vesicarium referente, Cirsæa.
- Sicyi hemeri, Cucumeris satium. Sices. Ficus.
- Cucumerem satium imitante, Cocolocynthis, Cucumer sylvestris. Ad ficulnei folij formam & quantitatem accedente, sed minore circa caulem, Panaces Herculeum.
- Sisymbrij. Schini, Lentisci.
- Sisymbrium exprimente, Dictamnus altera. Lentisci similitudine, Tragium, Glycyrrhiza.
- Scillæ. Minore, Tragium.
- Scillæ simillimo, Aloe. Schoeni, Iunci.
- Scolopendrij. Aspleni. Iunci figura, Equisetum.
- Scolopendrij æmulo, Lonchitis altera, Tragium aliud. In summo qualis est Iuncorum coma, Tithymalus mas peculiari uocabulo characias.
- Maiore pluribus incisuris fisso & asperiore, Lonchitis altera.
- Scolymi. Cardui. Terminthi, Terebinthi.
- Carduum imitante, minore tamen

- Folio Terebinthi specie, Elaphoboscus.**
Teutli, Betæ.
Betaceum folium mentiente, Hieracium maius, Limonium, Mandragoras mas, Potamogeton.
Tenuiore, Limonium.
Triphylli, Trifolij.
Trifolij pratensis æmulo. Lotus sylvestris.
Quod pratensi Trifolio tametsi æquale spacio tantum contrahitur, & angustius euadit, Medica herba.
HYoscyami, Alterci.
Alterci siue Appollinaris herbæ primæ speciei folio teneriore, Altercum secundum.
Hyssopi.
Hyssopū æquante, Origanus, Chrysocome.
Phaci, Lentis.
Folio Lenticulæ propinquo, Enula Ægyptia, Anthyllis prima, Onobrychis, Trichomanes, Polygalon, Chamæsyce, Ononis.
Longiore, Enula Ægyptia, Onobrychis.
Phlomis. Verbasci.
Verbascum candidum foeminam simulante, Papauer corniculare, Æthiopis, Arction, Buglossum.
Hirsutius & rotundius, Arction.
Longiusculo & angustius Verbascum candidum mas unde & angustifolium dicitur.
Nigriore, Buglossum.
Verbasci candidi maris æmulo asperiorerantum, Enula campana.
Verbasci candidi latiore & nigriore. Verbascum nigrum.
Chamedryos. Quercule, trixaginis.
- Folio Trixagini simillimo maiorē tamen nec per ambitum tantopere incisuris diuiso, Scordium cui propterea inditum nomen Trixago palustris.**
Chamelæ, Oleastelli.
Oleastellum siue Oleaginem imitante, ceterum angustius & pinguiore, Thymelæa.
Chamæleonis.
Ad Chamæleonem album proximè alludente, Silybon.
Chamæleonem nigrum referente, angustius tamen & candidius, Acantha leuce, id est, Spina alba.
Acutius & asperius. Chamæleon albus.
Chamæpitryos, Aiugæ.
Aiugæ primæ propinquo, secundæ Aiuga, Anthyllis secundæ.
OCimi.
Folio Ocimum exprimente, Nepeta montana, Ocimastrum, Linzostis, Erinus, Heliotropiū maius.
Hirsutius. Acinus, Heliotropiū maius.
Maiore, Solanum satium, Heliotropium maius.
Minore, Erinus.
Latiore, Solanum satium.
Candidius, Heliotropium maius.
- QV AE AVT AD BINA PLV, rariè alia expenduntur folia per sedecim particulas.**
Eorum ad que fit collatio index.
- A** Grostis, id est, Gramen, particula decima.
Acantha leuce. i. Spina alba.
Aristolochia.
Arnoglossum. i. Plantago.
Calas.

C alamintha, id est, Nepeta.	14	Thymus.	7
C annabis.	8	Triphyllum, id est, Trifolium.	3
C arya, id est, Iuglans.	2		
C hamæleon niger.	6	PARTICVLA RRIMA.	
C issos, id est, Hedera.	1	F olio Helxines aut Hederae simili	
C ichorium.	7	sed molliore, Scammonia.	
C oronepus.	10	M ercuriali herbæ aut Hederae finiti-	
C rinum, id est, Lilium.	15	mo, Cynocrambe.	
C ydonium malum, id est, Cotoneu		Q uod summos ramos occupat Ari-	
malum.	5	stolochiæ aut Hederae oblongæ	
C yclaminus.	4	gura, Lathyrus.	
C ytisus.	3	SECUNDA.	
D aucus agrestis.	12	P lantaginis aut Betæ sylvestris æ-	
D rys, id est, quercus.	11	mulo, breuiore tamen & nigri-	
E laphoboscus.	9	re, Veratrum album.	
E leliphacos, id est, Saluia.	11 & 16	A d radicem Iuglâdis nucis aut Plan-	
E uzamon, id est, Eruca.	7	taginis effigie, Gentiana.	
H elixine.	1	TERTIA.	
H erpyllum, id est, Serpyllum.	7	F oenogræcum, Lotumæ aut Trifo-	
H ipposelinum, id est, Olusatrum.	9	lium imitante minore tantum.	
I on, id est, Viola.	13	C ytisus.	
L apathum, id est, Rumex.	5	A d Rutam, aut pratensem L., tum pro-	
L inozostis, id est, Mercurialis.	1	pius accedente. Ononis.	
L otus.	3	C ytisum, aut Lenticulam simulante.	
M arathrum, id est, Foeniculum.	11	G laux.	
O rganum.	7	QVARTA.	
P eganum, id est, Ruta.	3	C yclaminum, aut Cucumerem syl-	
P etaphyllum, i. Quinquefoliū.	8	vestrem referente, sed minore. A-	
P hacos, id est, Lenticula.	3	conitum.	
P hlomos, id est, Verbascum.	13	QVINTA.	
P olygonon.	14	R umicis Liliijæ sequaci minore ta-	
R hoa, id est, Punica.	15	men, Satyrium.	
S colymus, id est, Carduus.	6	SEXTA.	
S icyos agrios, id est, Cucumer	4	C hamæleon nigro albæq; Spingis	
agrestis.	6	simili, crassiore tamen & nigriore,	
S ilybum.	16	S colymos.	
S ilymbrium.	16	S ilybia aut Cardui figura, Chamæle-	
T elis, id est, Foenum græcum.	3	on albus.	
T euton agrion, id est, Beta sylue-	2	SEPTIMA.	
stris.		O rganum, agreste uel Serpyllū æmu-	
		lante,	

- lante. Tragoriganus. centium foliorum, Symphytum
 Origano, Erucæuē, aut Cichario, aut alterum.
 Thymo nō abſimili, ſed longiore, In pluribus quas habent per caules
 Papauer erraticum. eruptionibus locato, Eryngium:
 OCTAVA. Solis pediculis nixo. Chelidonium
 Quinquæfolium, Cannabemuē refe minus, Filix, Petasites.
 rente, Eupatorium. Longis qui in caule pediculis hæ
 NONA. rente, Sideritis ſecunda, Tribulus
 Elaphobosco, aut Olufatro æquali, aquaticus.
 Phu, In geniculis ædito, Lyſimachia, Po
 DECIMA. lygonon ſœmina, Rubia, Ebulū.
 Cornicis pedem, aut gramen ſimu Ex alarum cauis emicante, Orchis Se
 lante, Oloſteum. rapias.
 VNDECIMA. Quod à medio caule incipit, Pſylliſt.
 Ad Saluæ, aut Quercus figuram ac Solum cacumen ueſtiente, Atracty
 cedente, ſed minore. Sideritis. lis Latinis Colus ruſtica.
 DVODECIMA. Humi expanſo, Peplos, Cynogloſ
 Dauſi agreſtis & Fœniculi imagine, ſum, Hippophæſtum, Condrilla
 Pyrethrum. altera, Catanance altera, Libon
 DECIMATERTIA. tis ſœcunda prior, Moly, Pana
 Magnitudine inter Violam & Ver ces Herculeum, Mandragoras ſœ
 baſcum, Baccharis. mina, Chamæſyce.
 DECIMAQVARTA. In ima parte per terram ſtrato, Teſti
 Ad Polygoni & Nepetæ longitudi culus, Semperuiuum maius.
 nem, Polemonia. Vndique ad radicē per terram ſpar
 DECIMAQVINTA. ſo, Anchufa.
 Simile quiddam in guſtu Cotoneo Ad ſummam radicem iacente, Litho
 malo, aut Punicæ reddente, Poly ſpermum.
 gonatum. Supra aquam tantum inueniendo:
 DECIMASEXTA. Tribulus aquaticus.
 Inter Siſymbrium & Eleliſphacum, Paulum extra aquam ſupereminēte,
 medium odorem qui ſuauiffi Potamogaton.
 mus eſt, fragrante, Dictamnus al Alijs in ſumma aqua extātibus, alijs
 tera. demerſis, Nymphæa.
 Folio mox ex radice, protruſo, An Recto, Phyllitis.
 chuſa. Inflexo, Orchis Serapias, Elaphobo
 Chelidonium minus, Nymphæa, ſcus, Phu, Chamæpeuce.
 Aſplenon, Sideritis tertia, Tuſſila In terram annuente, Anemone om
 go. nes cultis uenientes, Thlaſpi, Aliſ
 Productionibus quibuſdā caulī adia ma, Smyrnum. Bugloſſum, Sary
 rium

Prope radicem ad terram refracto, Circa radicis caput in orbem utrens
Lonchitis. te, Aethiopsis.

Ad summum radicis caput in terrā Folio florem subsequente, Colchi-
deciduo, Lycopsis. con.

Ex radice pendente. Chelidonium Per Autumnum pereunte, Smilax le-
minus. nis.

Ad solis cursum se circumagente, Ti Folio exulcerandi urendiq; ignis
thymalus quartus unde Solise- in modum cum dolore uim ha-
quus uocatur. bente, omne Ranunculi genus.

Contiguo inuicem, Senecio. Fauces scarificante, Chamælea.

Sibi inuicem implicito, Dracuncu- Quod aspera lanugine pruritus ex-
lus maior. citat, Symphytum alterum.

Deinceps locato. Tithymalus terti-
us qui Paralios.

Intercedentibus spatijs gliscēte, Hip-
puris altera, Sonchus & agresti-
or, & qui edēdo est, Periclymenū,
Eupatorium, Heliochrysum, Bal-
lote, Muris auricula altera, Hiera-
cium utrunque, Verbenaca supi-
na, Sambucus, Ebulum, Aparine,
Rubia.

Folliolis quibusdam per interualla
sub ipsum usque uerticem distin-
ctis, Acanthus.

Folio non magnis interuallis distan-
te, Symphytum alterum.

Maiores interstitijs dissito, Gentia-
na.

Ab utraq; parte enato, Echion, Ara-
bis.

Vtrinque deinceps emissio. Tricho-
manes, Muris auricula altera.

Contrarijs inuicem pediculis pro-
deunte, Trichomanes.

Caulē circumuolente, Thymus.

In orbem disposito, Marrubium ni-
grum, Polygonon foemina, Liba-
notis foecunda prior, Rubia, He-
lio chrysum, Peplos.

PLANTARVM DIFFEREN- tia à flore accepta.

Flore spinoso, Chamæleon niger,
Clypeolis obstruso in medio, Al-
tercum.

Quum digitis teritur humorem exu-
dante, Ruta syluestris.

Plantæ à flore immunes, Dictam-
nus, Libanotis sterilis, Phyllitis,
Onosma, Filix, Asplenon, Hemi-
onitis, Adiantum, Epimedium,
Hippoglossum, Chamælyce.

Largo flore, Gallium, Circæa, Ty-
pha, lenis Smilax, Napus, Artemi-
sia aliqua, Abrotonum foemina.
Coma plena, Hippocistinum, Hya-
cinthus, Spica referta, Thymbra-

In singulis foliorū germinationib;
frequentiore quam folia quæ a ra-
dice usque ad summum se profes-
runt, Polygonatum.

In singulis caulibus uno, Iris.

Triplici quadrupliciue in singulis sca-
pis, Hemerocallis.

Grandi flore, Medium, Solanum
somniaficum, Oenagra.

Pusillo,

Pusillo, Viola nigra, L. ⁹ Egyptia, Albefcente & leniter luteo. Oroban
Pityusa, Androsæmos, Chamæche.

drys, Artemisia altera, Am. mū, Pallido, Poterium, Tussilago, Papa
Circæa, Alcea, Chamæpitys, Auer corniculare, Semperuium mi
stragalus, Stratiotes millefolia, Si nus, Plantago minor.

deritis tertia. Quamplurimum pallido, Hemero
callis.

Gracili, Isatis sylvestris, Artemisia al
tera, & aliqua alia nonnullis sic di Melino, Nardus Gallica, Erysimon,
cta, Alisma, Verbenaca supina, Isatis sylvestris, Ruta sylvestris, Cha
Semperuium minus, Galio mæpitys prima & tertia, Panaces
psis, Gallium. Herculeum, Hieracium utrunq,

Longo, Poterion.

Flore splendente. Nymphaea alia.

Egregi splendoris. Chrysanthemū

Lacteo flore, Erinus, Gramen Par
nassi, Dorycnium, Lotus Egy
ptia, Laureola, Altercum tertiū,

Thymelæa, Ephemerō, Stratiotes mil
le folia, Sābucus, Ebulū, Scaño-

nia, Smilax lenis, Sesamoides ma
ius, Hiberis, Moly, Arabis, Cy-

nosbatum, Ligustrum, Cistus foe
mina, Batis, Thlaspi, Cyclamin⁹

altera, Capparis, Aristolochia ro
tunda, Acanthus, Aloe, Origanus

sylvestris, Ruta alia agrestis,

Daucus Creticus, Dauci tertia spe
cies, Aparine, Caucalis, Marrubi

um nigrum, Phalangium, Arte
misia altera, Oenanthe, Leucoiū,

id est, Viola candida ob id nuncu
pata, Phyllon theligonon, Satyri

um, Cacalia, Hypericum, Chamæ
pitys secunda, Polygonatum.

Candido pallefcēte, Verbasco can
didum foemina, Alisma, Spondy

lium.

Subalbido. Anemone aliqua locis

cultis nascens, Cicuta, quartū Ra
nunculi genus, Colchicon, Tithy

malus tertius.

ex Leucoijs, Nymphaea alia, Buph
thalmos, Ascyron, Androsæmos,

Chrysanthemum, Symphytum

alterum, Altercum secundum, Gal
lium, Thapsia, Senecio, Verba

scum sylvestre.

Ad melinum seu luteum colorē uer
gente, Elaphoboscus.

Aureo & rutilo. Ranunculus terti
us, Panaces Asclepium & Chiro

nium, Artemisia aliqua, Agera
ton, Verbasum sylvestre.

Rubente, Solanum somnificum.

Humoris sanguinei, Ruta sylvestris.

Subrubro, Scordium, Cannabis syl
vestris.

Roseo, Oenagra, Chamæpeuce, Fa
ba Egyptia.

Purpureo, Verbenaca supina, Fu
mus, Astragal⁹, Glaux, Asarum,

Hyacinthus, Altercum primum,

Viola nigra, Andirrhinon,

Vitex alter, Anemone aliqua loc
cis cultis nascēs, Aristolochia lon

ga, Acantha leuce, Calamyntha

montana, Delphinium, Lychnis

coronaria, Triphyllon peculiari
ter Oxytriphyllon dictū, Echion,

unum.

- unum ex Leucoijs, Testiculus, Anthyllis secunda, Gladiolus.
- Purpureo ipsius cacumine, Cirsium.
- Purpuræ colore ad puniceum inclinato, Anchusa altera, Centauriū minus.
- Purpurascente, Sesamoides minus, Chamæleon albus, Thymus, Cyclaminus, Trixago, Orchis Serapias, Medium, Lycopsis, Pityusa, Galiopsis.
- Inter purpureū & candidum mediū coloris, Baccharis, Veratrum nigrum, Heliotropium maius.
- Puniceo, Anemone aliqua cultis locis nascens, item quæ sylvestris est, Argemone, Anagallis mas, Leonopetalon, Onobrychis, Sideritis tertia.
- Glaucō, Anagallis foemina, Vna ex uiolis quæ sunt Græcis Leucoia.
- Quadantenus glaucō, Centaurium maius.
- Atro, Dictamnus altera, Solanum furiosum, Circæa, Leontopodiū.
- Pallido aliquibus uero locis purpureo, Atractylis Latinis Colus rustica.
- Luteo sed aliquo tempore colore purpuræ Ranunculus primus.
- Puniceo & aliquoties albo, Papauer erraticum.
- Niuco aut phoeniceo, Polygonon mas.
- Candido in pallido uel auri modo flauescente, Pentaphyllon.
- Luteo aut candido, Thelephium.
- Rubro uel ad aurum uergente, Lysimachia.
- Ter quotidie, ut fertur, mutato colo-
- re apparente, nempe matutino albente, meridie paulo min⁹ quam purpureo, phoeniceo uespere, Tri-
polium.
- Vario: Chamæleon niger.
- Albo cum purpureo, Vitex alter.
- Qui Corymbo Hederæ similis acinis præditus est in lacteo colore ex parte rubentibus, Hippophaes Romanis Lappago.
- In albedo per mediū purpureo. Phu:
- Candido, in medio quod croceum sit habente, Nymphæa.
- Per ambitum niueo in medio luteo, Parthenium.
- Purpureo & in medio malī colore, Aster atticus, Latinis Inguinalis.
- Purpuræ colore & per medium puniceo, Xyris.
- Pene purpureo, medio albicante, Sesamoides minus.
- Foris quidem herbaceo, intus uero & aperto lacteo Ornithogalon.
- Qui comicijs personis hiantibus similis, niger quidem est, candida tamen ueluti lingula ab hiatus oris ad inferius labrum exerta, Lonchitis, id est, Lanceola.
- Vario inter purpureum, album & aureum colore, Achillea.
- Colore incandidum, uiridem, luteū, purpureum, & cæruleum uariante, Iris.
- Niuco, media parte croceo, in aliquibus autem purpuræ aspectu. Narcissus.
- Exiguū quid purpuræ in medio habente quod tamen in croci colore uariet. Pastinaca erratica.
- Colore intus ad aurum inclinato, foris per

- ris per ambitum circumpositis fo
 lijs albis luteisve aut purpureis, uanescant. Chamæle, n albus.
 Anthemis seu Chamæmalum. Humanæ capilli modo euanescente,
 Senecio.
- O** Dorato flore, Asarum, Ligustrū. Vbi confricatur Sampsuchi odorem
 Cyclaminus altera, Bacccharis, spirante, Artemisia tenuifolia:
 Gramen Parnasi, Gallium, Cauca Foris per ambitum circumpositis fo
 lis, Violanigra. lijs Rutaceorū magnitudine, An
 themis siue Chamæmalum.
- Acuti odoris iuxta ac iucundi, Pa
 naces Asclepium. Racemoso, Elleborus niger.
- Graueolente, Asclepias, Artemisia al
 tera. Corymborum Hederæ modo ceu
 racemis sibi inuicem coherentib⁹
 sed minoribus, Hippophaes.
- Grauiissime odorato, Aristolochia
 longa, Anthyllis secunda. Corymborum in morem antequā
 se pandat concreto, Hipposelinū.
- A** maro flore, Ephemeron. Vasculis Alterci simili. Asarum.
- Nō adeo amaro, Conyza minor. Muscoso, Cypros Latinis Ligustrū.
- Egregie amaro, Chamæcissos. Concretionem muscosa, Myrice Lati
 nis Tamarix.
- Gustum erodente, Serpyllum sylue
 stre.
- Amaro & uiscoso, Sideritis tertia. Pileolum æmulante, Aristolochia ro
 tunda, Lonchitis.
- M**olli flore, Dictamnus altera, Comicis personis hiantibus non ab
 Hippophaes, Alypon. simili, candida ueluti lingula ab
 infirmo, Conyza minor. hiatu oris ad inferius labrum ex
 Leui nec aspero, Alypon. erta. Lonchitis.
- Scabro. Marrubium. Verticillorū imaginem præferen
 te, Marrubium.
- F**lore in orbem circumacto, Sml
 lax lenis, Scammonia, Medium, Pedum lecti speciem describente, Cili
 Hieracium minus. nopodium, unde nomen sibi ad
 Fere rotundo, Periclymenum. sciuit.
- In arcum flexo, Iris. Calatorum instar concauo, Scam
 monia.
- Incisuris pluribus secto, Phalangiū.
- F**lore foliolis stellę similibus, Aster
 Atticus, unde nomen inuenit.
- O**culi figurā circumscribente, Buph
 thalmos ideo nuncupatus. Chry
 santhemom.
- Scorpionis caudæ similiter inflexo,
 Heliotropium maius.
- Ceu muscolo capillo, Vitis sylue
 stris.
- Capillorum specie qui in pappos e
 Nagallidis.
 Flore cæruleæ Anagallidis co
 lore. Muris auricula altera.

FLORVM MUTVA PRO
 pinquitas & distantia eodem,
 quosupra ordine.

- Anemones.** Latioribus folijs ac Crocus, Othonna.
Anemone propinquo, Leontopetalon. Cyami Fabæ.
Sylvestri Anemone finitimo, Papauer erraticum. Fabaceum florem referente, Periclymenum.
Punice coloris minus profunde q̃ in sylvestri Anemone splendētis, Argemone, Papauer erraticum. L. Eucoij, Violæ candidæ.
Serius quam Anemones sylvestris surgente, Argemone. Flore candidæ Violæ gulo. Chelidonium maius, Moly, Delphinium, Lychnis coronaria, Chamæcissos, Antirrhinon, Glaux, Amomum.
Anethi. Eiusdem in modum luteo, Spartum.
Anethi æmulo, Bunion Romanis Napus. Minore, Chamæcissos, Antirrhinon, Glaux, Moly.
Bolbi, Bulbi. Lychnidis.
Flore Bulbi figura, Ageratum. Lychnidi proximo, Centaurium minus, Cannabis sylvestris.
Heliochrysi. M. Ecenis, Papaueris.
Heliochrysi flore minore, Ageratum. Papauerum florem mentiente, Anemone omnes.
II violæ nigræ aut purpureæ. N. Arcissi. Flore figuram Narcissi referente, maiore tamen & teneriore, Phur.
Flore Violæ purpureæ seu matronali cognato, Hypericum. O. Rigani.
Ad eius magnitudinem accedente, Moly. Flore Origanæ æmulo, sed odoratior, Maron.
Isatidis. Glaſti. Agrestem Origanum simulante, Diastamus altera Cretensis.
Glaſtum referente, Staphis sylvestris. P. Egani, Rutæ.
Clcharij, Ambubeiæ. Rutaceum florem imitante, Aristolochia clematidis, quasi dicas Sarmentariam, Symphytum alterum.
Flore Ambubeiam seu agrestem Intybum imitante, Condrilla. P. Prasi, Marrubij.
Crambes, Brassicæ. Per interualla Marrubij modo disposito, Clinopodium.
Brassicæ simillimo, Anagyris. R. Hodii. Rosæ.
Crini. Lilij. Rosacei floris effigiem ostendente, Cyclaminus, Alcea, Nymphaea, Althea, Nerium siue Rhododaphne, Rhoæ.
Lilium æmulante, Phalangium, Nymphaea, Lotus Egyptia, Saryrium.
Qui cum hiscere coeperit Lilio diuisione est similis, Hemerocallis, ea de causa Latini Lilium sylvestre appellant.
Croci.
Croci figura, Colchicon, Cnicus, Othonna.

Rhoz. Punicæ.

Punicæ cytinorum figura, Altercū,
Cistus.

HYacinthi, Vaccinij.

Hyacinthinum florem referente,

Glycyrrhiza, Chamæleon niger.

Hyperici.

Hypericum æquante, Coryledon al-
tera.

Phlomi. Verbasci.

Coronario Verbasco æquali,
Chrysogonum.

Chamæmali, Anthemidis.

Chamæmalini capituli ritu undi-
que per orbem incisuris diuiso,
Aster Atticus.

Chamæmali flore maiore, Buph-
thalmos.

OCimi.

Ocimi florem omnino imitante
Pycnocomon.

MVico aut Oleæ simili, Cacalia.

Flore undique exeunte, Smilax le-
nis.

Ex Bulbi diuisione, quæ in medio, se
promente, Colchicon.

Ad radicem fixo, Asarum.

Per caulem pāso, Orchis, Narcissus,
Scordium, Argemone, Marrubiū

utrumque, Gladiolus, Lonchitis,

Typha, Aster Atticus, Iris, Thla-

spi, Polycnemom, Anemone om-

nes, Muris auricula altera, Aceta-

bulum utrumque, Viola nigra,

Plātago minor, Barbahirci, Dra-

cunculus uterq, Elelispacos, Ve-

ronica, Helxine, Ambrosia, Medi-

ca herba, Chamæleon niger, Pana-

ces Asclepiū, Ligusticum, Sefeli

Peloponnesiacum, Pastinacæ erra-

tica, Semperuiuum minus, Xyris,
Orminon, Clymenon, Pæonia
utraq, Isatis syluestris.

Summis caulibus sublocato, Tithy-
malus mas.

In ramis exorto, Anchusa altera, He-
liotropium maius, Hydropeperi,
Cretensis altera Dictamnus, Tra-
gus, Lathyrus, Polemonia, Sideri-
tis secunda, Botrys.

Pentaphyllon, Origanus sylue-
stris.

In singulis germinib⁹ porrecto, Tha-
psia.

In uirgis posito, Catanance altera,
Eupatorium, Origanum, Sambu-
cus.

Veluti uiticulas occupāte. Idæa radix
In uiticulis consistente, Tithymalus
secundus.

In adnatis ædito, Lycopsis, Ornitho-
galon, Elaphoboscus.

In caule & adnatis prolato, Rumex
priuatim Oxalis dicta.

In germinationibus quibusdā quæ
secus folia apparente, Periclyme-
num.

In eminentibus productionibus qui-
busdam collocato, Symphytum
alterum.

In festucis uigente, Stratiotes millefo-
lia.

In summis cirris sito, Androsaces.

Ex foliolis ueluti nucamentis aculea-
tis protruso, Acanthus.

Qui folio adiacet, Echion, Chelido-
nium maius, Chamædaphne, A-
lysson, Papauer spumeum, Man-
dragoras scemina, Hydropeperi,
Linozostis, Cynocrambe, Litho-
spermum.

- Singulis folijs adnexo, Polygonon te uero se claudit, Lotus Aegyptia.
mas. Deinceps disposito, Gladiolus, Alter
Inter folia emicante, Asarum, Lau- cum, Eupatorium.
rus Alexandrina, Ruscus, Cype- Per interualla segregato, Marrubiu.
rus. Paribus iter se spacijs discreto, Iris,
Veluti folijs superposito, Periclyme- Gladiolus.
num. In orbem constituto, Marrubium ni-
Folijs subiacente, Peplos, Peplium, grum.
Chamaesyce. Fructus, seminis & caeterorum quæ
In triquetris, quæ sunt ueluti filique, florem necessario consequuntur,
porrecto, Xyris. ut umbellarum & pericarpioru,
Concauitates alarum nacto, Chame- perspicuum est eandem prope cu
pitys tertia, Leontopetalon. illo esse positionem. Capituloru
Circa alas autum modo pennatas e- tamen, cum flore ipsum non sem-
rum pente, Androsæmos. per respiciant, situs non erat huc re-
Culmen adsecuto, Gallium, Typha, ferendus.
After Atticus, Iris, Anemone om FLore cito dehiscente, Senecio.
nes, Heliotropium maius, Poly. Vere tantum se proferente, Tussila-
cnemon, Polemonia, Abrotonu go.
foemina, Lathyrus, Spondylium, Æstate apparente, Hiberis, Artemi-
Barba hircina, Sison, Origanum, sia altera, Scammonia.
Plantago minor, Veronica, uter Per mensem nascente, Asphodelus.
que Dracunculus, Elelisphacos, Autumni exitu se prodente, Colchi-
Holoschoenus, Ægilops, Libano- con.
tis foecunda prior, Thapsia, Ebu Protinus deciduo. Papauer erraticu,
lus, Panaces Herculeum & Ascle- quam obrem Græcis rheas uoci-
pium. Arabis, Achillea, Cicuta, tatur.
Chamaelon niger, Pastinaca erra Qui quamprimum cum caule mar-
tica, Ligusticum, Sceli Pelopon- cescit, Tussilago.
nesiacum, Caucalis, Sambucus, Flore ignis modo cum dolore uren-
Erysimon, Leontopetalon, Dory- te ulceranteq, omne Ranunculi ge-
cnium, Clymenum Pæonia utra- nus.
que, Isatis syluestris, Sparganiu.
- Ex medio caule ad summum usq; ca- STIRPIVM DIFFERENTIAE
cumen emisso, Plantago maior. à fructu deductæ.
- Qui toto capite sub aqua se condit & P
rursus oriente sole emergit, Lotus Omis præditus est Mandrago-
Aegyptia. ras, tum mas, tum foemina.
Qui recta surgit, Iris. Aculeato fructu, Xanthion.
Qui oriente sole se explicat, occiden- Nucleis uacuo, Comaros, id est, ara-
burus. Confer.

Confercto, Oxyacantha.

Contentis intus ueluti lanis, Cynof-
batum.

Lanis pleno, Nerion.

Copiosum uinosumq; succum effun-
dente, Sambucus.

STeriles plantæ, Hedera helix, Liba-
noris una, Oxylichœnus alter, Di-
ctamnus, Asplenon, Hemionitis,
Adiantum, Phyllitis, Onosma, E-
pimedium, Filix.

Vberiore fructu, Lyciū, Rhamnus
tertia, Rhu.

Decem duodecimue acinorum, So-
lanum furiosum.

Minuto fructu, Alysson, Smilax,
Icnis, Polycnemon, Papauer cor-
niculare.

Tenui, Rhamnus tertia.

Oblongo, Sentis canina, Cornus.

Digitali prope longitudine, Apocy-
non.

Lato, Rhamnus tertia, Rhu.

In summa sui parte modice lato, Thla-
spi.

Candido fructu, Rhamnus tertia,
Hedera cādida, Papauer spumeū.

Pallido, Mandragoras foemina.

Luteo croci colore, Mandragoras
mas.

Auri fulgore, Abrotonū foemina.

Primum uiridi per maturitatē san-
guineo, Oxyacantha, Vitis alba,
item syluestris, Sentis canina. Smi-
lax aspera, Ruscus, Solanum hali-
cacabum, Laurus Alexandrina,
Chamædaphne, Tragus.

Nigro, Ligustrum, Tilia, Lycium,
Hedera nigra, Solanū furiosum,
Icnis Smilax, Vitis nigra, Laure-
ola.

In nigro purpurascens coloris, Sā-
bucus.

Ante maturitatem uiridi, postea ue-
ro ut maturuit ruffo aut cætræ co-
lore, Cornus.

A principio herbacei coloris, cum
ad maturitatem peruenit ruffoni-
groq; Solanum fatium.

Qui aut ruffus aut ruber existit ma-
turitatem adeptus, Arbutus.

Per initium uiridi, mox rubente, po-
stremo ubi maturuit atro, Rubia.

Fructu sua uolente, Batis, Mandra-
goras foemina.

Acrem simul & iucundum odorem
spirante, Polycnemon.

Cū grauitate odorato, Latus arbor:
Subgrauis odoris, Mandragoras
mas.

Subadstringente fructu, Smilax
hortensis.

Vehementer adstringente, Tragus.

Os commendante ac esculento, Latus
arbor, Cornus.

Dulci, Latus arbor, Tribulus aquati-
cus.

Subdulci, Tilia.

Amaro, Lycium.

Amarissimo, Colocynthis.

Leniter linguam erodēte, Tithyma-
lus secundus.

Aeri & glutinoso, Cyclaminus al-
tera.

Molli fructu, Batis, Cyclaminus
altera.

Offæ intus duritici, Ruscus.

Solido, Tribulus aquaticus.

Fragili, Oxyacantha.

Qui leuore est prædictus, Solanū ha-
licacabum, Lycium.

- Aspero Ricinus.
 Qui tenaci contactu uestibus hæret.
 Xanthion.
 Qui cum manditur ueluti palearum
 acus linguæ & dentibus represen
 rat. Arbutus.
R Otundo fructu, Batis, Rubia, La
 thyris, Solanum satium, Halica
 cabum & furiosum, Vitis sylue
 stris, Xanthion, Ruscus, Chamæ
 daphne, Colocynthis.
 Acuminati uerticis. Tragus.
 Fructu cornu in modū inflexo, Ne
 rion, Papauer corniculare unde
 nomen inuenit.
 Oui uitellum æquante, Mandrago.
 ras foemina.
 Lanis cum dehiscit Acanthi spinæ
 pappos referentibus, Nerion.
 Crocato, Hedera nigra.
 Folliculi specie, Rhamnus tertia, A
 pocynon.
 Fabaceam siliquam conformante,
 Apocynon.
 Feenogræci cornicula imitante, Pa
 pauer corniculare.
 Concretionem suam mukoso, Tama
 rix.
 Mediocris pilæ quantitate, Colocyn
 this.
 Duplicis clypeoli figura, Alysson.
 Verticillum repræsentante, Rham
 nus tertia.

FRUCTVVM SIMILITV

do & inter se dissidium eadem
 cum superioribus serie.

- A** Nethi.
 Fructu Anethi æmulo, Dauci
 tertia species.

- Amygdalæ.
 Amygdalæ nucem æquante. Nerion.
B Alani. Glandis.
 Fructu oblongæ glandi propin
 quo, Cucumer syluestris.
 Botryos & Staphyles, Racemi &
 vuæ.
 Racemoso, Phyllon, Rhu, Solanum
 furiosum, Sambucus, Ricinus, Vi
 tis alba & nigra, Tilia.
 Vuæ racemiq; figura qualis est quem
 Græci Epiphyllida uocant, Smi
 lax aspera.
 Vuarum instar molli, Solanum fu
 riosum.
 Exiguus uuis non dissimili, Vitis syl
 uestris.
E Lææ. Oliuæ.
 Fructu Oliuæ figuram exhibente,
 Capparis, Cornus, Sētis canina.
 Incipienti Oliuæ proximo, Phyllon.
 Grandem Oliuam æquante, Xanthi
 on, Erebinthi, Ciceris.
 Magnitudine Ciceris, Laurus Ale
 xandrina.
 Erinei. Caprifici.
 Caprificum referente, Sycomorus.
T Hermi, Lupini.
 Fructu Lupinum repræsentante,
 Smilax lenis.
C Aryi basilici. Nucis regię.
 Fructu Nucem regiam seu iuglan
 dem æmulante, Tithymalus se
 cundus.
 Capparis.
 Capparis effigie, Lathyrus.
 Coccimilei. Pruni.
 Pruni magnitudine. Arbutus.
 Corymbi, Baccæ Hederaceæ.
 Corymbum referente, Solanum fu
 riosum.

- riosum, Cyclaminus altera, Po- In interiore sarcto nullis, qualia in Fi
 lycnemon, Polemonia, Abroto- co frumentis latentibus, nec ra-
 num foemina, mis, ut ficus, sed caudici adnascen-
 te, Sycomorus.
Coni seu Strobili, Pineæ nucis.
 Pineæ nucis figura, Chelidonium Schini, Lentisici.
 maius. Lentiscinum fructum representante,
Libanotidis. Tilia.
 Fructu Libanotidi propinquo. **T**Erminchi, Terebinchi.
 Batis. Terebinchini fructus figura, Li-
MAndragoræ foeminæ. gustrum, Sambucus, Ebulus,
 Pomo Mandragoræ foeminæ du Rhu.
 plo maiore. Mandragoras mas. **P**Endulo fructu, Tragus.
 Meconis ceratidis, Papaueris cornu- **A**Nnuo fructu inuicē alternato, id
 ti. Fructu Cornuti Papaueris gra est, post annum emissio, Tithyma
 cilitate, Chelidonium maius. lus secundus.
 Myrti. Terquaterus per annum colligen-
 Myrti baccam æquante. Oxyacan- do, Sycomorus.
 tha. Non, nisi unguibus aut ferro ante
OLynthorum, Grossulorum. scalpatur, maturescen- te, Sycomo-
 Fructu ficorum grossulis dulcio- rus.
 re, Sycomorus.
PEpercos. Piperis.
 Fructu piperis figura, Lycium,
 Lotus arbor,
 Maiore. Lotus arbor.
 Platani.
 Pilularum Platani æmulo Xathion,
 Glycyrrhiza.
 Asperiore, Glycyrrhiza.
 Pyri. Tritici.
 Tritici magnitudine. Tragus.
Rhagis staphyline. Acini uuacel.
 Fructu acinum uuæ imitante, Cy-
 claminus altera, Solanum halica-
 cabum.
 Paruis ueluti uuarum acinis, Trag^o.
Sicyi hemeri. Cucumeris satiui.
 Fructu Cucumeris satiui longe
 minore. Cucumeris syluestris.
 Syces. Ficus.

PLANTARVM DIFFEREN-
tia à semine sumpta.

Sine flore semen gignit Ambro-
sia.

Fabis paululum bullarum modo su-
pra operculum emergentibus, Fa-
ba Ægyptia.

Veluti semine prædita est Helxine.

Semine cuspidibus raris munito.
Asarum.

Piloso, Daucus Creticus, Eupatori-
um.

Subhirsuto, Triphyllon priuati, Oxi-
triphyllon.

Ob supercurrentem lanuginem de-
præhensu difficili, Leontopeta-
lon.

- Veluti lanis inuoluta. Centaurium Crasso, Phalangium.
maius. Tenui, Apium montanum, Vrtica
Aristis ueluti capillis inter ipsum se- mollis.
men exeuntibus, Aegilops Lati- Longo, Sefeli Massiliense, Apium
nis Avena. montanum, Olusatrum
Concauo. Aparine. Oblongo, Acanthus, Ligusticum, Si-
Quod confricatum liquore manus son, Orminon satium, Phalaris,
inficit, Ascyron. Narcissus, Cnicus.
C O pio so semine, Libanotis foecun Lato, Gentiana, Pityusa, Sefeli Pelo-
da prior, Phyteuma, Linozostis ponnesciacum, Libanotis foecun-
foemina, Paeonia utraque, Sefeli da altera, Laserpitium, Nymphæa.
Æthiopicum, Polium montanum, Paululum lato, Oxytriphylon,
Limonium, Ambrosia, Altercum Thapsia, Alysson.
Scriphium seu Absinthium mari- Splendente semine, Satyrium alterum
num. A lbo semine, Daucus Creticus, Li-
Totos ramulos implente, Botrys. banotis foecunda prior, Aparine,
Vmbella plena, Daucus tertius. Phalaris, Papauer satium, Alter-
Plenis capitibus. Cirsium, Isopyrum. cum tertium.
Differtis siliquis, Ocimastrum. Ruffo, Securidaca, Sesamoides ma-
Gemino semine, Linozostis mas, nus, Papauer erraticum, Colchi-
Tordylon seu Sefeli Creticum, con.
Spondylium. Ruffescente, Ruta aliqua sylvestris.
In singulis uasculis bino, Æthiopis. Flauido, Altercum secundum.
Duplici tripliciue, Leontopetalon, Melino, Acanthus.
Aegilops. Rubro, Paeonia utraque, Aegilops,
Triplici utriculis inuicem discreto, Capparis, Oxalis, Limonium,
Lathyrus. Xyris.
Terno aut quaterno, Aphace. Quod confricatum sanguineo liquo-
Quino aut seno, Dorycnium. re manus cruentat. Ascyron.
P A ruo semine. Chelidonium ma- Rubro colore Croci, Solanum soma-
ius, Medium, Peplos, Capparis nificum, Aron.
Helxine, Sisyn, Paeonia utraq, Er Puniceo, Anchusa tertia.
uum, Plantago maior, Thlaspi, Fusco, Orminon sylvestre.
Arction, Erysimon, Ammi, Am Atro, Barba hircina, Aphace, Ruta
brosia, Gramen Parnasi, Thyme sylvestris, Ligusticum, Sefeli Æ-
læa, Isopyron, Papauer cornicula thiopicum, Sisyn, Olusatrum, Smyr-
re, Catanance secunda, Dorycni- nium, Libanotis foecunda altera,
um, Apios, Tordylon, Apocy- Melanthium, Phalangium, Ormi-
non, Linozostis mascula, Cyno- non satium, Nymphæa, Hype-
crambe, Lithospermum. ricum, Chamæpitys secunda, Po-
lemonia.

- Iemonia, Ocismastrum, Papauer
 corniculare, item sylvestre, Erin⁹,
 Altercum primum, Sideritis, O-
 xychoenus alter, Verbascum can-
 didum foemina, Narcissus, Psylli-
 um, Apocynon.
- Principio uiridi mox sanguineo, Thymelæa.
- Herbaceo primum, cum maturuit
 ante capillamentorum Croci ru-
 tilo colore, Dracunculus minor.
- Ab ipso ortu cinereo, ut maturitatē
 attigit capillamentorum croci co-
 lore puniceoq; Dracunculus ma-
 ior.
- Diuersi coloris, Anagyris. Doryc-
 nium, Tithymalus tertius.
- Non colore uno, sed ex altera parte
 subrufo, Smilax hortensis.
- Candido rufoq; Cnicus.
- Quod cortice nudatum lacteo colo-
 re se offert, Lathyrus. Quod est in
 nigro subruffum foris, intrinse-
 cus candidum, Staphis sylvestris.
- Extimo operimento nigro, intus al-
 bo, Thymelæa.
- In medio rubentium alijs quinque
 aut sex in purpura nigris, Pæonia
 utraque.
- Semine grati odoris, Panaces Her-
 culeum, Napus, Sefeli Æthiopi-
 cum & Peloponnesiacum, Apiū
 montanum, Libanotis foecunda
 altera, Melanthium.
- In gustu odorato, Poterium, Daucus
 Creticus.
- Graueolente, Spondylium.
- Aromaticum modo odorato, Ligusti-
 cum, Tordylon, Petroselinum,
 Olusatrum.
- Vinoso odore & suauis, Ambrosia.
 Cerbo semine, Erinus.
 Viscido Nymphæa.
 Pingui & oleoso, Myagron.
 Si corticem detraxeris, dulci, Lathy-
 ris.
- Amaro, Sesamoides utrunque, Secu-
 ridaca, Sefeli Æthiopicum, alia
 agrestis Ruta nonnullis sic dicta.
- Acri, Oxalis, Thlaspi, Erysimon,
 Hidropeperi, Dracunculus mi-
 nor, Poterium, Smyrnum, Sta-
 phis sylvestris, Peplium, Panaces
 Herculeum, Ligusticum, Sefeli
 Massiliense & Æthiopicum, Si-
 son, Cyminum sylvestre, Ammi,
 Apium montanum, Petroselinū,
 Olusatrum, Daucus tertius, item
 Creticus, Libanotis foecunda pri-
 or, Melanthium, Xyris.
- Subacri, Tordylon seu Creticum
 Sefeli.
- Saporis medicati, Lotus sylvestris.
- Mollis semine, Ephemeron.
 Carnosiore, Sefeli Peloponnesia-
 cum.
- Pingui & fuliginoso, Paliurus.
- Duro, Aparine, Periclymenum, Psyl-
 lium Dorycnium, Apocynon.
 Operimenti duri, Thymelæa.
- Maturescēte uua durato, Anagyris.
 Lapidoso, Lithospermum ea de cau-
 sa ita nominatum.
- Firmo, Ligusticum, Olusatrum, Nyme-
 phæa.
- Quod difficile uellitur, Periclyme-
 num.
- Non plane solido, Anagyris.
 Leui ac polito, Sacyrium alterum,

- Dorycnium.** Quod cortice nudatum ricinum ani
Scabro, Helxine, Staphis sylvestris. mal æmulatur, Ricinus unde &
Cuspidibus subasperis, Alarum. nomen inuenit.
- Vestibus hærente. Helxine. Vituli narem referēte, Antirrhinon
Adeo aspero & hirsuto, ut vestibus siue Anarrhinon, idcirco nomen
siccatum hæreat, Eupatorium. ei inditum.
- Leni, Gentiana. In medio umbilici figura. Aparinæ.
ORbiculato semine, Orminon syl- Renem representante, Smilax horten
uestre, Lithospermum, Cannabis sis, Anagyris.
satiua, Gladiolus, Xyris, Peplos, Testiculi instar pendulo, Linozostis
Anagallis, Oxychoenus alter, Li mascula.
banotis fœcunda prior, Dorycni Scorpionis caudam æquante, Scor-
um, Lathyris, Tordylon, Heliotro pioides ob id appellata.
pium minus, Smyrnum, Peplū, Viperinum caput simulāte, Echion.
Thymelæa, Linozostis mascula, Corniculi in morem inflexo, Me-
Aparine, Chamæsyce, Cynocram dica herba.
be.
- Non plane rotundo, Anagyris. Quum siccatur ad speciem unguium
Anguloso, Sefeli Massiliense, Cnic^o, examinati milui se contrahente.
Libanotis fœcunda prior. Catanance prima.
Cuspide angulosa, Alarum. Verrucæ similiter pendente. Helio-
Trigono, Staphis sylvestris, Ruta Piceæ halitu, Chamæpitys secunda.
alia sylvestris nonnullis sic nuncu Glumoso ac paleaceo, Gentiana, Cy
para. minum sylvestre.
- Triquetro in pericarpis clauso, Lon Quasi foliaceo, Laserpitium.
chitis. Epithymo simili, Alypon.
- Acuminato, Oxalis Latinis Aceto- Resinoso. Libanotis fœcunda prior.
sa. Resinæ odore. Hypericum.
- Veluti infracto, Thlaspi. Resinam pineam fragrante, Ruta syl-
Veluti punctis distincto, Androsæ- uestris.
mos. Myrrhæ sapore. Smyrnum.
- Longiorem ueluti apicem suspēden- Cuspidi lanceæ respondente, Lon-
te ex altero cacumine, Oxyphyl- chitis, id est, Lanceola ideo nuncu
lon. para.
- Perforata, Phyteuma. Ancipitem securim referente. Secur-
Multis foraminibus cerebrato, Ca- ridaca.
tanance altera. Clypeoli effigie, Tordylon seu Cre-
Semine pulicis figuram exprimen- ticum Sefeli.
te, Psyllium Græci, Latini Pulica Verticillum imitante, Libanotis fœ-
rem eadem de causa dixerunt. cunda utraque.

- Disci figura, Thlaspi.
 Seminum inter se æmulatio & diuer-
 fitas.
Anchusæ.
 Anchusæ secundæ semine mino-
 re, Anchusa tertia,
 Althææ.
 Althææ simili Cannabís sylvestris,
 Ammi.
 Ammi æmulante sed odoratiore, Pe-
 trofelinum,
 Anethi.
 Anethum referente, Elaphioboscus
 Latinis Ceruiocellum.
 Anisi.
 Aniso æquali sed cãdidiore. Cicuta.
 Apij. Piri.
 Quale est pistorum, Mandragoras fœ-
 mina.
 Asphodeli. Hastulæ regiar.
 Asphodelum æquante. Aloe.
 Atraphaxis. Atriplicis.
 Vt Atriplicis, Oenanthe.
 Absinthij.
 Non adeo ut Absinthij copioso, Ab-
 sinthium Santonicum.
Botrys. Racemi.
 Semine racemoso, Dracunculus
 uterq.
 Linozostis fœmina, Hydropeperi,
 Ambrosia.
Gigartorum, Nucleorum uuar.
 Semine acinorum nucleis respon-
 dente. Asarum.
 Glichonis, Pulegij.
 Pulegij æmulo, Polycnemon.
Erebintii. Ciceris.
 Ciceris forma, Catanance altera,
 Erysimi. Irionis.
 Ceu Irionis. Altercum secundum.
Hedyfari, Securidacæ.
- Ad Securidacæ accedẽte, Asclepias.
Canchryos. Seminis Libanætidis.
 Canchryn referente, Fœniculum
 erraticum.
 Cardami. Nasturtij.
 Nasturtij mētiẽte, Thlaspi, Erysimō
 Cenchri. Milij.
 Milio equali, Delphiniū, L.º Egy-
 ptia, Phalaris, Circæa, Cratægo-
 non.
 Cissi. Hederæ.
 Hederam imitante, Periclymenum.
 Cnici, Cartami;
 Cnico simili. Centaurium maius.
 Chamæleon albus, Medium, Ve-
 ratrum nigrum, Acanthaleuce.
 Rotundiore, Acanthaleuce.
 Corymbi, Baccæ Hederæ.
 Conferẽti Corymbi specie, Origa-
 nus onitis.
 Crambes, Brassicæ.
 Brassicæ figura, Smyrnium.
 Crithes. Hordei.
 Hordeū representate, Ruta sylvestris.
 Cyami. Fabæ.
 Fabæ æmulo. Xyris.
 Cymini.
 Cyminiū simulante, Aptū mōtanū.
 Arction. Daucus tertius.
 Multo exiliore, Ammi.
 Acriore. Cuminum sylvestre.
Lini.
 Semine Linum æquante, Sary-
 rium alterum priuatim erythron,
 id est, Rubens, Vrtica altera.
 Maiore & firmiore. Satyriū alterū.
 Minore, Vrtica altera.
MArathri, Fœniculi. (sticū.
 Semine Fœniculū referente. Ligu-
 Melanthij, Girs siue Nigellæ.
 Nigellæ

- Nigellæ proximo, alterum syluestre** **R** Hoë. Punicæ.
 Cyminum. Semine Punicæ acinum referente,
Nigellæ sapore. Isopyron. Pæonia utraque, Capparis.
Mecanis. Papaueris. **S** Elini. Aprij.
 Papaueraceum semen exprimente. Semine Apio non dissimili, Si-
 Phyllon thelygonon, Papauer son.
 corniculare, Altercum primum. Seseleos æmulo, uerum latiore, can-
Maiore, Phyllon thelygonon, Cheli didiore, Spondylium.
 donium maius. Massiliensis Seseleos semine odora-
Minore. Peplos. tiore & acriore, Sefeli Æthiopi-
 Veluti nigri papaueris, Androsæ- cum.
 mos. Sefami.
Myrsines. Myrti. Sefamum mentiente. Sefamoides
 Ad Myrtinum semē alludente, Thy- utrumque.
 melæa. Spondylii. Verticillaris herbæ.
N Arthecis. Ferulæ. Spondylium imitante. Gentiana.
 Semine ferulacei æmulo, sed mi- Schini, Lentisci.
 nore. Thapsia. Lentiscinum semen referente, sed mi-
O Rigani. nore & breuiore, Tragium.
 Semine Origanum gustu resipien- **T** Eutli. Betæ.
 te, Ammi. Betacei seminis æmulo, uerum ro-
Ormini. tundiore & duriore. Sideritis se-
 Ormini syluestris æmulo, Elelispha- cunda.
 cos. Teleos. Fœni græci.
Coloris & figuræ ab hoc uariantis Fœni græci figura, Latus syluestris,
 satium. Myagron.
Orobi. Erui. Multo minore, Latus syluestris.
 Eruum æquāte, Æthiopsis, Catanan- **T** ithymali characiæ, Lactariæ ual-
 ce prima, Lithospermum, Tithy- laris.
 malus tertius. Tithymalo characiæ respondente,
Maiore, Lathyris. Tithymalus sextus.
 Minimi Erui quantitate, Dorycniū. **H** yoscyami. Alterci.
 Oxychoeni, Acuminati Iunci. Alterci seu Apollinaris herbæ se-
 Oxychoeno simili, Holoschoenus. mine minore. Napus.
P Epereos. Piperis. Hyperici,
 Semine Piperis sapore, Vitex. Hyperici effigie, Ascyron, Cotyle-
 Prasi. Porri. don altera.
 Porri similitudine, Pycnocomon. **P** Haci, Lentis.
 Pyri. Tritici. Semine Lenticulæ proximo, Me-
 Tritici figura, Batis, Centaurium mi- dica herba, Pityula, Spartū, Coc-
 nus. cus ba.

cus baphicus, id est, Granum tinctorium.

Minore, Aphace.

Dimidiatæ Lentis figura, uerū multo graciliore, Phalangium.

Phlomi, Verbasci.

Verbasci æmulo, Symphytum alterum.

Semine in calyculis latente, Gentiana.

In pomis concepto, Mandragoras.

Ceu membrana incluso, Narcissus.

In terram inclinato, Eupatorium.

Semine Autumno maturescente, aliquid agrestis. Ruta quibusdā sic nominata.

Inutili semine, Poterium.

PLANTARVM DIFFERENTIA

secundum eaque à flore, fructu

et semine pendent, cuiusmodi sunt hæc fere.

1 Calyces. 5 Capitula & uascula.

2 Verticilli. 6 Siliquæ.

3 Spicæ. 7 Pappi.

4 Umbellæ. 8 Spinæ.

1 Calyce magno summum calyculum occupante, Tragopogon, id est, Barba hircina.

Cytinis duris & aculeatis, Hyoscyamus primus.

2 Verticillis orbiculatis caules, ut in Marrubio, per interstitia cingentibus, Sideritis.

3 Spicis septem aut octo Lolio similibus, Hordeum murinum.

Viridi spica, Thymbra seu Satureia: Satureiæ modo spicata est Veronica.

4 Umbella constant Libanotis fecunda prior, Cicuta. Chamæleon niger, Panaces Asclepium, Linguisticum, Semperuium minus, Ageratum, Caucalis.

Densiore umbella, Stratiotes millefolia.

Lata, Seseli Peloponnesiacum.

Vegetiore, Stratiotes millefolia.

Circinata, Pyrethrum, Achillea, Heliochrysum, Sambucus.

Umbella Anethi & Coriandri figura, Seseli Massiliense, Smyrnum,

Elaphoboscus, Pyrethrum, Origanus sylvestris, Stratiotes millefolia, Panaces Herculeum, Thapsia, Pastinaca erratica, Daucus

Creticus.

Erraticæ Pastinacæ imaginem ostendente, Daucus tettrius.

Sambuci formam referente, Arabis, humilis Sambucus quæ proprie Latinis Ebulum dicitur.

Veluti corymbis arescentibus, Heliochrysum.

Non Hyssopi modo in rotæ speciei orbiculata sed multifida & ueluti diuisa, Origanus.

Capitulo spinoso, Hippophæstum, Dipsacos Latinis Venetis labrum, Atractylis, Latini colum rusticam uocant, Acantha leuace, id est, Spina alba, Scolymos, id est, Carduus.

Spinis acutissimis horrente, Eryngium.

Inani, Epithymum.

Semen continente, Isopyron, Cnicus, Catanance prima, Nigella, Apium montanum, Cuminum sylvestre

- uestre Nymphæa, Psyllium, alia In rotundo oblongo, Centaurium
 Ruta sylvestris, Lotus Ægyptia, maius.
 Tithymalus tertius & quartus. Sefeli, Papauer sylvestre quod pithi
 Quod uermiculos quosdam in me- te à dolij forma quasi doliare nun-
 dia medulla ostendit per longitu- cupatur.
 dinem diuisum, Veneris labrum. Quasi incisuris diuiso, Leontopo-
 Veneris labrum in singularum ger dium.
 minationum caulibus singula ca- Interiore sui parte discurrentibus ue-
 pitula porrigit. luti cancellis dissepto, Melanthiū.
 Duo triaue profert Psyllium. Capitulo spinis stellatim circums-
 Quinq; aut sex. Cyminum sylvestre. pto, Eryngium.
 Sex aut septem, Caranance prima. Marinum Echinū simulante, sed mi-
 Exiguo capitulo, Polium monta- nore & oblongiore, Acantha leu-
 num, Melanthiū, Gracili, Epithy- ce.
 mum, Ilopyrum. Spinis echinato, Veneris labrum.
 Oblongo, Argemone, Melanthium, Cano hominis capillo simili, Polii
 Papauer satium, erraticum & ter montanum.
 tium, Veneris labrum, Hieraciū Capillorum modo caudas habente,
 maius. Epithymum.
 In angustum contracto, Psyllium. Piri figura, Aristolochia longa.
 Apitulo cum aruerit candorem Oliuæ speciem exhibente, sed maio-
 Cinduente, Veneris labrum. re & latiore & ut platani pilula,
 Nigro, Nymphæa. pilosiore, Solanum furiosum.
 Nigro aut cæruleo, Anem. næ om- Corymbi effigie, Polium montanū.
 nes. Non aliter ac Pilula, quam in arbori-
 Spinis horrente quæ modo uirides, bus aliquot Cachryn uocant, an-
 nunc pallidæ, alias candidæ, ali- cifo, Ornithogalon.
 quando etiam glaucæ uidentur, Veluti asparagi cacumine, Anem.
 Eryngium. næ omnes.
 Grauitè cū suauitate aliqua odo- Globi figura, Sideritis secunda.
 rato, Polium montanum. Thyrsi non dissimili, Acanthus.
 ACri & quod olfactu sternutamē-
 ta proritat, Ptarmice, id est, sternu-
 tamentaria ideo sic dicta. CAPITVM ET VASCULO-
 rum inter se collatio.
 Capitulo molli, Cyminum sylue-
 stre,
 Aspero, Sideritis secunda. ANem. nes.
 Rotundo capitulo, Cyminum syl- A Capitulo Anemones minore,
 uestre, Ptarmice, Nymphæa, An- Papauer erraticum.
 themis, Ononis, Tithymalus ter- Anemones culta amantis oblongo
 tius. re, capitulo sylvestris.
 Anethi.

Anethi.

Anethi æmulo, Sefeli Æthiopicum,
Daucus tertius, Tithymalus quar-
tus.

Anthemidis seu Chamæmali.

Chamæmalini capituli formam de-
scribente, Parmice.

Thymi.

Capite Thymū imitante, Symphy-
tum petraeum.

Meconis. Papaueris.

Papaueraceum caput mentiente, A-
pium montanum, Melanthium,
Centaurium maius.

Multo tenuiore. Apium montanū.

Papaueris maximum uasculum refe-
rente, Lotus Aegyptia.

Erratici papaueris æmulo, sed oblon-
gior & in superiore fui parte lati-
ore, Argemone.

Pegani. Rutæ.

Capite paulo ac Rutæ satiuæ maio-
re, alia agrestis Ruta nonnullis ita
uocata.

Rorundum pomum aut Papaue-
ris caput imitante, Nymphæa.

Capitulo tribus maiori ex parte
partibus constituto, alia Ruta syl-
uestris aliquibus sic nominata.

In caulibus consistente, Leontopodi-
um, Cyminum syluestre, Eryngi-
um, Solanum furiosum, Veneris
labrum, Acantha leuce, Carduus,
Cnicus, Sesamoides minus.

In adnatis fito, Centaurium maius.

In medio floris prominente, Anem-
on omnes, Ornithogalon.

Cacumen tenente, Melanthium, alia
agrestis Ruta, Polium montanū,
Hopyrum, Apium montanum,

Parmite, Tithymalus tertius,
Thymus, Anemone omnes, Alif-
ma, Psyllium, Sideritis secunda,
Leontopodium, Cyminum syl-
uestre, Eryngium, Solanum furio-
sum, Veneris labrum, Acantha
leuce, Carduus, Sesamoides mi-
nus.

Capitulo ubi emarcuit flos, extu-
berante, Nymphæa, Aristolochia
longa.

Siliquatae plantæ, Delphinium,
Solanum somnificum, Eruum,
Xyris, Androsaces.

Veluti siliqua in terram decliui se-
men complexa, Orminon.

Folliculo in quo continetur fructus,
Lathyrus, Solanum halicacabum.

Siliqua non adeo hirsuta, Hypericū.
In summo pendentibus paruulis ue-
luti locustis duplici crure diuaria-
tis, in quibus semen est, Bromos
Latinis Auena.

Multis siliquis, Isatis syluestris,
Dorycnium. Duplici, Clymenū,
Triplici, Lathyrus.

Parua siliqua, Glycyrrhiza.
Tenui, Erysimum.

Longa, Anagyris.

Oblongo quodam folliculo, Solae-
num halicacabum.

Siliqua quadamtenus oblonga, A-
conitum alterum.

Siliqua ruffa, Glycyrrhiza.

Herbacea, Staphis syluestris.

Siliqua in rotundo oblonga, Hype-
ricum, Ruta syluestris.

Triangulari, Xyris.

Aliquantulum caua, Tithymalus
mas cognomine characias.

Siliqua

Siliqua linguæ figura, Isatis sylvestris.

Folliculo quodam uesicam referente, Solanum halicacabum, id est, uesicarium ob id ita uocatum.

Corniculata siliqua, Cirsæa, Erysimon, Hedyсарum, alterum sylvestre Cyminum.

Amygdalæ propinqua, Pæonia utraq.

Veluti oblonga glande, Capparis.

Hordei magnitudine, Hypericum.

Melanthij uasculum imitante, Ocismastrum.

Veluti pilula, Sparganium.

Peluis figura, Tithymalus mas.

Vesparum fauis simili, Faba Ægyptia.

Iridem & polyporum cirrhos simulantem, Clymenum.

SILIQVARVM INTER se collatio.

Rebinthi. Ciceris.

Siliqua Ciceri proxima, Leonotopetalon, Dorycnium, Staphis sylvestris.

Teleos. Fœni græci.

Siliqua Fœni græci specie, Smilax hortensis, Erysimum.

Crassiore & longiore, Smilax hortensis.

Hysciami. Alterci.

Siliqua Alterci figura, Ocismastrum.

Alterci primi uasculo teneriore, secundum Altercum.

Phaci, Lentis.

Siliqua Lentis similitudine, Glycyrrhiza.

Maïore, Aphace.

Phasioli siue Phaseli.

Phaseli formam exprimente, Sparium.

Pendula siliqua, Isatis sylvestris, Cyminum alterum sylvestre.

Sibi inuicem annuente, Clymenū.

IN Pappos deflorescunt Typha, Senecio, Conyza minor, Cirsium.

8 SPINAM emittit Colus rustica. Latiore spina est Silybon.

Spinam aquis occultat Tribulus aquaticus.

Spina quæ ex medio prodit Echini marinum aut Cinaram æmulante, Chamæleon albus.

F I N I S.

INDEX GRAECARVM NOMEN- CLATIONVM, QVAE STIRPIBVS A' DIOSCORIDE alijsq; Graecis rei herbariae scriptoribus assignantur.

A

ἀβύσσος	ἀβύσσος	870
ἀβύσσος	842	871
ἀβύσσος	842	1037
ἀβύσσος	881	810
ἀβύσσος	943	818
ἀβύσσος	333	1060
ἀβύσσος	1076	731
ἀβύσσος	861	1090
ἀβύσσος	1062	692
ἀβύσσος	1017	388
ἀβύσσος	81	187
ἀβύσσος	881	318
ἀβύσσος	678	362
ἀβύσσος	820	382
ἀβύσσος	832	810
ἀβύσσος	374	75
ἀβύσσος	377	131
ἀβύσσος	380	451
ἀβύσσος	1083	150
ἀβύσσος	672	160
ἀβύσσος	597	452
ἀβύσσος	6	362
ἀβύσσος	850. 857	869
ἀβύσσος	552	495
ἀβύσσος	185	1046
ἀβύσσος	248	632
ἀβύσσος	308	120
ἀβύσσος	304	775
ἀβύσσος	371	191
ἀβύσσος	995	769
ἀβύσσος	164	179
ἀβύσσος	366	191
ἀβύσσος	933	838. 840
ἀβύσσος	277	1074
ἀβύσσος	33	227
ἀβύσσος	332	227
ἀβύσσος	137	775
ἀβύσσος	886	345
ἀβύσσος	764	345
ἀβύσσος	698	345

INDEX.

E

ἐπισκοπὴ uel ἐπισκοπῶν

ἐκκλησίαν

ἐκείνη

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

ἐκκλησίαν

971 ἐκκλησίαν

1053 ἐκκλησίαν

1062 ἐκκλησίαν

464 ἐκκλησίαν

196 ἐκκλησίαν

333

53

172 ἐκκλησίαν

803 ἐκκλησίαν

516 ἐκκλησίαν

410 ἐκκλησίαν

407 ἐκκλησίαν

193 ἐκκλησίαν

660 ἐκκλησίαν

529 ἐκκλησίαν

185 ἐκκλησίαν

1015 ἐκκλησίαν

619 ἐκκλησίαν

127 ἐκκλησίαν

501 ἐκκλησίαν

397 ἐκκλησίαν

607.609 ἐκκλησίαν

952 ἐκκλησίαν

1051 ἐκκλησίαν

185 ἐκκλησίαν

498 ἐκκλησίαν

285 ἐκκλησίαν

191 ἐκκλησίαν

863

41

41 ἐκκλησίαν

498 ἐκκλησίαν

104 ἐκκλησίαν

104 ἐκκλησίαν

692 ἐκκλησίαν

334 ἐκκλησίαν

185 ἐκκλησίαν

642 ἐκκλησίαν

642 ἐκκλησίαν

983 ἐκκλησίαν

670 ἐκκλησίαν

185 ἐκκλησίαν

185 ἐκκλησίαν

22

394

754

552

451

150

872

285

810

86

150

569

603

622

292

547

86

86

803

160

160

160

130

219

670

958

45

44

546

274

263

263

211

565

920

950

557

692

694

312

438

700

704

Z

H

W

I

GGg

η

INDEX.

ἄριστον	700.702	πισκείτω	416
ἄριστον	676	πισκείτω	467
ἄριστος	700	πισκείτω	380
		πισκείτω	881
		πισκείτω	70
ἄν	8013	πισκείτω ἄριστον	70
ἄνθρωπος	883	πισκείτω	810
ἄνθρωπος	647	πισκείτω	614
ἄνθρωπος	647	πισκείτω	1116
ἄνθρωπος	495	πισκείτω	298
ἄνθρωπος	1105	πισκείτω	1116
ἄνθρωπος	869	πισκείτω	879
ἄνθρωπος	318	πισκείτω	886
ἄνθρωπος	992	πισκείτω	803
ἄνθρωπος	318	πισκείτω	130
ἄνθρωπος	920	πισκείτω	333
ἄνθρωπος	521	πισκείτω	570
ἄνθρωπος	124	πισκείτω	150
ἄνθρωπος	349	πισκείτω	393
ἄνθρωπος	1088	πισκείτω	391
ἄνθρωπος	38	πισκείτω	395
ἄνθρωπος	50	πισκείτω	393
ἄνθρωπος	199	πισκείτω	393
ἄνθρωπος	526	πισκείτω	227
ἄνθρωπος	625	πισκείτω	539
ἄνθρωπος	664	πισκείτω	533
ἄνθρωπος	625	πισκείτω	622
ἄνθρωπος	644	πισκείτω	689
ἄνθρωπος	785	πισκείτω	10
ἄνθρωπος	359	πισκείτω	10
ἄνθρωπος	323	πισκείτω	227
ἄνθρωπος	749	πισκείτω	838
ἄνθρωπος	820	πισκείτω	1017
ἄνθρωπος		πισκείτω	160
ἄνθρωπος		πισκείτω	1088
ἄνθρωπος	168	πισκείτω	544
ἄνθρωπος	423	πισκείτω	281
ἄνθρωπος	1114	πισκείτω	458
ἄνθρωπος	156.149.191.194	πισκείτω	636
ἄνθρωπος	832	πισκείτω	113
ἄνθρωπος	464	πισκείτω	8070
ἄνθρωπος	503.507	πισκείτω	1053
ἄνθρωπος	402	πισκείτω	
ἄνθρωπος	298	πισκείτω	
ἄνθρωπος	823	πισκείτω	978
ἄνθρωπος	211	πισκείτω	400
ἄνθρωπος	8030	πισκείτω	1032

O

II

P

μύη

INDEX

٢٠٠٠
 ٢٠٠١
 ٢٠٠٢
 ٢٠٠٣

Σ

Σάμψυχον
 σαρκινον
 σατυριον τριφυλλον
 σιλινον και αιον
 σιλινον ἄγχιον
 σιραπια
 σιριε
 σίριε
 σίριον
 σισλι κίριον
 σισλι τὴ κρητινὸν καὶ τὸ αἰσιπινόν
 σισλι τομασλιωτικον
 σισνύδα
 σισαμ
 σισαμιν ἄγχιον
 σιδε
 σιδριτις ἱράκλαα
 σιδριτις Crataeuz
 σικυς ἄγχι
 σικυς λιμν
 σιντω
 σιντωι ἄγχιον
 σιν
 σισαρον
 σισαρον Columellaz
 σισυβριον
 σισον
 σισαριον
 σισλλα
 σισλλα
 σισλλωσιδρον
 σισριδρον σισυ σισριδρον
 σισριδρον uel σισριδρον
 σισριδρον φασον
 σισλαξ
 σισλαξ και σία
 σισλαξ και σία
 σισλαξ λαα
 σισλαξ τραχία.
 σισριον
 σισριον uel

913 σήχυνε τράχυνε	270
988 σήχυνε τράχυνε	274
917 σήχυνε τράχυνε	326
988 σήχυνε	826
σπαρχαίνω	676
σπαρχαίνω	962
33 σπλάχνω	552
339 τάρησιν ἄγρια	902
786 τερνύω	439
462 τερνύω	689
95 τίχαι	212
786 τριάντη	478
274 τριάντη	478
268 τριάντη	901
338 τριάντη	254
289 τριάντη	304
879 τριάντη μανιάντη	305
879 τριάντη μανιάντη	304
1114 τριάντη ὑπερτιάντη	305
656 συνκαμύω	1047
289 συνκαμύω συνκαμύω	1052
1037 σύκα	298
50 σύμμετρον	241
80 σύμμετρον πτερύον	510
832 σύμμετρον	675
832 σύμμετρον	879
104 σπάρω	53
86 σπάρω	1124
462 σπάρω	686
725 σπάρω	351
911	
18	
472 Τανύμετρον	840
1015 τανύμετρον	386
909 τάνυμετρον	205
867 τάνυμετρον	208
339 τάνυμετρον	708
886 τάνυμετρον	597
746 τάνυμετρον	296
750 τάνυμετρον ἄρην	297
1070 τάνυμετρον ἄρην	297
816	
616	
816	
13814 τάνυμετρον	
434	
395	

GGg iiñ

I N D E X.

ρυπαρίσκει
 τήν καρδίαν
 ρυπαρὸν
 πλάτυφυλλον
 καρμινίαι
 τήν καρδίαν
 αμυγδαλοειδὲς
 κυβίος
 τορδύλιον sive τὸ ροδύλον

τράχυν
 τράχυν ἄλλο
 τραχύπωγων
 τείβειν ὁ χιρσαῖος
 τείβειν οὐδὲν
 τείφυλλον
 τείφυλλον
 τύρε

Y

ὑάκινθος
 ὑάκινθος
 ὑάκινθος
 ὑάκινθος
 ὑάκινθος
 ὑάκινθος
 ὑάκινθος
 ὑάκινθος
 ὑάκινθος
 ὑάκινθος

Φ

φανός ὁ φανός
 φανός ὁ φανός
 φανός ὁ φανός
 φανός ὁ φανός
 φανός ὁ φανός
 φανός ὁ φανός
 φανός ὁ φανός
 φανός ὁ φανός
 φανός ὁ φανός
 φανός ὁ φανός
 φανός ὁ φανός

298	φύττονμα	254
298	καμααίντα	797
298	καμαβαλάνος	632
297	καμαβάτ	971
	καμαδόνος	205
297	καμαδόνος	205
	καμαδόνος	886
	καμακίρματος	1028
297	καμακίρματος	799 803
879	καμακίρματος	77
644	καμακίρματος	853
160	καμακίρματος	920
281. 183	καμακίρματος	75-77
840	καμακίρματος	205
842	καμακίρματος	603
501	καμακίρματος	124
586	καμακίρματος	958.960
581	καμακίρματος	820
	καμακίρματος	107
773	καμακίρματος	113
942	καμακίρματος	107
185	καμακίρματος	130
464	καμακίρματος	478
92	καμακίρματος	642
132	καμακίρματος	150
308	καμακίρματος	333
75	καμακίρματος	345
47	καμακίρματος	803
	καμακίρματος	974
630	καμακίρματος	712
691	καμακίρματος	1040
691	καμακίρματος	191
527	καμακίρματος	
612	καμακίρματος	28
1107	καμακίρματος	131
495	καμακίρματος	163
1112	καμακίρματος	820
218	καμακίρματος	198
564	καμακίρματος	
669	καμακίρματος	185
1053	καμακίρματος	649
1053	καμακίρματος	1079
63	καμακίρματος	508
689	καμακίρματος	
582	καμακίρματος	

X

Ψ

Ω

INDEX NOMENCLATIONVM

LATINARVM, QVAE STIRPIBUS TAM A PRO-

batis autoribus, quam ab officinis, & uulgo herbario-
rum tribuuntur.

A

A Bies	Alga Vergilij	688
Abiga	1118 Alkaleia	137
Abrotonum syluestre	78 Alimus	995
Abrotoni uaria genera	341. 342 Alisma Euricij Cordi	485
Abfinthium	340. 341 Alisma Tragi & aliorum	164
Abfinthium ponticum	334 Allcluid	521
Abfinthium rusticum	342 Alliaris	85. 86
Abfinthium Santonicum	335 Allium	745
Abuolum	338 Allium caninum	748. 750. 751
Acanthus Germanicus	23 Allium caninum alterum	748. 750. 751
Acanthus uerus	883 Allium caninum exiguum	751
Acetofa	863 Allium syluestre	749
Acetofa syluestris	318. 319 Alnus	1084
Acer	521 Aloe	932
Acinus	1123 Alfine	277
Acorum adulterinum	29 Alfine quorundam	386
Acus muscata	699 Althea	371
De Adianto eiusq; generibus proluxa diffu-	108 Altercum	135
tatio	Amanite	939
Adianton magnum	531. 533 Amantilla	62
Aegilops Plinij	531 Amara dulcis	815
Agaricum	670 Amaranthus	330
Ageratum	941 Amaranthus maior	359
Agnus castus	46. 333 Amarella	157
Agrimonia	1076 Ambrosia	52
Agriocardamum	513. 514 Ambubcia.	274
Aithales	84 Ammi	674
Aizoon	376 Amomum Germanicum	461
Alcanna	376 Ampeloprason	750
Alcea	1006 Amygdalus	1089
Alcea Veneta	366 An. gallis	388
Alchimilla	921 An. gallis aquatica	137
Alga	511 An. gallis media	393
	687. 689 Andropogon	802

I N D E X.

<i>Anemone hortensis</i>	129	<i>Asphodelus foemina</i>	787
<i>Anserina</i>	479	<i>Asplenon sylvestre</i>	550
<i>Anethum</i>	451	<i>Aster, sed non Atticus</i>	308
<i>Angelica</i>	421	<i>Atractylis</i>	859
<i>Angelica sylvestris</i>	422	<i>Atriplex</i>	711. 713
<i>Anicetum</i>	451. 452	<i>Atriplex canina</i>	715
<i>Anisum</i>	452	<i>Avena</i>	653
<i>Anonium</i>	6	<i>Aurelia Theophrasti</i>	332
<i>Anthemis</i>	150	<i>Auricula muris maior</i>	277
<i>Antirrhinum</i>	362	<i>Auricula muris minor</i>	279
<i>Anthyllis Tragi</i>	160		
<i>Aparina</i>	495		
<i>Apiastrum</i>	12	<i>Baccharis Germanica</i>	31
<i>Apios</i>	632	<i>Balsamina</i>	898
<i>Apium aquaticum</i>	96	<i>Balsamina agrestis</i>	16
<i>Apium hortense Tragi</i>	462	<i>Balsamita acuta</i>	19
<i>Apium vulgare seu rusticum</i>	464	<i>Bancia</i>	439
<i>Aposcium</i>	23	<i>Baptifecula</i>	563
<i>Apollinaris</i>	132	<i>Barba Iouis</i>	376
<i>Aquifolia</i>	1067	<i>Barba hircina Arabum</i>	283
<i>Aquilegia</i>	136	<i>Barbula Dei</i>	469
<i>Arbor Germanis faulbaum dicta</i>	981	<i>Barbula caprae</i>	282
<i>Argemone maior & minor</i>	120	<i>Barbula hirci</i>	280
<i>Argemone minima</i>	131	<i>Bardana maior</i>	322
<i>Aristolthea</i>	371	<i>Basichia</i>	326
<i>Aristolochia longa</i>	178	<i>Basilicon agreste</i>	32
<i>Aristolochia rotunda vera</i>	768	<i>Basilicon nobile & exiguum</i>	32
<i>Aristolochia rotunda vulgaris</i>	766. 767	<i>Basilicon sylvestre</i>	22
<i>Armoracia radix</i>	734	<i>Baticula</i>	326
<i>Aron</i>	774. 775	<i>Batis marina</i>	326
<i>Artemisia</i>	344	<i>Batrachium</i>	96
<i>Artemisia unde dicta</i>	345	<i>Been album & rubrum</i>	131
<i>Artemisia monoclonos</i>	160	<i>Bellis</i>	162
<i>Artemisia varia secundum recentiores</i>		<i>Bellis maior Barbara</i>	144
<i>quosdam genera</i>	345	<i>Benedicta</i>	66
<i>Arthritica</i>	162	<i>Benedicta sylvestris</i>	517
<i>Asarum</i>	62	<i>Berberis</i>	992
<i>Asclepias</i>	181	<i>Beta pratensis</i>	705
<i>Asparagus</i>	223	<i>Beta varia genera</i>	708
<i>Asphodelus</i>	790	<i>Betonica</i>	199

Below

I N D E X.

<i>Betonica candida</i>	201	<i>Calamagrostis altera</i>	677
<i>Betula</i>	113	<i>Calamagrostis due species</i>	679
<i>Bibinella</i>	467	<i>Calamentum montanum</i>	36
<i>Bifolium</i>	486	<i>Calamentum Serapionis</i>	17
<i>Bipennula</i>	467	<i>Calendula</i>	146
<i>Bistorta</i>	322.502	<i>Callion</i>	304
<i>Bismalua</i>	371	<i>Callitricon agreste</i>	53
<i>Blattaria</i>	925	<i>Caltha</i>	146
<i>Blitum</i>	713	<i>Caltha Plinij</i>	924
<i>Boleti</i>	939.940	<i>Caltha Vergilij</i>	142
<i>Bonus Henrichus</i>	317	<i>Calthula</i>	146
<i>Bonus Henrichus alter</i>	715	<i>Caluaria Monachi</i>	898
<i>Borago</i>	237	<i>Camedreos</i>	205
<i>Botrys</i>	887	<i>Campanella</i>	805
<i>Branca ursina</i>	437	<i>Campanula sylvestris</i>	889
<i>Branca ursina Italica</i>	863	<i>Cannabis</i>	350.351
<i>Brassica canina</i>	392	<i>Cannabis tria apud Plinium genera</i>	
<i>Brassica crispa seu Apiana</i>	721		351
<i>Brassica sativa</i>	719	<i>Candela regis</i>	218
<i>Britannica</i>	399	<i>Candelaria</i>	218
<i>Britannica Plinij</i>	201	<i>Capillus Veneris</i>	330.331
<i>Bromos</i>	654	<i>Capparis</i>	967
<i>Bruscus</i>	920	<i>Caprificus</i>	1051
<i>Bryonia</i>	820	<i>Caprifolium</i>	823
<i>Bucranion</i>	362	<i>Caput Monachi</i>	146.263
<i>Buglossa domestica minor</i>	235	<i>Cardaminaca</i>	81
<i>Buglossa Italica</i>	232	<i>Cardamina</i>	81
<i>Buglossa magna</i>	244	<i>Carduus</i>	866
<i>Buglossa maior</i>	233	<i>Carduus benedictus</i>	862
<i>Buglossa sylvestris</i>	224	<i>Cardui fullonij genera</i>	847.848
<i>Buglosson Tragi</i>	238	<i>Carduus Italicus</i>	867
<i>Bulbus agrestis</i>	737.740	<i>Carduus Mariae</i>	850
<i>Buphthalmus</i>	144	<i>Carduus pratensis</i>	862
<i>Buphthalmus uerus</i>	350	<i>Carduus puellarum, siue sativum & horten-</i>	
<i>Bursa Pastoria</i>	215	<i>sis</i>	858
<i>Buxus</i>	1069	<i>Carduus sylvestris</i>	856
		<i>Caros</i>	458
		<i>Carpinus Theophrasti</i>	983
<i>Cacalia</i>	427	<i>Cartamus</i>	843
<i>Cacalia Plinij</i>	836	<i>Cartamus sylvestris</i>	859

I N D E X.

<i>Cassia Germanica</i>	58 <i>Chamaepitys tertia</i>	80
<i>Cassula cordis</i>	419 <i>Chamaepityos uaria genera</i>	77.78:
<i>Cassya</i>	811 <i>Chamaespation</i>	602
<i>Castanea</i>	1099 <i>Chamelea</i>	959
<i>Catanance altera</i>	146 <i>Chamomilla fatua</i>	150
<i>Cataputia maior</i>	289 <i>Chamomilla foetida</i>	150
<i>Cataputia minor</i>	291 <i>Chamomilla nobilis</i>	149
<i>Caulis</i>	718 <i>Chamomilla tertia species</i>	154
<i>Caulis capitulatus</i>	717 <i>Chamomilla uulgaris</i>	148
<i>Cauta</i>	150 <i>Chamos Syluatici</i>	146
<i>Celastrus Germanicus</i>	1003 <i>Charatia</i>	899
<i>Celosia</i>	917 <i>Chelidonium maius</i>	107
<i>Centrum galli</i>	211 <i>Chelidonium minus</i>	107.112
<i>Centaureum Germanicum</i>	136 <i>Chrysanthemum</i>	150
<i>Centaureum maius</i>	137 <i>Chrysanthemum Democriti</i>	99.143
<i>Centaureum minus</i>	139 <i>Chrysocome</i>	374
<i>Cepa</i>	737 <i>Cicer</i>	609
<i>Cepa marina seu muris</i>	909 <i>Cicer arietinum</i>	605
<i>Cepa sterilis</i>	741.742 <i>Ciceris uaria genera</i>	609
<i>Cepula</i>	741 <i>Cicerbita aspera</i>	270
<i>Cerasus</i>	1026 <i>Cichorea sativa</i>	273
<i>Cerasus syluestris</i>	1027 <i>Cichorium & Intyborum genera species</i>	
<i>Cernicaria</i>	926 <i>esq; & earum discernicula</i>	274
<i>Cestron</i>	199 <i>Cichoreum erraticum</i>	274
<i>Ceterach</i>	552 <i>Cicuta</i>	474
<i>Chereseonium</i>	472 <i>Cicutaria</i>	472
<i>Chereseonium syluestre</i>	472 <i>Cinara</i>	167
<i>Cherephyllon</i>	472 <i>Cinnamalis</i>	531
<i>Chamaebalanos</i>	632 <i>Circea</i>	579
<i>Chamaebatos</i>	973 <i>Cirsium quorundam</i>	224
<i>Chamaecissus</i>	798 <i>Citrato</i>	12
<i>Chamaecyparissus</i>	77 <i>Citraria</i>	12
<i>Chamaecyparissus agrestis</i>	79 <i>Citrea mala</i>	1032
<i>Chamaedaphne</i>	395 <i>Citreolus</i>	831
<i>Chamaedaphne Dioscoridis secundum</i>	Tra <i>Citrullus</i>	832
<i>gum</i>	401 <i>Clematis daphnoides</i>	395
<i>Chamaedrys uera</i>	204.205 <i>Clinopodium</i>	45
<i>Chamaeleon exiguus</i>	852 <i>Cnecus</i>	845
<i>Chamaeleon uerus</i>	853 <i>Coccognidium</i>	958
<i>Chamaeleon uulgaris</i>	851 <i>Colchicon</i>	759

Colocyn-

I N D E X.

<i>Colocynthis</i>	828	<i>Cucumis sylvestris</i>	832
<i>Colubrina</i>	321	<i>Cucumis Turcicus</i>	835
<i>Colus rustica</i>	860	<i>Cucurbita</i>	824. 825
<i>Colutea Theophrasti</i>	964	<i>Cumanum sebile</i>	718
<i>Coma</i>	281	<i>Cuminum sativum</i>	876
<i>Condrille</i>	274	<i>Cuminum sylvestre Rue Hy</i>	570
<i>Consiligo Ruellii</i>	251. 404. 407	<i>Cunila</i>	45
<i>Consolida maior</i>	240	<i>Cunilago Plinii</i>	39
<i>Consolida siue Solidaginis uaria genera</i>		<i>Cupressina</i>	77
	312. 242	<i>Cuscuta</i>	810
<i>Consolida regalis lutea</i>	359	<i>Cuscuta alter Serapionis</i>	665
<i>Consolida regia</i>	369	<i>Cyanus</i>	565
<i>Conyza maior & minor</i>	166. 168	<i>Cylaminus</i>	905
<i>Corago</i>	238	<i>Cyclaminus exigua</i>	905
<i>Corchorus</i>	388	<i>Cymbalaris</i>	805
<i>Cordialis</i>	496	<i>Cyminum dulce</i>	453
<i>Coriandrum</i>	215	<i>Cyminum equinum</i>	430
<i>Corona montana</i>	55	<i>Cyminum latum</i>	879
<i>Coronopus</i>	99	<i>Cyminum leporinum</i>	266
<i>Corneola</i>	182	<i>Cyminum pratense</i>	455
<i>Cornus</i>	1024	<i>Cyminum regium</i>	875
<i>Cornuta</i>	85	<i>Cyminum sylvestre oblongum</i>	879
<i>Corruda uel Corrudago</i>	223	<i>Cynanthemis</i>	350
<i>Corylus</i>	1096	<i>Cynoecephalia</i>	359
<i>Cotula</i>	150	<i>Cynocrambe</i>	192
<i>Cotula non foetida</i>	150	<i>Cynoglosson</i>	230
<i>Cotyledon</i>	483	<i>Cynorhodon</i>	989
<i>Cotyledon sylvestre</i>	484	<i>Cynosbatos</i>	984
<i>Crambe</i>	719	<i>Cynosorchis mar</i>	779
<i>Crepitus lupi</i>	941	<i>Cyperus</i>	915
<i>Crispula</i>	215	<i>Cytisua</i>	600. 601
<i>Crista gallinacea</i>	211		
<i>Cristamus agrestis</i>	663		
<i>Crocus</i>	763. 764. 765	<i>Daneta</i>	160
<i>Crocus campestris seu Sarracenicus</i>	845	<i>Daucus</i>	445
<i>Crocus uasicus</i>	498	<i>Dens caballinus</i>	136
<i>Cruciata</i>	253	<i>Dens leonis</i>	263
<i>Cuculi flos</i>	403	<i>Dianthus</i>	55
<i>Cucumis</i>	830	<i>Diapensia</i>	510
<i>Cucumis asininus</i>	832	<i>Dictamnus</i>	25

D

Dictamnus

I N D E X.

<i>Distamnus agrestis</i>	28	<i>Eupatorium Mesue</i>	59
<i>Distamnus cretensis</i>	26	<i>Eupatorium officinarum adulterinum</i>	
<i>Distamnus vulgaris</i>	27		490. 516
<i>Digitalis</i>	889	<i>Euphrasia gramen</i>	329
<i>Digitelli</i>	940	<i>Euphrasia varia generis</i>	327. 328
<i>Dolichos</i>	612	<i>Exacon</i>	139
<i>Dracunculus maior</i>	776. 777		
<i>Dryopteris</i>	538		
<i>Dulcamarum</i>	815		
<i>Dulcis amara</i>	816		
<i>Dulcis radix</i>	935	<i>Faba Germanica seu vulgaris</i>	617
<i>Diospyron Theoph.</i>	336	<i>Faba grossa</i>	374
		<i>De fabis sententia Tragi</i>	618. 619. 620
		<i>Faba ueterum secundum Tragam</i>	626
		<i>Fagus</i>	1107
<i>Ebiscus sine Ibisus</i>	796. 797	<i>Far adorem</i>	642
<i>Ebulum</i>	234	<i>Far candidum</i>	644
<i>Echium Tragi</i>	196	<i>Far fugium</i>	417
<i>Elatine</i>	333	<i>Farranum</i>	417
<i>Eliochryson</i>	410	<i>Farris quatuor genera</i>	643
<i>Elleborus albus</i>	405	<i>Febrifuga</i>	140. 157
<i>Elleborus niger adulterinus</i>	406	<i>Fel terre</i>	139
<i>Elleborus niger uerus</i>	527	<i>Ferraria minor</i>	510
<i>Empetron</i>	526	<i>Ferula</i>	603
<i>Empetron album</i>	268	<i>Fescera</i>	820
<i>Endiuia</i>	170	<i>Ficus</i>	1050
<i>Enula campana</i>	173	<i>Filicis maioris duo genera</i>	542. 543
<i>Ephemerum quorundam</i>	694. 692	<i>Filicis semen</i>	544
<i>Equisetum</i>	607	<i>Filicula</i>	540
<i>Erebinthus</i>	952	<i>Filicularis herba</i>	540
<i>Erica</i>	104	<i>Filipendula</i>	883
<i>Eruca</i>	626	<i>Filicis arborea genera</i>	537
<i>Eruum candidum</i>	871	<i>Filix foemella</i>	547
<i>Eryngium</i>	872	<i>Filix saxatilis</i>	537
<i>Eryngium alterum</i>	298	<i>Filix vulgaris</i>	546
<i>Esula dulcis</i>	296	<i>Flammea uiola</i>	565
<i>Esula exigua</i>	295	<i>Flammula</i>	96
<i>Esula sylvestris</i>	295	<i>Flos Aprilis</i>	96
<i>Esula sylvestris alia</i>	294	<i>Flos S. Iacobi</i>	287
<i>Esula vulgaris</i>	523	<i>Flos S. Iohannis</i>	144
<i>Eupatorium</i>			

I N D E X

<i>Flos tinctorius</i>	154	<i>Gentiana uaria species</i>	375
<i>Foeniculum</i>	447	<i>Geranium</i>	108
<i>Foeniculum erraticum</i>	448	<i>Geranium</i>	347
<i>Foeniculum equinum, seu erraticum, seu p4</i>		<i>Gingidium</i>	472
<i>lustre</i>	427	<i>Gith</i>	118
<i>Foeniculum montanum</i>	429	<i>Githago</i>	131
<i>Foeniculum porcinum</i>	446	<i>Gladiolus ceruleus</i>	699
<i>Foenum græcum</i>	597-599	<i>Gladiolus ceruleus minor</i>	702
<i>Frag1</i>	501	<i>Glans terrestris</i>	632
<i>Fragaria</i>	501	<i>Glaſtum</i>	257
<i>Fraxinus</i>	1121	<i>Glaux</i>	571
<i>Fraxinea arbor</i>	1008	<i>Glechon Agrion</i>	21
<i>Frugum impedimenta</i>	629	<i>Glycypicrum</i>	815
<i>Fuga demonum</i>	75	<i>Glycyrrhiza</i>	936
<i>Fumaria</i>	110	<i>Glycyrrhiza sylueſtris</i>	539
<i>Fumus terre</i>	111	<i>Gnaphalion</i>	683
<i>Fungorum uaria genera</i>	941-943	<i>Gordilion</i>	879
<i>Fusus agreſtis</i>	860	<i>Gramen anatum</i>	682

G

<i>Galla</i>	1105	<i>Graminis multa genera</i>	679
<i>Galanga ſylueſtris</i>	916	<i>Graminum folia</i>	292
<i>Galatij apud Dioſcoridem III. genus</i>		<i>Gratia dei</i>	107
		<i>Groſſula tranſmarina</i>	995
	496	<i>Groſſula hortenſis ſive rubra</i>	995
<i>Galeopſis</i>	6		
<i>Gallion</i>	493		
<i>Gallitricum & Callitrichum differunt</i>	60		

H

<i>Gallitricum agreſte</i>	50	<i>Halica</i>	643
<i>Gamandrea</i>	205	<i>Halicacabum</i>	307
<i>Garyophyllata</i>	66	<i>Harundo</i>	674-675
<i>Garyophyllea</i>	574	<i>Haſtula regia</i>	790
<i>Garyophyllea ſylueſtris</i>	576	<i>Herba agnina</i>	227
<i>Garyophylli Indici</i>	923	<i>Herba S. Barbara</i>	102
<i>Genicularis</i>	63	<i>Herba benedicta</i>	63
<i>Geniſta</i>	961	<i>Herba blanca</i>	146
<i>Geniſta humilis</i>	602	<i>Herba Borith</i>	354
<i>Geniſtella</i>	962	<i>Herba cancri</i>	115
<i>Gentiana</i>	174	<i>Herba fullonum</i>	902

Herba

I N D E X.

Herba fortis	489 Hippomacathrum	448
Herba Germanis pendelstrant dicta	402 Hippuris	692
Herba gruina	349 Hippuris minor	694
Herba hortenses quæ surculo feri possint	Hirundinaria	181. 807
	45 Hordeum	640
Herba S. Kunigundis	490 Horminium	223
Herba leporina	594 Hyacinthus poetarum	787
Herba militaris	478 Hyacinthorum historia	771. 772. 773.
Herba paralysis	201 Hyoscyamus	132
Herba pedicularia	903 Hyoscyamus candidus	134
Herba perforata	72 Hypericon vulgare	73
Herba S. Petri	253 Hypericum pulchrum	74
Herba pulicaris	168 Hypericum exiguum	75
Herba regia	29 Hyssopus campestris	221
Herba sacra	211 Hyssopus montana	47
Herba Trinitatis	564	
Herba uenti	433	
Herba uenti maior	194 Iacea	564
Herba uiltri	194 Iacea nigra	246
Herba vulneraria	431 Iberis	81
Herbae vulnerariae appellatio multis plan-	Ibica uel ibiga.	80
tis communicatur	489 Intybus	258
Herbulum	285 Intybus erratica	270
Hedera	800. 802 Inula	170
Hedera terrestris	799 Iouis flos Plinij & Gesneri	130
Hederula	181. 802 Iris Germanica	703
Heliotropium	274 Isatis agria	253
Helxine	193 Isatis sativa & sylvestris	256
Helxine altera Galeni	195 Iua Moschata	80
Hemerocallis Brunfel.	573 Iuiuba	1023
Herculea	6 Iuncus odoratus angulosus	916
Hermodactylus offic.	759 Iuncus palustris maior	685. 674.
Hermodactylus quorundam	758 Iuncus vulgaris	686
Hepatica	496 Iuniperus	1074
Hepatica nobilis	519	
Hepatica fontana	522	
Hieracium	263 Labrum ueneris	848
Hieracopodium	565 Labrusca	1059
Hierobotane	211 Lactuca crispa	258. 260
Hippia media	385 Lactuca erratica seu syluatica	263
		Lactus

I N D E X.

<i>Lactuca leporina</i> Germanis Hasen lat.	<i>Leuisticum</i> sylvestre	427
tid	266 <i>Libycum</i>	223
<i>Lactuca sylvestris</i>	359.260 <i>Lichen petreus</i>	522
<i>Lagopus</i>	66.265.332.593 <i>Lichen sylvestris</i>	523
<i>Lagopus Comitis de Neuenare</i>	263 <i>Ligustrum</i>	1005
<i>Lanium</i>	6 <i>Ligusticum</i>	427
<i>Lanaria</i>	218.901 <i>Lilium album</i>	793.794.
<i>Lapathi uaria genera</i>	318 <i>Lilium conuallium</i>	572.823
<i>Lapathium acutum</i>	318 <i>Lilium inter spinas</i>	823
<i>Lappago</i>	495 <i>Lilium rufum</i>	791.792
<i>Lappa agrestis</i>	843 <i>Lilium sylvestre</i>	823
<i>Lappa maior</i>	837 <i>Limones</i>	1032
<i>Lappa minor</i>	839 <i>Limonium pratense</i>	705
<i>Lappa sylvestris</i>	843 <i>Limonium sylvestre</i>	707
<i>Larix</i>	1119 <i>Lamuscus</i>	140
<i>Laferpitium Ruellij</i>	435 <i>Lingua, seu Lingulaca Plinij</i>	324
<i>Lathyrus</i>	293 <i>Lingua agni</i>	227
<i>Lauendula</i>	58 <i>Lingua bubula</i>	238
<i>Lauer</i>	84 <i>Lingua canis</i>	230
<i>Lauer Plinij</i>	465 <i>Lingua serpentina</i>	323
<i>Laureola Tragi</i>	470 <i>Lini genera</i>	354
<i>Laurus</i>	1063 <i>Linum domesticum agreste</i>	355
<i>Laurus Alexandrina</i>	397 <i>Linariae uaria genera</i>	356.357.
<i>Leguminum nocumenta</i>	629 358	
<i>Lens</i>	628 <i>Lithospermum maius</i>	916
<i>Lenticula palustris</i>	690 <i>Lolium eiusq; uaria genera</i>	668.
<i>Leonis pata</i>	251 669.670.671.672	
<i>Leonis pes</i>	511 <i>Loti uaria species</i>	599
<i>Leontopetalon</i>	518 <i>Lotus campestris</i>	595
<i>Leontopodium</i>	512 <i>Lotus sylvestris</i>	600
<i>Leontopodium Barbari</i>	146 <i>Lucernare</i>	219
<i>Lepidium</i>	88.89 <i>Lunaria</i>	914
<i>Lepusculi</i>	943 <i>Luparia</i>	247.248
<i>Leucacantha</i>	855 <i>Lupinus</i>	622
<i>Leucanthemon Plinij</i>	150 <i>Lupulus</i>	812
<i>Leucoion agreste</i>	568 <i>Lychnis agrestis</i>	565
<i>Leucoij uaria genera</i>	560.561 <i>Lychnitis</i>	219
<i>Leucoij uoce ut utantur rei herbarie scri-</i>	<i>Lysimachia</i>	182
<i>ptores</i>	562 <i>Lysimachium</i>	146
<i>Leuisticum</i>	427	

INDEX.

M

<i>Maiorana</i>		<i>Melittana</i>	12
<i>Maiorana sativa</i>		33 <i>Melissa sylvestris</i>	13
<i>Maiorana sylvestris</i>		33 <i>Melilotus</i>	593
<i>Mala granata</i>		34 <i>Melilotus nobilis</i>	594
<i>Mala Indica</i>		1037 <i>Meliloti Serapionis</i>	594
<i>Mala insana</i>		836 <i>Meliloti varia genera</i>	590.591.592
<i>Malua agrestis</i>		894 <i>Melo</i>	830
<i>Malua arborescens Theophrasti</i>		371 <i>Mentha agrestis tertia</i>	21
<i>Malua equina</i>		366 <i>Mentha agrestis altera</i>	21
<i>Malua Romana seu hortensis</i>	364	416 <i>Mentha sylvestris</i>	17
365.366		364 <i>Mentha</i>	18
<i>Maluaniscus</i>	371	<i>Mentha sativa</i>	18
<i>Malua unde apud Latinos dicta sit</i>	369	<i>Mentha rubra</i>	19
<i>Malua vulgaris</i>	368.369	<i>Mentha crissa</i>	19
<i>Malum terrestre</i>	905	<i>Menthastrum</i>	20.21
<i>Malus cotonea</i>	1039	<i>Mercurialis sylvestris</i>	192
<i>Malus</i>	1042	<i>Mercurialis variae species</i>	191
<i>Malus Persica, Medica, Assyria</i>	1033	<i>Mespilus</i>	204
<i>Malus Punica</i>	1037	<i>Mezereon</i>	959.
<i>Mandragora</i>	890.891	<i>Milium</i>	658
<i>Mandragora Morion</i>	891.895	<i>Milium exiguum</i>	661
<i>Mandragora unde dicta</i>	891	<i>Milium solis</i>	535
<i>Rosa Mariane</i>	130	<i>Milium solis maius</i>	916
<i>Marinella</i>	63	<i>Millesfolium sylvestre</i>	882
<i>Marrubium agreste</i>	30	<i>Millesfolium vulgare, nobile</i>	476.
		477	
<i>Marrubium campestre</i>	10	<i>Miracula nature in plantis</i>	75.117.
<i>Marrubium nigrum seu magnum</i>		217.271.394.585.651.718.760.764.766	
<i>Marrubium album</i>		<i>Moloches</i>	366.
<i>Marrubium palustre</i>		<i>Molua</i>	369
<i>Marsilica herba</i>		<i>Moly</i>	70
<i>Mater herbarum</i>		251 <i>Mora baticana</i>	971
<i>Matricaria</i>		345 <i>Moracelsi</i>	1047
<i>Matri sylva</i>	13.156	<i>Morus</i>	1047
<i>Muralium</i>	496	<i>Morsus diaboli</i>	246
<i>Medica herba</i>	194	<i>Morsus gallinae variae species</i>	384.
<i>Mel frugum</i>	594.	385	
<i>Melissa quamvis sit Traga</i>	660	<i>Multineruia</i>	227
<i>Melissa</i>	10	<i>Muralis</i>	194
	12	<i>Muscarij fungi</i>	942
		<i>Musci</i>	

I N D E X.

Musci uaria genera
Muscus terrestris
Myrica
Myrrhis Brunfelsij
Myrtillus
Myxaria

N

Napus
Narcissus coeruleus
Narcissus Germanicus
Narcissus luteus
Narcissus Theophrasti
Narcissus ueterum
Nardus agrestis
Nardus germanica
Nardus rustica
Nasturtiaria
Nasturtium agreste
Nasturtium aquaticum
Nasturtium hortense
Nasturtium pratense
Nepeta montana uera
Nepeta
Nepeta agrestis
Nepeta aquatica
Nerion
Neris
Nigella
Nigella Damascena
Numularia
Nux auellana
Nuxinglans
Nux lacustris
Nux uesicaria
Nymphaea candida
Nymphaea lutea

946 *Ocimum Catonis* 91
 555 *Ocimum citratum* 11
 962.954.955 *Ocimum generum omnium discernicula*
 472 185
 975 *Ocimum Dioscoridis quodam Trago*
 1022 29
Ocimum fluuiatile 31
Ocimum garyophyllatum 29
 730 *Ocimum ueterum* 648.649
 756 *Ocularia herba* 328
 577 *Oenanthe* 883
 757 *Olea* 1061
 760 *Oleaster* 1062
 753 *Olus atrum* 438
 60.66 *Olus Hispanicum* 325
 58 *Olyra* 647
 65 *Ononis* 869
 84 *Ophioglosson* 323
 82.84 *Ophris* 486
 82 *Orchios uaria genera* 778.
 81.82 779.780.781.782.783.
 83 *Origanum agreste* 45
Origanum Dioscoridis quanam herba Tra
 14 30 39
 15.17 *Origanum minus* 36
 16.17 *Ornus* 1109
 20 *Orobancha* 664
 917.918 *Oryza Germanica* 644
 917 *Oryza peregrina* 644
 117 *Os mundi* 625
 118 *Osteritium uulgare, syluestre, et montanum*
 807 433.434
 1096 *Osyris* 359
 1092 *Ouillea herba* 227
 842 *Oxalis* 315
 1097 *Oxalis minima* 316
 696 *Oxyacantha* 992.993
 697

HHh ij

Ocimastrum Tragi

185

I N D E X.

Oxytriphylon

P

Peonia

Peonia foemina

Peonia mascula

Peonia nobilior

Peonia vulgaris

Palma

Palma Christi

Pampinula

Pampinella

Panaces Chironium

Panaces Herculeum

Panicum

Panis cuculi

Panis porcinus

Papauer agreste seu nigrum

Papauer corniculare

Papauer erraticum

Papaueris uaria genera

Parietaria

Paritaria

Parthica uiola Barbari

Parthenion

Parthenium

Passerina

Passula

Pastinaca

Pedicularia campestris

Pentaphylon uerum

Peplis

Pepo

Pera pastoris

Perdicaria

Perdicium

Perfoliata

Perfoliata sylvestris

Periclymenon

Peristereon

Persica arbor

321 Persicaria

Persicaria altera

581 Personatia

582 Peruinca

583 Pes leporis

582 Pes leporinus

581 Petasites

1053 Petrasindula

289 Petrapium

467 Petrella

467 Petroselinum

431 Petroselinon Alexandrinum

423 Petroselinum Macedonicum

660.661 Petroselinum peregrinum

521 Peucedanon

632 Phalaris Dioscoridis

118 Phaselus Romanus

124.125 Phasioli

120 Phasioli Tragi

124 Phlogion

193 Phlox

194 Phu nobile

567 Phyteuma Tragi

194 Pilosella

149.157 Pilosella sylvestris

535 Pimpinella Italica

1055 Pimpinella uaria genera

439 Pinus

250 Piper aquaticum

503.507 Piperis historia

402 Piper Indianum

830 Piperina

215 Piperitis

194 De Pisis sententia Tragi

199 Pisi uaria genera

483 Pisum Græcorum

485 Pistacia

823 Pituitaria

211 Planta leonis

1029 Plantaginis uaria genera

Platanus

92

91.92

838

394.395

66

266

416

467

462

285

460

436

467

462

880.881

669

290

611

612

564

564

62

254

266.279

329

469

466.467

116

92

929

931

89

89

606.607

605.606

613

1098

903

512

225 & 226

I N D E X.

Platanus	1125	Pulegium sylvestre	25
Plumbago	92	Pulicaria	168
Folium alterum Dioscoridis secundum Tra-		Pulmonaria	251. 523
gum	333	Pycnocomon	283
Polycnemon	393	Pyrethrum	458
Polygalon	571	Pyrus	1045
Polygonaton	130	Q	
Polygonaton Euricij Cordi	399		
Polygonon alterum	393	Quercus	1102
Polygonon mas	391	Quercula minor	205
Polypodium	539	Quinquefolium Tragi	507. 508
Polytrichi: uaria genera	528	Quinquefolium, cuiusq; uaria species	505.
Polytrichon officinarum	530	506 & 507.	
Pomanerantia	1032	Quinquanervia	127
Pomelea	251	R	
Pomum mirabile	898		
Pomum spinosum	896	Radicula	901
Populus alba	1080	Radix	733
Populus nigra	1083	Ranunculus	95
Porrage	238	Ranunculus dulcis	99
Porrum agreste	751	Ranunculus exiguus	96
Porrum sectiuum	747. 743	Raphanus	731. 732
Portulaca agrestis	380	Raphanus maior	734
Portulaca hortensis & sylvestris	381.	Raphanus sylvestris	632
382	382	Rapum	728
Portulaca maior	374	Rapum sylvestre	905
Potamogeton	688	Rapunculum hortense	911
Potentilla	63	Rapunculum sylvestre	726
Primula Veris	162	Rapunculum uulgare	725
Probatton	46	Reſta bouis	869
Prunella Argentinesium	312	Rhabbarbarum Monachorum	314
Prunellæ uaria genera	309. 310. 311	Rhamni alia species	979
Prunus	1019	Rhamni tertium genus	978
Prunus sylvestris	1016	Rhapontica	138
Pseudomelanthion	131	Rhodia radix	913
Pſora	244	Rhodia Rhiza	498
Pſyllium	167. 168	Ribes	995
Ptarmice	160	Ricinus	288
Pulegium	23	Ropertiana	108
Pul-gium agreste Serapionis	17	Rosa	986

I N D E X.

<i>Rosa campestris</i>	989	<i>Sancti spiritus radix.</i>	323
<i>Rosa canina</i>	986	<i>Sanguinalis</i>	211
<i>Rosa Græca & matronalis</i>	965	<i>Sanguinaria</i>	215
<i>Rosa hortensiana</i>	989	<i>Sanguinaria radix</i>	348
<i>Rosa uaria genera</i>	990	<i>Sanguinaria multe</i>	714
<i>Rosmarinus</i>	55	<i>Sanguisorba</i>	467
<i>Rostrium porcinum</i>	263	<i>Sanicula</i>	510
<i>Rubea</i>	108	<i>Sanicula formina</i>	510
<i>Rubia tinctorum</i>	497	<i>Saponaria</i>	253.900.
<i>Rubi uaria genera</i>	969	<i>Sardea herba</i>	95
<i>Rubus canis</i>	985	<i>Satureia</i>	45
<i>Rubus Idæus</i>	971	<i>Satyrion maius</i>	185
<i>Rucula</i>	104	<i>Satyrionum uaria genera</i>	778.779.
<i>Rumex acutus</i>	321	780.781.782.783.784.785.	
<i>Rumex hortensis</i>	314	<i>Sauina sylvestris</i>	556
<i>Rumex palustris</i>	317.319	<i>Saxifraga alba</i>	525
<i>Rumex unctuosus</i>	319	<i>Saxifraga rubea</i>	531
<i>Rumpi saxum</i>	516	<i>Saxifraga uox multis & uarijs attribui-</i>	
<i>Ruscus</i>	919	<i>tur plantis</i>	525
<i>Ruta exigua</i>	68	<i>Saxifragia maior</i>	879
<i>Ruta muraria</i>	530	<i>Saxifragia rubea</i>	883
<i>Ruta sylvestris</i>	69	<i>Scabiosa uaria genera</i>	243
<i>Ruta ulgaris</i>	68	<i>Scariola</i>	169
		<i>Scarlea</i>	50
		<i>Scilla</i>	909
		<i>Scirpus</i>	684
<i>Sabina</i>	1071	<i>Scolopendria quonam in Dioscoride refec</i>	
<i>Salicaria</i>	182	<i>renda</i>	552
<i>Salinaris herba</i>	458	<i>Scolopendria uera</i>	551
<i>Salix</i>	1077	<i>Scolopendria uulgaris.</i>	549
<i>Salvia angustifolia</i>	51	<i>Scolymus</i>	866
<i>Salvia latifolia</i>	51	<i>Scoparia herba</i>	342
<i>Salvia sylvestris adulterina</i>	53	<i>Scope Amerina</i>	954
<i>Salvia sylvestris uulgo uocata</i>	14	<i>Scordium</i>	885
<i>Salvia sylvestris uera.</i>	52	<i>Scordoprason</i>	745.749
<i>Salusandra</i>	118	<i>Scrophularia</i>	374
<i>Sambucus</i>	997	<i>Scrophularia exigua</i>	114
<i>Sambucus aquatica</i>	1002	<i>Scrophularia media.</i>	185
<i>Sambucus sylvestris</i>	1000	<i>Sebesten</i>	1021
<i>Sampetra</i>	526	<i>Secale</i>	647
<i>Sanamunda</i>	66		

I N D E X.

<i>Sedi minoris uaria species</i>	378.379	<i>Sinapi candidum</i>	104
<i>Sedum</i>	376	<i>Sinapi satium</i>	104
<i>Sedum agreste</i>	209	<i>Sion non odoratum</i>	187
<i>Sedum maius, minus & medium</i>	380	<i>Sion odoratum</i>	461
<i>Seli</i>	879	<i>Sium</i>	84
<i>Semen sanctum</i>	339	<i>Sisarum</i>	440
<i>Semperuium maius</i>	376	<i>Sisarum Columelle</i>	911
<i>Sena</i>	994	<i>Sison hortense</i>	462
<i>Senecio</i>	285	<i>Sisymbrium</i>	84
<i>Senecio maior</i>	287	<i>Sisymbrium secundum Dioscoridis</i>	
<i>Sennicula</i>	540	465	
<i>Sentes</i>	971	<i>Smilax aspera</i>	814
<i>Septineruia</i>	227	<i>Smilax hortenſis</i>	615
<i>Seriphium Germanicum</i>	338	<i>Smilax leuis Trago</i>	816
<i>Seris</i>	268	<i>Smilacis genera</i>	816
<i>Serpentaria</i>	807	<i>Smyrnion</i>	433
<i>Serpentaria radix</i>	252	<i>Solanum hortense</i>	301
<i>Serpyllum Italicum</i>	42	<i>Solanum vulgare</i>	303
<i>Serpyllum maius</i>	61.63	<i>Solatrum</i>	304
<i>Serpyllum Romanum</i>	44	<i>Solidago</i>	162
<i>Serta campanica</i>	594	<i>Solidago Sarracenica eiusq; species</i>	487
<i>Sertula campana</i>	594	488	
<i>Sesama</i>	655.656	<i>Solidago Sarracenica sed non uera</i>	277
<i>Seseli</i>	878	<i>Solis Thymiana</i>	56
<i>Seseli Massiliense</i>	879	<i>Solsequium</i>	274
<i>Seutomalachon</i>	326	<i>Sorbus</i>	1012
<i>Sideritis Crateue tertia</i>	80	<i>Sorbus Torminalis</i>	1010.1011
<i>Sideritis III Dioſco.</i>	108	<i>Sparagus</i>	223
<i>Sigillum Salomonis angustifolium</i>	400	<i>Sparganion</i>	677
<i>Sigillum Salomonis latifolium</i>	399	<i>Spargula</i>	498
<i>Sigillum Salomonis non est Elleborus</i>	al	<i>Spartion</i>	962
<i>bus</i>	399	<i>Spelta trium generum</i>	642
<i>Siler montanum</i>	877	<i>Sphatula foetida</i>	904
<i>Silicia</i>	597	<i>Spica</i>	58
<i>Silicula</i>	597	<i>Spina acuta</i>	992
<i>Siligo</i>	646	<i>Spina alba</i>	857
<i>Siliqua</i>	597	<i>Spinachia</i>	326.325
<i>Siliqua Theophrasti</i>	612.615	<i>Spina Mariae</i>	989
<i>Siliquastrum</i>	928.931	<i>Squilla</i>	909
<i>Sinapi agreste</i>	104		

I N D E X.

<i>Staphis agria</i>	902	<i>Tragus frumentaceus</i>	644
<i>Staphylini tres</i>	443	<i>Tribulus aquaticus</i>	841
<i>Stoechas</i>	213	<i>Tribulus campestris</i>	844
<i>Stramonia</i>	896	<i>Tribulus terrestris</i>	840
<i>Stratiotes</i>	478	<i>Trichomanes</i>	530
<i>Succisa</i>	245	<i>Trichon</i>	304
<i>Superba</i>	575	<i>Tria usitati apud ueteres. Trifolij genera</i>	
<i>Symphytum</i>	241	589	
<i>Symphytum exiguum</i>	241	<i>Trifolij nomenclatura late patet</i>	585
<i>Symphytum petraeum</i>	510	<i>Trifolium</i>	501

T

<i>Teda</i>	1119	<i>Trifolium aureum</i>	519
<i>Tamariscus</i>	954	<i>Trifolium caprinum maius</i>	600
<i>Tamarix</i>	954	<i>Trifolium ceruinum</i>	490
<i>Tanacetum</i>	158	<i>Trifolium Dioscoridi peculiariter</i>	<i>τριφυλλον</i>
<i>Tanacetum album</i>	158	<i>dictum</i>	587. 588
<i>Tapsus barbatus</i>	218	<i>Trifolium pratense</i>	585. 586
<i>Taxus</i>	1070	<i>Trifolium ursinum</i>	594
<i>Telephion</i>	386	<i>Trifago</i>	205
<i>Telephium quorundam</i>	374	<i>Trithales</i>	377
<i>Teucrium uerum</i>	207. 208	<i>Tritici genera multa</i>	635
<i>Thalictroon Tragi</i>	569	<i>Triticum</i>	634
<i>Thlaspi</i>	87	<i>Triticum agreste</i>	113
<i>Thlaspidij genus</i>	14. 83	<i>Triticum nigricans</i>	663
<i>Thlaspidium secundum Crataeum</i>	85	<i>Triticum secundum Columelle</i>	647
<i>Thridazine</i>	260	<i>Triticum uaccinum</i>	663
<i>Thryllis</i>	219	<i>Tuber</i>	939
<i>Thymelea</i>	957	<i>Turbit</i>	299. 300
<i>Thymus</i>	44	<i>Turcicum frumentum</i>	651
<i>Tilia</i>	1110	<i>Tussilago</i>	53
<i>Tinearia</i>	332	<i>Tussilago</i>	417
<i>Tinctorius flos exiguus</i>	602	<i>Typha aquatica</i>	681
<i>Tipha magna</i>	652		
<i>Tithymalorum discernicula, et appellatio-</i>			
<i>nes</i>	292. 296. 297. 298. 299	<i>Vaccinia quorundam</i>	975
<i>Tordylion</i>	879	<i>Vaccinium</i>	569
<i>Tormentilla</i>	502	<i>Valeriana exigua</i>	62
<i>Tragium alterum</i>	160	<i>Valeriana uera</i>	60
<i>Tragopogon</i>	281	<i>Valeriana uulgaris</i>	61

V

I N D E X.

<i>Veragbium</i>	194	<i>Vitriolaris</i>	194
<i>Veratrum nigrum</i>	407	<i>Vlmus</i>	1087
<i>Verbasci uaria genera</i>	217, 218, 219	<i>Vnclufa</i>	240
<i>Verbasum</i>	218	<i>Vngula caballina</i>	417
<i>Verbasum maius</i>	218	<i>Vnfolium</i>	485
<i>Verbasum nigrum</i>	219	<i>Volubilis maior</i>	803
<i>Verbasculum</i>	219	<i>Volubilis minor</i>	806
<i>Verbena</i>	210	<i>Vrceolaris</i>	194
<i>Verbena foemina</i>	104		
<i>Verbenaca</i>	211	<i>Vrtica</i>	
<i>Verbenaca supina</i>	211	<i>Vrtica caustica</i>	
<i>Verbenaca supina Gesneri</i>	313	<i>Vrtica maior</i>	
<i>Vermicularis</i>	380	<i>Vrtica Romana</i>	
<i>Veronica</i>	208	<i>Vrtica sylvestris</i>	
<i>Vesicaria</i>	304	<i>Vrtica Labeo</i>	
<i>Vesicaria nigra</i>	897		
<i>Vesicula</i>	304	<i>Vsnea</i>	947
<i>Vicia uaria genera</i>	623, 624	<i>Vstilago</i>	661
<i>Victorialis</i>	194	<i>Vua crispa</i>	977
<i>Viola agrestis</i>	567	<i>Vua lupina</i>	308
<i>Viola alba Theophrasti</i>	752	<i>Vulgago</i>	65
<i>Viola canina</i>	557	<i>Vuularia</i>	926, 927
<i>Viola hyemalis</i>	568	<i>Vuularia</i>	397
<i>Viola lutea</i>	560		
<i>Viola nigra, purpurea, Martia, quadragesimalis</i>	557	X	
<i>Virga pastoris</i>	848	<i>Xanthion</i>	833, 840
<i>Viscum</i>	949	<i>Xiphion</i>	702
<i>Vitex</i>	1076	Z	
<i>Viticella</i>	820	<i>Zea</i>	55, 642
<i>Vitis nigra</i>	820	<i>Zinziberina</i>	89
<i>Vitis sylvestris</i>	818	<i>Ziziphus</i>	1023
<i>Vitis Vinifera</i>	1056	<i>Zucco marinus</i>	835
<i>Vitrigo</i>	190		

F I N I S.

HHh. v

INDEX GERMANICARVM AP

PELLATIONVM QVAE TAM ARBORIBVS QVAM

fruticibus et herbis in his Commentarijs adscribuntur.

A

Abbiß oder Teuffels abbiß	245	Fatzen Balsam	21
Aefclei oder aglei	137	Krauser Balsam	19
Aenis	115	Balsam spffel	898
amß samen	452	Barbel kraut	101
Alhorn	1123	Basilgen	29
Alant wurzel	170	wild Basilgen	21
Alb kraut	490	weiß Barthonien	201
Alraun	891	weiß Barthonien	199
Amarellen	1027	braun Barthonien kraut	199
Amney 875		Klein Barthonien oder barthengel	205
Ammelforn	636	Baum farn	538
waldr saurampffer	521	Bein wellen 140	Bellen 1081
wilder Ampffer	318	Bein hültzen	1006
büch Ampffer	520	Benedicten rosen	582
Andorn der groß	8	Benedicten wurzel	79
Andorn der weiß		wild Benedicten wurzel	518
feld Andorn		Bengel kraut	191
wasseroder weier Andorn	10.9.50	wald Bengel kraut	191
feld Anemone	131	Beren klaw	438
Angelick	423	welsch Beren klaw	863
wild Angelick	423	Ber lappen	554
Apffel baum	1043	Ber wurtz	446. 879
Apzullen blumen	96	Bertram	458
Aressel 1011		Besem kraut	342. 84
Aspenbaum	1083	vnser frawen Bestro	75
Artich	797	vnser frawen Bestro	493
Augen kraut	308	Bestler seil	805
Augen trost	328	Bestler leuß	840
Augen trost wild	329	Beyfuß	344
Augen wurzel	63	Beymenta	19
Augen wurzel	264	Bibernell	467
		Biberwurtz	179
		Biber hödlein	112
		Bynetsch	326
		Bynen kraut	465
		wolricchend eckechr Bintzen	916
		bintzen	

B

Bachbonen	187
Bachmünz	21
Klein Bachmünz	22
groß Bachbungen	188

I N D E X.

Bingen helmer	68; bülsen frau	132
Bingen	674. 686 weiß bülsen	134
groß weißer Bintzen	68; büben fist	943
Binsaug 6 Binsaug die gäl	13 büben sträl	848
Bierbaum	1046 büchbaum	107
Birck wurtz	502 buppen frau	318
Bircken baum	114 burgel	382
Bieren sampt jrē geschlechten	1046 burzes	238
Birzen bertz	954 burtzel	382
Bitter wurtz	176 büttel rosen	989
Blattloß	380 burbaum	1070
Blcken	642	
Blomenderlin	205	
Blürwurtz	349 Calmus	700
Blüt frau	391 Camillen	148
Blüt frau	714 Capren oder Cappres	968
Blüt oder rorwurtzel	502 Cardo benedict	863
Boborellen	304 edel Chamillen	149
Bocks hoden	833 S. Christoffels frau	625
Bocks horn	597 wild Christwurtzel	251
Bocks bart	281 Christwurtz	405
Bocks beer	973 Citrinaten	1032
Bonen	612 Citrullen	831
bonen	618 Colmar frau	388
welsch bonen	616 Coloquinten	829
bonen blatt	374 wasser Coriander	513
bracken distel	848 schwarz Coriander	118
brandlettschen	417 Coriander oder Coliander	114
braunnell	311 Cornelbaum	1025
braun wurtz	185 brunn Cress	82
groß braun wurtz	185 garten Cress	82
biemen	971 Creütz baum	289
bienn frau	218 Creütz blümen	570
bröseling	943 Creütz blümen	785
biombeer hecken	971 Creütz wurtz	285
biuch wurtz	374 Creütz wurtz	253
biuch beer	975 wild Cucumer	832
biust wurtzel	423 Cypressen	77
brant	666	
Bucken	344	

C

feld

I N D E X.

feld Cipressen

D

Sacrelbaum

Saubentropff

Saubentropff

Saufent gulden

Saufentschon

Sennmarck

Dick blatt/oder dick blumen

haber oder feld Distel

Drey Distel

meid oder jungfrawen Distel

weiß Distel

saw Distel

veh Distel

vehe Distel

genß Distel

Marien Distel

welsch Distel

raden Distel

wallen Distel

frawen Distel

weiß weg Distel

bracken Distel

zam garten Distel

wald Distel

Dudistel

Dudistel

Dinkel

wilder Dinkel

Dicram der gemein

Dicram auß Creta

Dollkraut

Doll öpffel

Dollwurz

Sonderbar

Sonderwurz

Sonder zäpfflein

Dort

80 Dort

Dosten

wasser Dost

1053 Dotterblumen

111 Dotterblumen

131 Dotterkraut

139 Drachenwurz

580 Drachenwurz

63 Dreib Körner

281 Dreib Körner

856 Dropffwurz

860 Drumpelbeer

855 Duschling

855 Dünnblatt

270 Durchwachs

850 wild Durchwachs

848 Dürzwurz

270 274 Syll

850

867

872 Eberwurz

872 Egelkraut

850 Eibenbaum

858 Eichenbaum

872 Acker oder grundteicheln

855 Eyerblumen

1068 Einblat

269 Einkorn

270 Eißholz

642 Eysenfraut oder Eiserich

671 Eysenfraut weiblein

927 Eysenhülein

26 Ellend

132 Eltz

895 Emmerling

304 Endiuin

377 zame Endiuin

168 Engelsfuß

580 Engelblümlein

359 Entian oder gentian

672

38

490

143

263

359

777

700

292

298

539

975

943

298

483

485

168

451

E

853

807

1070

1103

632

263

485

642

1103

211

104

248

872

334

1028

268

268

539

333

176

Ephew

I N D E X.

Epheu	803	Fenchel	447
roß Eppich	435. 438	roß Fenchel	427
feig blatern Eppich	112	sew Fenchel	446
groß Eppich	438	sew Fenchel	881
wasser Epff	96	wilder Fenchel	427
Baur oder wasser Epff	464	berg Fenchel	430
garten Epff/garten oder zam peter-		weier Fenchel	427
lein	462	welsch Feselen	616
Erbsal	992	Fäselen	612
Erbsen	603	Gäl färb blümen	963
Erdbær frau	501	Gäl ferb blümen	603
Erduß oder		Silzfrau	811
Erdsiegen oder	631	Singer frau	889
Erdrandlen		siben Singer frau	501
Erdrach	111	Flachs	355
Erdr gallen	829	Flachs dotter	656
Erdr weissen	380	Flachs frau	358
Ehrenbreiß	208	Flachs seiden	812
Erlen oder ellern baum	1085	braun Fleisch blümen	} 586
Ern rosen	366	weiß Fleisch blümen	
zyser Erweissen	609	Flöh frau	168
Esels öpffel	1105	Flöh frau	91
Eschröfel	1011	Flöh frau	399
waldr Eschern oder büch eschern	1126	wild Fornum græcum	1116
Eschern baum	1121	Födenbaum	374
		Förzwein	211
		Förzen ygel	374
	544	Förz zwang	205
	538	frawen biß	989
	159	frawen dorn	12
	538. 539	frawen frau	163
	547	frawen frau	564
	202	freißam oder dreysaltigkeit	227
	982	froschlöffel	507
	1051	fünff finger frau	
	621		
	112		
	1079	Gäng blüm	144
	351	wild Galgan.	916
	662	Gallöpfel	1105

S

grosse faren oder farn frau
 eichel farn
 weisser oder spitzer rein farn
 stein farn
 wald farn
 fasten blümen
 Saul baum
 feigen baum
 feig bonen
 feig warzen frau
 selbinger
 semel
 fench vnd heidel fench

G

Forner, frant

I N D E X.

Gamander	105	Goldt öpffel	1049
Ganfer frau	342	Goldt knöpfflein	926
Garb	478	Goldt wurtz	107
edel Garb	478	Goldt wurtz	788
groß Garb	481	Gots gnad	107
wild Garb	883	Granat öpffel	1037
Garrhagen	342	riedt Gras	678
Gauch blüm	403	weg Gras	390
Gauchbirot	281	weg Gras	678
Gauchbirot	521	enten Gras	682
Gauchblumen	84	Gras blumen	577
Gauch heyl	388	Grensel	382
wasser Gauchheil	187	Grensfich	
Geißblat	823	Grensfing	
Geißbart	283	Grenserich vnd	479
Geißholz	1006	Genserich	
Geiß kirbs	829	Grindt magen	120
Geiß süß	715	Grindt frau	244
Geiß frau	385	Grindt wurtz	318
Geißfüßel	305	Großelbeeren	978
Geiß zungen	269	zame Großel	995
Gerinsel	749	rote Großel beerlein	995
Gerlin	440.	Gruntheil	208
Gierlin	873	Gulden gunsel	312
Gerlin Gierlin	911	Gundelreb oder grundtreb	799
groß / klein Gersten	640	Gürgelein	911
Gert wurtz	342		
Gerwel	478		
Gewand salben	888		
Gicht wurtz	582	Habern	654
Blaw Gilgen	700	gauch oder meiß Habern	669
weiß Gilgen	794	Hacket frau	414
wasser Gilgen	696	Hacken blatt	397
gäl wasser Gilgen	700	Hafft frau	512
Gleiß	462	Hagendorn	985
Glydweich	131	Hag öpffel	985
Glydweich	399	Hag reich	1103
Glydweich	568	Halß freutter	926
Goldblumen	99	Hanen bein	714
rot goldt Gilgen	791		

Han

I N D E X.

Ban büchen oder Eagenbüchen	1108	Heyderling	942
Banbüttel	989	heylgen geists wurtzel	423
Banff	32	heilwurtz	370
Banenfüß	96	heilender	797
Banen famp	221	güt Heinrich	317
banenkopff	6	stoltz heinrich	718
merzen banenfüß	98	Belffe	208
Klein Banenfüß	96	hendelkraut	402
süßer Banenfüß	97	Herbst rosen	366
Banhöddlein	983	herigotts bertlein	469
barbeer	201	Hertz freude	496
Barnkraut	529	hertz frau	12. 13
barnkraut	358	Hertz gesper	18
Barschar	554	hewheckel	869
barstrang	881	Bilffwurtz	372
Barriegel	3003, 1005	himmel schlüssel	201
bartzbaum	1116	Himmel brande	218
Barwurtz oder barstrang	696	hynsch frau	179
groß Barthaw	75	Hynsch frau	337. 812
gemein barthaw	73	hirß	609
Klein barthaw	73	kleiner oder wilder hirß	662
zwei hecken Barthaw	73	Mör hirsen	535
Basen pfötlein	266	wilder mörhirß	536
basen pfötlein	332	grosser meerhirsen	917
Basen pfötlein	593, 595	welscher Hirß	660
baselnuß	1095	Birschholder	1000
Basendelin	943	hitz wurtz	446
basen ölein oder basen brode	672	schwarz hirtzwurtz	446
Basenstrauch	265	Hirtz jung	512
baselwurtz	65	holder oder holunder	997
Baug wurtz	377	bachholder	1003
beckel frau	869	waldholder	999
Beyd	952	feld	
heydel beeren	975	holder	797
Heyden blümlein	577	summer	
heyden flachs	359	Holwurtz	769. 773
Heyden Korn	649	hopffen	812
heyden schmuck	603	Harbeeren	971
Heydnisch blüm	788	hoinungs blumen	754. 772
		blaw Merzen oder Hoinungs blü-	
		men	756
			841

I N D E X

Gelb Hornungsblumen	757	Jüngling	323
weiß Hornungsblumen	754		
Hünerseb	41	Kalbsaug	144
Hünerdarm	385	Kappes	718
Hünerseb	385	Kartendistel	848
Hünerbiß	385	Kartzenfraut das wild	16
Hundsdorn	985	Kartzenfraut	17
Hundsfraut	192	feld Kartzen	332
Hundsf Knoblauch	751. 771	Kartzen schwantz oder Kartzen wadel	694
Hundszung/hundsfraut/hundst			380
wurtzel	230	Kartzentreibel	958
Hundtbeeren	971	Kellers halß	642
Hüftenkreutter	417	Kern	1099
Hüttelbeer	501	Kestenbaum oder Castanienbaum	332
Hymbeeren	971		1076
Hynfuß	423	Kätzlein	41
Hyfop	47	Keuschbaum	614
feld Hyfop	221	Kienlein	614
Kirch Hyfop	47	Rechern oder Fichern	359
wilder kirchhyfop	37	wild Rechern	1017
garten Hyfop	45	Kimmel vnd Klüel	1028
zwibel Hyfop	45	Kirschenbaum	1028
Heyden yfop	221	wild vogel Kirschen	1028
		Bloder Kirschen	1028
		groß bundt Kirschen	1028
		187 welsch Kirschen	1025
		815 weiß Kirschen	1028
		12 groß Klapperrosen	1280
		72 klein Klapperrosen	151
		344 Kartzenwurtzel	63
		374 Klebfraut	495
		144 Klee	585
		287 guckganchs Klee	520
		344 saur Klee	520
		371 gulden Klee	519
		380 spitziger Klee	589
		304 wif-n Klee	586
		329 hirtz Klee	490
		671 Beren Klee	594
		478	groß
S. Jacobs blüm			
Je lenger je lieber			
Zinnenkraut			
S. Johans kraut			
S. Johans kraut			
S. Johans kraut			
S. Johans blüm			
S. Johans blüm			
S. Johans gürtel			
Juden kraut			
Juden treubel			
Juden Kirschen			
Jungfrawen haar			
Jungfrawen haar			
Jungfrawen angbrawen			

I N D E X.

groß geiß Blee	600	Korn rosen	120
stein flec	593	fagen Kößfel	111
hünerflee	41	Kriechen	1018
gulden oder flein steinflee	594	gäl Kriechen	1019
wolriechender flec	589	Krotten oder hunds dyll	150
hasenflee	266	Kurbeer baum	1025
fagen flec	595	Kümel	41
Kletten	838	mözen Kümel	835
waldr Kletten	844	langer wald Kümel	879
feldt oder acker Kletten	844	herzen Kümel	875
Kletten fraut	196	weg kümel	455
flein Kletten	840	roßkümel	430
Knaben fraut	374. 380. 385	Mozenkümel	879
Knawel	393	roßkümel	446
Knoblauch	746	roßkümel	877
aber Knoblauch	750	breit wald kümel	879
wald oder hunders knoblauch		süßer kümel	453
749		wisen kümel	455
flein hunders knoblauch	751	Rühorn	597
lachen knoblauch	885	Rüweissen	664
Knospen	681	Rüschellen	414
Köl	722	Rünigunds fraut	1490
zam garten Köl	876	Rünigs ferg	218
gräßköl	861	Rünigs blümen	582
rot Köl	714	Rörß	825
groß zam Köl	722	bitter fürbs	829
frauß Köl	722	wild fürbs	829
hunders Köl	192	wild fürbs	820
hüner Köl	41	Rürbslin	829
wisen Köl	861	Rüttel fraut	542
Kollerwurz	696		
Kößfel oder Kößel fraut	472		
Korn	636	Lattich	260
Korn	642	strupff Lattich	318
Turckisch Korn	652	wisen Lattich	263
Welsch Korn	652	frauser Lattich	326
Korn blümen	566	brandt Lattich	417
wald Korn blümen	219	weg Lattich	263
Kornroß	131	wilder Lauch	751

L

I N D E X.

Läwendel	58	wilder Maieron	24
groß Lauch	750	zamer Maieron	32
Leberfraut	496	Mandelbaum	1090
brunnen Leberfraut	523	Mangolt	708
edel Leberfraut	519	holz mangolt	706
Leinbaum	1106	waldr mangolt	706
Lerchenbaum	1119	wilder mangolt	318
Letschen	838	wisen mangolt	705
Leitichel	85	Manstrew	872
Leitichel oder eschleitichel	741	vnser frawen mantel	511
Leitßbaum	982	Margen drehen	785
Leitßwurtz	903	Mariendorn	989
Leitßfraut	251	Maßholder	1123
Lewenzan	263	maßlieben	162
Lewen süß	511	maßsüßlen	162
Lybstöckel	427	mattenblümen	143
Lydweich	130. 131	matten flachs	683
waldr lilien	823	Maulbeerbaum	1047
speck lilien	823	maurrauten	531
Liesen	681	meerlinsen	691
Limonen	1032	meerrhetich	735
Lindbast	1088	Meerrtreibel	1055
Lynkraut	358	megelkraut	469
Linkraut	359	Megelkraut oder megerel	493
Linen	818	meidblümen	156
Lindenbaum	1112	Meidkraut	345
Linsen	629	Meien blümlin	173
schwarzlinsen	625	meien kraut	112
Löffelkraut	483	meyle	32
Lorbeerbaum	1065	meier	385
Lungenkraut	349	meister wurtz	434
Lungenkraut	523	Melangen	895
		groß Mälbaum	1008
		Melonen	832
	1007	Mengelwurtz	583
	1007	Menschen dieb	960
	122. 124	Mienwelwurtz	318
	123	Merien rößlin	130
	715	Mergenblümen	261. 754
	32	weiß Mergen violen	754

m

Merter

I N D E X.

Metter	139	Nackete blümen oder Nackete hüren	
Metter/mütterkraut	156	760	
groß meißor	277	Narcissen rößlin	753
meißdorn	920	Narzen kolben	682
klein Meißor	279	Naterzünglin	323
meißdörlin wild	329	Negelin	577
meißdörlin	266	Indianisch negelin	924
breit milchkraut	298	wild oder feld negelin	557
sonnen milchkraut	298	Niept	15
klein acker milc	712	acker nept	15
milten	712	acker nept	16
hunds milten	715	Niespelbaum	1015
mist milten	714	Nessel	6
milzkraut oder monkraut	552	heiter nessel	6
Modelger	253	daub nessel	6
Möllelin	1030	rothen nessel	6
mön	124	Kleinheil oder Kleingleich	554
mörder	960	schwarz nießwurz	407
Morchellen	942	weiß nießwurz	409
Morellen	439	Nußbaum	1093
Mooß	947	wasser nuß	842
moßblümen	143	seenuß	842
mottenblümen	332	weier nuß	842
mottenkraut	926	nüßmörder	903
gewand oder motten samen	887		
mucken kraut	92	Ochsenbrech	869
münch kopff	263	Ochsenzung	235
münchs köpfflin	898	groß ochsenzung	232
Münz	19	ochsenzung vom ham	235
rote münz	19	wald ochsenzung	234
fraußmünz	19	welsch ochsen zung	233
berg münz	38	Odermenig	514
roßmünz	21	ölsamen	124
mundrholcz	1006	Augst öpffel	1044
mütterkraut	12.345	erd öpffel	891 905
mürwillen	577	hunders öpffel	891
Mystel	950	Indianisch öpffel	836
		S. Johans öpffel	1043
Nabelkraut	358. 483	summeröpffel	836
Nabelsamen	495		

N

I N D E X

wurtz öpffel		Pfeffer	931
schrägen öpffel		kloster oder münch pfeffer	1076
bergots öpffel		maur Pfeffer	380
gens öpffel		(1044) meuß oder ratten Pfeffer	903
holz öpffel/ vñ vil andere geschlechter		Teütsch oder Indianischer pfeffer	
Olender	918		931
Olbaum		wasser pfeffer	92
wild Olbaum	1062	pfeffer frau	89
Omfraut	511	pfenning frau	807
Orant	362	pfer sing baum	1030
Osterlucy	179	pfer sing	1030
		pflaumen	1018
		dama scener pflaumen	1018
stech Palmen	1068	blaw	
Pappeln	369	bülßen	pflaumen 1020
garten oder römisch Pappeln	366	herbst	
gens Pappel	369	schaft	pflaumen 1020
hasen Pappel	369	groß roß	
raß Pappel	369	pfrimmen	962
roß Pappel	369, 416	acker pfrimmen	362
venedeger Pappeln	92	erdt pfrimmen	602
Pappelbaum	1081	pfifferling	943
Pastemen frau	144	pimpernißlein	1097
Peonien rosen	582	poley	23
Pestilenz wurzel	416	wilder poley	41
Pestnachen	439	pomeranzen	1032, 1036
Peterlein auß Alexandria	438	portz	954
frembder Peterlein	462	porzel frau	382
S. Peters korn	642	psyllen frau	168
S. Peters frau	193, 253	pungen	187
S. Peters schlüssel	201	bach pungen	187
Pfaffen blatt	263		
Pfaffen boden	761		
Pfaffen höddlein	112	Quecken	670
Pfaffen frau	12	Quendel	41
Pfaffen pint	775	welscher Quendel	43
Pfaffen röslin	274	Quetschen	1018
Pfawen frau	92	fütten oder Quitten	1040
Pfawen spiegel	92		
Pfeden	832	münch Rhabarbarum	314
		groß	

I N D E X.

groß Raden	131	rosen beumlin	918
Käbstock	157	Damascener rosen	990
wild wein Käben	1057	feldt rosen	989
Kammenhödlin	112	haber rosen	989
Kamsel	570	Han rosen	989
Kamseren	749	wildt hecken rosen	989
Kappenfüß	99	pfingst rosen	582
Kapungel	725	rot rosen	990
wald Kapungel	725	wein rosen	989
zam garten Kapungel	911	weiß rosen	990
Kassel	91	winter rosen	990
groß Kaucken	102	Rosen wurg	913
Flein Kaucken	103	roßbeeren	975
Kauten	70	roßhüb	417
mon Kauten	914	roßschwanz	692
wein Kauten	70	roßzan	135
Rheinblümen	332	rungulsen	708
groß Rheinblümen	359	Rüben	729
Reinsaren	158	geele rüben	443
Reinweiden	106	rohre rüben	443
Reysß	644	weisse rüben	443
Teürsch Reysß	143. 644	zam rüben	729
Rhetrich	732	wild rüben	729
Rheling	943	feld rüben	729
Riedt	676	steck rüben	730
Flein Riedtgrasß	679	sticckel rüben	730
rinder wurzel	252	biorsfeldisch rüben	730
ringelblümen	146	baumholder rüben	730
rittersporn	241. 569	waldt rüben	906
gäl rittersporen	358	erd rüben	906
rocken	646	wild rüben	820
rodel Fraut	251	rhurfraut	328
rödr	497	rüstholtz oder	
römisch Föl	708	rüsterbaum	
römisch kummel	458. 876	feldrüster	1088
rhoz	675		
waldt roz	685		
Flein roseinlin	1055	Saffran	764
Rosmarein	55	wilder Saffran	845
Rosen	988. 990	breit Salbey	53

S

I N D E X.

edel salbey	33 haber schlehen	1017
groß salbey	36 schlippen wurzel	322
klein salbey	33 schlotten blümen	414
oricht salbey	33 schlutten	304
spiz salbey	33 schwarz oder welsch schlutten	598
waldr salbey	35 schmalcz blümen	99
wild salbey	616 schmelen	683
Sammal blümen	924 schmerbel	319
sain kraut	689 schmerwurtz	140
sanickel	510 schnitlauch	714
Sarbaum	1081 fleinschöl kraut	107
saffkraut	85 schölwurtz	107
satucey	46 schorbocks kraut	112
sawbonen	132 schoßwurtz	342
sawerach	992 vnser frauen schüchlin	594
scabiosen	244 schwalben kraut	114
schaben kraut	926 schwalben wurtz	181
schaffibew	692 schwamm	943
klein schaffibew	694 holz schwamm	943
schaffmül	1076 schwertel	700
schaffrip	478 schwebel wurtz	881
schaffzung	235 schweins tod	303
schampanier wurtzel	410 schwelcken	1008
schantz wurtz	140 zunder schwemm	943
wild scharlach	50 eich schwemm	943
zam scharlach	50 hendel schwemm	943
scharten kraut	107 mucken schwemm	943
scharten kraut	153 rodt oder angstschwemm	943
scheißkraut	358 gäl schwertel	700
scheißköner	298 kleinblaw schwertel	702
scheißmilt	712 himel schwertel	704
klein schellen	804 see blümen	696
schirling	474 gäl see blümen	696
schirling kraut	349 seidelpast	959
schlaffkraut	132 seiffen kraut	901.253
schlangen kraut	807 seiden	811
schlangen wurtzel oder nater wurtzel	seil oder gürtel kraut	554
322	senet	964
schlangen wurtzel	251 senff kraut	89.104
Schlehen	1017	Garten

I N D E X.

gärten senff	104	staudel beeren	978
galer senff	101	stechas kraut	218
wasser senff	104	rauch oder stechöpfel	896
seckel kraut	84.215	stein eppich oder stein peterlin	642
birten seckel	215	steinsarn	553
feuenbaum	1072	stein/streich oder sterckblümen	152
waldr feuenbaum	556	groß steinbrech	104
sewbror	632	rot steinbrech	531.883
sewdistel	860	weiß steinbrech	426.535
sewfraut	104	stendel wurtz	774.786
sewplag	305	stoploch	483
sew rod	715	storcken oder frannich schnabel	349
seilbaum	805	sterck kraut	362
siben gezeit	588	stern kraut	38
sichel moeren oder sichel kraut		klein streichblümen	60
664		streich kraut	362
sinnaw	511	strobildorn	867
sonnen würbel	263	steyppert	318
sorgsamen	660	summer dorn	263
spargen	223	süßholtz oder süßwurtz	937
spatzen wurzel	901	süßwurtzel	539
speichel wurzel	901.903.458	sygmarswurtzel	366
speirling	1013	symons wurtzel	366
sperwerbaum	1011.1013	sympsen	686
sperwel fruchte	1013		
speren stich	254		
spelez	642		
spicanard	58	T	
spilling	1019	Tällen	1119
blaw spilling	1020	Matten oder wisen täschen	251
spinnat	326	Tag vnd nacht	193
spindelbaum	983	Tamariscen	954
spitzling	654	schwarz oder rot tannen	1119
splyspettel	131	weiß Tannen	1119
springkraut	192.292	Teschelkraut	84.215
springföner	298	Teuffelsblümen	328
springtsamen	292	Teuffels kirsen	304.820
spißkraut	227	Teuffelsflawen	554
stabwurtz	342	Teuffels milch	298
stalfraut	869	Teuffels trauben	223

I N D E X.

Thierlinbaum	1025	Walddrehen	818
Todten frau	395	groß waldwurtz	140
Todtern	81	klein waldwurtz	241
Tormentill	502	wälstro	493
S. Johans Treübel	995	wandtleißfrau	904
Traubenfrau	887	wasserbungen	187
hertling Trauben	1060	schwarzwolfrant	218
		webersträl	848
		weckholterbaum	1074
Vchtblimen	760	wegditt:	390
Vergiß mein nit	205	wegdornbeer	980
Versing	992	breiter Wegrich	227
Vihwurtz	208	roter wegrich	227
Vichtannenbaum	1116	spitzer wegrich	227
Violen oder Nertzen Violen.	557	wasser wegrich	227. 485
groß Violen	568	wegwart	272
hundes Violen	557	zam wegwart	273
Todten Violen	395	wegweiß	274
weiß acker Viol	568	Weidenbaum.	1079
winter Violen	568		
gäl.		bandt	
weiß		bruch	
braun.	} Violaten: 562	weiß	} Weiden 1079
rot		gäl.	
leibfarb.		bach	
Teütsch Violwurtz		seil	
Ulmerbaum	704		
Unholden fertz	1088		
Unholden frau	218	wild weidfrau	293
Unkraut	918	weinstell	1027
Unnütz sorg	672	Weissen	63
Vogel frau	564	weißglocken	804
	385	weissen kolben	636
		welscher weissen	636
		weiß wurtz	399
Waide	257	welschfrau	901
wild Waide	257	welschschwertel	904
Waldglocken oder waldschellen	889	wellsamen	538
Waldhenle	96	wundwurtzel	63
Waldhopff	75	Wermüt	334
Waldmeister	496	Acker wermüt	335

wersen

I N D E X.

werfenbeer	980	Wunderbaum	289
Wetter kraut	987	Wundtfräut	374.431.808.423
Wetter rößlein	922	153.489.423	
Wexel	99	heidnisch Wundtfräut	277.489
Weyderich	182	Wurmkräut	160
Wicken	625		
stein Wicken	594		
vogels Wicken	593.614	Ybisck	371
roß Wicken		Yffenholz	1088
groß Wicken		Yngrün	1088
zam		floster Ysop	47
felde	625		
walde			
weiß Wicken	626	Zapffenblatt	397
Widerschein	917	Zapffenholz	982
Widerstoß	130	Zapffenkreutter	926
Wider todt	529	Zaumkräut	512
Wicholen	1027	Zeckenböner	289
Winde	804	Zedern	671
Klein oder schwarz Wind	665	Zeilandt	958
stechende Winde	814	Zeitlosen/oder wifen zeitlosen	760
Winter grün	191.706	weiß Zeitlosen	754
Winterkräut oder winter weissen		Zeitlößlein	162
380		Zeunling	823
Winterrosen	366	seu Zibel	773
Wifenblumen	99	wild Zitterwen	820
braun Wifenblumen	312	Zumpnkräut	374
gäl wifenblumen	143	Zütterkräut	318
Wirscherlewettsch	423	Zweiblat oder zweiling	485
Wolffsbeer	308	Äcker	
Wolffs milch	298	wilte	Zwibel 741
sonnenwendende Wolffs milch	298	felde	
wild Wolffs milch	358	hundts Zwibel	751.771
Wolffs wurz	248	meuß Zwibel	909
Wolgemüt	38	Zybel	738
Klein Wolgemüt	36	meer Zwibel	909
Wurmkräut	337	groß sam Zybel	739
Wütrich	474	roth	
Wullkräut	218	schwarz	Zyser 609
Wundelbaum	289	weiß	

INDEX NOMENCLATURAE STIR- PIVM ARABICAE.

A

Aaron	Altoſta	794
Abel	775 Altercangenon	135
Abſinthium Romanum	1072 Alſcebram	386
Aca	335 Anaxue	875
Aglyphrois	992 Aniſum	453
Abhacaz	583 Albatheca	833
Albes	104 Ammeos	456
Achuen	475 Arbor Marie	56
Alpheſera	357 Armorachion	735
Alcartachar	820 Aſalis	465
Alphocenus	230 Atrog	1035
Alnegeu	20 Aſtonchos	535
Affurſung	25 Aſſaraticon	872
Abalzemer	223 Apmalphach	56
Aſat	965 Andrage Agria	386
Azaba	594 Artemiſia	342
Alifiſcat	38 Araba	25
Alchata	594 Ardas	41
Alchiſon	260 Ardanema	41
Alnam	199 Arz	1116
Alcarphar	24 Axneeh	947
Alhazarafin	954 Almes	614
Alnegea	820 Amachim	185
Alchartama	28 Andrachabora	386
Alharib	873 Auſig	978
Alchelilamelech	75 Alpharphas	475
Alſcebra	594 Alibleb	192
Algingibel	299 Arbor Abrahe	1076
Alunchara	444 Albelengeſif	345
Alſaran	125 Aſtulba	598
Aegarelchaar	172 Abrotonum ſylueſtre	345
Amirberis	1065 Alchzaaber	230
Albaſce	992 Altercuz	125
Alcharſas	223 Alcherſ	81
	465	
	Alphagel	

I N D E X.

Alphazel
Alphas
Archev
Alfa

733

594

81 Cannabiri

372 Cacos

Carmezit

Catfmu

25 Carohon

407 Cannabem

28 Chubeze

168 Chartans

407 Chafuth

833 Caromon

448 Chaom

176 Cauar

355 Caruia

342 Capparus

199 Chatha

377 Cataf

444 Camedres uel Camedrios

333 Caniamus

31 Chalkile

168 Cardel

Cannabis

Cataputia maior

Cafat uel Gafit

Cabcalchar

855 Cheismi seu Keismi

342 Cenefen

130 Chelidomonthoma

135 Chitini

140 Ceterach

153 Childarum uel Kildarum

355 Cyromon

872 Cot

632 Cormub

1079 Condes

971 Corasteni

819 Codab

56 Condisf

141 Condisa

C

718

800

354

142

46

352

169

246

811

432

746

933

456

968

833

712

203

947

553

104

352

290

516

230

427

230

107

372

352

244

433

394

718

901

333

394

407

903

B

Bari
Barba Alfrigi
Baluum
Bazarachaton
Barbacus
Batheca
Bayalina
Basilica
Bazarichichen
Beremisch
Beragnes
Beiahalems
Brucia
Berfergnascen
Bedarungi
Besfarcoton

Bederangie

Bedarungi

Bedeguard

Berengesiff seu Belengesiff

Behen

Bengi

Bisberg

Bichor

Bizerichilem

Byonyon

Buchormarien

Bulef

Buleich

Britania

Buchormarien

Budeig

CHIL

I N D E X.

Curat	743	Gar Alexandria	397
Curcuma	107	Garch	589
Custaralber	333	Granum sterilitatis	1076
Cusiule	335		
Cusbera	115	H	
Chubes	609	Haur	1081
Cuchola	36	Harthanita	632
Chemps	609	Haboltanisa	965
Churtal	846	Harcharath	458
Cussum	803	Hafce	44
Cherbachen	407	Halacarta	458
		Hatar	942
		Halcula xys	47
	950	Harabdes	583
Dabach uel Dibach	654	Hades	630
Dausir	205	Haanthal	829
Damederias	541	Halgazar	444
Desbers	708	Habbagar	1074
Decka	25	Halanchat	909
Diphtamum	659	Haliabbis	458
Dochon		Hamehim	185
		Halcafmeg	448
	873	Hafpel	909
Elgarzaria	38	Hausig	978
Eradhiotica	135	Hausab	89
Elfoc	475	Handachocha	589
Euphorbium	116	Halsedep	75
Elposbur	335	Haraba	325
Erision		Hachille	620
		Haurronij	1083
	20	Hayron	1053
Fandenigi	38	Harbatum	381
Fandenigi	1076	Haxozalsacher	523
Famamchett	583	Halscia	342
Foenia	733	Halion	223
Fugel		Hafienis	448
		Hafach	340
	115	Hamcanella	96
Gad Dijabora, Cumbora curbur	1065	Hermodactylus	761
Gaur & Gar		Heifene	629

Herbum

I N D E X.

Herbum	625 Leum	1094
Heuftricon	75 Ligua arietis	227
Hele	950 Lifen Alhamel	227
Hefnin	342 Lifen Hafafir	1108
Helba	598 Lythos	589
Helleborus niger	475 Luf	776
Hezeriazen	820 Lubia	616
Humure Vraith	6	
Haama	12.20	
Humaal	319 Macharecaraha	458

I

Iabora	Machita	81
Iafim	Marua iantufa	10
Iaum	891 Mafmochra	769
Iefemin	172 Matricaria	194
Iergir	1090 Mesfeu Meifce	614
Iringi	564 Mefcatremephir	25
	104 Mefcatremefir	28
	872 Mezeheregi	299
	Mezereon	960
	Merzenium	34
	947 Mes	612
	230 Mellifigon	71
	137 Menem	786
	107 Meniten	114
	462.465 Molochia	366
	829 Muluchia	366
	609	
	140	
	290 Nabathi	335
	625 Narbathio	620
	137 Nard	988
	96 Nabamata	19
	1103 Nahanah	19
	1037 Nauoca	456
	833 Nalion	225
	115 Nanochach	875
	Napellus	475
	Nemen	416
	281 Nelifricon	75
	891 Norph	81

K

Kali		
Kaliber		
Kanturion		
Kauroch		
Karphs & Karphi		
Kandel		
Karfenne		
Kauturion		
Kerua fme Cherua		
Kefue		
Kibir		
Koreathalmi		
Kullot		
Kuman		
Kura		
Kufbor		

L

Ledon fme Ladanum		
Lephaa		

M

N

Ocinnum

I N D E X.

O
Ocimum nabati
Olba
Olibarda
Othomarathrum
Oximum maius
Oximum Carminum

P
Panax
Panicala
Paue
Pentadactylus
Pentafiler
Pinufer
Pomum Ancheninon

R
Ragis agreste
Ramech
Rastata
Relicammolo
Reofricon
Remeſcir
Ricinum pentadactylon
Rosa afinorum
Rorab

S
Scariola
Saber
Sadeb
Sadianalach
Sahater
Sabafaran
Sarax
Saricha
Sauchaurarin
Sanguosaro

Scaunix	118
Segir	140
85 Seniruton	435
597 Secacul	873
516 Secachut	399
427 Selien	730
84 Sege	140
84 Senation	96
Serriola	269
Sentus	10
430. 432 Selichi	485
873 Sefel	879
498 Sceilen & sceuen	672
290 Sccha	333
1076 Scchedenegi	352
583 Scenat	451
875 Sccha Romanum	335
Sccha aut Scchea	339
Scebra	399
41 Sin	1051
942 Sifnabar	41
199 Sicla syluestris	318
478 Seitaragi Indum	89
75 Solabar	555
423 Sonobar	1116
508 Scordium	749
583 Stebulot	1099
1053 Stechiterius	111
Steusir	423
269 Suffargel	1040
933 Sufui	335
70 Sufen	794
Surugen	761
1099 Succhaham	854
46 Sus	937
764 Succara aliq zuchara	
544 Scichara & Suchara	475
335	
342	
342 Taahaleb	

I

Tarcon

I N D E X.

Tarcon
Tarfa
Tanorus
Tarsene
Taraxacon
Thesific
Tilaphon
Tormos
Thuff
Tuffa
Turbit

V

Vebet
Vram
Vlla
Vchuen

458

654

820 Xabaer

335 Xaulmariam

270 Xaniuin

603 Xebeth

386

622

589 Zantor

1040 Zaror

299 Zaraund

Zaneni

Zaiton

451 Zinziber de Sem

786 Zinziber Caninum

825 Zinziber Caninum.

157

X

648

56

118

451

Z

45

1015

769

372

1062

172

92

931

I N D E X

31.
671.
863.
447.
38.
82.

1037.
1074.
1037.
1037.
807.

70.
746.
47.
794.
654.
1058.
640.
1090.
1047

1051.
1070.
1088.
746
1053
1058.
622.
10.
1053.
1053.
1043.
898.
722.
708.

קובוס 729.
קנה 1108.
קסוס
קצה 157.
קרניה 764.
קשאם 70.
6.

רומנא 833.
רוחם 21.
רמון 108.
רמונא 334.
334.

שכב
שוק 111.

שומשוק
שושן 892.
שיפון 746.
שמר 971.
שעורה
שקר 1099.
שקמא 953.
630.

תאנה
תאשור 733.
תדהר 70.
תום 733.
תומר 931.
הירוש 942.
הלתן 829.
תמיהא 607.
תמורה 355.
תמר
תפוח 733.

תפוח ירושלמי
הרכתור 833.
תרוין 825.
31.

X

X

ש

ת

לפת
לשון הצפור

מ

מולושה
מוריקא
מחול
מלוח
מלפניא
מגתא
מרר
מרר
מרורותא

נ

נהאלחמן

ס

סוגלי
סמלק
סנה

ע

ערמון
ערער
ערש

פ

פוגלא
פיגם
פילגא
פלפל
פעפ ין
פקעה
פרקדן
פשתה

צ

צגון

ק

קטיא
קיקיון
קלקמול

ושלם מורה מקום

INDEX NOMENCLATURAE

STIRPIVM HEBRAICAE.

1034.	הרר	א	אבטיחים
366.	הרני 833.		אגוז
	1093.		אגמון
988.	וורר 686.		אגס
988.	ווררא 1046.		אזוביון
988	מי ווררים 47.		אדרן
	645.		אדרן
1048	זג 1116.		אזוב
1062.	זית 47.		אטר
1057.	זמורה 978.		אזובא
625.	זין 47.	א	אלה
		1103.	אל ראיון
260.	ה		אלון
636.	חורח 933.		אמירתא
345.	חטה 1103.		אפרסקים
366	חלגלוגות 21.		ארז
1015.	חלמות 1030.		ארמל
636.	חמישיות 1116. 1119.		אשרה
104.	חנטה 536.		אתרג
6.	חרדל 1112.		
	חרול 1034.	ב	באשים
			בורית
1013.	טולש 1060.		בוריתא
630.	טלופחא 254.		בנא
	254.		בסר
892.	תאסמין 1047.		בצל
891. 892.	יברוח 1060.		ברוש
1058.	יין 738.		
630.	ימא 1119.	ג	גז
447.	ירבון		גזניות
			גמא
642.	ב		גפן
355.	בונחא 115. 116.		גדענים
455.	ביתנא 1027.		
455.	במון 686.		דכלה
764.	במונא 1057.		דורא
642.	ברכום 1058.		דחן
743.	בסמת 1051.		דחן
	ברש 891. 892.		דשא
		ה	
1081.	לבנח 659.		
1096.	לז 536.		
41.	למבא 678.		
334.	לענא 25.		

לפת

KKK

ELENCHVS IN HIERONYMI TRA- GI DE STIRPIBVS COMMENTARIOS CVRACIONES morborum indicans.

A

Abscessus quæ sanent 7. 138. 220. 220.
231. 273. 320. 367. 368. 370. 412. 420.
505. 644. 698. 755. 994. 1052. 1094. 1121.

Aculeos corpori infixos quæ extrahant
29. 84. 179. 389. 674. 701. 770. 873.
985.

Aculeatorum ictibus quæ opem ferant, 377.
372.

Aegilopas quæ sanent 306. 370. 673.

Alcole oris quæ sunt auxilia 32.

Alopecijs quæ remedio sunt 106. 710.
733. 740. 789. 1095.

Aluum quæ molliant, purgent, cieant
6. 76. 84. 121. 125. 157. 223. 261. 267. 284.
293. 319. 326. 401. 481. 559. 612. 630. 650.
712. 723. 739. 798. 846. 991. 998. 1028.
1044.

Aluum sistentia uel astringentia, 39. 70.
150. 169. 220. 228. 267. 273. 319. 392. 396.
533. 626. 654. 659. 985. 991. 993. 1013.
1058. 1090. 1103. 1117.

Ambustorum remedia, 76. 220. 228. 231. 356.
377. 420. 493. 545. 657. 795. 804. 865.
1006. 1041. 1062. 1112. 1126.

Anginis quæ prosunt, 25. 39. 336. 367. 502.
559. 565. 798.

Anthraces pestilentes sanantia, 109. 273.
420. 698. 795. 865.

Apoplexia quæ auxilio sunt, 59. 76. 202.

Apoplecticis quæ sint remedio, 202. 911.

Apostematibus quæ opem ferant, 244. 245.
264. 281. 401. 559. 596. 744.

Apostemata quæ emolliunt, 740. 910.
937.

Appetentiam cibi quæ moueant, 46. 996.
1028. 1035.

Araneorum moribus quæ opitulantur, 14.
25. 229. 322. 327. 343. 429. 449. 566.
590. 733. 1076.

Arterie asperæ quæ prosunt, 125. 508.
637.

**Articulis, articularijsq; morbis quæ succur-
rant**, 70. 109. 286. 346. 377.
459. 723. 755. 893. 945.

**Aspidum Venenis aut plagis quæ aduersen-
tur**, 1035.

Astmaticis quæ prosunt, 13. 44. 65. 105.
173. 343. 372. 435. 541.

Auditum restituentia, 228. 864. 911.

Auribus uermiosis quæ opem ferant, 17.
352. 449. 846. 968.

Aurium sonitus uel tinnitus quæ emendent,
39. 277. 740. 1052.

Aurium doloribus quæ medeantur, 22.
126. 135. 187. 228. 320. 337. 396. 827. 882.
1038. 1079. 1091.

Aurium fracturis quæ medeantur, 454.
657.

B

**Bilem tam flauam quam atram quæ detræ-
hant uel extinguant**, 48. 25. 141. 157.
192. 273. 284. 336. 541. 553. 776. 893.
1035.

Bilem suffusam quæ purgant, 150. 153.

Bilem per aluum trahentia, 290. 529. 566.
881.

Bilem purgantia, 320. 705. 723.
Cacoëthi

I N D E X.

C

- Cacoëthie is ulceribus duritissimè conuenientia,** 322. 777. 951.
- Calculus quæ quouis modo medeantur,** 150. 189. 306. 349. 361. 368. 389. 392. 393. 414. 428. 449. 529. 556. 610. 695. 735. 803. 864. 840. 865. 870. 911. 916. 991. 1020. 1059. 1104. 1114.
- Calculos renum quæ expellant,** 392. 401. 435. 463. 473. 4485. 26. 553. 701. 723. 972.
- Calculus uesticæ,** 526. 553. 680. 814. 1031.
- Canum morsibus quæ opitulentur,** 1091. 1094.
- Canis rabiosi morsus quæ sanant,** 7. 14. 22. 173. 176. 181. 200. 228. 231. 389. 429. 449. 747.
- Cancro quæ opem ferunt,** 228. 322. 360. 408. 473. 701. 705. 865.
- Capillos denigrantia,** 54. 804. 972. 1106.
- Capillos rufantia,** 1070.
- Capitis furfures tollentia** 84. 139. 206. 245. 249. 334. 367. 598. 747. 911. 1062.
- Capillum flauum quid faciat,** 838.
- Capitibus puerorum scabiosis quæ prosint,** 1073.
- Capillorum defluuijs quid medeatur, uide supra alopecias,** 231. 343. 534. 724. 934.
- Capitis destillationibus frigidis quæ medeantur,** 39. 206. 322. 384. 447. 596. 710. 795.
- Capitis doloribus quæ opem ferant,** 25. 32. 63. 71. 139. 151. 169. 200. 336. 383. 420. 454. 559. 739. 804. 864. 934. 992. 1006. 1031. 1059. 1091.
- Caput purgantia,** 114. 322.
- Capitis ardores reslinguentia,** 998.
- Caput tentantia,** 116. 261. 826.
- Catharrum incidentia,** 35. 51. 360. 1022. 1038.
- Carbunculis quæ medeantur,** 84. 228. 1006. 1095.
- Carcinomata quæ sanant,** 7. 56. 67. 109. 724.
- Cardiacis quæ sunt remedio,** 14. 35. 59. 343. 1058.
- Cerebrum corroborantia,** 21. 34. 42. 51. 66. 990.
- Cerebrum purgantia,** 105. 412. 650. 740. 901.
- Cholericis quæ conueniunt,** 320. 713. 978. 992. 1023.
- Cicatrices quæ tollant,** 17. 429. 821.
- Cicatricem uulneribus ulceribusque quæ obducant,** 141. 517. 608. 886.
- Cicutæ ueneno quæ medeantur,** 48. 446.
- Coeliacis quæ medeantur,** 125. 319. 706. 723. 955. 1101.
- Clysteres ex quibus conficiantur optime,** 13. 48. 141. 151. 192. 368. 598. 644. 705.
- Cholicis cruciatibus quæ opitulentur,** 48. 70. 141. 356. 456. 468. 551. 54. 723. 945. 953.
- Collectionibus quæ prosunt,** 151. 157. 192. 435. 447. 505. 598. 621. 623. 740. 877. 950. 1072.
- Comitiales excitantia,** 34. 72.
- Comitialibus quæ opem ferant,** 87. 13. 151. 169. 199. 370. 408. 559. 584. 590. 821. 873. 950. 1051. 1112.
- Concoctionem iuuantia,** 21. 56. 106. 336. 428. 454. 723. 931.
- Cor confortantia,** 13. 32. 236. 273. 521. 559. 965. 589. 990.
- Condylomatibus quæ opem ferant,** 1059.
- Contusis quæ medentur.** 48. 220.

I N D E X

Convulsis quæ medentur, 179.220.360.	Erysipelatis quæ imponantur, 109.
367.375.856.886.	116.121.220.273.307.352.383.392.463.
Grapulam quæ discutiant & impediunt, 1091	473.484.676.
Cutem commendantia aut emendantia, 177.273.290.429.623.724.795.819.821.1079.1020.	Epinyctidas quæ sanant, 1091.
Cutis faciei uitia emendantia 356.	Exulcerationibus quæ sint remedio 32.
623.755.795.1052.1091.	96.109.169.173.228.239.313.384.598.
Coxendicum inflammationes quæ extinguant, 267.911.	637.800.1115.1120.
Choleram purgantia 319.312	Epatis obstructionibus quæ medentur, 109.
329.	112.269.333.516.800.811.
Capitis ulcera manantia quæ sanant, 367.	Epatis inflammationes extinguuntia, 305.
795.1052.	306.307.320.383.387.554.559.698.823.
	850.972.1041.1049.
	Epaticis quæ ferant auxilium, 176.
	368.562.723.1065.1076.1090.1117.
	Excrecentias quæ absumant, 907.
	Epar corroborantia 993.

D

Dentium dolores sedantia, 39.59.109.
147.200.320.337.372.396.412.458.
855.856.858.870.882.968.982.1049.
1117.1126.
Dentium stupori succurrentia 384.
Dentes infirmos & mobiles quæ stabiliant, 911.1062.
Dentibus putridis quæ prosint 982.
Dentibus cauis quæ medentur 228.424.
Dysenterijs quæ conferunt, 54.169.
224.284.319.322.339.367.375.377.383.
396.504.693.695.706.707.800.803.
972.991.1025.1041.1053.1058.1106.
Dorsi doloribus quæ succurrant, 459.
481.
Dolores mitigantia, 150.151.261.336.596.
795.840.

E

Ebrietatem quæ arcent, 8041
Elephantia quæ medentur 228.
Enterocelis quæ conveniant, 169.693.

F

Faciei uitia quæ tollant & corrigant, 186
360.468.502.623.777.849.833.
Flatus quæ discutunt, 6.59.67.424.
1076.
Fastidia & nausæas inhibentia, 21.206.
337.504.622.
Faucium uitijs quæ opem ferant, 121.
162.367.384.
Faunorum ludibrijs remedium 584.
Febri tertianæ quæ opitulentur, 17.
76.228.239.
Febrium ardores restinguunt, 121.
264.269.273.367.377.420.559.698.
826.972.996.1044.
Febrium horrores algoresq; quæ abigant, 70.105.459.705.
Febribus frigidis quæ remedio sunt, 435.
Febribus putridis quæ sint remedio, 945.

864.
Febribus quæ medeantur, 14.199.220.
267.504.526.817.

Febribus

I N D E X.

Febribus pestilentialibus quæ sint auxilio, Genituram fluentem quæ inhibeant,

320. 424.

705.

Fœtum quæ expellant,

18. **Gingiviarum vitijs quæ medeantur,** 239.

Fœtus mortuos expellentia,

44. 392. 508. 840. 931. 934. 972. 991. 934.

25. 28. 141. 139. 169. 276. 189. 420. 435.

972. 991. 1020. 1076.

444.

Fœcunditas foeminis quomodo augetur, aut

Gutturis malis quæ auxilientur, 429.

restituitur

951. 1051.

Fluxiones quæ cohibeant, 109. 377. 504.

Gutturis asperitati quæ prosunt, 326.

698. 701. 1049. 1106.

Grumos sanguinis concretos quæ discutunt, 313. 322. 360. 473. 770. 1112.

Fistulis quæ auxilientur,

139. 408. **Gule atque lingue ardori quæ prosint,**

508. 522. 705. 800. 849.

1041.

Fistulas spiritalies pulmonis & thoracis

quæ purgant, 7. 56. 67. 231.

Fistulas quæ iuvent,

56. 109. 228.

Halitum grauem quæ corrigant, 454.

360. 934. 999.

673. 1120.

Formicas corporis quæ tollant, 608. 849.

Hæmorrhoidas quæ sanent, 740.

Frontis dolores mitigantia,

22.

Herpetas quæ sanent, 756.

Furfures quæ tollant,

249. 412.

228. 705.

1079.

Furiosis quæ opem ferant,

199. 411.

Hernijs quæ medeantur, uide Ramex. Et

Enterocle, 375. 1038.

Hydropicis quæ remedio sunt,

34.

G

Gangrenis quæ auxiliantur, 7392.

408. 424. 435. 623. 724. 821.

39. 66. 71. 112. 181. 206. 199. 273. 279. 300.

Genitalibus eorumq; morbis quæ meden-

tur, 54. 116. 162. 173. 179. 220. 231. 286.

621. 705. 934. 1038.

360. 435. 447. 454. 463. 529. 590. 608.

Genitalium inflammationibus quæ succur-

rant, 264. 307. 392.

610. 701. 733. 747. 798. 811. 830. 854.

Genitalium pruritus quæ sanent, 392.

1006.

910. 916. 945. 947. 958. 960. 998. 1051.

1075. 1121.

Genitalium tumores quæ discutunt, 695.

701. 789. 795.

Humores discutientia, 84. 141. 346.

428. 811. 881. 944.

Genituram quæ augeant,

744. 1076.

435. 739. **Ictericis quæ sunt remedio,** 129. 320.

463.

Genituram quæ absument uel extinguant,

223. 452. 698.

Iocinori & iocinerosis quæ medeantur,

257. 467. 873. 901. 910. 937. 945.

I

KKk in

Tocinris meatus que aperiant, 17. 138.

150. 533. 701. 880.

Iecoris obstructions tollentia, 41. 66.

67. 223. 141. 169. 360. 389. 446. 454.

463. 499. 504. 520. 955.

Ignibus sacris que medeantur, 109. 116.

121. 1126. 157. 169. 220. 228. 236. 257. 269.

306. 32. 4. 352. 367. 368. 383. 392. 420.

463. 475. 484. 493. 676. 719. 724. 795.

893. 978. 991.

Iliosif que conferant, 150.

1079. 1091.

Impetigines que sanent, 320. 408. 854.

1062. 1091. 1108.

Infantibus male affectis fouendis, 739.

858. 947.

Inflammationibus que conferant, 25. 32.

71. 121. 139. 157. 169. 192. 220. 229. 241.

273. 277. 286. 290. 307. 324. 368. 377.

454. 513. 520. 521. 564. 587. 637. 657.

701. 79. 755. 786. 827. 873. 877. 945.

998. 1006. 1028. 1117. 1126.

Inguinum doloribus que conferant, 309.

Infanientibus que auxiliantur, 136.

408. 739. 893.

Intestinorum uitij que conferant, 67.

468. 850.

Iocinoris obstructionibus que conferant, 84.

125. 179. 273. 279. 553. 623.

Iecur refrigerantia, 121. 162. 261. 377.

420. 501. 521. 690. 698. 765.

Intertrigines sanantia, 117.

Ischiadicis que medeantur, 106. 141. 76.

71. 89. 87. 125. 173. 186. 199. 223. 236. 264.

361. 424. 435. 505. 518. 623. 673. 701. 856.

882. 963. 968. 1066. 1081. 1091.

Iumentorū morbis conuenientia, 179. 1072.

Iumentorum oculis que medentur, 116.

Inflammationibus que profint, 277.

305. 367. 387. 475. 807.

L

Lac que augeant, 118. 236. 261. 367. 449.

601. 608. 640. 1076.

Lac elicentia 326. 451. 650.

Laterum doloribus que opem ferant, 73.

70. 176. 179. 281. 770. 821. 850. 856. 886.

1017. 1068.

Laſitudines que tollāt reficiātūe, 493. 1086

Lendibus que remedio ſunt, 747. 903. 956.

Lentigines que ſanant, 406. 705. 733. 821.

Lepras que emendant, 186. 245. 408. 673.

747. 901. 956. 1052. 1059. 1075.

Leporis marini uenenum que curent, 164.

1038.

Lethargicis que auxiliantur, 34. 25. 85. 87.

Lichenas que ſanant, 71. 139. 673. 1020.

1028. 1052. 1059. 1108.

Lienis obſtruccio meatus que aperiant,

7. 41. 66. 84. 141. 150. 269. 273. 333.

446. 463. 623. 705. 800. 813. 955. 1091.

Lienis inflammationibus que profint, 698.

Lienis uitij et lienofis opem ferentia, que

re ſpleneticis, 35. 89. 206. 199. 368. 488

504. 563. 873. 901. 956. 1090.

Lienem conſumentia uel extenuantia,

499. 553. 951.

Lipopſychia que ſint remedio, 136. 850. 972

Liuore s que tollant, 623

Loquela amiſſa quibus recuperetur, 34.

56. 1028.

Lumborum uitij que medeantur, 14.

6. 41. 84. 361. 675. 873. 865.

Lumbricos, uentris animalia que excutiant,

17. 141. 160. 186. 333. 339. 377. 479. 423.

630. 739.

Luxatis que opem ferant, 169. 224. 517.

637. 640. 654. 755. 795. 838. 1094.

M

Matricis tumoribus que ſint auxilio. 396

Matricis

I N D E X

- Matricis dolores sedantia**, 17. 28. 350. 177. 182. 334. 334. 343. 496. 701. *utiliter adhibentur*, 307. 343. 490. 800. 1076.
- Matricis obstructionibus que opem ferant**, *Mulierum superfluis humiditatibus que prosunt*, 343. 993.
- Maculas que corrigant**, 67. 84. 121. 264. 372. 401. 429. 499. 608. 698. 747. 819. 821. 849. 960. 1073. 1115.
- Mammarum inflammationibus uel collectionibus que conferant**, 264. 286. 307. 637. 1094.
- Mammarum duritias que emolliant**, 109. 463. 626. 789. 795.
- Mammis lacte à partu turgentibus que conserant**, 135. 630. 755.
- Mariscas que sanent**, 63. 109. 114. 231. 372. 414. 120. 505. 907. 934.
- Mammis eorumq; uitij que prosunt**, 3. 109. 182. 621. 640. 701.
- Melancholicis que conferant**, 13. 236. 239. 408. 428. 499. 533. 811. 846. 911. 956. 965.
- Memoriam que conseruent & augeant**, 21. 34. 66. 864.
- Meliceridas que sanant**, 396.
- Menstruas sanantia**, 48. 228.
- Membra que corroborent**, 21. 163.
- Menses que cohibent, sistunt, & augent**, 18. 25. 150. 228. 306. 383. 396. 479. 505. 693. 698. 1106.
- Mulierum albis mensibus que sunt remedio**, 50. 206. 447. 481. 596. 991.
- Menses que cieant trahant, & augent**, 14. 17. 34. 35. 41. 44. 25. 28. 32. 51. 54. 59. 63. 66. 76. 126. 118. 141. 138. 151. 165. 173. 179. 189. 273. 346. 260. 398. 401. 408. 428. 435. 439. 444. 447. 449. 463. 468. 533. 623. 701. 705. 733. 751. 788. 800. 803. 864. 873. 879. 886. 901. 947. 1076.
- Mures que necent**, 855. 1070.
- Muscas que necant**, 412. 798. 945.
- Muliebrium locorum inflammationi que**
- Narium uitij que medentur**, 126. 804. 1038.
- Nauseam cohibentia**, 21. 877. 1041.
- Nervos induratos que mollescant**, 35. 657. 765. 795.
- Nervis & nervorum resolutionibus alijsq; uitij que opem ferant**, 141. 286. 637. 755. 882. 1066.
- Nomas hoc est, putrida ulcera, & ad sanas partes serpentia que sanant**, 389. 724. 1038. 1049. 1072.
- O
- Oculorum cicatrices que eluant**, 264. 701.
- Oculorum albugines siue argema que emendant**, 389. 569.
- Oculorum tumores que tollant iuuant, & augent**, 35.
- Oculorum epiphoris que prosunt**, 989.
- Oculorum calliginem que tollant, & claritatem adferant**, 14. 25. 63. 66. 71. 109. 112. 126. 139. 261. 264. 273. 336. 389. 424. 449. 563. 596. 739. 931. 1059. 1079.
- Oculorum fluxiones que inhibeant**, 135. 187. 306. 377. 505. 650. 765.
- Oculis caligantibus que sint remedio**, 141. 424. 449. 849. 1079. 1081.
- Oculorum inflammationibus que auxilientur**, 35. 32. 121. 135. 147. 177. 220. 228. 236. 269. 290. 306. 307. 309. 360. 383. 463. 566. 596. 807. 827. 954. 991. 1059.

I N D E X.

- Oculis** que confrant in genere et eorum uitijs que medentur, 7. 84. 223. 244. 255. 372. 637. 733. 776. 798. 808.
- Oculorum** ulcera & scabiem que tollant, 864. 931. 1022. 1075. 1120.
- Oculorum** suffusioni remedio que sint, 112. 972.
- Oculorum** prurigines sedantia, 36. 823.
- Opisthotonicos** que leuant, 873.
- Orthopnoicorum** auxilia, 44. 173. 420. 693. 880. 888. 901. 1041. 1065.
- Oris** suauitatem quibus contrahas, 1035.
- Oris** ulcera & uitia que sanent, 14. 25.
- Oris** Ardores que emendent, 239.
- Osibus** fractis extrahendis que conueniant, 241. 821.
- Pectoris** uitijs que medentur, 7. 84. 223. 244. 255. 372. 637. 733. 776. 798. 808.
- Pectus** purgantia, 13. 17. 118. 1031. 1075.
- Perfrictionibus** membrorum que medeantur, 417. 907.
- Peripneumonics** que auxiliuntur, 39. 367.
- Phlegmata** que trahant pellantue, 880.
- Pedum** rimas que tollant, 911. 1075.
- Pediculos** enecantia, 249. 334. 412.
- Pesti** seu pestilentie que medeantur, 70.
- Phtiriasi** que medentur, 903.
- Phagedena** Germanis der trurm / 7. 109.
- Phthificis** que medeantur, 199. 228. 367. 736. 864. 1117.
- Phreneticis** que remedio sunt, 42. 119. 121. 125. 169. 377. 383. 698. 849.
- Pituitam** que trahant, 39. 206. 273. 290. 449. 516. 541. 733. 775. 830. 864. 846.
- Papulas** sanantia, 247. 290. 320. 414. 893. 931. 1028. 1073. 1075. 1088. 1098.
- Pleuriticis** que sint remedia, 7. 54. 138. 173. 244. 424. 428. 473. 589. 698. 701.
- Paralyticis** que conueniant, 59. 85. 199. 765. 821. 954. 968.
- Paronychias** que succurrant, 309.
- Parotidas** que sanent, 85. 106. 169. 179. 306. 356. 630. 712. 873. 951.
- Partus** que accelerent uel inuent, 770. 880. 931.
- Partus** mortuos, & abortus que extrahant uel pellant, 499. 563. 623. 821. 902. 947. 1072.
- Partus** enecantia, 1065.
- Parturientibus** que utiliter dantur, 398. 454.
- Pituitam** que trahant, 39. 206. 273. 290. 449. 516. 541. 733. 775. 830. 864. 846.
- Pleuriticis** que sint remedia, 7. 54. 138. 173. 244. 424. 428. 473. 589. 698. 701.
- Podagrarum** remedia, 25. 36. 141. 220. 271. 273. 352. 377. 408. 424. 557. 563. 630. 640. 689. 723. 755. 945. 954. 968. 999. 1083.
- Porriginis** emendantia, 54. 84. 206. 334. 598.
- Pracordiorum** malis que subueniant, 991.
- Aduersus** Prestigias demonum & tempestates que profunt, 76. 169.
- Profluuium** mulierum alba que inhibeant, 54. 125. 126. 392. 955. 956.
- Profluuium** Alui que sistunt, 673. 693. 1013. 1017. 1025. 1028.

I N D E X.

- Pruriginis sanantia*, 71. 689. 903. *Renum morbis que conferant*, 17. 66. 72.
Pforas que sanent, 48. 245. 903. 907. 150. 199. 333. 367. 368. 377. 383. 499. 520.
 1052. 1059. 562. 765. 853. 937. 1051. 1091. 1098.
Pueris quid medicamenti tuto dari possit, *Regio morbo que medeantur*, 59. 78. 141.
 673. 1104. 138. 169. 322. 333. 360. 428. 495. 499.
Pulices que enecant aut fugant, 25. 92. 139. 504. 533. 553. 608. 712. 765. 773. 800.
 169. 708. 1986. 811. 817. 830. 877. 884. 907. 910. 934.
Pulmonum uitijis que opitulantur, 41. 945. 955. 1071. 1114. 1121.
 56. 65. 118. 138. 150. 179. 199. 220. 241. *Reumatismos cohibent*, 39. 206. 389. 1065.
 346. 367. 372. 424. 435. 454. 533. 541. *Ructus abolentia*, 604.
 565. 610. 701. 704. 736. 744. 776. 937. *Acida ructantibus utilia*, 626.
 945. 1051. 1090. 1120. *Ruptis que subueniant*, 17. 48. 138.
Pulmonum Inflammationibus que profunt 176. 179. 220. 241. 255. 360. 424. 484.
 70. 269. 501. 650. 765. 808. 513. 811. 856. 886.
Pudendorum tumoribus que sunt auxilio, *Renes purgantia*, 223. 306. 346. 389.
 32. 109. 121. 173. 273. 309. 596. 640. 516. 695.
Pulmonis obstructionibus que conferunt,
 66. 446. 504. 955. 1031.
Purulenta excreantibus que conferant,
 858. 880. 1120.
Purgantia optime & sine periculo, 965.
 966.
Pustulas que inhibeant sanentur, 14. 71.
 112. 162. 231. 264. 273. 420. 623. 698.
 795. 811. 905. 1062. 1066. 1091.
Pustulas ab urtica excitatas quid sanet, 7.
Puerperas que purgant, 150. 179. 429.
 776. 1066.

Q

- Quadrupedibus à serpentibus demorsis*,
 quid conferat, 553. 1121.
Quartanis conferentia, 76. 228. 239.
 408. 541. 553. 849. 864.

R

- Ramici conferentia*, 484. 511. 640. 776.
 882.

- Sanguinem mingentibus que utilia sint*,
 228. 693. 823.
Sanguinem concretum que discutiunt, 44.
 146. 424. 35. 176. 313. 401. 473. 479.
 481.
Sanguinem excreantibus utilia, 21. 41.
 42. 76. 138. 173. 228. 241. 383. 392. 511.
 604. 637. 693. 955. 1031. 1038. 1053. 1079.
 1090. 1091. 1101. 1103.
Sanguinem que sistant, 322. 349. 375. 499.
 511. 604. 693. 877. 934. 947. 1106.
Sanguinem purgantia, 56. 121. 236. 508.
 765. 813. 864. 956. 965. 1028.
Sanguinem que exigunt, 7.
Sagittas infixas extrahentia, 29. 762.
Scabiei que medentur, 14. 48. 71. 84.
 112. 121. 186. 220. 245. 412. 499. 505. 623.
 630. 724. 854. 901. 903. 937. 963. 982.
 1062. 1108.

- Spasmo que conferant*, 25. 408. 468.
 882.

I N D E X.

- Scorpionum ictibusque sint remedio*, 14.
 25. 105. 269. 327. 343. 429. 449. 566.
 650. 733. 795. 865. 1065.
Secundinas extrahentia, 44. 51. 66. 141.
 18. 25. 28. 147. 169. 346. 360. 444. 499.
 563. 821.
Sedis rimis que utilia, 849.
Sedis procidentia que profunt, 1013. 1041.
 1047.
Sedis uitis quibus suis utilia, 286. 596. 695.
 991.
Serpentium ictibus, et uenenis que medentur
 42. 25. 169. 173. 176. 186. 228. 389. 428.
 430. 441. 449. 498. 499. 518. 553. 701.
 705. 733. 747. 821. 882. 886. 954. 963.
 973. 998. 1099.
Serpentes quibus fugentur abiganturue,
 18. 119. 169. 1075. 1122.
Singultus que inhibeat, 21. 35. 44. 105.
 451. 454.
Situm que exstinguant, 454. 501. 521. 710.
 834. 993. 996. 1020. 1038. 1051.
Somnos que concilient, 161. 264. 705.
 136. 384. 475.
Spirandi difficultatibus que conueniant,
 70. 118. 533.
Spleneticis que profunt, 719. 933. 910.
 945. 968. 1121.
Stomacho aestuanti que profunt, 261.
 264. 269. 271. 273. 320. 392. 449. 463.
 484. 719. 823. 834. 937. 972. 1038. 1059.
Sternutamenta que cient, 34. 35. 51. 85.
 87. 401. 412. 650. 893. 901.
Syncope que conferant, 56. 138. 202.
Stillicidio urine que conferant, 444.
 590. 701. 884. 1081.
Stomacho eiusque morbis medentia, 17. 21.
 50. 105. 116. 150. 173. 176. 199. 327. 336.
 383. 446. 454. 463. 598. 723. 934. 991.
 1031. 1041. 1075. 1120.
Stranguria que auxiliantur, 42. 54. 62.
 169. 533. 695. 807. 833. 836. 880. 882. 884.
Strumis que commodant, 85. 229. 484.
 495. 505. 613. 640. 673. 873. 893. 907.
 969.
Sudores mouentia, 17. 56. 160. 333. 435.
 459. 770. 864. 963.
Sugillata que tollant, 865.
Singultibus que medentur, 35. 44. 105.
 451. 454.
Suibus lienosis aut aliter affectis eorum
morbis quid medeatur, 541. 533. 955.
Suspiriosis que prestent opem, 39. 32.
 56. 84. 138. 150. 173. 300. 770. 775. 808.
 823. 884. 910. 1091. 1120.
- ## T
- Tabidis que salutaria*, 1120.
Tormina cohibentia, 6. 367. 424. 446.
 451. 481. 659. 693. 879. 910. 1031. 1112.
Tremoribus membrorum que sunt auxilia,
 56. 59.
Thymos que tollant, 1059.
Tarmos a carnibus abigentia, 92. 116.
Thoracis malis que opem ferant, 173. 501.
 965. 937.
Tela infixae extrahentia, 84.
Thoracis uitia que educant, 105. 241. 701.
 704. 744. 881. 1090.
Tineae uentris que pellant, 21. 39. 44.
 71. 116. 118. 141. 157. 336. 516. 545. 623.
 747. 751. 854. 911. 945. 1022. 1031. 1038.
Testium inflammationibus que sint reme-
dio, 106. 136. 795.
Tineae uestimentorum quo modo repellan-
tur, 334. 337. 361.
Tonsillis que medentur, 934. 1010.
 1052.
Torminibus que medentur, 6. 34. 25. 70.
 105. 109. 118. 141. 148. 165. 181. 408. 511.
 564.

INDEX

564. 598. 701. 747. 864. 879. 931. 945. *Vesicam expurgantia*, 66. 78. 84. 150. 199.
 996. 1065. 1075. 223. 306. 333. 347. 346. 520. 596. 610. 1066.
Tubercula quæ sanare possunt, 893. 901. *Ventrem mollientia uel soluentia*, 159.
 907. 951. 1044. 1051.
Tumorum remedia, 784. 100. 119. 151. 153. *Vterum fouentia*, 25. 87. 151. 199. 446.
 165. 173. 192. 229. 269. 284. 290. 324. *Vterum purgantia*, 66.
 370. 424. 435. 454. 505. 513. 533. 601. *Vertigini quæ opitulentur*, 59. 135. 408.
 613. 621. 630. 657. 701. 719. 786. 945. 864. 877. 1073.
 954. 1086. 1108. 1126. *Ventriculi doloribus quæ opem præstant*,
Tumoribus tonsillarum quæ conferant, 67. 199. 1091.
 105. 637. 840. 1049. *Venerem quæ stimulent uel fatigatam repa-*
Tussi frigida quæ opem ferant, 7. 352. *rent, & gratiorem reddant*, 6. 21. 46.
 435. 105. 444. 520. 562. 731. 786. 901.
Tussi quæ conferant, 7. 32. 39. 54. 63. 65. *Venerem quæ inhibeant*, 261. 383. 786.
 70. 84. 115. 173. 206. 244. 264. 343. *Verrucas quid pellat tollatue*, 32. 44. 72.
 367. 449. 598. 637. 654. 704. 776. 803. 96. 293. 414. 608. 849. 911.
 808. 821. 823. 884. 901. 937. 1022. 1075. *Ulceribus manantibus quæ opitulentur*,
 1091. 179. 306. 375. 398. 608. 626. 630. 707.
Tussi inueterate quæ sint remedio, 798. 770. 786. 945. 1025.
 880. 882. 886. 910. 976. 1028. 1051. *Vulnera tam externa quàm interna quæ cura-*
 1097. 1120. *gant, & abstergant*, 6. 67. 76. 92. 84.
 109. 138. 435. 479. 489. 511.
V *Ulceribus uetustis quæ prosunt*, 141. 151.
 179. 372. 412. 490. 707. 838.
Varos quæ emendent, 821. *Ulcera quæ purgant*, 179. 306. 360. 517.
Venenis aut uenenatorum ictibus aut mor- 705. 744. 821. 882. 960. 1121.
sibus quæ aduersentur, 17. 42. 28. 54. *Ulcerebus quæ commodant*, *quauis ex*
 105. 176. 181. 202. 236. 389. 396. 435. *causa*, 44. 182. 241. 370. 698.
 454. 534. 590. 775. 777. 864. 972. *Ulcera aut Vulnera quæ replcant, aut glu-*
 1104. *tinent*, 141. 138. 151. 202. 200. 241. 257.
Venenosa animalia fungantia, 18. 343. 323. 375. 479. 511. 934. 1104.
Venenis resistentia, 44. 56. 70. 76. 84. *Vulneribus uenenosis feris, uel ferro factis*
 138. 165. 173. 179. 199. 236. 255. 336. 392. *quæ sunt remedio*, 29. 54. 139.
 424. 428. 435. 449. 451. 451. 454. 503. *Ulcerebus serpentibus, & depascentibus*
 504. 533. 589. 701. 731. 746. 747. 751. *quæ auxiliantur*, 85. 228. 257. 306. 508.
 770. 800. 813. 854. 865. 1051. 1075. 1120. 724. 777. 978. 980. 1091.
Veneficiorum amoris amuleta, 360. 363. *Ulcera & uulnera maligna, & difficilia,*
 979. *& deplorata quæ sanant*, 29. 109. 169.
Ventrem sistentia, 71. 165. 339. 620. 991. 179. 255. 323. 408. 430. 501. 554. 795. 809.
 1015. 1040. 865. 882. 911.

I N D E X

- V**mbilicis prociuis uel eminentibus In fan Vitiliginibus quæ succurrant, 408. 78.
tium quid proſit, 169. 882. 968. 1052. 1066.
- V**nguim ſcabriem quæ tollant. 356. **V**ulneribus quæ medeantur, 7. 277.
414. **V**ulneribus quæ conferunt uarijs modis,
21. 387. 392. 417. 522.
- V**omicis quæ Vtilia, 21. **V**ulnera quæ purgant, 6. 277. 755.
Vomitiones quæ cohibeant qualescunq; 22. 25. 206. 392. 996. 1042. **V**uluarum ſtrangulati aut preſocationi
quæ creant uel faciles reddūt, 65. 153. 290. 293. 300. 412. 451. 633. 733. 14. 199. 882.
- V**rina difficultatibus quæ medeantur, 78. **V**lcera inueterata & putrida pedum ſanant
125. 206. 224. 343. 398. 424. 439. 659. 776. 777. 1091.
- V**rinæ difficultatibus quæ medeantur, 78. **V**lcera quæ emolliunt atq; maturant, 372.
788. 814. 877. 945. 947. **V**uluis inflammatis, contractis uel duris,
uel Inſtatis quæ conferant, 157. 356.
54. 63. 76. 84. 105. 118. 189. 306. 360. 416. 372. 563. 766. 991.
- V**rinæ quæ cieant trahaturūc, 6. 17. 34. 32. **V**uluis quæ utilia & earum uitia emendas
439. 444. 449. 451. 454. 526. 532. 589. 610. 625. 659. 723. 747. 763. 821. 854. 87. 590. 805. 880. 921. 947. 1066.
- V**rinæ quæ cieant trahaturūc, 6. 17. 34. 32. **V**iperarum leſibus quæ opem ferant, 389.
54. 63. 76. 84. 105. 118. 189. 306. 360. 416. 429. 493. 604. 626. 637. 747. 992.
- V**rinæ quæ cieant trahaturūc, 6. 17. 34. 32. **V**uluis quæ utilia & earum uitia emendas
439. 444. 449. 451. 454. 526. 532. 589. 610. 625. 659. 723. 747. 763. 821. 854. 87. 590. 805. 880. 921. 947. 1066.
- V**rinæ quæ cieant trahaturūc, 6. 17. 34. 32. **V**iperarum leſibus quæ opem ferant, 389.
54. 63. 76. 84. 105. 118. 189. 306. 360. 416. 429. 493. 604. 626. 637. 747. 992.
- V**rinæ arenofæ remedia, 125. **V**uluis quæ utilia & earum uitia emendas
439. 444. 449. 451. 454. 526. 532. 589. 610. 625. 659. 723. 747. 763. 821. 854. 87. 590. 805. 880. 921. 947. 1066.
- V**rinæ quæ conferunt, 383. 607. **V**iperarum leſibus quæ opem ferant, 389.
54. 63. 76. 84. 105. 118. 189. 306. 360. 416. 429. 493. 604. 626. 637. 747. 992.
- V**ue in faucibus quæ auxilientur, 7. **V**uluis quæ utilia & earum uitia emendas
439. 444. 449. 451. 454. 526. 532. 589. 610. 625. 659. 723. 747. 763. 821. 854. 87. 590. 805. 880. 921. 947. 1066.

T

V

Aſſe rā ſiā rā ſiā rā ſiā

DAVID KYBERVS, CANDIDO

Lectori.

¶ Vm nemo adeo oculatus sit, ut non interdum inter legendum quedam prætereat, ignoscent nobis (ut speramus) studiosi, si quando & in hoc opere errata aliqua deprehenderint, quæ tamen tanta non sunt, ut uel mediocriter doctum hominem remorari possint. Annotauimus uero nonnulla ex his quæ impedimento legentibus esse posse putabamus. Tuum erit candide Lector labores nostros candidè interpretari. Vale,

| Folio: | linea. | lege |
|--------|--------|--------------------------|
| 6. | 2 & 3. | Ocimi. |
| 11. | 24. | Quamobrem pueri, qui &c. |
| 14. | 10. | desessionibus. |
| 25. | 12. | decoctione aut decocto. |
| 26. | 19. | Conradus |
| 32. | 30. | internettoni |
| 38. | 1. | stellatorum |
| 46. | 14. | ille |
| 50. | 14. | Germani |
| 51. | 15. | tam |
| 63. | 30. | multorum |
| 57. | 6. | Filix saxatilis. |

Alicubi etiam Empiræa male scriptum est pro Emparia. ¶ Voce erosionis interdum non proprie usi sumus, substituatur ergo in locum eius, affectio, uel, uitium, aut aliquid tale &c. Reliqua prudens Lector facile per se corriget.

¶ In Prefatione D. Gesneri hæc sunt errata:

| | Facie | linea | lege |
|------|-------|-------|--------------------------------|
| b 1. | 1. | 7. | medice |
| | 2. | 11. | Tarentinus |
| | 2. | 15. | ceteris. |
| 1. | 1. | 1. | Apollodorus, &c. & Apollonius, |
| | 2. | 6. | magis |
| 3. | 2. | 15. | adde, potius |
| | | 16. | petunt |
| 4. | 1. | 33. | Epicharmi. |

Acanthus seu Branca urstina Italica uero.

Welsch Berenflaw.

Pertinet ad Caput CXIII. secundi libri.



INDEX CHARTARVM.

a b c d A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.
A a B b C c D d E e F f G g H h I i K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t V v
X x Y y Z z. A A B B C C D D E E F F G G H H I I K K L L M M N N
O O P P Q Q R R S S T T V V X X Y Y Z Z. A A a B B b C C c
D D d E E e F F f G G g H H h I i K K k.

ARGENTORATI

Excudebat Vuendelinus Ribelius, Anno

M. D. LII.

